This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

+ *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.

+ *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.

+ *Beibehaltung von Google-Markenelementen* Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.

+ *Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität* Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter `http://books.google.com` durchsuchen.

LANE MEDICAL LIBRARY STANFORD
D748 .L56 1851 STOR
Schul-Naturgeschichte : Eine analytische
24503295255
D748
L56
1851

Antiquarium
von W. J. Peiser
Berlin, Ritterstr. Friedrichs St.
Ecke d. Georgen-Str.

LANE
MEDICAL

LIBRARY

Gift of
Mrs G. Schitt.

Schul-Naturgeschichte.

Eine

analytische Darstellung der drei Naturreiche,

zum Selbstbestimmen der Naturkörper.

Mit vorzüglicher Berücksichtigung
der nützlichen und schädlichen Naturkörper Deutschlands
für
höhere Lehranstalten
bearbeitet
von

Johannes Leunis,
Professor am Josephinum in Hildesheim und Mitgliede mehrer naturhistorischen Gesellschaften.

Erster Theil.

Zoologie.

Zweite verbesserte und vermehrte Auflage.
Mit 250 Abbildungen auf 190 Holzstöcken.

Hannover.
Hahn'sche Hofbuchhandlung.
1851.

B

LAW LIBRARY

L56
1851

Vorrede zur zweiten Auflage.

Die freundliche Aufnahme, welche meine Schul-Naturgeſchichte an Unterrichtsanſtalten gefunden hat, machte ſchon nach anderthalb Jahren vorliegende*) neue Auflage nöthig, welche faſt auf jeder Seite Verbeſſerungen und Zuſätze erhielt. Dieſe ſind als das Ergebniß meiner Erfahrungen beim Unterrichte ſelbſt anzuſehen und beſtehen vorzüglich darin, daß ich **1.** das Selbſtbeſtimmen der Thiere durch Holzſchnitte bei den ſchwierigſten Abtheilungen zu erleichtern ſuchte; **2.** die Charaktere ſchärfer faßte und **3.** die analytiſche Behandlung des Stoffes noch mehr vorherrſchen ließ. Da die Weichthiere nach ihrer innern Organiſation geordnet werden mußten und dadurch manche, äußerlich ſehr ähnliche Conchylien-Gehäuſe weit von einander getrennt wurden, ſo fügte ich im §. 221. eine analytiſche Überſicht der Gehäuſe dieſer Thiere hinzu ohne Rückſicht auf den innern Bau, um dadurch das Beſtimmen der Conchylien zu erleichtern. Auch durch den Druck wurde die Ueberſichtlichkeit noch mehr gehoben. Die frühern §§. wurden beibehalten, damit beide Ausgaben gleichzeitig beim Unterrichte in derſelben Schulklaſſe gebraucht werden können. Die Holzſchnitte dieſer Ausgabe, welche nur das dringendſte Bedürfniß befriedigen ſollen, ſind zu obigem Zwecke in einem beſondern Supplementhefte zur erſten Ausgabe erſchienen und ſo eingerichtet, daß ſie auch zu jedem andern Schulbuche der Naturgeſchichte benutzt werden können. Der Hauptzweck des Buches erforderte ein genaues Regiſter, auf welches denn auch die größte Sorgfalt verwendet, und ſo ein Inhaltsverzeichniß entbehrlich gemacht wurde.

Ueber die Art der Benutzung dieſes Buches habe ich mich in der Vorrede zum zweiten Theile (Botanik pag. IV.) ausführlicher ausgeſprochen und beſonders hervorgehoben, daß bei Beſtimmungen von Naturkörpern in folgender Reihefolge: **1.** die Klaſſe, **2.** die Ordnung, **3.** die Familie, **4.** die Gattung und endlich **5.** die Art aufgeſucht werden muß; weshalb denn auch von den höhern Abtheilungen immer durch §§. auf die tiefern hingezeigt wurde. Schüler, welche die im §. 23. analytiſch dargeſtellten Klaſſen mit deren Repräſentanten, ſo wie die Ordnungen und Familien, auf welche von dort aus hingewieſen iſt, genau kennen, ſind auch ſchon, etwa noch mit geringer Nachhülfe des Lehrers in

*) Die erſte Abtheilung, welche die Wirbelthiere enthält, erſchien bereits im October 1850.

43390

schwierigern Fällen, zum Selbstbestimmen von Naturkörpern befähigt. Einige Beispiele mögen das Angedeutete hier noch erläutern.

1) Es sei Mustela erminea zu bestimmen. — Die **Klassenübersicht** (§. 23.) zeigt, daß wir wegen des behaarten, vierbeinigen Körpers ein Säugethier vor uns haben, welches nach der **Uebersicht der Ordnungen** (§. 26 a.) zu den Zehensäugethieren und zwar zu den Raubthieren gehört, da dasselbe 3 Zahnarten hat, freie, nicht in einen Beutel eingeschlossene Bauchzitzen und weder Hände noch Flughäute. Die **Familienübersicht** (§. 26 b, IV.) setzt dies schlüsselbeinlose Thier wegen der Zahnformel, wegen des Ganges auf den Zehen und wegen des gestreckten Körpers und der unbeweglichen Krallen zu den Mardern, unter welchen sich das zu bestimmende Thier dann nach der Uebersicht der Gattungen (§. 36, 15) als Mustela und nach §. 37, 15 durch Bildung und Färbung des Schwanzes als Mustela erminea oder **Hermelin** charakterisirt.
2) Es sei der schwarze Storch zu bestimmen. — §. 63. zeigt, daß der fragliche Vogel wegen der Beine, welche länger sind, als der Rumpf, zu den Sumpfvögeln gehört; §. 63 b, VII. stellt ihn wegen der Bildung des Schnabels zu den Reihern und §. 78, 25 läßt ihn als Storch, §. 79, 25 als schwarzen Storch erkennen.
3) Es sei einer, unter der Borke eines Zwetschenbaumes gefundener Käfer zu bestimmen. — §. 23. stellt das gefundene Thierchen wegen der 6 gegliederten Beine zu den Insekten; §. 124 b. zeigt daß dies Insekt der hornigen Flügeldecken wegen zu den Käfern gehört, unter denen wir als Repräsentanten den Maikäfer schon kennen. Nach §. 126. gehört dieser Käfer wegen der 4 Tarsen an allen Füßen zur III. Abtheilung und zwar wegen des rüsselloſen Kopfes und der Fühler mit kugligem Knopfe zu den Holzfressern. Endlich weiset ihn §. 127, 13 als echten Borkenkäfer aus der Gattung Splintkäfer (Eccoptogaster Fig. 77 b.) nach, dessen Art in §. 140, 76 als Zwetschen-Splintkäfer charakterisirt ist. Bei einiger Uebung und vorheriger Durchsicht der Abbildungen wäre dieser Käfer auch schon sogleich unter den, in der Botanik (II. §. 112, 3) beim Pflaumenbaume angegebenen Insekten als Eccoptogaster pruni herausgefunden.

Die analytische Methode besteht in der Subordination der Merkmale, weshalb in den Uebersichten beim Bestimmen keins der angegebenen *Merkmale ohne Prüfung* an dem fraglichen Thiere überschlagen werden darf,

wenn man ſicher zum Ziele gelangen will, welches dann auch um ſo ſicherer erreicht werden kann, weil die Ueberſichten den Unterſchied zwiſchen den verwandten und ähnlichen Thieren überall kurz angeben und auf ſolche Weiſe ſchnell eine genaue Prüfung und dadurch eine richtige Beſtimmung des fraglichen Thiers ermöglichen.

Schließlich ſei dieſe neue Auflage der freundlichen Beachtung der Schulmänner angelegentlichſt empfohlen vom

Hildesheim, im September 1851. **Verfaſſer.**

Vorrede zur erſten Auflage.

Meine Anſichten über naturgeſchichtlichen Unterricht an Schulen habe ich in der Vorrede zu meiner *Synopſis*, welche dem minder bewanderten Lehrer auch als Commentar zu dieſer Naturgeſchichte dienen kann, ausgeſprochen und ich bemerke hier nur noch, daß die Schul-Naturgeſchichte ebenfalls nach den dort ausgeſprochenen Grundſätzen, welche auch bei den geachtetſten Schulmännern Anerkennung gefunden haben, bearbeitet iſt. Auch dies Werk hat den Hauptzweck, den Schüler in *die Natur ſelbſt einzuführen*, ihm durch Überſichten (denn ohne Überſicht keine Einſicht) das Auffaſſen zu erleichtern und ihn ſo zur eigenen Thätigkeit, zum *Selbſtbeſtimmen*, anzuleiten. Kurze, ſchematiſirte Charaktere ſind nach meinen 24jährigen Erfahrungen das beſte Mittel zu dieſem Zwecke. Sie zeigen ſogleich auf den erſten Blick, worauf es beim Beſtimmen vorzüglich ankommt, erleichtern die Vergleichung mit den vorhergehenden und nachfolgenden Charakteren, und wirken ſo der leicht überhand nehmenden Speciesjagd entgegen. Ornithologie, Entomologie und Conchyliologie nebſt Petrefaktenkunde mußten deshalb hier vorzüglich berückſichtigt werden, weil ſie überall zur Erreichung meines Zweckes die meiſte Gelegenheit bieten. Die hier, obwohl im andern Sinne angewandte Regel: „divide et impera“, machte es mir möglich, auf ſo beſchränktem Raume das hinreichende Material zu liefern. Daß ich die lateiniſche Nomenclatur auch hier vorherrſchen ließ und vorherrſchen laſſen mußte und daß ich die nöthigſten Auctoritäten hinter den Namen anführte, wird Keiner tadeln, der wiſſenſchaftlichen Sinn hat und weiß, daß wir in unſerer Mutterſprache für die *meiſten wirbelloſen* Thiere entweder noch gar keine oder nur faſt ganz unbrauchbare Namen haben. Wer möchte z. B. nicht die für Alle, welche ſich wiſſenſchaftlich mit Naturgeſchichte beſchäftigen, verſtändlichen *lateiniſchen* Namen Zabrus gibbus, Tenebrio molitor, Haltica ne-

morum lieber wählen, als die von Sturm vorgeschlagenen deutschen: Buckel-Rückenlaufkäfer, Müller-Dunkelschattenkäfer, Wald-Springblattkäfer? Sollen deutsche Namen wissenschaftlichen Werth haben, so müssen sie nur für einen bestimmten Naturkörper gebraucht werden. Für welche Pflanze will man aber den Namen „Je länger je lieber“ in Anspruch nehmen und welcher von den dreiundzwanzig in dem volksthümlichen Lexikon von Heinsius für Arnica montana angeführten Namen soll gewählt werden? In dem Hauptwerke über europäische Schmetterlinge von Ochsenheimer und Treitschke finden wir von den für unsere Sommer- und Wintereiche geschmiedeten Namen folgende zu Schmetterlingsnamen benutzt: Busch-, Frucht-, Gallen-, Grün-, Hart-, Hasel-, Hag-, Kahn-, Loh-, Roth-, Schwarz-, Stiel-, Stein-, Trauben-, Vier-, Woll- und Zwergeiche. Die meisten dieser Namen sind werthlos. Soll eine Eiche Kahneiche genannt werden, weil man aus derselben Kähne macht, so darf ich auch die Namen Prügeleiche, Häusereiche, Tonneneiche u. s. w. bilden!! Ein Nomen sollte in der Naturgeschichte auch immer ein Omen haben, d. h. irgend eine unterscheidende Eigenschaft eines Naturkörpers bezeichnen; da dies aber, besonders im niedern Thierreiche schwer ausführbar ist, so müssen wir hier die reinwissenschaftlichen, lateinischen Namen beibehalten, weil es immer besser ist, für einen Naturkörper gar keinen deutschen Namen, als einen sinnlosen zu haben, deren wir leider schon zur Genüge besitzen. Die deutschen oder Trivialnamen haben deshalb, wie Prof. Ratzeburg in seinem Werke über Forstinsekten treffend bemerkt, nur da Werth, wo sie auch von Laien in der Naturgeschichte allgemein gebraucht werden oder wenigstens für dieselben brauchbar sind, und in diesen Fällen sind auch von mir die deutschen Namen überall beigefügt.

Die am leichtesten auffindbaren Merkmale wurden von mir immer vorzüglich berücksichtigt; daß indeß bei dem niedern Thierreiche, namentlich bei den Insekten, oft auch weniger augenfällige gewählt werden mußten, findet in der Natur der Sache selbst seine Entschuldigung und kann dem Lehrer den Unterricht nicht erschweren, sobald er nur vergrößerte Abbildungen von den Hauptmerkmalen auf Tabellen gezeichnet in der Schule aufhängt oder solche zum Nachzeichnen an die Tafel zeichnet.

Daß dieser Abriß nicht zu der übergroßen Zahl unzweckmäßiger und unbrauchbarer Anleitungen gezählt werden möge, ist der sehnlichste Wunsch des

Verfassers.

Verzeichniß

der als Auctorität (§. 9.) angeführten Schriftsteller.

(Von den naturhistorischen Werken konnte hier nur in Kürze der Hauptinhalt oder der abgekürzte Titel angegeben werden; das Ausführlichere sehe man in der zweiten Auflage meiner Synopsis.)

Agassiz, früher Professor der Naturgeschichte zu Neufschatel, seit 1847 Prof. der Naturgeschichte zu Cambridge bei Boston in Nordamerika. 1) Ueber fossile Fische (Recherches sur les poissons fossiles. 1832 ff. Hauptwerk. — 180 Thlr.). 2) Monographie der Echinodermen (Stachelhäuter). (1842. — 28 Thlr.) 3) Nomenclator zoologicus (§. 9.). — 24 Thlr. 4) Ueber Süßwasserfische Mitteleuropas; geologische Alpenreisen; Grundzüge der Zoologie ꝛc. ꝛc.

Bechstein, 1757—1822; **starb** als Director der Forstakademie zu Dreißigacker. 1) Gemeinnützige Naturgeschichte Deutschlands (Hauptwerk, nur Säugethiere und Vögel. — 24 Thlr.). 2) Ornithologisches Taschenbuch (6½ Thlr.). 3) Forstbotanik (5te Aufl. 5 Thlr.) ꝛc.

Blainville (Heinrich v.), Professor am Pflanzengarten zu Paris; 1778 geboren; ausgezeichneter Zoolog Schrieb 1) Ostéographie (1839—44. — 160 Thlr.). 2) Er beschrieb in der Faune française (1820 ff. — 22½ Thlr.) die Fische und Weichthiere. 3) Zahlreiche Abhandlungen im Dictionnaire des sciences naturelles etc. etc.

Blasius (J. H.), Professor der Zoologie u. Botanik zu Braunschweig. — Wirbelthiere Europas. (Erster Band 1840 — 3½ Thlr. Säugethiere und Vögel.)

Bloch (Marcus Elifer), 1723 — 1799. Israelitischer Arzt und ausgezeichneter Ichthyolog zu Berlin, **starb** zu Carlsbad. 1) Allgemeine Naturgeschichte der Fische (1782—95. — 180 Thlr.). 2) Oekonomische Naturgeschichte der Fische Deutschlands (25 Thlr.).

Blumenbach (Joh. Fr.), 1752—1840. **Starb** zu Göttingen als Obermedicinalrath und Professor der Naturgeschichte. 1) Handbuch der vergleichenden Anatomie und Physiologie (2⅓ Thlr.). 2) Handbuch der Naturgeschichte (12. Ausgabe. — 2½ Thlr.). 3) Schädelsammlung (4⅔ Thlr.) ꝛc. 4) Abbildungen naturhistor. Gegenstände (100 Tafeln; 5½ Thlr.).

Bonaparte (Carl Lucian), früher Prinz von Monfignano, heißt seit dem Tode seines Vaters Lucian B. (des zweiten, 1840 gestorbenen Bruders von Napoleon) Fürst von Canino. Ein unbezähmbarer Demokrat u. ausgezeichneter Zoolog u. Archäolog; bildete sich in Nordamerika zu einem ausgezeichneten Naturforscher. Schrieb in italienischer, englischer und französischer Sprache: 1) Ikonographie der Fauna Italiens (Rom 1832 ff. — 160 Thlr.). 2) Vier Bände Supplemente zu Wilson's (pag. X.) Ornithologie Amerikas. 3) Uebersicht der Gattungen der Vögel (1. Abth. 1850. — 4⅔ Thlr.) ꝛc.

Bonelli (Franz), Professor der Zoologie zu Turin. — Entomologische Beobachtungen (vorzüglich über Laufkäfer). Turin 1813.

Brisson (Mathurin Jacob), 1723—1806. Schüler und Gehülfe Reaumür's; **starb** zu Paris als Professor der Physik. 1) Ornithologie (6¼ Thlr.). 2) Zoologisches System (1769).

Brongniart (Alexander), 1770—1846. **Starb** als Professor der Mineralogie zu Paris. 1) Classification der Reptilien. 2) Naturgeschichte der fossilen Crustaceen. 3) Mehre geognostische Werke, besonders geognostische Beschreibung der Umgegend von Paris.

Bronn (H. G.), Hofrath und Professor der Naturgeschichte zu Heidelberg. 1) System der urweltlichen Pflanzenthiere (15/6 Thlr.) und Conchylien (15/6 Thlr.). 2) Lethaea geognostica oder Abbildung und Beschreibung der für die Gebirgsformationen bezeichnendsten Versteinerungen (neue Ausgabe seit 1851). 3) Handbuch der Geschichte der Natur (10 Thlr.). 4) Allgemeine Zoologie (1850. — 2 Thlr.) ꝛc.

Bruguière (Joh. Wilh.), 1750—1798. Arzt zu Montpellier; nahm Theil an einer Entdeckungsreise nach der Südsee; **starb** auf der Rückreise von einer zweiten Reise nach Persien zu Ancona. Mitredacteur der Encyclopédie méthodique (an 20 Bände). Schrieb 1) Eine (unvollendete) Naturgeschichte der Weichthiere und Würmer (12 Thlr.) 2) Naturhistorische Zeitschrift ꝛc.

Buffon, von Ludwig XV. in den Grafenstand erhoben; 1707 — 1788. **Starb** zu Paris als Oberaufseher des königl. botanischen Gartens. Seine häufig übersetzte (von Martini, v. Funke, v. Haller und zuletzt, aber am unbrauchbarsten von Schaltenbrandt. Cöln 1837 ff. — 50 Thlr.) Naturgeschichte in 36 Quartbänden enthält nur Säugethiere, Vögel und eine sogenannte Theorie der Erde, und wurde vom Grafen Lacépède fortgesetzt (Fischsäugethiere und Reptilien). Durch eleganten Stil und ausführliche Beschreibung der Lebensweise der Thiere erwarb er der Naturgeschichte viele Freunde.

Burmeister (Hermann), bis zur politischen Reaction von 1849 Professor der Zoologie zu Halle. 1) Handbuch der Entomologie (1832 ff. — über 20 Thlr.). 2) Zoologischer Handatlas (7 Thlr.). 3) Geschichte der Schöpfung (vierte Auflage 1851. — $3^2/_3$ Thlr.). 4) Geologische Bilder ($1^1/_3$ Thlr.) ꝛc.

Charpentier (Toussaint de), 1799—1847; **starb** als Oberberghauptmann zu Breslau. Schrieb in lateinischer Sprache 1) über europäische Libellen (16 Thlr.). 2) Ueber Geradflügler (15 Thlr.). Hauptwerke über diese Insektenordnungen. — 3) Horae entomologicae ($3^3/_4$ Thlr.) etc.

Chemnitz (Joh. Hieronymus), 1730 — 1800: zu Magdeburg geboren und zu Kopenhagen als Garnisonprediger **gestorben.** Setzte Martini's Conchyliencabinet (pag. VIII.) fort.

Cuvier (Georg v.), 1769 — 1832. Zu Mömpelgard geboren und zu Paris als Staatsrath und Professor der Anatomie **gestorben.** Einer der größten Naturforscher und Anatomiker Europas. 1) Histoire naturelle des poissons (20 Bde., noch unvollendet — über 68 Thlr.). 2) Recherches sur les ossemens fossiles des Quadrupèdes (4. Aufl. 10 Bde. — 20 Thlr.). 3) Das Thierreich, eingetheilt nach dem Bau, als Grundlage ihrer Naturgeschichte ꝛc. Aus dem Französischen von Schinz. 4 Bde. (12 Thlr.) Desgleichen von Voigt. 6 Bde. (18 Thlr.) Sein Bruder, Fried. Cuvier, 1773 zu Mömpelgard geboren, Generalinspector der Universität, schrieb 1) Naturgeschichte der Säugethiere mit Originalabbildungen. 3 Bde. gr. Fol. (150 Thlr.). 2) Ueber die Zähne der Säugethiere (10 Thlr.) ꝛc.

Daubenton, 1716—1800. Ein Jugendfreund Buffon's und dessen Mitarbeiter; **starb** zu Paris als Arzt, Professor der Naturgeschichte und Director des naturhistorischen Cabinets. Bearbeiter der Säugethiere für die Naturgeschichte in der Encyclopédie méthodique etc.

Dejean, Graf und Pair von Frankreich, **starb** 1846 zu Paris. Schrieb ein Prachtwerk über Laufkäfer (7 Bde. — 22 Thlr.). Besaß die größte Käfersammlung (für 50,000 Frcs. verkauft), deren Katalog dreimal aufgelegt ist (1837. — $3^3/_4$ Thlr.).

Deshayes, naturhistorischer Schriftsteller zu Paris. Beschreibung der fossilen Conchylien um Paris (3 Bde. — 50 Thlr.) und eine neue Ausgabe von Lamarck (pag. VII).

Drapernaud (Jac. Philp.), **starb** als Professor zu Montpellier. Histoire naturelle des Mollusques terrestres et fluviatiles de la France. Paris 1805. ($4^1/_2$ Thlr.)

Dujardin (Felix), Professor der Zoologie zu Paris. Schrieb 1) Histoire naturelle des Zoophytes (Paris 1841. — $4^3/_4$ Thlr.), in welcher er als Ehrenberg's (S. 274.) Gegner auftritt. 2) Viele Abhandlungen in den Annales des sciences naturelles.

Dumeril, 1774 zu Amiens geboren, Professor am Pflanzengarten zu Paris; schrieb über Zoologie, besonders: Erpétologie général ou histoire naturelle complète des Reptiles (1834—44; 9 Bde. — 21 Thlr.).

Edwards (Milne), Professor zu Paris. 1) Neue Ausgabe von Lamarck (S. VII) und histoire naturelle des Crustacés (1834. 3 Bde.; 18 Thlr. [Das Hauptwerk über Crustaceen]). 2) In Verbindung mit Beudant ꝛc.: Populäre Naturgeschichte der 3 Reiche. In zwei deutschen Uebersetzungen ($2^5/_8$ Thlr.).

Ehrenberg (Chr. Gottfr.), Professor der Arzneikunde zu Berlin, 1795 geboren. Bereiste mit Hemperich Westasien und Aegypten, mit Humboldt Sibirien und den Caucasus. Ihm verdanken wir fast den ganzen Umfang unserer Kenntnisse über Infusorien. 1) Die Infusionsthierchen als vollkommene Organismen (1838, gr. Fol., mit 64 illum. Kupfertafeln. — 90 Thlr.). 2) Viele kleine Abhandlungen über Infusorien. 3) Die Korallenthiere des rothen Meeres ꝛc.

Erichson, **starb** 1850 als Prof. der Naturgeschichte zu Berlin. Hauptschriftsteller über die kurzflügligen Käfer. 1) Genera et species Staphylino um (§. 132.). 1840. 2 Bde. (7 Thlr.). 2) Käfer der Mark Brandenburg (unvollendet) ꝛc.

Esper, 1742 — 1816: zu Wunsiedel geboren und als Professor der Philosophie zu Erlangen **gestorben.** 1) Europäische Schmetterlinge in Abbildungen. Neue Ausg. von Charpentier. 1839. 7 Bde. ($173^1/_2$ Thlr.) 2) Pflanzenthiere (Korallen) in Abbildungen. 1788—1830. 3 Bde. (50 Thlr.)

Fabricius (Joh. Christ.), 1745—1808; geboren zu Tondern, **gestorben** zu Kiel als Professor der Naturgeschichte. Ein Schüler Linné's und durch die Menge seiner trefflichen, jetzt aber für das Studium der Entomologie wenig mehr ausreichenden Schriften der berühmteste Entomolog des 18. Jahrhunderts.

***Fer**ussac (Baron v.)*, 1786—1836; **starb** als französischer Obrist. Histoire natu-

relle générale et particulière des mollusques terrestres et fluviatiles (187½ Thlr.). Ein von seinem Vater angefangenes Prachtwerk.

Forster (Joh. Reinhold), 1729—1798; geboren zu Dirschau, **gestorben** als Professor der Naturgeschichte zu Halle. Cook's Begleiter auf dessen zweiter Entdeckungsreise 1772. 1) Handbuch der Naturgeschichte der Vögel, Fische ꝛc. 2) Schrieb und übersetzte mehre Reisewerke.

Geoffroy St. Hilaire (Stephan), 1773 geboren, legte 1841 seine Professur der Zoologie zu Paris nieder. War Begleiter von Bonaparte's Expedition nach Aegypten und Mitarbeiter an dem Prachtwerke über Aegypten (800 Thlr.), für welches sein Sohn Isidor die Fische bearbeitete. Schrieb auch mit Fr. Cuvier: Hist. nat. des mammifères (58½ Thlr.) und viele andere naturhistorische Werke.

Germar (E. F.), zu Glauchau 1785 geboren; Prof. der Mineralogie ꝛc. zu Halle. 1) Fauna insectorum Europae (1813 ff. 24 Hefte à 1⅓ Thlr.) 2) Magazin der Entomologie (4 Bde. 8⅚ Thlr.). 3) Mehre petrefaktologische Werke u. ein Handbuch der Mineralogie (1837; 2. Aufl.) ꝛc.

Gmelin (Jg. Frd.), 1748—1804; zu Tübingen geboren und zu Göttingen als Professor der Chemie und Hofrath **gestorben.** Besorgte die 13. Auflage von Linné's systema naturae.

Gravenhorst, Professor der Zoologie zu Breslau; 1777 zu Braunschweig geb. 1) Monographie der Microptera (kurzflüglige Käfer. §. 132.). 2) Ichneumonologia europaea (europäische Schlupfwespen. §. 150.) 3 Bde. (15 Thlr.).

Gyllenhall, ein ausgezeichneter Entomolog, **starb** 1842 als schwedischer Obrist-wachtmeister. Insecta suecica (4 Bde. Käfer. — 10⅚ Thlr.). Selbst für die Kenntniß der deutschen Käfer unentbehrliches Werk.

Hartig (Theodor), zu Dillenburg 1805 geboren; Professor und Forstrath zu Braunschweig. 1) Pflanzenwespen Deutschlands (3 Thlr.). 2) Forstliches Conversations-Lexikon (5 Thlr.). 3) Forstliche Culturpflanzen Deutschlands. 14 Hefte. (20⅔ Thlr.)

Herbst, 1743—1807; **starb** als Prediger zu Berlin. 1) Naturgeschichte der Krabben und Krebse (45⅔ Thlr.). 2) Fortsetzung des Kupferwerks über Insekten von Jablonski (Käfer 643¼ Thlr.; Schmetterlinge 97⅓ Thlr.).

Hübner (Jacob), **starb** 1826 zu Augsburg als Maler. 1) Sammlung europäischer Schmetterlinge, fortgesetzt von Geyer. 790 Kupfertafeln. (200 Thlr.) 2) Sammlung exotischer Schmetterlinge 471 Kupfertafeln (125⅞ Thlr.).

Humboldt (Alex. v.), 1769 zu Berlin geboren. Der berühmteste, bekannteste und gelehrteste aller jetzt lebenden Naturforscher, welcher durch seine Reisen Natur- und Völkerkunde außerordentlich gefördert hat. Außer vielen Prachtwerken schrieb er 1) Ansichten der Natur (1⅔ Thlr.). 2) Kosmos oder Entwurf einer physischen Erdbeschreibung. 2 Bde. und 3 Bde. 1. Abth. 1846—51 (6⅔ Thlr.).

Illiger, 1775—1813; zu Braunschweig geboren und zu Berlin als Director des zoologischen Museums **gestorben.** 1) Magazin für Insektenkunde (5 Bde. — 8 Thlr.). 2) Zoologische Terminologie (1½ Thlr.). 3) Prodromus etc.: ein neues System der Säugethiere (1¼ Thlr.).

Kaltenbach, Lehrer in Aachen, Verfasser der neuesten und besten Monographie der Pflanzenläuse (1. Theil 1844. — 1⅓ Thlr.).

Kirby, ein ausgezeichneter Entomolog. Rector zu Barham in der Grafschaft Suffolk. Schrieb: 1) eine Monographie der Bienen Englands (6 Thlr.); 2) über Käfer ꝛc. und 3) eine vorzügliche, von Oken übersetzte Einleitung in die Entomologie (4 Bde. 1833 — 11 Thlr.).

Klug, **starb** 1850 als geheimer Obermedicinalrath und Director des königl Museums in Berlin. Schrieb über Insekten, besonders über die deutschen Holzwespen (§. 149.), Blattwespen (§. 148.) und auch entomologische Monographien (3¾ Thlr.).

Lacepède (Graf v.), 1756—1825. Professor der Zoologie zu Paris, 1791 Präsident der Nationalversammlung; **starb** auf seinem Landgute. Lieferte als Fortsetzung des Werks von Buffon die Naturgeschichte der Fischsäugethiere, Reptilien (Amphibien, übersetzt von Bechstein. 5 Bde. — 17⅓ Thlr.) und Fische und eine neue Ausgabe von Buffon (1799—1802; mit colorirten Abbildungen. — 129 Thlr.).

Lamark, 1744—1829; **starb** als Professor der Zoologie zu Paris. Von ihm ging die analytische Bestimmungsmethode der Pflanzen aus; auch schrieb er das vollständigste Werk über Mollusken: Histoire naturelle des animaux sans vertèbres. Neue Ausgabe von Deshayes und Milne-Edwards (Paris 1835—45. — 22 Thlr. Nachdruck in Brüssel nur 12 Thlr.).

Latreille, 1762—1833; **starb** zu Paris als Professor der Entomologie. — Histoire naturelle des Crustacés et des Insectes (mit colorirten Abbildungen. — 28 Thlr.). Auch bearbeitete er die Insekten zu Cuvier's Thierreiche (pag. VI.).

Laurenti, **starb** als Arzt zu Wien; schrieb 1768: Synopsis Reptilium (2/3 Thlr.).

Leach, Arzt und Conservator des britischen Museums, **starb** 1836 zu Genua an der Cholera. Viele zoologische Abhandlungen in Zeitschriften.

Lichtenstein (Heinrich), 1780 geboren; Professor der Naturgeschichte und Director des zoologischen Museums zu Berlin. — Reisen im südlichen Afrika. — Darstellung neuer oder wenig bekannter Säugethiere. 10 Hfte. (18 1/3 Thlr.).

Linné (Carl v.), 1707 — 1778, der Sohn eines Predigers zu Räshult; **starb** als Professor der Naturgeschichte zu Upsala. Stifter einer großen Reform in der Nomenclatur der Naturgeschichte, das Haupt aller früheren, gegenwärtigen und auch wohl der zukünftigen Naturforscher. 1) Systema naturae (13. Ausgabe von Gmelin. 15 Bde. — 17 1/6 Thlr.). 2) Systema vegetabilium (16. Ausgabe von Curt Sprengel. 19 1/2 Thlr.).

Martini, 1729 — 1788, **starb** als Arzt zu Berlin. — Neues systematisches Conchyliencabinet; fortgesetzt von Chemnitz (210 Thlr.), später von J. A. Wagner (12 Thlr.). Neue Ausgabe von Küster seit 1840.

Meigen, 1775 — 1845. **Starb** als Sekretair der Handelskammer zu Stollberg bei Aachen. 1) Systematische Beschreibung der europäischen zweiflügligen Insekten (7 Bde. 24 Thlr., illum. 42 Thlr.). Das Hauptwerk über Zweiflügler Europas. 2) Deutschlands Flora. 3) Europäische Schmetterlinge (6 Thlr., illum. 68 Thlr.).

Merrem, 1761 — 1824; zu Bremen geboren und zu Marburg als Professor der Naturgeschichte **gestorben.** 1) Versuch eines Systems der Amphibien (1 3/4 Thlr.). 2) Beiträge zur Naturgeschichte der Amphibien (6 Thlr.).

Meyer u. **Wolf.** Ersterer Arzt zu Offenbach, letzterer Professor zu Nürnberg — gaben 1810 ein Taschenbuch der deutschen Vögelkunde in 2 Bänden heraus (11 1/2 Thlr.).

Müller (Otto Friedrich), 1730 — 1784; Sohn des Rectors M. zu Sondershausen; **starb** zu Kopenhagen als Staatsrath. Verfasser der drei ersten Theile der Zoologia danica (60 Thlr.) und Herausgeber des 5. und 6. Bandes der von Oeder angefangenen Flora danica (12 Bde. 724 Thlr.).

v. **Münst**er (Graf), **starb** 1844 zu Baireuth als Finanzdirector. Viele Abhandlungen über Petrefakten.

Naumann (Joh. Ad.), 1744 — 1826; geb. zu Ziebigk bei Köthen und daselbst als Forstbeamter **gestorben.** Naturgeschichte der Vögel Deutschlands. Sein Sohn, Inspector bei dem von seinem Vater an den Herzog von Anhalt-Köthen verkauften ornithologischen Museum, besorgte eine neue Ausgabe in 12 Bdn. mit 349 Kupfertafeln (über 230 Thlr.).

Nees v. Esenbeck (Christ. Gottf.), 1776 zu Reichenbach im Odenwalde geboren, von 1830 — 1851 zu Breslau Professor der Botanik und Director des botanischen Gartens. Schrieb außer zahlreichen botanischen Werken (II. pag. XI.) eine Monographie der kleinen Hymenoptern, als Fortsetzung des Werkes von Gravenhorst (p. VII.). 2 Bände (3 5/6 Thlr.).

Nitzsch (Christ. Ludw.). **Starb** 1836 als Professor d. Naturgeschichte zu Halle. Schrieb vorzüglich über Thierläuse in Germar's Magazine.

Ochsenheimer, 1756 — 1822; zu Mainz geboren und zu Wien als Schauspieler **gestorben.** — Schmetterlinge von Europa, fortgesetzt von Treitschke (S. X.). Das Hauptwerk. 17 Bde. (29 Thlr.).

Oken (Lorenz), 1799 — 1851; zu Offenburg geboren, und als Professor der Zoologie in Zürich **gestorben.** 1) Isis oder encyklopädische Zeitschrift für Naturgeschichte ꝛc. 1817 — 1848 (über 200 Thlr.). 2) Allgemeine Naturgeschichte für alle Stände (13 Bde. 18 3/4 Thlr. und Abbildungen 15 Thlr.). 3) Naturphilosophie ꝛc. Dritte Aufl. (1 3/4 Thlr.).

Olivier (Ant. Wilh.), 1756 — 1814; **starb** als Professor der Zoologie zu Aalfort. Bereisete Persien, Arabien und die Türkei. — Histoire naturelle des coléoptères (Partie de l'Encyclop. méthod. 8 Bde. 75 Thlr.).

d'Orbigny, ein ausgezeichneter französischer Naturforscher, machte von 1826 — 1833 eine naturhistorische Reise durch Südamerika. — Voyage dans l'Amérique méridionale etc. — Viele Aufsätze über Mollusken, Crinoideen (§. 231.) ꝛc.

Pallas, 1741 — 1811, zu Berlin geboren und daselbst **gestorben.** Wurde als Akademiker nach Petersburg berufen und machte von hier aus mehre Reisen, deren sehr wichtigen Resultate für Natur- und Völkerkunde in seinen Wer-

ken niedergelegt wurden: 1) Specilegia zoologica (10 Thlr.). 2) Zoographia Russo-Asiatica (23 Thlr.) ꝛc.

Panzer, 1755 — 1829, **starb** als Arzt zu Hersbrück bei Nürnberg. — Deutschlands Insekten-Fauna (110 Hefte. 101 2/3 Thlr.), später von Herrich-Schäffer fortgesetzt. (80 Hfte. 65 Thlr.) ꝛc.

Philippi, Lehrer der Botanik und Zoologie und Director an der höhern Gewerbsschule zu Cassel; legte 1850 seine Stelle nieder und reisete 1851 nach Südamerika. Schrieb über lebende und versteinerte Mollusken, besonders ein Werk über die Mollusken Siciliens (Enumeratio molluscorum Siciliae. 2 Bde. 13 Thlr.), Hauptwerk.

Prinz Maximilian von Neuwied, geboren 1782, bereisete 1813 — 1817 Brasilien und 1832 — 1834 Nordamerika, beschrieb diese Reisen in 2 Prachtwerken und gab auch Abbildungen zur Naturgeschichte Brasiliens heraus (60 Thlr.).

Ratzeburg, 1801 zu Berlin geboren, Professor an der höhern Forstlehranstalt zu Neustadt-Eberswalde. — 1) Die Forst-Insekten (3 Theile 21 Thlr.). 2) Die Ichneumonen der Forst-Insekten. 3) Der Waldverderber (1851. 2 3/4 Thlr.). Hauptwerke für diesen Zweig der Naturgeschichte.

Ray, Rajus oder Wray, Sohn eines engländischen Hufschmieds, anfangs Prediger; **starb** 1707 als einer der ausgezeichnetsten Zoologen und Botaniker.

Reaumur, 1683 — 1757; zu Rochelle geboren und auf seinem Landgute Bermondière **gestorben.** Physiker (Thermometer-Scala) und Entomolog (Mémoires pour servir à l'histoire des Insectes, 6 Bde. 15 Thlr.).

Reichenbach (Ludwig), 1793 zu Leipzig geboren, Professor der Naturgeschichte in Dresden. 1) Flora Deutschlands (nach eigenem Systeme). 2) Praktisch-gemeinnützige Naturgeschichte a. des In- und Auslandes (79 Kpftfln. 10 Thlr.); b. des Inlandes (10 Tafeln Säugethiere und 55 Tafeln Vögel — 9 1/2 Thlr.).

Römer (Ad.), 1809 zu Hildesheim geboren, Bergamts-Assessor zu Clausthal. 1) Norddeutsches Oolithen- und Kreidegebirge (13 1/6 Thlr.). 2) Das Harzgebirge (2 Thlr.). — Die Algen Deutschlands (2 Thlr.).

Roesel von Rosenhoff, 1705 — 1759; **starb** als Miniaturmaler und Kupferstecher zu Nürnberg. 1) Monatliche Insekten-Belustigung (4 Bde. 36 Thlr.), von Kleemann fortgesetzt (2 Bde. 14 1/3 Thlr. 2) Natürliche Historie der Frösche. (Neue Auflage von Schreber. 32 Thlr.).

Rossmässler, Professor der Naturgeschichte an der Forst-Akademie zu Tharand; legte seine Stelle nieder wegen seiner Verwickelung in die Zeitwirren von 1848 und 49. Iconographie der deutschen Land- und Süßwasser-Mollusken (1834 ff. 12 Hfte. 13 Thlr.). Hauptwerk über Deutschlands Weichthiere.

Rudolphi (Carl Asmund), 1771 — 1834; zu Stockholm geboren und zu Berlin als Professor der Anatomie und Director des anatomischen Museums **gestorben.** Hauptschriftsteller über Eingeweidewürmer (Entozoorum historia naturalis. 2 Bde. 7 1/2 Thlr. — Entozoorum synopsis. 5 Thlr.).

Rüppel, 1794 zu Frankfurt a. M. geboren, anfangs Handlungsdiener, später Naturforscher. Bereicherte die Wissenschaft durch mehre zoologische Specialwerke und das Museum seiner Geburtsstadt durch viele, auf seinen 3 Reisen in Afrika entdeckte Thiere.

v. Schlotheim (Ernst Fr.), **starb** 1832 als sächsisch-koburgischer Geheimerath. 1) Die Petrefactenkunde ꝛc. (5 Thlr.). 2) Nachträge dazu (10 1/2 Thlr.).

Schneider (Joh. Gottlob), 1750 — 1822; zu Kolm bei Hubertsburg geboren und als Oberbibliothekar in Breslau **gestorben.** Ausgezeichneter Philolog und Zoolog. — Griechisches Lexikon und viele Ausgaben alter Klassiker, besonders die Geschichte der Thiere von Aristoteles. — Naturgeschichte der Schildkröten ꝛc.

Schoenherr (Carl Joh.), lebt als königl. schwedischer Commerzienrath zu Stockholm. Hauptschriftsteller über die Rüsselkäfer: Genera et species curculionidum. 8 Bde. (42 2/3 Thlr.)

Schrank (Franz von Paula), 1747 — 1835; zu Varnbach in Baiern geboren; Exjesuit, **starb** als Oberdirector des botanischen Gartens in München. — Fauna boica (7 Thlr.). — Baiersche Flora ꝛc.

Schreber (Joh. Ch. Daniel v.), 1739 — 1810; zu Weißenfee geboren, **starb** als Leibarzt und Professor in Erlangen. — Die Säugethiere in Abbildungen (1775 — 1845), von Andr. Wagner fortgesetzt. 129 Hfte. oder 7 Bde. und 4 Supplementbde. 274 Thlr.). Hauptbilderwerk über Säugethiere.

Sowerby (Jacob und Georg, Vater und Sohn), englische Maler und Naturforscher. — Mineral-Conchyliologie Großbritanniens ꝛc. (Originalausgabe in 6 Bden; über 130 Thlr.). Deutsch bearbeitet von Desor, mit Anmerkungen von Agassiz (S. V.).

Spix (Joh. Baptiſt v.). 1781 — 1806. Zu Höchſtadt geboren und als Akademiker zu München **geſtorben.** Bereiſete von 1817 — 1819 mit v. Martius Braſilien. Gab Kupferwerke über Braſiliens Affen (56 Thlr.), Vögel (168 Thlr.) und Reptilien (85 Thlr.) heraus.

Sturm (Jacob), 1771 zu Nürnberg geboren; Kupferſtecher und Naturforſcher daſelbſt. — Deutſchlands Flora in Abbildungen. — Deutſchlands Fauna in Abbildungen. 1) Vögel. 3 Hfte. (2 Thlr.). 2) Amphibien. 6 Hfte. (4 Thlr.). 3) Käfer über 20 Hfte. (über 50 Thlr.). 4) Weichthiere. 8 Hft. ($7\frac{1}{3}$ Thlr.).

Temminck (C. J.), 1770 geboren; Director des Muſeums zu Leyden und Verfaſſer mehrer Prachtwerke. 1) Manuel d'Ornithologie ($7\frac{1}{2}$ Thlr.). 2) Monographie de Mammologie (25 Thlr.). 3) Planches coloriées des oiseaux (267 Thlr.).

Thunberg (Peter), 1743 — 1828; geboren zu Jönköping und **geſtorben** auf ſeinem Landſitze Tunaberg bei Upſala. Linné's Schüler; bereiſete das Innere Afrikas, ſo wie Japan ꝛc.; ſchenkte ſeine reichen Sammlungen der Univerſität zu Upſala, wo er Profeſſor der Botanik war.

Treitschke (Joh. Fr.), 1776 — 1842; zu Leipzig geboren und als Hoftheaterökonom zu Wien **geſtorben.** Beendigte Ochſenheimer's Werk (S. VIII.).

Le Vaillant (Franz), 1754 — 1825; zu Paramaribo geboren und zu Paris **geſtorben.** Machte 3 naturhiſtoriſche Reiſen in Afrika. — 1) Voyage dans l'intérieur de l'Afrique ($3\frac{3}{4}$ Thlr.). 2) Histoire naturelle des oiseaux d'Afrique etc. (125 Thlr.).

Walckenaer (Baron v.), 1771 zu Paris geboren, ſeit 1840 beſtändiger Sekretär der Akademie; lebt als reicher Privatmann auf ſeinem, 8 Stunden von Paris entfernten Landgute. — Viele naturhiſtoriſche Werke: Faune parisienne ($3\frac{1}{2}$ Thlr.). — Histoire des Aranéides (4 Thlr.) etc. etc.

Wagler (Joh.), 1800 — 1832; zu Nürnberg geboren und zu München als Profeſſor der Zoologie in Folge eines Schuſſes durch unvorſichtige Behandlung eines Schießgewehrs **geſtorben.** 1) Natürliches Syſtem der Amphibien ($2\frac{1}{4}$ Thlr.). 2) Beſchreibungen und Abbildungen von Amphibien ($11\frac{1}{3}$ Thlr.) ꝛc.

Wilson (Alex.), in Schottland geboren, Weber, Krämer, Dichter; ging ſpäter nach Amerika, wo er als Schulmeiſter und als ausgezeichneter Ornitholog 1813 **ſtarb.** — American Ornithology (9 Bde. 4., 1808 — 1814, mit illuminirten Kupfern (91 Thlr.). Die 3 letzten Bände dieſes Prachtwerks von Carl Bonaparte. (S. V.).

Erklärung der Zeichen und Abkürzungen.

♂ = Männchen.
♀ = Weibchen.
☿ = Zwitter.
* = Zur Fauna Norddeutſchlands gehörend.
† = ſchädlich oder als ſchädlich verdächtig.
‡ = merklich ſchädlich.
‡‡ = ſehr ſchädlich.
1‴ = 1 Linie lang (Länge des Flohs).
2‴ = 2 Linien (Größe des Sonnenkäfers mit 2 Punkten).
3‴ = 3 Linien (Größe der Stubenfliege).
6‴ = 6 Linien (Größe der Biene).
12‴ od. 1″ = 1 Zoll (Größe des Maikäfers)
3″ = 3 Zoll (Größe der Hausmaus ohne den Schwanz.
5″ = 5 Zoll (Größe des Sperlings).
10″ = 10 Zoll (Größe der Wanderratte ohne den Schwanz).
12″ od. 1′ = 1 Fuß (Größe der Feldtaube) ꝛc.

Fig. 83: Bogiger Flohkäfer iſt.... $1\frac{1}{2}$‴ lang.
„ 81: Linné's Buchdrucker iſt... $2\frac{1}{2}$‴ „
„ 78: Saat-Schnellkäfer iſt.... 5‴ „
„ 79: Müllerkäfer iſt..... 7‴ „
Fig. 73: Gemeiner Todtengräber iſt 8‴ lang.
„ 71: Leder-Laufkäfer iſt..... 16‴ „

Die Größe der Säugethiere iſt ohne Berückſichtigung des Schwanzes angegeben.

Die Zahlen bezeichnen bei Schmetterlingen und Vögeln die Monate des Jahrs von 1 (Januar) bis 12 (December), in welchen dieſe Thiere bei uns erſcheinen.

Die Bruchzahlen drücken bei den Säugethieren die Zahnformel (§. 11.), bei den Muſcheln die Zahl der Zähne in der rechten und linken Klappe aus.

br. = breit.
d. = dick.
Fl. = Flügel.
Flgd. = Flügeldecken.
h. = hoch.
Hfl. = Hinterflügel.
l. = lang.
Rp. = Raupe.
Vdfl. = Vorderflügel.

Die Abkürzungen in den Ueberſichten erklären ſich leicht aus den unmittelbar vorhergehenden, nicht abgekürzten Wörtern.

Allgemeine Einleitung.

Das Wort **Natur** bezeichnet: 1) die Ursache der Schöpfung, das heißt die Gottheit selbst; 2) die wesentlichen Eigenschaften eines Körpers; 3) den Inbegriff aller erschaffenen Dinge oder die Körperwelt. §. 1.

Naturkörper, Naturalien, Naturprodukte oder **Naturerzeugnisse** nennt man alle Körper, welche durch Menschen noch keine wesentliche Veränderungen erlitten haben, sondern noch in dem ursprünglichen Zustande sind, in welchem sie geschaffen wurden; Kunstprodukte, Artefacte heißen die durch Kunstfleiß schon wesentlich in Form, Theilen und Eigenschaften veränderten Körper. Erstere sind Gegenstand der Naturgeschichte, letztere der Technologie.

Naturwissenschaft ist der Inbegriff aller über Naturkörper und Naturerscheinungen gemachten Beobachtungen im systematischen Zusammenhange. Sie zerfällt: 1) in **Naturphilosophie**, welche das innere Wesen der Natur, die letzten Gründe der Naturerscheinungen zu erforschen strebt; 2) in **Naturkunde**, welche die Erscheinungen in der Natur und deren Gesetze darstellt, ohne die letzten Ursachen aufzusuchen.

Die Zweige der Naturkunde heißen: 1) **Astronomie**, welche die Himmelskörper kennen lehrt; 2) **Physik** oder **Naturlehre**, welche die allen Naturkörpern zukommenden Eigenschaften (Schwere, Ausdehnung ꝛc.) und die in ihnen wirkenden Kräfte und deren Erscheinungen untersucht; 3) **Naturgeschichte, Physiographie** oder **Naturbeschreibung**, welche uns die Naturkörper nach ihren gemeinschaftlichen und unterscheidenden innern und äußern Merkmalen kennen und systematisch (§. 7.) ordnen lehrt, so daß man den innigen Zusammenhang derselben und die von den niedrigsten Pflanzen bis zu den Menschen hinauf fortschreitende organische Bildung klar erschauet. §. 2.

Alle Naturkörper zerfallen in zwei große Abtheilungen: §. 3.

1) in **organische** (organisirte, lebende) Körper: Thiere und Pflanzen;
2) in **unorganische** (unorganisirte, leblose) Körper oder Mineralkörper.

Organische Körper sind äußerlich wie innerlich aus verschiedenen, zu ihrer Ernährung und Fortpflanzung nöthigen Theilen (Organen oder Werkzeugen §. 10.) zusammengesetzt, welche zu einander in bestimmter Mittels- und Zweckbeziehung stehen; **unorganische Körper** haben jene Theile nicht und bestehen entweder gar nicht aus verschiedenen Theilen oder wenn sie aus verschiedenen Theilen bestehen, so hat doch keiner derselben eine Verrichtung zur Erhaltung des Ganzen. Durch Ernährung und Wiedererzeugung unterscheiden sich also organische Körper wesentlich von unorganischen. Organische Körper sind deshalb in beständiger innerer Thätigkeit, indem sie ungleichartige Theile in sich aufnehmen, sie assimiliren (§. 15.), d. h. ihrer eigenen Mischung ähnlich machen, im Innern absetzen und so von Innen nach Außen eine bestimmte Zeit wachsen, sich fortpflanzen, dann absterben und faulen; sie haben also eine Entwickelungsperiode. Unorganische Körper sind beständig in Ruhe, vergrößern sich nur durch Ansetzen gleichartiger Theile von Außen, nehmen also nur an Masse zu, pflanzen sich nicht fort, sterben und faulen nicht. Nur fremde, physische oder chemische (III. §. 52 ꝛc.) Einflüsse können sie verändern. Ihr Charakter ist starre Beharrlichkeit. Da alle Theile der organischen Körper in bestimmten Mittels- und Zweckbeziehungen zu einander stehen, so kann man sie nicht über einen gewissen Grad hinaus verstümmeln ohne ihre Existenz zu vernichten, dagegen Mineralkörper ihrem Wesen nach dieselben bleiben, wenn sie auch bis ins Kleinste getheilt werden; organische Körper bilden deshalb Individuen (§. 8.), ihre Form ist bis auf ein Maximum bestimmt; Mineralkörper bilden (mit Ausnahme der Krystalle III. §. 6.) keine Individuen

und ihre Größe ist nicht bestimmt (Marmor kann als mikroskopisches Stückchen und in Form eines Gebirges erscheinen).

Die auf Entstehung, Erhaltung und Fortpflanzung gerichtete Thätigkeit eines organischen Körpers heißt Leben; die Ursache der eigenthümlichen Erscheinungen dieses Lebens ist die sogenannte Lebenskraft, welche neuerdings Mulder in Utrecht bestritten hat und mit der chemischen Bildungskraft für einerlei hält. Entstehen die Gährungspilze (§. 20. I. und II. §. 337) durch Lebenskraft oder chemische Kraft? Ist letztere eine modificirte Lebenskraft?

§. 4. Die organisirten Körper zerfallen wieder in 2 große Abtheilungen, in Thiere und Pflanzen. **Thiere** sind organisirte Körper, welche sich äußerlicher Eindrücke bewußt werden, d. h. welche **empfinden** (§. 13.) und sich in Folge dieser Empfindung **willkührlich**, d. h. ohne Einwirkung und Reiz von außen, **bewegen** (den Ort ändern. Nahrung suchen und auswählen ꝛc.). Die festgewachsenen Polypen (Venusfächer, Edelkoralle ꝛc. §. 237.), manche Fischläuse (§. 212.) und alle Rankenfüßer, z. B. Seetulpen (§. 213.) bewegen sich zwar freiwillig, können jedoch den Ort nicht verändern. Der Hauptcharakter der Thiere ist daher **Empfindbarkeit** oder **Sensibilität. Pflanzen** sind organisirte Körper ohne Empfindung und ohne willkührliche Bewegung. Die Pflanzen sind mit der Wurzel meist der Erde angeheftet und streben mit Stengel und Blatt der Sonne entgegen; das Streben der Pflanzen ist auf plastische oder körperliche Bildung beschränkt, ihr Lebenszweck ist mit Bildung der zur Reife gelangten Blüthe und Frucht erreicht; ihr Hauptcharakter ist **Plasticität** oder **Bildsamkeit.** So leicht hiernach Thiere und Pflanzen auf höherer Stufe der Ausbildung von einander zu unterscheiden sind, so schwer wird die Unterscheidung auf niedrigster Stufe der Organisation; weshalb Ehrenberg als Hauptcharakter des Thiers neben der willkührlichen Bewegung auch **innere thierische Organisation** fordert, namentlich eine Mundöffnung und innere Ernährungsorgane (Magen), die er denn auch bei den einfachsten Thieren, den Infusorien (§. 243.) nachgewiesen hat; doch gibt es auch hier Fälle, wo uns unsere besten optischen Hülfsmittel bis jetzt noch in Zweifel lassen oder wo die innern Organe verschieden gedeutet werden (Badeschwamm und manche Infusorien §. 239. u. §. 240.). Zu den Pflanzen, welche eine scheinbare willkührliche Bewegung zeigen, rechnen wir die schamhafte Sinnpflanze, den beweglichen Süßklee, die Venusfliegenfalle, die Oscillarien ꝛc. (II. §. 1.)

§. 5. Die Naturgeschichte zerfällt nach der genannten Verschiedenheit der Naturkörper in drei große Abtheilungen, welche schon von den Alten die drei Naturreiche genannt wurden:

1) das Thierreich, dessen Naturgeschichte **Zoologie** oder Thierkunde,
2) das Pflanzenreich, dessen Naturgeschichte **Botanik** oder Pflanzenkunde, und
3) das Mineralreich, dessen Naturgeschichte **Mineralogie** genannt wird. — Die in einem Lande lebenden Thiere bilden dessen *Fauna* und die in einem Lande wachsenden Pflanzen dessen *Flora* (Fauna Europas, Hannover's ꝛc.; Local-Fauna, Uebergangs-Fauna).

§. 6. Bei der chemischen Untersuchung der Naturkörper (III. §. 39.) kommen wir zuletzt auf einfache Körper, welche nicht mehr in verschiedene Stoffe zerlegt werden konnten und deshalb **Urstoffe, Grundstoffe, Elemente***) (III. §. 40.) heißen, deren man schon 63 kennt, welche nach dem verschiedenartigen Zusammenhange ihrer Theile (Aggregatzustand) eingetheilt werden: **a)** in feste, **b)** tropfbarflüssige und **c)** gas- oder luftförmige Grundstoffe. Zu den festen gehören von den Grundstoffen die Metalle mit Ausnahme des tropfbar-flüssigen Quecksilbers; zu den gasförmigen gehört vorzüglich der Sauer-, Wasser-

*) Früher glaubte man, alle Körper seien aus Luft, Wasser, Feuer und Erde entstanden (die 4 Elemente der Alten); weil Erdboden der verbreitetste feste, Wasser der verbreitetste flüssige und Luft der verbreitetste luftförmige Körper ist. Alle 3 sind in einfache Körper zerlegt und deshalb keine Elemente; können aber als Sinnbild der 3 Aggregatzustände der Körper dienen.

und Stickstoff (III. §. 40.). Aber nicht allein die Grundstoffe, sondern alle Körper besitzen eine der 3 Formen, ja einige können nach Umständen jede derselben annehmen. Queckſilber und Waſſer werden durch Kälte zu festen, durch Wärme zu luftförmigen Körpern. Durch Verbindung der Grundstoffe mit einander werden alle verschiedenen Körper gebildet. Fast 89 Gewichtstheile Sauerstoff und 11 Wasserstoff bilden Waſſer; 21 Raumtheile Sauerstoff und 78 Stickstoff und etwas Kohlensäure bilden unsere atmosphärische Luft; Kohlenstoff bildet im reinsten Zustande den Diamant, mit Sauerstoff die Kohlensäure, einen luftförmigen Körper, welcher das Schäumen bei gährenden Getränken verursacht; die Kohlensäure bildet in Verbindung mit Kalk den kohlensauren Kalk oder unsern gemeinen Kalkstein, so wie den Marmor und die Kreide. Obgleich manche Mineralkörper nur aus einem Grundstoffe bestehen (Diamant), so finden wir doch im Mineralreiche die mannigfaltigsten Verbindungen der Grundstoffe, dagegen Pflanzen und Thiere größten Theils nur aus Sauer-, Waſſer-, Kohlen- und Stickstoff zusammengesetzt sind (welche man deshalb auch die 4 organischen Elemente oder Organogene nennt); jedoch kommen außer diesen noch einige andere Elemente im thierischen Körper vor, wie Phosphor und Kalk, welche zusammen die mineralische Grundlage der Knochen, Zähne, Muschelschalen ꝛc. (III. §. 43, 4) bilden; in geringen Quantitäten auch Eisen im Blute, Schwefel im Eidotter ꝛc.; überhaupt hat man bis jetzt nur 19 Urstoffe im Thierreiche gefunden. Der **Sauerstoff** ist als vorzüglichster Bestandtheil der atmosphärischen Luft den Warmblütern zum Athmen unentbehrlich; der **Stickstoff** ist vorwaltender Bestandtheil im Thierreiche wie der **Kohlenstoff** im Pflanzenreiche. Genannte 4 Grundstoffe (Organogene) bilden die Grundsubstanz der Thiere und Pflanzen und diese ist im thierischen Organismus die Gallerte, auf einer höhern Stufe das Eiweiß, im vegetabilischen dagegen der Schleim. Das Eiweiß bildet sich durch den Lebensprozeß in Faserstoff (Fibrine) um, aus welchem die Hautgebilde (Schleimhäute, eigentliche Haut ꝛc.) und Fasergebilde (Zellgewebe, Muskelfleisch, Knorpel- und Nervensubstanz) bestehen. Der Schleim verwandelt sich durch den Lebensprozeß der Pflanze in Gummi und Stärkemehl (II. §. 60. B.).

Uebersicht der lebenden und fossilen (vorweltlichen oder versteinerten) §. 7.
Thierarten (nach Wagner, Göppert und Broun. 1848 und 1850).

	1. Säugethiere.	2. Vögel.	3. Reptilien.	4. Fische.	5. Insekten.	6. Spinnenthiere.	7. Krustenthiere.	8. Würmer.	9. Weichthiere.	10. Strahlthiere.	11. Polypen.	12. Infusorien.	Im Ganzen.
Lebend	2067	7000	1500	8000	65000	3000	1500	1270	11400	1232	3528	1400	106897
Fossil..	700	150	390	1461	1570	130	900	290	13800	698	1703	670	22462
Zus.....	2767	7150	1890	9461	66570	3130	2400	1560	25200	1930	5231	2070	129359

Es sind also in den beschreibenden Werken etwa 129.759 Thierarten aufgeführt, wenn wir noch etwa 200 lebende und 200 fossile Arten Schwämme hinzuzählen; doch möchte die wirkliche Zahl der bekannten Thierarten wohl um $^1/_5$ geringer sein, da in den Werken oft dieselbe Art unter 2 verschiedenen Namen aufgeführt und manche Spielart aus Speciesmacherei von den Schriftstellern für eigne Art ausgegeben ist. Zählen wir zu obiger Summe noch 80.000 lebende und 2000 fossile Pflanzenarten, so ist die Zahl aller bekannten organisirten Körper etwa 211,759. Der größte Theil dieser Arten kommt auf Europa, so daß obige Zahl sicher um ein sehr Bedeutendes größer wird, wenn die übrigen Erdtheile erst noch genauer durchforscht sind. Linné kannte um 1748 etwa nur 1104 lebende Thierarten, deren Zahl sich bis jetzt alle 10 Jahre ungefähr

um $^3/_5$ vermehrt hat. 1766 kannte man etwa 100 fossile Thiere, jetzt über 22,000. Nehmen wir die Zahl der lebenden Säugethiere als 1 an, so erhalten wir für Infusorien so wie für Strahlthiere und Würmer etwa $^3/_5$, für Reptilien so wie für Krustenthiere $^3/_4$, für Spinnenthiere $1^1/_2$, für Polypen $1^3/_4$, für Vögel 3, Fische $3^3/_4$, Weichthiere $5^1/_2$ und für Insekten $31^1/_2$. Die Zahl der Insektenarten übertrifft also die der Säugethiere $31^1/_2$ mal.

Man hat die große Zahl der bekannten Naturkörper zur leichtern Uebersicht und deutlichern Einsicht in ihre Verwandtschaft in ein Natursystem (Systēma natūrae) gebracht, unter welchem man eine wissenschaftliche Zusammenstellung, Eintheilung und Beschreibung der Naturkörper nach ihrer nächsten Verwandtschaft versteht. Ein **künstliches** System gründet die Eintheilung nur auf einzelne, willkührlich gewählte Theile der Naturkörper, z. B. auf die Bewegungsorgane bei den Thieren, die Befruchtungsorgane bei den Pflanzen (Linné's Pflanzensystem); ein **natürliches** System dagegen berücksichtigt alle wesentlichen innern und äußern Merkmale (die Gesammtheit der Charaktere), den Totalhabitus der Naturkörper (Decandolle's Pflanzensystem). Ein natürliches System erfordert die genaue Kenntniß sämmtlicher charakteristischen Merkmale, beim künstlichen reicht schon die Kenntniß einzelner Merkmale aus. Deshalb sind auch künstliche Systeme als die leichtern älter. Auf ähnliche Weise ist die alphabetisch geordnete Wörtermenge eines Lexikons eine künstliche, die Zusammenstellung der Haupt-, Zeit-, Eigenschaftswörter ꝛc. eine natürliche Methode. Das natürliche System ordnet die Körper a) nach dem Grade ihrer gegenseitigen Verwandtschaft, so daß die ähnlichsten Arten am nächsten zusammen und die unähnlichsten am entferntesten von einander stehen. Ihre Entfernung bildet so das Maaß ihrer Unähnlichkeit. b) Nach dem Principe der Unterordnung der Charaktere, d. h. die Merkmale müssen nach der größern oder geringern Wichtigkeit auf den ganzen Organismus einander untergeordnet werden. Es darf daher der äußern Aehnlichkeit nach der Wallfisch nicht zu den Fischen, die Blindschleiche (§. 90, 17.) nicht zu den Schlangen, der Wassersalamander (§. 96, 10.) nicht zu den Eidechsen gezählt werden; es dürfen, wie in Linné's Pflanzensystem, die Gräser nicht in 4 verschiedenen Klassen vertheilt sein. Künstliche Systeme erleichtern zwar die Uebersicht, das Auffinden und Einordnen der Naturkörper, entfernen aber nahe verwandte Körper oft zu weit von einander und zeigen die allmählige Entwickelung und Verkettung der Naturkörper weniger als die natürlichen Systeme.

§. 8. Jedes System ordnet die einzelnen Individuen nach Reichen, Klassen, Ordnungen, Familien, Gattungen und Arten. Will man indeß hier noch Unterabtheilungen machen, so werden die Klassen wieder in Unterklassen ꝛc. getheilt, so daß folgendes Schema entsteht:

Reich (regnum);
Klasse (classis);
Unterklasse (subclassis);
Ordnung (ordo);
Unterordnung (subordo);
Familie, Sippe oder Sippschaft (familia);
Zunft oder Tribus (tribus);
Gattung oder Geschlecht (genus);
Untergattung (subgenus);
Abtheilung oder Sectio (sectio);
Art (species);
Abart, Race oder Unterart (subspecies);
Spielart oder Varietät (varietas);
Individuum (individuum).

Alle Individuen oder Einzelwesen von gemeinschaftlicher, gleicher Abstammung, welche sich in einer Reihe von Generationen in ihren Hauptmerkmalen gleich bleiben, bilden eine Art; in wesentlichen Eigenschaften übereinstimmende Arten eine Gattung; verwandte Gattungen eine Familie, die Familien eine Ordnung, die Ordnungen eine Klasse und diese endlich eins der drei großen Naturreiche (§. 5.).

Wenn sich bei Individuen derselben Art durch äußere Einflüsse entstandene unwesentliche Verschiedenheiten in Größe, Farbe u. s. w. durch Zeugung oder Samen fortpflanzen, so entsteht eine Unterart (unsere Kohlarten und Hunde); wenn diese sich aber durch folgende Generationen wieder verlieren, eine Spielart (veredelte Obstsorten, deren Samen wieder die wilde Art liefern). Aus der Befruchtung specifisch verschiedener Thiere oder Pflanzen entstehen Blendlinge oder Bastarde (species hybridae), welche sich im Thierreiche, z. B. beim Maulesel und Maulthiere, selten und im günstigsten Falle noch nicht bis über die vierte Generation haben fortpflanzen können, sich aber im Pflanzenreiche häufig wieder fortpflanzen. Man nennt solche Fortpflanzung eine Verbasterung oder Bastardbildung, auch Kreuzung.

Jeder Naturkörper wird mit einem Gattungs- und Artnamen bezeichnet, welchem als Auctorität der meist abgekürzte Name desjenigen Naturforschers hinzugefügt wird, der den Körper zuerst unter diesem Namen beschrieben hat. Dies ist zur genauen Bezeichnung deshalb nothwendig, weil a) mancher Naturkörper unter zwei verschiedenen Namen gleichzeitig von zwei Schriftstellern beschrieben ist oder weil b) noch häufiger der Name eines schon früher, aber nicht kenntlich genug beschriebenen Naturkörpers fälschlich auf einen ganz andern übertragen wurde. So haben z. B. Linné und Bechstein unter dem Namen Strix passerina (§. 65, 14.) zwei ganz verschiedene Eulen und Fabricius und Gyllenhall unter dem Namen Bostrychus typographus (§. 140.) zwei ganz verschiedene Käfer beschrieben, so daß man ohne beigefügte Auctorität in Zweifel bleibt, von welchem Thiere die Rede ist. So beschreibt ferner Linné die Rothtanne und Duroi die Weißtanne als Pinus abies. In ausführlichen Werken und, bei leicht zu besorgenden Verwechselungen, auch in kleinern, setzt man hinter den Namen, welcher als der richtigste gewählt ist, auch die übrigen Namen, welche demselben Naturkörper gegeben sind als sinnverwandte Wörter (synonyma). Agassiz führt in seinem Nomenclator zoologicus, einem Werke über die Namen, besonders über die Gattungsnamen in der Thierkunde, 31,000 Namen auf, von denen 3000 für Thiere und Pflanzen zugleich und 10,000 leider für Thiere doppelt und mehrfach gebraucht sind. §. 9.

Um die Naturkörper kurz und bestimmt zu charakterisiren, hat man eine eigene Kunstsprache, Terminologie, Nomenklatur oder Glossologie (Sprachlehre der Naturkunde) eingeführt, welche für jede besondere Form und Eigenschaft einen bestimmten Ausdruck festsetzt. Die genaue Kenntniß dieser Ausdrücke ist zum Verstehen der naturhistorischen Beschreibungen erstes Erforderniß. Da die äußern Merkmale zur genauen Unterscheidung der Naturkörper oft nicht ausreichen, so müssen auch die Hülfswissenschaften der Naturgeschichte immer mehr oder weniger zu Rathe gezogen werden und zwar Anatomie und Physiologie bei den Thieren und Pflanzen; Chemie und Physik (§. 2.) bei den Mineralien. Die Anatomie oder Zergliederungskunst lehrt die verschiedenen Theile der organischen Körper, die Physiologie oder Naturlehre der organischen Körper lehrt die Lebensverrichtungen der einzelnen Theile derselben und die Chemie oder Scheidekunst lehrt die Grundstoffe (§. 6. und III. §. 40.) kennen, aus welchen die Naturkörper zusammengesetzt sind.

§. 11.

Fig. 2. Skelet des Menschen.

A. Kopf.

I Nasenbein.
II Stirnbein.
III Flügel des Keilbeins.
IV Scheitelbein.
a Warzenbein am Hinterhauptbeine.
b Schläfenbein.
b′ Dessen Jochfortsatz und
e Jochbein.
h Oberkiefer.
h′ Unterkiefer mit dem Gelenkfortsatze a′ u. Kronenfortsatze b″

B. Rumpf.

V—V Wirbelsäule: 1—7 Halswirbel; 8—19 Rückenwirbel; 20—24 Lendenwirbel; 25—29 Kreuzwirbel; 30—33 Steißwirbel (die erstern und letztern Wirbel sind hier nicht sichtbar).
g—k Rippen: die 7 ersten sind wahre, die 5 letzten k—k falsche Rippen;
g Rippenköpfchen;
h Mittlerer Theil der Rippen od. eigentliche Rippen;
i Rippenknorpel.
a—f Brustbein: a Handhabe; b—e verwachsene Brustbeinstücke; f Schwertknorpel.
a—d Beckenknochen: a Hüft- od. Darmbein; b Sitz- oder unteres Hüftbein; c Scham- oder Schooßbein; d Hüftloch.

C. Knochen der Gliedmaßen.

Arme:

a Schulterbein (hinter den Rippen);
b Schulterhöhe;
c Rabenschnabelfortsatz;
d Schlüsselbein;
e Oberarm;
e¹ Gelenkkopf;
e² großer und
e³ kleiner Höcker;
e⁴ rauhe Linie;
e⁵ innerer und
e⁶ äußerer Knopf;
e⁷ Rolle;
f Speiche;
g Ellenbogenbein;
h erste und
i zweite Reihe der Handwurzelknochen;
k—k Mittelhand;
l—l Finger, jeder mit 1—3, der Daumen mit 2 Gliedern.

Beine:

e Schenkel;
e¹ Schenkelkopf;
e² großer und e³ kleiner Höcker od. Umdreher (trochanter);
e⁴ rauhe Linie;
e⁵ die beiden Gelenkköpfe;
f Schienbein;
f′ innerer Knöchel;
g Wadenbein;
g″ Kniescheibe;
h hintere und
i vordere Fußwurzelknochen;
1 Sprungbein;
2 Fersenbein;
3 Kahnbein;
k Mittelfuß;
l Zehen.

2) Der **Rumpf** oder Stamm, dessen Theile: **a)** die **Wirbelsäule** oder das Rückgrath (s. Fig. 2.), welches auf seinem obern Ende den Kopf trägt, besteht beim Menschen aus 24 wahren Wirbeln (7 Hals-, 12 Rücken- oder Brust- und 5 Bauch- oder Lendenwirbeln), aus dem Kreuz- oder Heiligenbein (5 falsche, d. h. verwachsene Wirbel) und Steiß- oder Kuckucksbein (4 bis 5 kleine Knochen). Durch die Wirbelsäule zieht sich von der Hirnschale bis zum äußersten Ende des Leibes ein Kanal, welcher das Rückenmark einschließt. **b)** Die **Brustknochen,** nämlich das Brustbein und die Rippen. Die 7 obern Rippenpaare verbinden sich vorn mit dem Brustbeine und heißen Brustrippen oder wahre Rippen, und die 5 untern Paare kurze, falsche oder Bauchrippen. Die Rippen umschließen eine große Höhlung: die Brustrippen und das Brustbein die Brusthöhle mit Herz und Lungen; die Bauchrippen die Bauchhöhle mit Darm, Leber, Nieren ꝛc.; beide Höhlen sind durch das Zwerchfell getrennt. **c)** Die **Beckenknochen** (s. Fig. 2.).

3) Die **Gliedmaßen** oder **Extremitäten,** (s. Fig. 2.) deren die meisten Wirbelthiere 2 vordere und 2 hintere haben. **1.** Vorderglieder: **a)** die Schulter, aus dem Schulterbeine, der Schulterhöhe, dem Hakenfortsatze und Schlüsselbeine bestehend; **b)** der Arm, aus dem Ober- und Unterarme, mit der Speiche und Elle, und aus der Hand mit Handwurzel (carpus), Mittelhand (metacarpus) und Fingern (digiti), nämlich Daumen, Zeige-, Mittel-, Ring- und Ohrfinger bestehend. **2.** Hinterglieder: **a)** das Bein mit dem Schenkel (femur), Schienbeine (tibia), Wadbeine und der Kniescheibe; **b)** der eigentliche Fuß mit dem Fußwurzelknochen (tarsus), Mittelfußknochen (metatarsus) und den Zehen (digiti).

II. Das **Muskelsystem.** Muskeln sind in der Mitte dicke, an den Enden dünne, sehr verlängerte elastische Bündel von Fleischfasern, zwischen welchen das Zellgewebe liegt, worin sich das Fett ansammelt. Sie hüllen die Knochen ein u. bilden bei den höhern Thieren das eigentliche Fleisch, den größten Theil der Körpermasse. Das Muskelsyst. ist am Vollkommensten bei den warmblütigen, schon unvollkommner bei den kaltblütigen Wirbelthieren, bei den Insekten etwas verwickelter durch die Zahl der Muskeln (an der Raupe des Weidenbohrers hat Lyonnet schon um 1762 üb. 4000 Muskeln unterschieden), verliert sich abwärts allmählig immer mehr bis auf die letzte Spur. §. 12.

Alle Bewegungen des Thiers, die Ausdehnungen, Beugungen und Verkürzungen der Glieder, das Kauen, Schlucken, Schreien ꝛc. werden durch Verlängerung und Zusammenziehung der Muskeln in Folge eines ihnen von den **Bewegungsnerven** mitgetheilten Reizes bewirkt. Legallois und Andere haben gezeigt, daß die Ursache der Muskelbewegung nicht im Gehirn, sondern im Rückenmarke ihren Sitz habe und vom Gehirne **nur** der die Bewegung bestimmende Wille ausgehe. Man unterscheidet die Muskeln nach ihren Verrichtungen: Streck-, Beug-, Hebe-, Roll-, Ab- und Anziehmuskeln; in Beziehung auf den Willen: willkührliche und unwillkührliche Muskeln; nach ihrer Lage: Kopf-, Glieder-, Rumpf- und allgemeine Leibesmuskeln. Die Muskeln der willkührlichen Bewegung sind durch sehr feste **Sehnen** oder **Flechsen** an harte Theile befestigt, die man als eben so viele Hebel ansehen kann und die bei den Wirbelthieren innerlich liegen und Knochen (inneres Skelet), bei den wirbellosen Thieren aber äußerlich den Körper bedecken und Muschelschalen, Crusten ꝛc. (äußeres oder Hautskelet) heißen. Die Muskeln der unwillkührlichen Bewegung (beim Athmen und Verdauen thätig) sind an Schleimhäuten der innern Organe befestigt. Durch die Thätigkeit der Muskeln wird die freiwillige Ortsbewegung oder Locomotivität bewirkt, welche **a)** durch Gliedmaßen, die vollkommensten Bewegungsorgane, geschieht: Gehen, Laufen, Hüpfen, Springen, Klettern, Graben, Fliegen, Schwimmen, Tauchen; **b)** ohne Gliedmaßen: Kriechen, Spannen (Blutegel, Spannraupen ꝛc.). Die Bewegungsorgane heißen nach der verschiedenen Form: **a)** Arme, **b)** Flügel, **c)** Beine, **d)** Flossen, **e)** Saugnäpfe (Dintenfisch), **f)** Fangarme (Polypen).

III. Die **Empfindung,** deren Organe die **Empfindungsnerven,** die Vermittler zwischen Seele und Körper sind, die Träger des Empfindungsvermö- §. 13.

§. 13. gens (Sensibilität) oder der Fähigkeit, Eindrücke aufzunehmen und zum Bewußtsein zu bringen. Die empfindlichsten Körpertheile haben die meisten Nerven; wo gar keine Nerven sind, da ist auch keine Empfindung.

Die Nerven bestehen aus Marksubstanz, einer weichen, käseartigen Masse, und verbreiten sich als zweig- und netzartig verbundene, aus einem Mittelstamme entspringende Fäden (Nervensystem) durch den ganzen Körper, liegen aber als die verletzbarsten u. empfindlichsten Organe nie äußerlich, sondern immer versteckt an geschützten Stellen des Körpers. Nach Prévost und Dumas kann ein $1/2$‴ dicker Nerv 16,000 Nervenfäden neben einander enthalten, ohne sich zu verzweigen. Je höher ein Thier auf den Stufen der Organisation steht, desto ausgebildeter ist auch dessen Nervensystem; am ausgebildetsten bei den Wirbelthieren, bei welchen es in folgende 2 Systeme zerfällt:

III. Das **Cerebral- oder animalische Nervensystem,** dessen Hauptsitz der Schädel mit dem Gehirne und der Rückenmarkskanal mit dem Rückenmarke. Das Gehirn zeigt auf der Oberfläche darmähnliche Wülste (Windungen), und wird durch einen tiefen Einschnitt in 2 Hälften getheilt, das große und kleine Gehirn, jenes im Vorder-, dieses im Hinterschädel liegend und jedes 2 Halbkugeln bildend. Durch das sogenannte verlängerte Mark, welches durch das Hinterhauptloch tritt, setzt sich das Gehirn ins Rückenmark fort. Aus dem Gehirn (s. Fig. 3.) entspringen 12 Nervenpaare für die Sinnesorgane

Fig. 3.



Darstellung der aus dem Gehirn a und dem Rückenmarke g bis l entspringenden Nerven (Cerebro-Spinalnervensystem).

a Großes Gehirn.
b Vorderlappen der linken Halbkugel desselben.
c Mittellappen.
d und e Hinterlappen und kleines Gehirn.
f Verlängertes Mark.
g Rückenmark.
h Armgeflecht.
i Schenkelgeflecht.
k Großer Hüftnerv.
l Ende des Rückenmarks, Pferdeschweif.
1—12 Die 12 Gehirn- oder Kopfnervenpaare.
13—19 ꝛc. Rückenmarksnerven.

(Riechnerven, Sehnerven ꝛc.); aus dem verlängerten Marke entspringen 4 Nervenpaare, welche sich nur theilweise im Kopfe verbreiten und Zweige nach den übrigen Körpertheilen, namentlich dem Magen und den Gedärmen, aussenden (Magenübel sind deshalb meist mit Kopfschmerz verbunden und Eingeweidewürmer erregen zugleich ein Grübeln in der Nase). Vom Rückenmarke aus laufen 30 bis 32, nach den Wirbeln der Wirbelsäule benannte Nervenpaare aus (8 Hals-, 12 Rücken-, 5 Lenden- und 5 Kreuznerven). Der 5te bis 8te Halsnerv bildet das Armgeflecht h; die 5 Lendennerven das Schenkelgeflecht i; aus ersterm entspringen die Armnerven, aus letzterem die Nerven für die Hinterglieder. Die Nerven gehen also vom Gehirn und Rückenmarke aus durch den ganzen Körper zu den Muskeln, Sinnesorganen und der Haut und dienen sowohl zur willkührlichen Bewegung als zur Anregung der Sinnesorgane (Bewegungs- und Empfindungsnerven). Der Mensch hat das entwickeltste und größte Gehirn (durchschnittlich 3 Pfund schwer), die Affen und Fleischfresser haben ein kleineres, die Nagethiere ein noch kleineres und einfacheres; bei den Fischen, den dummsten aller Wirbelthiere, ist es auf das Minimum zurückgeführt.

IV. Das **Ganglien-** oder **Rumpfnerven-** oder **vegetative Nervensystem** (sympathetische Nerven) hat seinen Hauptsitz in der Bauch- und Brusthöhle. Es besteht aus einer großen Anzahl kleiner Nervenmassen, welche durch Markfäden u. verschiedene Nerven verbunden sind u. mit den aus dem Cerebralsysteme entspringenden anastomisiren (zusammenmünden, sich verflechten), viele Geflechte und Knoten (Nervenknoten oder Ganglien) bilden und Ganglien- oder Eingeweidenerven heißen, weil sie die Verrichtungen der Eingeweide, die unwillkührlichen Bewegungen des Magens, Herzens, Darms, der Lunge, so wie alle im gesunden Zustande uns unbewußten Absonderungen des Schleims, Fetts, Harns, der Galle ꝛc. bewirken.

Fig. 4.





Darstellung der Nerven eines Seesterns (§. 231), darunter einer nackten Schnecke u. daneben eines Kohlweißlings (§. 157).

Seestern. Um den Mund liegen 5 einander ganz gleiche Nervenknoten a, welche durch einen Nervenring b verbunden sind und Nervenfäden nach den 5 Strahlen c abgeben.

Schnecke. Ein Nervenknoten a oben über der Speiseröhre, Hirnknoten genannt u. die Sinnesnerven für Augen d, Mund u. Fühler aussendend; ein zweiter, größerer Nervenknoten b in der Kehlgegend, die Nerven der Eingeweide und des Fußes (Sohle) aussendend. Beide Nervenknoten sind durch einen Nervenring c, das Markhalsband genannt, verbunden, welches für die meisten Weichthiere charakteristisch ist.

Kohlweißling. Nervenstrang der Raupe am längsten, der Puppe daneben kürzer, u. des Schmetterlings am kürzesten. Diese 3 Figuren zeigen das allmählige Verkürzen, Zusammenfließen u. Verschwinden der durch Zahlen bezeichneten Nervenknoten.

Die wirbellosen Thiere haben nur vegetative Nerven, welche sich zu einer gewissen Anzahl mehr oder weniger von einander entfernter Ganglien vereinigen und auch die willkührlichen Bewegungen vermitteln. Bei manchen der niedrigsten Thiere, z. B. bei einigen Infusorien (§. 240.) fand man, vielleicht weil unsere Mikroskope zur Erkennung von solchen feinen Gebilden nicht stark genug sind, noch gar keine Nerven, bei vielen nur einfache Nervenfäden, welche bei Strahlthieren (§. 228.) zuerst als fast einfacher Nervenring um den Schlund auftreten, bei Mollusken schon dicke Knoten bilden und sich so immer mehr bei Insekten ꝛc. verzweigen, bis bei den Wirbelthieren das Gehirn als Centralorgan aller Nerven auftritt. (s. Fig. 3. u. 4.)

Die Fähigkeiten, durch Nerven äußere Eindrücke zu empfinden, nennt man Sinne; die Organe, durch welche dies geschieht, Sinneswerkzeuge oder Sinnesorgane, deren die höheren Thiere 5 haben: §. 14.

1) Der **Gefühlssinn**, dessen Organ die Haut, in welche zahlreiche Nervenverzweigungen enden. Sie besteht: **a)** aus der nervenlosen, also unempfindlichen Oberhaut (epidermis), unter welcher **b)** die Schleimhaut oder das Malpighi'sche Schleimnetz liegt, die färbende Substanz (Pigment) der Haut (Neger, Indianer, Europäer §. 28.) enthaltend; **c)** die Leder- oder Gefäßhaut mit den Hautwärzchen oder Papillarkörpern, dem eigentlichen Sitze des Gefühls, zugleich die dickste, schwer zerreißliche Haut, welche gegerbt das Leder liefert. Die obersten Schichten der Epidermis lösen sich nach und nach ab und bilden einen weißlichen, aus kleinen Schüppchen bestehenden Staub (s. g. Schinn); durch Brandblasen wird die Epidermis ganz abgeschält und läßt die Lederhaut nackt. Die zahlreichen Oeffnungen in der Epidermis für den freien Durchgang

§. 14. des Schweißes nennt man Hautporen; die flaschenförmigen, eine fette Substanz (Hautschmiere) absondernden Beutelchen (Hautdrüsen) in der Lederhaut heißen Talgdrüsen und die darin erhärtete Hautschmiere nennt man Mitesser. Der Gefühlssinn ist der einfachste, aber am allgemeinsten und fast über den ganzen Körper verbreitete, keinem Thiere fehlende Sinn, obgleich eigentliche **Taſtorgane** meist nur sehr unvollkommen entwickelt sind. Als solche gelten bei den Weich-, Strahlthieren und Polypen die Fühlfäden; bei den Insekten die Fühler, bei einigen Vögeln, z. B. Enten, Schnepfen ꝛc. der häutige Ueberzug des Schnabels; bei Schlangen die Zunge; bei vielen Reptilien, Fischen und Säugethieren die Lippen; bei dem Menschen vorzüglich die Fingerspitzen. Haare, Schuppen, Federn, Nägel, Hörner ꝛc. sind als Hautbildungen anzusehen. Für die Fledermäuse, welche in völliger Dunkelheit und in beschränktem Raume umherflattern, ohne anzustoßen, will Spalanzani noch einen sechsten Sinn annehmen.

2) Der **Gesichtssinn**, dessen Organ das Auge, ist nächst dem Gefühlssinne im Thierreiche am allgemeinsten verbreitet und wird im Embryo (§. 20. IV.) zuerst sichtbar. Bei den Wirbelthieren ist das Auge paarig und beweglich und besteht aus 3 in einander steckenden Häuten: **a)** die Netzhaut, der wesentlichste Theil, ist eine netzförmige Ausbreitung des Sehnervs, schließt 2 durchsichtige Körper, den runden Glaskörper und linsenförmigen Krystallkörper ein. Diese werden **b)** von der Gefäßhaut umschlossen, welche vorn über der Krystalllinse, von der sie nur durch Wasser abgesondert wird, braun, grau oder blau ist und Regenbogenhaut, Iris oder Augenstern heißt, in der Mitte aber über der Krystalllinse eine runde Oeffnung, das Sehloch (Pupille) hat. Auf der innern Fläche der Gefäßhaut liegt ein schwarzer Farbestoff, das schwarze Pigment, welches den Albino's (§. 28.) fehlt. Ueber der Gefäßhaut liegt **c)** die harte Augenhaut, welche den ganzen Augapfel umschließt und vorn Hornhaut heißt. Augen der Vögel (§. 61.), der Fische (§. 97.), Reptilien (§. 83.), Gliederthiere (§§. 121. und 122.), Kopffüßler (§. 222.) u. s. w. Unter den Wirbelthieren hat die Blindmaus, der Zokor und der Blindmaulwurf (§. 43.), so wie die Blindwühle, der Olm (§. 96.) verkümmerte, und die Bauchkieme (§. 120.) gar keine Augen; unter den wirbellosen Thieren sind viele Thiere ohne Augen, wie Polypen, Eingeweidewürmer ꝛc.

3) Der **Geschmackssinn**, dessen Organ die Zunge, wenn sie fleischig und mit Nervenwärzchen (Papillen) besetzt ist. Bei Säugethieren und vorzüglich beim Menschen ist dieser Sinn am schärfsten, bei Vögeln und Reptilien schwächer. Fische haben eine kleine, festgewachsene, oft knöcherne oder mit Zähnen besetzte Zunge, die mehr zum Festhalten und Verschlucken der Nahrung, als zum Schmecken dient. Bei den niedern Thieren scheint der Geschmack seinen Sitz in keinem besondern Apparate, sondern in allen Theilen der Mundöffnung zu haben.

4) Der **Geruchssinn** (Sinn für die Atmosphäre), dessen Organ die vielgestaltige Nase, zwei aus zarten Knochen (Siebbein ꝛc.) und Knorpeln gebildete und mit nervenreicher Schleimhaut ausgekleidete Höhlen, welche sich nur bei den Wirbelthieren finden und mit der Rachenhöhle in Verbindung stehen, nur bei den Fischen sich blindsackförmig schließen (§. 97.). Viele der übrigen Thiere, namentlich manche Insekten, riechen sehr gut; doch hat man noch kein specielles Geruchsorgan bei ihnen entdeckt.

5) Der **Gehörssinn**, dessen Organ das Ohr, welches nur bei Wirbelthieren vollkommen ausgebildet ist. Das äußere Ohr oder die Ohrmuschel geht in den Gehörgang über und führt zur Paukenhöhle, welche durch das Paukenfell (Trommelfell) geschlossen ist und durch die Ohrtrompete (Eustachische Röhre) mit dem Munde in Verbindung steht. Aus der Paukenhöhle, in welcher 3 kleine Knochen, Hammer, Ambos und Steigbügel, liegen, führen 2 durch Häute verschlossene Löcher ins Labyrinth, den eigentlichen Sitz des Gehörs; das eine Loch führt zum Vorhofe vor den 3 zirkelförmigen Kanälen oder Bogengängen, das andere Loch führt zu einem Gange, der Schnecke. Viele der wirbellosen Thiere können ohne Zweifel hören, doch kennen wir deren Gehörorgane nicht; nur bei Krebsen und Sepien (§§. 203. und 222.) hat man innere

Gehörgänge gefunden und den Insekten dienen vielleicht die Fühler als Gehör- und Tastorgane zugleich.

III. Die **Ernährung** besteht **a)** in der Einführung fremder Stoffe in den Körper; **b)** in der Assimilation (§. 3.) und Organisirung der eingeführten Stoffe und **c)** im Ausstoßen der unbrauchbaren Stoffe. Ihr Zweck ist Erhaltung des Individuums durch Vermehrung oder Ersetzung verlorener oder verbrauchter Stoffe des thierischen Körpers. §. 15.

Die **Functionen der Ernährung** bestehen wesentlich: **1)** in der Verdauung im Darmkanale, in welchem durch die Verdauungsorgane aus den Nahrungsmitteln die nährenden Stoffe abgesondert werden (Darmsystem); **2)** in der Assimilation, indem die Nahrungsstoffe **a)** durch die Circulation oder den Kreislauf in den Blutgefäßen (Gefäßsystem) und **b)** durch die Respiration oder Athmung in den Lungen oder Kiemen (Lungensystem) in eine den Bestandtheilen des Körpers gleichartige Masse, in Blut, umgewandelt und **3)** durch Ausdünstung und Secretion überflüssige Stoffe (Harn, Schweiß ꝛc.) ausgeschieden werden. So entstehen die 3 vegetativen Systeme, das Darm-, Gefäß- und Lungensystem, welche sämmtlich durch weiche und schlauchartig in die Länge gezogene Häute gebildet werden. Der Darm liegt in der Bauchhöhle (§. 11, 2), welche von der Brusthöhle, worin die Lunge liegt, durch das Zwerchfell getrennt ist; das Gefäß geht über beide hinaus zu allen Theilen des Körpers.

V. Das **Darm-, Verdauungs-** oder **Digestionssystem,** welches im Nahrungskanale bewirkt wird, dessen Theile: **1)** die **Mundhöhle, 2)** der **Schlundkopf, 3)** die **Speiseröhre,** welche hinter der Luftröhre herablaufend unter dem Zwerchfelle sich **4)** zum **Magen** erweitert, einen mit Schleimhaut ganz ausgekleideten weiten, nach oben und unten offenen Sack bildet, welcher bei einigen Säugethieren einem Dudelsacke ähnlich ist und auch als solcher benutzt wird. Vorn wird der Magen von der Leber bedeckt und bildet an der Verbindungsstelle mit der Speiseröhre den Blindsack, an welchem die zum Gefäßsysteme gehörende Milz liegt. Die Leber umschließt die Gallenblase, deren Inhalt sie absondert; jedoch fehlt selbst vielen Säugethieren (Pferden, Hirschen, Elephanten, Kameelen ꝛc.) die Galle gänzlich. Die enge Fortsetzung des Magens nach unten bildet **5)** den beim Menschen an 30′ langen **Darm** (intestina), dessen Theile: **a)** der **Dünndarm,** an welchem man den quer über dem Magen liegenden, beim Menschen 12 Querfinger breiten Zwölffingerdarm unterscheidet und mit welchem Leber und Bauchspeicheldrüsen in Verbindung stehen; **b)** der beim Menschen an 20′ lange **gewundene Darm,** enger als der Dünndarm und überall vom Gekröse umgeben, aus welchem die Gefäße des Nahrungssaftes entspringen; **c)** der **Dickdarm,** beim Menschen etwa 5′ lang, sich mit dem After endend und in Blind-, Grimm- und Mastdarm unterscheiden. Der Nahrungskanal ist bei vielen Thieren nur ein einfacher Schlauch mit einer Oeffnung für Mund und After zugleich (die meisten Polypen und Seesterne) oder mit 2 gesonderten Oeffnungen für Mund und After und bald mehr oder weniger erweitert und mehr oder weniger Höhlen bildend (Wiederkäuer §. 51.). §. 16.

Zur Ernährung und Verdauung gehört: **1)** das Ergreifen der Nahrung. Die feste Nahrung wird vom Menschen und Affen mit Händen, vom Chamäleon (§. 90.) mit der Zunge, vom Elephanten mit dem Rüssel, von Insekten mit den Kinnladen und Tastern, von Polypen mit Fangarmen in die Mundhöhle gebracht; die flüssige Nahrung wird getrunken und eingesogen (Insekten mit saugenden Mundtheilen §. 125.); **2)** das Kauen mit den Zähnen; **3)** das Einspeicheln; **4)** das Verschlucken; **5)** die Verdauung im Magen oder die Chymusbildung. Die den Magen auskleidende Schleimhaut sondert durch ihre Magenschleimdrüsen den Magensaft ab, der nach Spallanzani's und Beaumont's Untersuchungen die Hauptursache der Verdauung oder Chymusbildung (Verwandlung in eine breiartige Masse) ist, welche durch einen eigenthümlichen Stoff, von Wasmann und Schwane entdeckt und Pepsin (Verdauungsstoff) genannt, bewirkt wird. Die Verdauung wird sodann im Dünndarm vollendet, wo sich die Galle, eine bitterschmeckende Flüssigkeit aus §. 17.

der Leber, und der Saft des Pancreas oder der Bauchspeicheldrüse hinzumischt und den Chymus in Chylus (Milchsaft, Speisesaft) verwandelt, eine weißliche, ölige, schleimige, wässerige Flüssigkeit, welche von zahlreichen Saugadern (Lymphgefäßen) aufgesogen und als Lymphe dem Blute zugeführt wird. Die Theile der Nahrungsstoffe, welche nicht in Chylus umgebildet werden konnten, werden als Urin und durch den Dickdarm als Koth abgeführt.

Die Absorption (Auffaugung) findet aber nicht allein durch die Lymphgefäße Statt, sondern durch alle Körpertheile, welche eine mehr oder weniger schwammige Structur haben, ist eine, allen lebenden Wesen, also auch den Pflanzen, gemeinsame Function. Die Absorption geschieht **1)** durch die Capillaranziehung, auf dieselbe Weise wie Oel im Lampendochte und Dinte im Löschpapiere schnell in die Höhe steigt; **2)** durch die Endosmose, eine von Dutrochet vor einigen Jahren entdeckte und auch bei Pflanzenernährung Statt findende Erscheinung, welche darin besteht, daß sich 2 durch ein organisches Gewebe getrennte Flüssigkeiten von verschiedener Dichtigkeit ins Gleichgewicht zu setzen streben, indem die dünnere Flüssigkeit durch die sie trennende Membran (Häutchen) von der einen, und die dichtere von der andern Seite so lange durchdringt, bis beide im Gleichgewichte sind. Dadurch entsteht eine doppelte Strömung, die dünnere Flüssigkeit dringt schneller durch, so daß die dichtere mehr gewinnt als verliert und also in ihrem Behälter so lange steigt, bis beide Flüssigkeiten gleiche Dichtigkeit haben. Das stärkere Eindringen der dünnern Flüssigkeit nennt Dutrochet die Endosmose, das viel unmerklichere Austreten der dichtern Flüssigkeit aber Exosmose. Nebst der Capillaranziehung hält Dutrochet dies Phänomen für den Hauptgrund aller Saftbewegung in Pflanzen, also des Aufsteigens des Saftes im Frühjahre, des Auffaugens der flüssigen Nahrungsstoffe durch die Pflanzenwurzeln ꝛc. Auch die thierischen Körper saugen Flüssigkeiten auf dieselbe Weise ein und zwar desto schneller, je schwammiger und gefäßreicher der Körpertheil ist. Daher ist die Absorption (Auffaugung) der Lungen sehr groß, die der äußern Haut sehr gering, so daß wir ohne Gefahr mit unverletzter Haut Blausäure (II. §. 112.) berühren können. Die höhern Thiere haben besondere Einsaugungsgefäße (Saugadern); bei vielen Thieren geschieht die Absorption aber nur durch die Blutgefäße. Bei den Eingeweidewürmern und vielen Wasserthieren ist auch die Haut ein vorzügliches Ernährungsorgan. Die starke Absorptionskraft der Haut sieht man deutlich an der starken Gewichtsvermehrung eines Frosches, welchen man einige Zeit so in Wasser taucht, daß dies nicht ins Maul eindringen kann; auch an einem, einige Zeit auf durchnäßten Torf gesetzten gefleckten Salamander (§. 96.). Thiere können ihre **Nahrung** nur aus dem organischen Reiche nehmen und wenn sie, wie manche Fische, einige wilde Völker ꝛc. auch Erde fressen, so besteht diese meist aus zersetzten thierischen und vegetabilischen Stoffen. Das Bedürfniß nach Nahrung gibt sich durch eine eigenthümliche Empfindung, den Hunger, kund. Dieser wird vermehrt durch Bewegung, mäßige Kälte ꝛc.; geschwächt durch Ruhe, Schlaf und alles, was die Lebensthätigkeit verzögert. Thiere fressen deshalb während ihres Winterschlafs wenig oder nichts; kaltblütige Thiere (Fische, Reptilien) können lange fasten; Thiere mit rascher Ernährung (Säugethiere und namentlich Junge derselben) sterben schneller den Hungertod, als die übrigen.

8. VI. Das **Gefäß- oder Adersystem** oder die Gesammtheit aller Gefäße oder Adern, d. h. aller häutigen, langen, Flüssigkeit führenden Röhren, welche von einem Centralorgane, von dem Herzen aus wie Zweige und Aeste eines Baumes nach allen Theilen des Körpers laufen. Die Theile des Gefäßsystems sind daher Herz, Gefäße und Blut.

A. Das **Herz** (Fig. 5. a), in der Brusthöhle zwischen den Lungen liegend und von einem häutigen Sacke, dem Herzbeutel umgeben, wird bei Säugethieren und Vögeln inwendig durch eine vertikale Scheidewand in 2 Hälften, die linke und rechte, (i u. h) geschieden und jede dieser durch eine Querwand wieder in 2 über einander liegende Höhlen getrennt; die beiden untern, vollständig geschiedenen Höhlen heißen linke und rechte Herzkammer und öffnen sich in die über jeder liegende kleinere Höhle, linkes und rechtes Herzohr (Vorkammern). Die

meisten Thiere haben ein Herz, doch ist die Bildung desselben schon bei den Wirbelthieren verschieden (§. 23.) noch mehr aber bei den wirbellosen Thieren; bei Insekten z. B. findet sich bloß ein kleines, geschlossenes cylindrisches Rückengefäß statt des Herzens. §. 18.

B. Das **Blut** ist die specielle Quelle der Ernährung, aus welchem alle übrigen Theile des Körpers sich bilden; aus welchem auf eine uns verborgene Art jedes Organ das ihm Taugliche zu ziehen weiß, so daß das Blut Allen Alles ist und in seinen Bestandtheilen, deren die Chemiker viele der verschiedenartigsten darin entdeckten, den ganzen Körper schon gleichsam flüssig enthält: in der Gallerte die Haut, im thierischen Faserstoffe (Fibrine §. 6.) die Muskeln (daher das Blut auch wohl flüssiges Fleisch genannt wird), im Eiweiße die Nerven, in der Kalkerde die Knochen, im Eisen die rothe Farbe der Muskeln ꝛc. Das Blut hat bei Säugethieren durchschnittlich eine Wärme von + 28° R., bei Vögeln von + 30° R.; bei Fischen und Reptilien ist die Wärme nicht viel höher als die Temperatur des Elements, in welchem sie leben (kaltblütige Thiere). Beim Erkalten scheidet sich das Blut in Blutwasser (serum) und Blutkuchen (cruor, crassamentum), welcher aus dem während des Lebens im Blutwasser aufgelöseten Faserstoffe und Blutkügelchen besteht; letztere sind beim Menschen etwa $^3/_{100}$‴ dick, haben inwendig einen Kern, geben dem Blute die rothe Farbe und sind bei den verschiedenen Thieren in Form, Farbe, Größe und Zahl sehr verschieden; die größten unter allen Thieren hat der Olm (§. 96.). Schlägt man das noch warme Thierblut mit einer Ruthe, so hängt sich der im Blutwasser enthaltene thierische Faserstoff als weißliche Fäden oder Flocken an die Ruthe und das Blut verliert die Eigenschaft zu gerinnen. Die Wirbelthiere haben rothes Blut; bei den meisten der übrigen Thiere besteht das Blut nur aus einer wässerigen Flüssigkeit, welche bald ganz farblos, bald gelblichgrün oder gelblichroth ist. Bei einigen Würmern und Mollusken ist das Blut zwar auch roth, steht aber überhaupt der Lymphe in den Saugadern der höhern Thiere näher. Alle Insekten und fast alle Crustaceen haben nur weißes Blut. Die rothen Säfte mancher Thiere sind, wie z. B. bei den saugenden Insekten, von rothblütigen Thieren eingesogen. Die rothe Flüssigkeit beim Zerdrücken der Stubenfliegen ist in den Augen derselben enthalten und kein Blut.

C. Die **Gefäße** heißen: 1) Schlag- oder Pulsadern (arteriae), welche das Blut vom Herzen fortleiten und deren Verzweigungen das Arteriensystem bilden. Die mit einem großen Stamme aus der linken Herzkammer (Fig. 5. i) entspringende und das Blut in alle Theile des Körpers führende Ader heißt die große Körperarterie oder Aorta (Fig. 5. g); die aus der rechten Herzkammer (Fig. 5. h) ausgehende und sich in den Lungen verzweigende heißt Lungenarterie (Fig. 5. d). 2) Blutadern (venae), welche das Blut zum Herzen zurückführen und deren Verzweigungen das Venensystem bilden. Die Lungenvenen (Fig. 5. e) führen das Blut aus der Lunge in die linke Vorkammer (Fig. 5. über i) und die Herzvenen führen dasselbe aus dem Körper in die rechte Vorkammer (Fig. 5. über h); 3) Saugadern oder lymphatische Gefäße, deren Verzweigungen das Saugadersystem bilden und die Lymphe (§. 17.) in allen Theilen des Körpers aufsaugen. Arterien und Venen sind an den äußersten Enden sehr fein und netzartig verzweigt und bilden die Haar- oder Capillargefäße, welche von beiden Systemen in einander übergehen (Fig. 5. A und B).

D. **Kreislauf** (Circulation) **des Bluts.** Die vorhin genannten Circulationsorgane können mit einem Baum verglichen werden, dessen fein verästelten Zweige (Fig. 5. A u. B) so gebogen sind, daß sie mit den fein verästelten Wurzeln sich vereinigen; der obere Stamm und dessen Zweige stellen die Arterien, der untere Stamm und dessen verzweigte Wurzeln stellen die Venen, die feinsten Verästelungen die Capillargefäße, der Vereinigungspunkt im Stamm die Stelle des Herzens vor. Der Blutumlauf wird vorzüglich durch das Herz und die Elasticität der Arterien bewirkt. Das Herz treibt durch seine Zusammenziehung (Herz-, Pulsschläge: bei erwachsenen Menschen 60—75, bei Kindern bis 120 in der Minute) das hellrothe oder Arterienblut (jedesmal etwa 3 Loth) aus der linken Herzkammer (Fig. 5. i) in die Aorta (Fig. 5. g) und durch deren Verzweigungen von da in alle Theile des Körpers bis zu den Capillararterien

3.



Theoretische Darstellung des Kreislaufs des Bluts:
Fig. 5. der Säugethiere u. Vögel. Fig. 6. der Reptilien. Fig. 7. der Fische.

In allen 3 Figuren bezeichnet A den kleinen und B den großen Kreislauf; die schwarz gezeichneten Adern f und b und d sind die zuführenden oder Venen oder Blutadern und die gegenüber liegenden weißen g, c und e die fortführenden oder Arterien oder Pulsadern; a das Herz; h und i in Fig. 5. bezeichnet die rechte und linke Herzkammer mit dem rechten und linken Vorhofe darüber; e die weiß gezeichneten Lungenvenen und d die schwarz gezeichneten Lungenarterien. Die Pfeile zeigen den Weg an, welchen das Blut nimmt.

(Fig. 5. B), wo es in dunkler gefärbtes Venenblut umgewandelt von den Capillarvenen aufgenommen und durch ihre Verzweigung in den rechten Vorhof des Herzens (Fig. 5. über h) zurückgeführt wird (großer Kreislauf Fig. 5. B). Diese Höhle treibt das zur Erhaltung des Lebens nicht mehr taugliche, dunkler gefärbte, wieder zu regenerirende Blut in die rechte Herzkammer (Fig. 5. h), welche es in die Lungenarterien (Fig. 5. d) bis zu deren Capillarsysteme in die Lungen stößt, wo es mit der Luft in Berührung kommt, und so wieder arterielles Blut wird, in die Lungenvenen (Fig. 5. e) strömt und von hier durch den linken Vorhof wieder in die linke Herzkammer (Fig. 5. i), von welcher er ausging (kleiner Kreislauf Fig. 5. A) und nun seinen Kreislauf (1619 von Harvey, Leibarzt des englischen Königs Karl I. entdeckt) von neuem beginnen kann. Der große Kreislauf B bewirkt die Ernährung, der kleine A die Respiration. Der Mensch hat etwa 28 bis 30 Pfd. Blut, welches in jeder Stunde etwa 20 mal im Körper herumkreiset. Ein Blutverlust von $^1/_{20}$ der Blutmenge tödtet schon manche Thiere; ein Blutverlust von 1—2 Pfd. schwächt den Menschen schon, doch erträgt er noch einen Verlust von 12, selten von 16—18 Pfd. **Säugethiere** und **Vögel** haben genannten doppelten Kreislauf (vollständige Circulation), welcher das Blut 2mal durchs Herz und durch 2 Capillarsysteme treibt. Diejenigen Warmblüter, welche lange Zeit unterm Wasser verweilen, haben meist gewisse Erweiterungen der Gefäße in der Nähe des Herzens, selbst zum Theil besondere Behälter, zur Aufnahme und Zurückhaltung des Bluts. Sehr ausgebildet ist diese Einrichtung bei Fischsäugethieren (§. 57.) und Tauchervögeln (§. 81.). Das Herz der **Reptilien** hat nur eine Herzkammer (Fig. 6. a) mit 2 Vorhöfen; ihre Respiration ist weniger vollständig, indem sich ein Theil des Venenbluts vor seinem Eintritte in die Lungen mit dem Arterienblute in dem einkammerigen Herzen mischt, wodurch das Blut nur unvollständig wieder belebt wird (§. 83.). Die **Fische** haben nur ein einkammeriges Herz mit einem Vorhof (Fig. 7. c, b); ihr Herz liegt fast an der Kehle hinten zwischen den Kiemen, nimmt alles Blut auf und treibt es unmittelbar in die Respirationsorgane (Kiemen), aus welchen es durch die Aorta und deren Zweige

allen Körpertheilen zugeführt wird, darauf kommt es durch die Venen (Fig. 7. d) zum Vorhofe des Herzens (Fig. 7. c), aus welchem es von Neuem durch die Herzkammer in die Respirationsorgane zurückkehrt; das Blut durchströmt also das Herz nur einmal. Der Kreislauf des Bluts ist hier also nur einfach, weil das Blut nicht, wie bei den Warmblütern, aus den Athmungsorganen ins Herz zurückkehrt; überhaupt tritt bei den Wirbelthieren eine doppelte Circulation erst mit den Lungen auf.

VII. Das **Athmungs-, Lungen- oder Respirationssystem.** Da alle Körpertheile aus dem Blute ihre Nahrung und Bildung erhalten, so bedarf das zum Herzen zurückgekehrte venöse Blut (S. 15.) auch einer Ergänzung; es muß in arterielles Blut umgewandelt werden, wenn es von Neuem zur Ernährung tauglich sein soll. Diese Umwandlung geschieht durch die Respiration oder das Athmen, nebst dem Herzschlage die erste Bedingung des thierischen Lebens. Die ausgebildetsten Respirationsorgane sind die Lungen, ein schwammiges, fast die ganze Brusthöhle ausfüllendes, aus 2 durch die Luftröhre verbundenen Flügeln (Lungenflügel) zusammengesetztes Organ (bei erwachsenen Menschen etwa 4 Pfund schwer). Die Luftröhre mündet im Schlunde, wo ihr oberer Theil den Kehlkopf mit der Stimmritze bildet. Im Zusammenziehen und Ausdehnen der Lungen besteht der Mechanismus des Athmens; außerdem bringen die Lungen auch noch die Stimme hervor. Aus dem Herzen wird das Blut durch die Lungenarterien (Fig. 5. d) in die Lungen getrieben, und durch die hinzutretende Luft umgewandelt durch die Lungenvenen (Fig. 5. e) dem Herzen wieder zugeführt (kleiner Kreislauf Fig. 5. u. 6. A). Die Umwandlung des Bluts, die neu belebende Kraft desselben wird durch die Luft bewirkt (21 Raumtheile Sauerstoff, 78 Stickstoff und etwas Kohlensäure) und besteht wesentlich in der Aufnahme des Sauerstoffs und Absetzung des Kohlenstoffs. (Die belebende Eigenschaft des Sauerstoffs ist erst 1771 von dem französischen Chemiker Lavoisier, welcher 1794 ein Opfer der Revolution wurde, entdeckt.) Die Luft giebt den Sauerstoff an das Blut ab, färbt dasselbe röther und erhält fast eben so viele, schon im Venenblute vorhandene Kohlensäure zurück (nach William Edwards Versuchen). Das Blut nimmt aber aus der Luft auch zugleich Stickstoff (S. 3.) auf, wodurch die Wirkung des Sauerstoffs, welcher im reinen Zustande bei den Thieren eine Art Fieber erzeugen würde, geschwächt wird. Da nun umgekehrt die Pflanzen aus der Atmosphäre Kohlensäure aufnehmen und Sauerstoff abgeben, so liefern sich Pflanzen und Thiere wechselweise ihren nöthigen Bedarf und erhalten das Gleichgewicht in der Luft. §. 19.

Bei den einfach organisirten Thieren geschieht die Respiration in keinem besondern Apparate (§. 10.), sondern in allen Theilen, welche mit der Luft in Berührung kommen, namentlich auch durch die allgemeine Körperhaut. Die **Respirationsorgane** der luftathmenden Thiere sind: **1)** Lungen (bei den Warmblütern und meisten Amphibien; einfacher gebauet auch bei den meisten Spinnen und einigen Mollusken); **2)** Luftkanäle oder Tracheen d. h. nach außen mit der Luft durch Oeffnungen (stigmata) in Verbindung stehende und durch ihre Verzweigungen die Luft in alle Theile des Körpers führende Kanäle (bei Insekten und einigen Arachniden). Die Respirationsorgane der wasserathmenden Thiere heißen **3)** Kiemen, welche in Form bei den verschiedenen Thieren sehr verschieden sind und den Sauerstoff aus dem Wasser (fast 89 Gewichtstheile Sauerstoff und 11 Wasserstoff) dem Blute zuführen (bei den Fischen, manchen Reptilien, Wasserinsekten ꝛc.).

VIII. Das **Fortpflanzungssystem.** Der Grund aller uranfänglichen Entstehung ist die Schöpfung. Das Wie hier erfragen, hieße die Allmacht des Schöpfers ergründen wollen. Gott sprach: es werde — und es ward. Die Fortpflanzung und Vermehrung der ursprünglich aus Gottes Hand hervorgegangenen Wesen geschieht nun §. 20a.

1. Durch **Urbildung, Urzeugung,** generatio spontanea oder aequivoca (freiwillige od. zweideutige: ob durch wirkliche Zeugung auf gewöhnlichem Wege od. durch Urzeugung entstanden?). Urzeugung nennt man eine ursprünglich mutterlose Zeugung d. h. ohne vorhergegangene Begattung und Befruchtung, ohne Entwickelung aus Eiern oder Samen und ohne ein Mutterthier oder ein Samenkorn derselben Art.

§. 20a. Seit Aristoteles Zeiten, welcher sogar die Zeugung der Aale aus verfaultem Moder annahm, hat sich der Glaube erhalten, daß die niedrigsten Organismen, namentlich die auf faulenden Stoffen lebenden, durch die Fäulniß selbst entständen. Durch Ehrenberg's Untersuchungen, welcher das wirkliche Keimen der Pilz- und Schimmelsamen (Sporen) und bei den kleinsten Infusorien von $^1/_{2000}$‴ Durchmesser männliche und weibliche Zeugungsorgane und Entwickelung aus Eiern neben der Vermehrung durch Theilung beobachtete, hat die Theorie der Urzeugung viel von ihrer frühern Wahrscheinlichkeit verloren, ist der Glaube an Urzeugung sehr schwankend gemacht, obgleich die Möglichkeit nicht geläugnet werden kann, daß Gott der Natur auch die Kraft verliehen habe, einen neuen, nicht schon im Keime vorhandenen organischen Körper zu bilden, da wir außerdem ja auch die Entstehung mancher Pflanzen und Thiere auf gewöhnlichem Wege noch immer nicht nachzuweisen vermögen. Wie kommt die nur auf das Gehirn beschränkte Quese (§. 218, 25) in den Schädel? Wie die Krätzmilbe (§. 210, 20) unter die Haut? Wie entsteht die Läusesuchslaus (§. 194.), die nur bei Kranken mit verdorbenen Säften sich erzeugt und gesunde Menschen gar nicht angreift? Wie entsteht der Schimmel in der geschlossenen Brusthöhle einiger Vögel; wie in völlig geschlossenen Wallnüssen? Von der Hefe, einem Produkte der Gährung, eines chemischen Prozesses (§. 3.), ist neuerdings nachgewiesen, daß sie aus Pflanzen (Hefenalge oder Gährungspilze. II. §. 337, 9) besteht. Hier sehen wir also, wie sich unter Vermittelung von Wärme auf chemischem Wege organische Wesen fortwährend bilden und beliebig bilden lassen. Ist nun die Entstehung der Gährungspilze eine Urzeugung? Sind auch die aus Pflanzen bestehenden Kahnbildungen auf Essig, Bier und Wein, so wie Essig- und Kleisteralchen gleich ursprünglich erschaffen? Einige Naturforscher verwerfen die Urzeugung ganz; andere dagegen nehmen jetzt nur noch zur Erklärung der Entstehung einiger niederer Thiere und Pflanzen eine Urbildung an, durch welche der Schöpfer anfangs alle Thiere und Pflanzen entstehen ließ, und glauben demnach, daß manche Eingeweidewürmer und besonders, daß durch Zerfällung der organischen Masse bei Fäulniß manche Infusorien, und durch verdorbene Pflanzensäfte manche Pilze entständen und sich dann auf die gewöhnliche Weise fortpflanzen. Je mehr Hinderniße jedoch der Fortpflanzung organischer Wesen im Wege stehen, desto reichlicher hat der Schöpfer für die Fortpflanzungsmittel gesorgt. Der Regenwurm hat in seinem Eierstocke 64 Millionen Eier, noch viel mehr Sporen hat der Riesenbovist (II. §§. 22 und 340.). Da nun die Fortpflanzungsmittel bei den niedrigsten Organismen immer am versteckteſten sind, so müssen wir glauben, daß wir auch von manchen die Fortpflanzungsart noch entdecken werden, wie sie denn auch besonders durch Ehrenberg neuerdings von mehren Infusorien entdeckt ist.

II. Durch **Sprossen-** oder **Knospenbildung,** indem **a)** das Junge aus dem Mutterkörper hervorsproßt und sich nach und nach trennt, oder indem sich **b)** der Mutterkörper in mehre Stücke theilt, welche ihre Organe nach und nach vollständig ausbilden und sich dann trennen. Medusen, Naiden, Magenthiere, Polypen (§§. 243. und 234.), so wie Conferven (II. §. 337, d.) im Pflanzenreiche entstehen und vermehren sich auf diese Weise.

III. Durch **Keimbildung,** durch **Keim-** oder **Eiersäcke,** welche ihre Metamorphose (S. 19.) erst durchlaufen, wenn sie an einen andern, meist äußerlichen Ort verpflanzt werden. Polypen, Medusen und Ascidien (§§. 234. 232 u. 227.) vermehren sich durch solche Keimsäcke.

§. 20b. IV. Durch **Begattung** oder geschlechtliche Fortpflanzung. Hier entwickelt sich das Thier aus dem Embryo (Thierkeime) des Eies im weiblichen Körper (♀), wozu Begattung und Befruchtung durch das männliche Thier (♂) nöthig ist. Nur ausnahmsweise findet auch eine Fortpflanzung mittelst unbefruchteter Eier Statt. Blattläuse (§. 192.), einige Spinnen und Mollusken (Paludina §. 224, 24) pflanzen sich auf diese Weise fort. Die unbefruchteten Eier scheinen hier die Kraft und Eigenschaft der Sprossen zu besitzen, so daß sich diese Erscheinung dem sogenannten **Generationswechsel** anschließt, unter welchem man Wechselgeburten von geschlechtlichen Individuen versteht, die sich

paaren und von ungeschlechtlichen Individuen, welche eine Nachkommenschaft aus Knospen und Sprossen liefern. Die Salpen unter den Mollusken (§. 227, 117), so wie Medusen (§. 232.) und manche Polypen (§. 233.) pflanzen sich durch Generationswechsel fort. Nur wenige Thiere (z. B. Bandwürmer, einige Schnecken und die Rankenfüßer §§. 218. 224. und 213.) sind ♂ und ♀ zugleich, also **Zwitter**, Hermaphroditen (☿), welche sich durch Selbstbefruchtung fortpflanzen, wie die meisten Pflanzen. Es befruchten sich dann **zwei** Individuen wechselseitig (Weinbergsschnecke) oder es befruchten sich wegen unbequemer Lage der Geschlechtstheile **mehre als zwei** wechselseitig, wie bei den Schlammschnecken, Limnaeus (§. 224, 22), deren oft 10—20 Exemplare in einem Klumpen zusammenhängen. Bei Bandwürmern (§. 218.) z. B. hat jedes der zahlreichen, mittlern Glieder einen Geschlechtsapparat. Nach der Begattung geschieht die fernere Entwickelung dann **a)** durch Eier außerhalb des ♀ entweder durch Bebrüten (Vögel) oder durch Sonnenwärme (Amphibien und Fische). Das Ei besteht aus Eiweiß und Dotter, in welchem das Keimbläschen dicht unter der Dotterhaut liegt. Vögel legen wenige und hartschalige Eier; Fische und Frösche sehr viele und kleine, in Schleim gehüllte Eier; nur bei Rochen und Haien sind unter den Fischen die Eier größer und lederartig (§. 118.). Schlangen, Eidechsen, Schildkröten und Krokodile haben meist Eier mit Pergamenthaut; bei Spinnen und Insekten bestehen die Eier fast ganz aus Dotter. **b)** Durch Eier innerhalb des ♀ oder durch Lebendiggebären, indem schon aus den vom Eierstocke losgetrennten Eiern mehr oder weniger entwickelte Junge hervorkriechen oder lebendig geboren werden, wie bei Säugethieren und einigen Reptilien ꝛc. Alle Thiere müssen bis zur völligen Entwickelung erst mehr oder weniger eine **Verwandlung** (metamorphōsis) bestehen. Am vollständigsten ist diese Verwandlung bei den Insekten (§. 122.), weniger vollständig bei den nackthäutigen Reptilien (§. 94.). Die gepanzerten Reptilien häuten sich nur; die jungen Vögel verlieren ihre Blutfedern und ihren wolligen Flaum; viele Säugethiere werden erst nach der Geburt sehend und erhalten ihre Zähne erst später oder wechseln die ersten Zähne (Milchzähne) mit größern und stärkern.

Fast in allen Thierklassen sind die Männchen oft ausgezeichnet durch Größe, Stärke, gröbere Muskeln, äußere Anhänge an Kopf, Brust, Füßen und hinterem Körperende (Hörner, Saugscheiben an den Füßen einiger Wasserkäfer, Haltorgane, Mähnen, Schweife, Federbüsche, Fleischkämme am Kopfe, befiederte Fühler, größere Kinnladen ꝛc.) so wie durch lebhaftere Färbung, stärkere Stimme, durch eigenthümliche Schwirrapparate ꝛc. (§. 25. d.)

I. Aeußere Lebensbedingungen. **1) Die innere Temperatur** wechselt von + 32° R. (bei Vögeln) bis — 4° R. bei wirbellosen Thieren; eine niedrigere Temperatur bewirkt bei den meisten kaltblütigen Thieren Erstarrung (Winterschlaf) oder Tod. Fische können bei — 4° bis — 8° R., Puppen und Raupen bei — 12° bis — 15° R., einige Warmblüter bei — 8° bis — 16° R., ja bei hinreichender Nahrung auf einige Zeit sogar bei — 32° bis — 36° R. ausdauern; Insekten ꝛc. leben in Sandwüsten sogar bei + 64° R.; Insekten, Mollusken und Fische leben in heißen Quellen von + 40° bis + 48° R. Die Grenze des gedeihlichen Lebens liegt zwischen + 8° bis + 16° R. **2) Licht** ist keine absolute Lebensbedingung (Eingeweidewürmer, unterirdische Thiere). **3) Atmosphärische Luft** mit mehr oder weniger Feuchtigkeit, selbst für die Wasserthiere, da diese ebenfalls Sauerstoff ein- und Kohlensäure ausathmen. **4) Größe des Luftdrucks** ist ebenfalls keine nothwendige Lebensbedingung (in wenigen Minuten stürzt der Condor aus einer Höhe von 30,000′ herab und die Wale von der Oberfläche des Meeres bis 2000′ Tiefe hinunter). Kapitain Roß zog aus einer Meerestiefe von 1620 Fuß noch Polypen und Mollusken herauf. **5) Pflanzenleben** und **Thierleben** bedingt unmittelbar die Existenz vieler Thiere. §. 21 a.

II. Allgemeine Lebenserscheinungen. **1)** Das **Klima** (Licht, Wärme und Luftbeschaffenheit) wirkt **a)** auf die Größe der Thiere, weshalb die auf den Inseln des Eismeers im Freien lebenden Pferde klein

§. 21 a. bleiben, auch die Polarvölker sich durch geringe Größe auszeichnen; **b)** auf die **Bekleidung**, weshalb Säugethiere und Vögel im Winter eine reichlichere und wärmere Bekleidung erhalten; weshalb Hunde im heißen Afrika ganz nackt werden und die angorischen Ziegen nur in ihrer Heimath das lange Seidenhaar besitzen; **c)** auf die **Färbung**, weshalb Vögel und Insekten der Tropengegenden reinere und glänzendere, Thiere der Polargegenden dunklere, meist weiße und unreine Färbung haben (Eisbären); weshalb die im Innern von Pflanzen lebenden Larven weißlich, die Nachtschmetterlinge dunkler, die Tagschmetterlinge heller gefärbt sind. Krankheit, Alter, Geschlecht und Zähmung (Domesticirung) wirken gleichfalls sehr auf die Färbung, ja bei Schweinen ꝛc. sogar auf den Knochenbau (Zahl der Wirbelknochen ꝛc.). Wir besitzen in Europa 35 Hausthierarten, manche mit 50 bis 100 Spielarten (§. 8.). **d)** Auf die **Paarung**. Hauskatzen paaren sich im tropischen Amerika zu jeder Jahreszeit; das Kaninchen paart sich im Freien 4mal, in warmen Ställen bis 8mal jährlich. **e)** Auf die **Absonderungen**. Schlangen und Insekten sondern in tropischen Gegenden häufigere und heftigere Giftstoffe ab; fettschwänzige Schafe und Fettsteiße (Steatopygen) unter den Buschmännern werden durch das Klima Südafrika's erzeugt.

2) Das Leuchten der Thiere im Dunkeln findet sich besonders bei den niedern Meerthieren (Quallen, Infusorien ꝛc.), aber auch bei Insekten (Johanniswürmchen, Laternenträgern ꝛc.) und bei vielen frischen, todten Seefischen.

3) Thierische oder **galvanische** oder **Kontact-Elektricität** zeigt sich bei einigen Fischen in besondern, bei den verschiedenen Arten verschiedenen, Organen, aber darin übereinstimmend, daß dünne Hautschichten mit Lagen von einer gallertartigen Flüssigkeit abwechseln und mit zahlreichen Nervenfäden durchzogen sind. Die Wirkungen gleichen denen einer galvanischen Säule und sind vorzüglich beobachtet beim Zitterrochen, Zitterwelse, Zitteraale ꝛc.

4) Laute der Thiere. Eine Stimme (vox), d. h. einen durch besondere Organe aus der Kehle hervorgebrachten Schall, finden wir nur bei höhern Thieren mit Lungen, vorzüglich bei Vögeln (§. 61.), am meisten entwickelt durch Singmuskeln bei den Singvögeln (§. 68.). Die meisten Säugethiere (vielleicht die Fischsäugethiere ausgenommen) haben eine, wiewohl unangenehme Stimme, obgleich sie wie die Vögel für verschiedene Seelenzustände verschiedene Laute besitzen (Locktöne der Hirsche, Wiehern der Pferde, Schreien der Kater im März ꝛc.). Manche haben auch besondere Organe (Brüllaffe; Schnurren der Katzen §§. 31. u. 37.). Die Fische können nur durch Zusammenpressen und wieder Auseinanderschnellen der Lippen Töne hervorbringen; bei Fröschen werden durch Schwingungen der aufgeblasenen Backen- und Kehlhäute laute Töne hervorgebracht; Schlangen und Eidechsen dagegen zischen nur. Von Insekten bringen einige Käfer (Bockkäfer, Lilienhähnchen) durch Reiben des Halsschildes an den Flügeldecken einen Ton hervor; von Schmetterlingen läßt nur der Todtenkopf beim Anfassen einen eigenthümlichen Ton hören (§. 159.); Cicaden und Grillen haben einen eigenthümlichen Singapparat (§§. 191. u. 181.); Aderflügler und Zweiflügler bewirken ihr Summen nicht durch Schwingen der Schwingkölbchen und schnellen Flügelschlag, sondern entweder durch die aus den Luftkanälen (§. 19.) des Körpers strömende Luft (nach Burmeister) oder durch die schwingenden und knitternden Bewegungen der Häute des Rumpfs (nach Erichson), weshalb dann auch das Summen bei abgeschnittenen Flügeln noch fortdauert.

5) Schlafen und **Wachen.** Das Leben der Thiere, vorzüglich der Warmblüter, verläuft im steten Wechsel zwischen Wachen und Schlafen. Auf diesen Wechsel äußern die planetarischen Verhältnisse (Tag und Nacht, Winter und Sommer) den größten Einfluß. Bei Säugethieren und Vögeln ist Schlafen und Wachen genau von der Sonne abhängig. Der **nächtliche** Schlaf dient zur Erholung und Stärkung der Muskeln und Nerven, da im Schlafe bei den höhern Thieren die aus dem Cerebralsysteme (§. 13. III.) stammenden Nerventhätigkeiten (Sinne und Bewegung) aufhören und nur die vom Gangliensysteme (§. 13. IV.) abhängigen Verrichtungen (Athmung, Verdauung, Kreislauf) fortbestehen. Der Schlaf setzt Wachen und Thätigkeit voraus und ist um so voll-

kommner, je vollkommner der Zustand des Wachens war; deshalb findet auch bei den niedern Thieren mit weniger ausgebildeten animalischen Functionen (§. 10.) kein eigentlicher Schlaf Statt. Beim Schlafe ist aber nicht gleich alle Gehirnthätigkeit erloschen, sondern diese dauert oft noch einige Zeit fort, was wir träumen nennen und selbst bei Thieren (Hunden, Stubenvögeln) wahrnehmen können. Der Vorgang beim nächtlichen Schlafe (Zurückziehung an einen ruhigen, gemäßigtern Aufenthaltsort, Zusammenziehung der Lage, Nachlassen der Blutwärme und des Pulses) hat Aehnlichkeit mit dem Winterschlafe, und dieser bringt das Thier dem Fötusleben (dem Leben im Mutterleibe) wieder näher. In nördlichen Gegenden fallen Winters viele Thiere in Erstarrung oder **Winterschlaf** (Lethargie), besonders viele Insekten (die sich verpuppenden meist als Puppen), viele Mollusken, die meisten Reptilien (Schlangen in tiefen Felsritzen; Batrachier unter Schlamm im Wasser), und auch einige Säugethiere (Fledermäuse ꝛc.), aber kein Vogel (Schwalben ausgenommen §. 62.). In heißen Gegenden verbergen sich Sommers während der trockensten Zeit Krokodile, Kröten und Schlangen ebenfalls in der Erde und liegen ohne Bewegung, halten also einen **Sommerschlaf.** Zu dieser Lethargie giebt eine eigne, noch wenig bekannte Disposition des Körpers, und in unserm Klima, besonders in den Polarzonen, die Entziehung der Wärme und der Mangel an Nahrung die nächste Veranlassung. §. 21 a.

6) **Instinkt** und **Kunsttrieb.** Die Seele der Thiere äußert sich im Bewußtsein gehabter Eindrücke, und zwar im Verlangen nach denselben oder im Widerwillen gegen sie. Die Seelenfähigkeiten der Thiere beschränken sich nur auf Vorstellungsvermögen und Gedächtniß. Das Träumen der Hunde und Stubenvögel beweiset z. B. ihr Vorstellungsvermögen, so wie die Fähigkeit der Hunde, auf bestimmte Zeichen und Gebärden zu achten, ihre Wohlthäter wieder zu erkennen, ihren Feind zu fliehen ꝛc. deren Gedächtniß *). Diese Seelenfunction so wie der Instinkt (Naturtrieb), d. h. der angeborene Trieb, das vorzunehmen, was zur eigenen Erhaltung und zur Erhaltung der Nachkommenschaft nöthig ist, macht den Thieren die Befriedigung aller ihrer Bedürfnisse möglich. Der Instinkt, dieser Sporn der Nothwendigkeit, läßt das junge Thier gleich vom Anfange an seine instinktmäßigen Handlungen eben so gut verrichten, wie es die alten Thiere später können; das junge Thier braucht dieselben nicht erst zu erlernen und einzuüben; der menschliche Verstand dagegen entwickelt sich erst allmählig und erst um so mehr, je zahlreichere Eindrücke die Außenwelt auf uns macht. Bei den Thieren vertritt der Instinkt mehr oder weniger die Stelle der Vernunft, beim Menschen ersetzt Vernunft den Instinkt, der sich bei diesem wenig, aber um so kräftiger äußert, je näher er dem Kindesalter ist. (Das kaum geborne Kind sucht schon instinktmäßig die Brust der Mutter und streckt später von selbst beim Niederfallen die Hände vor, um sich zu stützen.) Beim Menschen steht der Instinkt unter der Herrschaft der Vernunft, bei den Thieren unter den Gesetzen der Nothwendigkeit; doch wird der Instinkt bei Thieren auch oft durch Erfahrung modificirt. Wenn Hunde den Klopfer an der Thür benutzen, um sich Einlaß zu verschaffen; wenn die Pferde in der Grafschaft Staffordshire mit den Vorderfüßen so lange auf die Ginsterbüsche (II. §. 108.) stampfen, bis alle Stacheln zerknickt sind und dann erst fressen, um sich das Maul nicht zu verwunden; wenn eine Wespe mit einer Fliege davon eilen will, aber durch den Wind aufgehalten, der Fliege erst die Flügel abbeißt und dann ungehindert weiter fliegt; wenn Schwalben in ihr Nest eingedrungene Sperlinge einmauern; wenn Thiere überhaupt zwischen verschiedenen Auswegen und Hülfsmitteln das passendste herausfinden, um den Zweck des Instinkts zu erreichen, so können wir dies nicht bloß durch Instinkt erklären, sondern sehen den Instinkt durch eine Art Ueberlegung oder durch Erfahrung höher gesteigert. Häufig ist der Instinkt, besonders bei Insekten, bis zur Darstellung der bewunderungswürdigsten Gebilde nach Ana- §. 21 b.

*) Schmarda hat in seinen „Andeutungen aus dem Seelenleben der Thiere“ [Wien 1846] Alles zusammengetragen, was sich über diese Fähigkeiten der Thiere in den verschiedensten Werken zerstreut findet.

logie der Vernunft gesteigert und heißt dann Kunsttrieb. Instinkt ist überhaupt in der ganzen Thierwelt von unendlicher Wichtigkeit und wird in der Hand des weisen Schöpfers das Mittel zur Ausführung der wichtigsten Plane. Alle Instinkthandlungen lassen sich indeß auf Ernährung und Fortpflanzung zurückführen und deshalb unterscheiden wir Nahrungstrieb, Erhaltungstrieb, Freiheitstrieb, Begattungstrieb, Wanderungstrieb u. s. w. Nahrungstrieb und Geschlechtstrieb ist allen Thieren eigen, dagegen z. B. der Trieb auf dem Wasser zu schwimmen unter den befiederten Thieren nur den Wasservögeln, weshalb von Hühnern ausgebrütete Enten bei erster Gelegenheit auf das noch nie gesehene Wasser gehen. Gegen den Winter ziehen viele Thiere des Nordens, weil ihnen Wärme und Nahrung mangelt, durch Instinkt geleitet, nach wärmern Gegenden (Zugthiere, Wanderthiere). So sieht man einige Säugethiere, besonders Wiederkäuer, einige Nager (Lemming §. 43, 8), sehr viele Vögel und diese oft in großer Menge (Schwalben, Wachteln, Wandertauben §. 71.), auch wohl einige Fische (Heringe, Thunfische) vor Eintritt des Winters 6 bis 10 und mehre Grade vom Pole abwärts ziehen, viele Wasserthiere größere Tiefen der Gewässer aufsuchen und in milderer Jahreszeit wieder in ihre Heimath zurückkehren (Wanderungen). Auch um günstigere Stellen zur Fortpflanzung aufzusuchen, wandern Vögel und Fische (Lachse), Schildkröten ꝛc. Auch manche Insekten (Heuschrecken und Libellen §. 176.) machen oft weite Wanderungen. Aus Instinkt bauen sich Bieber (§. 43, 15) und graben sich Hamster (§. 43, 10) künstliche Wohnungen und tragen wie das Schoberthier (§. 43, 18) Wintervorräthe ein; beißen Feldmäuse von den eingetragenen Samen den Keim ab, um das Auswachsen zu verhindern; bauen sich Vögel (Webervogel, Schneidervogel, Republikaner (§. 69, 17 und 10) die künstlichsten Nester; weiß der Spritzfisch (§. 100, 18) und die Larve des Ameisenlöwen (§. 177.) sich auf eigenthümliche Weise Nahrung zu verschaffen; machen Bienen (§. 154, 30) Termiten, so wie Minirspinnen (§. 198, 5), Kreuzspinnen, Seidenwürmer, Sackträgermotten (§. 161, 33), und Frühlingsfliegen (§. 177.) die künstlichen Gewebe, Nester und Hüllen. Aus Instinkt wissen Insekten (Todtengräber §. 131, 34) ihre Eier auf die bewunderungswürdigste Weise da unterzubringen, wo die auskriechenden Larven sogleich ihre Nahrung finden, welche oft von der ihrigen ganz verschieden, ja ihnen selbst zu nichts tauglich ist. So wie Erfahrung und Cultur bei Thieren einerseits den Instinkt steigern kann (Jagdhund), so vermindert ihn anderseits Zähmung nicht selten in dem Grade, daß Thiere ihre natürliche List und Verschlagenheit ganz verlieren, so daß Katzen mit Mäusen verträglich aufgezogen und Hunde unfähig werden, sich auf ursprüngliche Weise selbst zu ernähren.

§. 22. **Eintheilung des Thierreichs** (§. 7.). Die verschiedenartige Bildung der zahlreichen Thiere macht eine Classification nöthig, welche um so besser ist, je näher die ähnlichsten Geschöpfe nach ihrer Organisation zusammengestellt sind. Die Organisation ist um so vollkommner, je größere Mannigfaltigkeit sie in ihren Theilen darbietet, und ein Thier steht deshalb immer um so höher, je verschiedener dessen äußere und innere Bildung ist; der Fisch steht also höher als die Auster, aber tiefer als der Hund, dieser aber tiefer als der Mensch. Der allgemeine Plan, welchen der Schöpfer in der Organisation befolgte, zeigt

1) Das Streben zur Lokalisirung der Functionen (§. 10.) **und zur Theilung der physiologischen** (§. 9.) **Arbeit.** Je mehr die Functionen lokalisirt sind, d. h. je mehr jedes einzelne Organ seine besondere Verrichtung hat, desto besser führt es dieselbe aus, desto höher steht das Thier, desto verschiedener und abweichender muß aber auch die Bildung jedes Organs von den übrigen sein. Bei den höhern Thieren sind daher alle Verrichtungen mehr oder weniger an bestimmte Organe gebunden, so daß keins dieser verletzt werden kann, ohne daß dessen Verrichtung aufhört. Je mehr wir indeß auf der Organisationsstufe abwärts steigen, desto einfacher zeigt sich überall der Bau des Körpers, desto einfacher ist das Leben, desto weniger ist die Arbeit vertheilt, desto vielfacher ist auch die Verrichtung eines und desselben Organs; ja jeder Körpertheil übt zuletzt fast die nämlichen Functionen aus, wie die benachbarten Theile. Beim grünen Armpolypen (§. 236.) ist z. B. die Organisation sehr einfach, alle

Körpertheile zeigen gleiche Structur und haben deshalb gleiche Verrichtungen; jeder Theil kann fühlen, sich bewegen, sich nähren und ein neues Wesen erzeugen. Es kann daher jedes Bruchstück, worin dieses Thier zertheilt wird, sein Leben selbstständig fortsetzen und wieder ein selbstständiges Thier werden. Die Organisation des Regenwurms (§. 216.) dagegen ist schon viel complicirter (mehr zusgesetzt); wir finden schon eine besondere Verdauungshöhle, ein Kanalsystem, um die verdauten Stoffe in alle Theile des Körpers zu führen, besondere Organe zur Ortsbewegung; der Regenwurm kann also nicht nach allen Richtungen zertheilt werden, ohne daß der Tod erfolgt. Bei genauerer Untersuchung des Baues finden wir indeß, daß die verschiedenen Apparate (§. 10), von denen jeder auf verschiedene Weise zur Fortdauer des Lebens (zur Ernährung, Fortpflanzung ꝛc.) beiträgt, sich alle gleichförmig von einem Ende des Körpers bis zum andern ausdehnen und daß jedes Querstück wenig oder gar nicht vom andern verschieden ist und gleichsam das ganze Thier repräsentirt; wenn daher der Regenwurm auch in 2—20 Querstücke zertheilt wird, so kann jedes Querstück fortfahren zu leben und ein neues Individuum bilden. Bei den höhern Thieren, wo die Hauptorgane nicht so einförmig vertheilt sind, wo jeder Theil seine bestimmte Verrichtung hat, muß eine Verstümmelung auch immer das Thier einer oder der andern Fähigkeit berauben und häufig das ganze Thier tödten. §. 22.

2) Das Streben der Natur nach organischen Umbildungen. Dies zeigt sich besonders darin, daß ein und dasselbe Organ durch eine einfache Umbildung im Baue zu mehren Verrichtungen tauglich wird. Bei dem Molukkenkrebse (§. 209.) umgeben die Gliedmaßen des Kopf- und Brusttheils unmittelbar den Mund und sind so gebaut, daß sie als Füße für die Ortsbewegung, mit ihren freien Enden als Greiforgane und mit ihrer Basis als Kinnladen dienen können, daher sind sie nur mittelmäßig brauchbare Füße und sehr unbequeme Kinnladen. Beim Flußkrebse (§. 203.) dagegen werden diese Verrichtungen nicht mehr durch ein einziges Organ ausgeführt, indem von den, jenen ähnlichen Organen die den Mund unmittelbar umgebenden nur zum Käuen, die folgenden nur zum Greifen und die letztern nur zur Ortsbewegung bestimmt sind und zwar einige der letztern bloß zum Gehen, andere bloß zum Schwimmen. Ebenso wird durch geringe Modification (Abänderung oder Umbildung) im Baue bei den Säugethieren die Hand in Fuß, Flosse und Flügel umgebildet. Man nennt solche umgebildete Theile analoge Organe.

3) Das Streben der Natur nach Gleichförmigkeit im Baue. Die Natur hat nach wenigen Haupttypen (Grundgestalten) die erstaunlichste Mannigfaltigkeit der Thiere hervorgebracht und nach und nach die großen Verschiedenheiten in der Bildung vorbereitet, wodurch die unzähligen Verbindungen zwischen den verschiedenartigsten Thieren entstehen. Solche Uebergänge von einer Form zur andern zeigen sich nicht allein bei verschiedenen, sondern oft bei einem und demselben Thiere. Frösche zeigen bei ihrer Geburt als Kaulquappen alle wesentlichen Merkmale der Fische und treten nur allmählig in die den Reptilien eigenthümliche Bildungsweise ein. Das Streben der Natur für Beibehaltung eines allgemeinen Plans mitten unter zahlreichen Abänderungen im Baue bildet die natürliche (§. 7.) Verwandtschaft der Thiere, nach welcher sie geordnet werden. Dieser Verwandtschaft liegt eine größere oder geringere Identität im Typus (Gleichheit in der Grundgestalt), der Analogie dagegen bloß eine Aehnlichkeit im Einzelnen zum Grunde (Flügel der Fledermäuse und Vögel). Die natürliche Verwandtschaft läßt sich aber nicht als eine ununterbrochene Kette darstellen; die Thiere scheinen im Gegentheile viele Reihen zu bilden, welche bald parallel neben einander herlaufen, bald auseinander laufen und sich zu verschiedenen Höhen erheben.

Da die innere Organisation der Thiere, welche die feste Grundlage jedes Systems bildet, früher noch zu wenig bekannt war, so konnte selbst das System des berühmten Linné*) um 1735 noch wenig genügen, zumal da dessen 2 letzten

*) 1) Säugethiere; 2) Vögel; 3) Amphibien; 4) Fische; 5) Insekten; 6) Würmer.

Klassen, Insekten und Würmer, Thiere von der verschiedensten Organisation zusammen stellten. Diese 2 Klassen sind es denn auch vorzüglich, welche um 1800 und 1817 die bedeutendste Umgestaltung durch Georg Cuvier erfuhren, dessen System mit einigen Veränderungen hier zum Grunde liegt. Außerdem haben noch zoologische Systeme aufgestellt: Lamarck 1801, Oken 1802, 1821 und 1833, Dumeril 1806, Goldfuß 1820 und 1834, Blainville 1822, Latreille 1825, Eichwald 1829, Kaup 1835, Ehrenberg 1836, Burmeister 1837, Berthold 1845, Streubel und Perty 1846.

Uebersicht der XII Klassen des Thierreichs.

I. Vertebrāta (osteozōa). Wirbel- oder Knochenthiere.

Ein inneres Knochenskelet; Gehirn- und Rückenmark in einer Knochenhöhle; rothes Blut; vollständiges Gefäß- u. Nervensystem (§. 13.).

- **Warmes Blut; Herz mit 2 Herz- u. 2 Vorkammern (Fig. 5.); Lufthathmung.**
  - Säugeorgane (Zitzen); gebären lebendige Junge; sind meist behaart, selten kahl; meist 4 Beine als Erbbewegungsorgane —— (Mensch, Hund) → **I. Mammalia, Säugethiere. §. 26.**
  - Keine Säugeorgane; legen hartschalige Eier; sind immer befiedert; 2 Beine und 2 Flügel als Luftbewegungsorgane —— (Adler, Sperling) ..... → **II. Aves, Vögel. §. 63.**
- **Kaltes Blut; Herz mit einer Herz- und 1—2 Vorkammern. (Fig. 6. u. 7.)**
  - Legen dünnschalige Eier; athmen durch Lungen (einige in der Jugend durch äußerliche Kiemen); beschuppt, beschildet oder nackt; keine oder 4 Beine (selten 2) als Erd- und Wasserbewegungsorgane —— (Krokodil, Natter). → **III. Reptilia, Reptilien. §. 84.**
  - Legen Rogen-Eier; athmen nur durch Kiemen; meist beschuppt, selten beschildet oder nackt; Flossen als Wasserbewegungsorgane — (Haifische, Karpfen) → **IV. Pisces, Fische. §. 98.**

II. Arthrozōa. Gliederthiere.

Kein inneres Skelet, aber der Leib im Allgemeinen aus vielen, hinter einander liegenden, beweglichen Ringeln zusammengesetzt (äußeres oder Hautskelet); statt des Gehirns und Rückenmarks kleine Ganglien (§. 13, IV.), welche paarig vereint auf der Mittelebene des Körpers eine lange Kette bilden; Kopf meist deutlich; meist gegliederte Gliedmaßen; kein eigentliches Herz; Blut weißlich; Kreislauf unvollkommen (§. 18. D.).

- **Bewegungsorgane gegliedert.**
  - eine Metamorphose. §. 122.
    - Leib mit drei Hauptabschnitten (Kopf, Brust u. Hinterleib); sechs Beine; 2 Fühler; meist Flügel. Land- u. Wasserthiere. — (Maikäfer, Stubenfliege) → **V. Insecta, Insekten. §. 125.**
  - keine Metamorphose.
    - Leib mit zwei Hauptabschnitten (Kopf u. Brust verwachsen); acht Beine; keine Fühler. Landthiere. — (Kreuzspinne) → **VI. Arachnīdae, Spinnen. §. 126.**
    - Leib mit vielen Ringeln, welche meist eine harte Schale (crusta) bilden; meist 10—14 Beine; 2—4 Fühler. Meist Wasserthiere. — (Flußkrebs, Kellerasel) ..... → **VII. Crustacea, Krustenthiere. §. 202.**
- **Bewegungsorgane ungegliedert oder fehlend.**
  - Leib weich, wurmförmig, ohne harte Schale, aber meist deutlich geringelt; statt der Beine höchstens mit Borsten besetzte Höcker. In andern Thieren lebend: Eingeweidewürmer, entozōa; oder frei lebend: Rothwürmer, vermes. —— (Spulwurm, Regenwurm). → **VIII. Vermes, Würmer. §. 215.**

III. Gastrozōa (myxozōa). **Bauch- oder Schleimthiere.** Weder ein gegliedertes inneres, noch geringeltes äußeres Skelet; nur zerstreute Markknoten oder einfache Markfäden, oder gar kein Nervensystem. Leib gallertartig, rundlich, scheibenförmig oder länglich, oft mit kalkiger Hülle und mit regelmäßigen Ausstrahlungen, aber nie mit wahren Gliedmaßen; Sinne und Kreislauf unvollkommen. Wasserthiere (nur einige Schnecken sind Landthiere).

- Mund am Ende des Körpers am Kopfe, oder wenn der Kopf fehlt, vorn in einer Vertiefung zwischen den sehr schleimigen Hautlappen (Mantel) des weichen und meist langen Körpers; Mantel meist ein 1- od. 2schaliges Kalkgehäuse absondernd; Athmung durch Kiemen oder Lungen; Gefäßsystem ziemlich vollkommen. Land- und Wasserthiere. (Weinbergsschnecke, Auster) ..... → IX. Mollusca, Weichthiere. §. 221.
- Mund in der Mitte des meist runden Körpers.
  - Nur ein Magen.
    - Frei bewegliche Thiere; Leib langgestreckt, walzig, mit lederartiger Hülle (Sternwürmer §. 230.) oder Leib flach oder kuglig und entweder mit kalkiger Schale und mit 5—10 Hauptstrahlen um den Mund (Stachelhäuter §. 231.) oder ohne Schale, gallertartig, mit 4, 8 oder vielen Fangarmen um den, oft durch Saugröhren vertretenen Mund (Quallen §. 232); Athmung und Gefäßsystem sehr unvollkommen. Meerthiere. — (Spritzwurm, Seeigel, Ohrenqualle) ..... → X. Radiāta, Strahlthiere. §. 229.
    - Viele zu einem strahligen oder ästigen Stamme (Polypenstamm) verwachsene Thiere; Leib gallertartig, rundlich, mit Fühlfäden um die Mundöffnung u. meist Kalkmasse innen oder außen absondernd. Süßwasser- und Meerthiere. — — (Edelkoralle, grüner Armpolyp) ..... → XI. Polypi, Polypen. §. 234.
  - Viele Magen; Leib meist mikroskopisch, gallertartig, nackt oder mit Kieselpanzer; viele rundliche Magenblasen (Magenthiere); in Flüssigkeiten frei lebende oder durch einen Stiel zu einem gemeinschaftlichen Stamme verwachsene Thiere. — — (Wirbelthierchen, Pantoffelthierchen) → XII. Infusoria, Aufgußthierchen. §. 241.

Erste Abtheilung.

Vertebrāta. Wirbel- oder Rückgrathsthiere (§. 23.),

durch ein inneres Knochengerüst (§. 11.) charakterisirt, welches von äußern §. 24.
Muskeln und meist 4, nur einigen Reptilien fehlenden Gliedmaßen bewegt wird. Sie haben unter allen Thieren die verschiedenartigsten und vollkommensten Fähigkeiten und die zahlreichsten und complicirtesten Organe. Der nie fehlende und am wenigsten veränderliche Theil des Skelets ist der Schädel und die Wirbelsäule. Das Gehirn (§. 13. III.) mit den hier am vollkommensten ausgebildeten Sinnesorganen wird immer kleiner, je weiter man vom Menschen zu den Fischen hinabsteigt. Die stets paarigen, beweglichen Augen

fehlen nur einigen Fischen und Reptilien und sind bei einigen Säugethieren (§. 14, 2.) verkümmert. Die stets paarigen Ohren sind bei den Fischen versteckt; den Amphibien fehlt der Gehörgang, weshalb bei vielen das Paukenfell äußerlich sichtbar. Den Vögeln fehlt die äußere Ohrmuschel, welche bei Pferden und Fledermäusen sehr groß ist und bei den übrigen Säugethieren nur Maulwürfen, Schnabelthieren und Wallfischen fehlt. Die Nase ragt nur bei Menschen frei aus dem Gesichte hervor, ist bei Elephanten, Schweinen und Maulwürfen ꝛc. zum Rüssel verlängert und zugleich Tastorgan; ihre zwei Höhlen öffnen sich nach hinten in die Rachenhöhle und bilden nur bei den Fischen 2 blinde Gruben. Nur die Wirbelthiere haben eine eigentliche Zunge, welche nur den Säugethieren zum Schmecken, den übrigen mehr zum Verschlingen dient. Die Kiefern bewegen sich in der Richtung der Mittellinie des Körpers, nie seitlich wie bei den Gliederthieren; sie haben bei den Säugethieren (Wallfische und Ameisenfresser ausgenommen), bei den Reptilien (Schildkröten ausgenommen), häufig bei den Fischen, aber nie bei den Vögeln Zähne. Alle sind getrennten Geschlechts, haben ein vollständiges Nerven-, Athmungs- und Gefäßsystem (§. 13. 18 u. 19.); Leber, Nieren und Milz, Harn- und Gallenblase fehlen einigen. Zahl der lebenden Wirbelthiere etwa 18,567, der fossilen 2700. Seit dem Bestehen der Menschen wurden der Dudu (§. 76.) und die Steller'sche Seekuh (§. 59.) gänzlich ausgerottet. Auch sollen sich unter den ägyptischen Mumien 2 jetzt nicht mehr existirende Krokodile gefunden haben. Mehre Thierarten, z. B. der Kiwi (§. 76.) sind dem Erlöschen nahe.

I. Klasse. **Mammalia, Säugethiere** (§. 23.).

§. 25. Rückgrathsthiere mit rothem, warmem Blute und Lungenathmung, vorzüglich ausgezeichnet durch ihre Entwickelungs- und Ernährungsweise in der ersten Lebenszeit. Sie gebären nämlich alle lebendige Junge und säugen sie mit der Milch aus ihren Zitzen. Sie stehen auf der höchsten Stufe der Entwickelung, da Nervensystem und Sinnesorgane (§. 14.) im größten Ebenmaße entwickelt sind und das Gehirn überwiegend ist gegen das Rückenmark. Hier ist das Athmungssystem nicht vorherrschend wie bei den Vögeln, nicht schwankend wie bei den Reptilien; hier ist keine zu große Ausdehnung des Bauches auf Kosten der Brust wie bei den Fischen. Der äußere Bau ist indeß ebenso verschieden (Wallfisch und Katze), wie der innere sehr übereinstimmend.

Eigenthümlichkeiten: **a)** in der Bedeckung der Haut. Diese ist meist behaart, selten nackt (Fischsäugethiere §. 57.) oder mit Schuppen und Schildpanzern bedeckt (Schuppenthier, Gürtelthier). Diese Bedeckungen sind wie Hörner, Hufe und Krallen als metamorphosirte Haare anzusehen. Die Farbe der Haare ist nach Alter (Frischlinge §. 48, 6), Jahrszeit (Winter- und Sommerpelz) und Klima (Eisbär) sehr verschieden und wird jährlich gewechselt (Haarung, Rauhung). Einige, wie die Hufthiere, haben nur einerlei Haar; andere, wie Marder und Schweine, haben zweierlei Haare, Spitz- oder Contourhaare, d. h. steifere, längere, und Grundwolle, Wollhaare, d. h. weichere und kürzere. Das Schaf hat nur Wollhaare. Zusammengewachsene, an der Spitze spaltbare Haare heißen Borsten (Schweine); sehr dicke, spitzen Dornen gleichende Haare heißen Stacheln (Igel und Stachelschwein). Diese sind ihrer innern Bildung nach gleichsam nackte, runde Federkiele ohne Fahne und bilden so eine Annäherung zu den Vögeln. Manche Thiere haben an gewissen Stellen längere Haare: Kopfhaar des Menschen, Mähnen des Löwen, Bart der Ziegen, Schwanz der Eichhörnchen und Pferde, Ohrbüschel der Luchse ꝛc.

b) Der Extremitäten. Das Endglied (Nagelglied) der Zehen hat eine Hornbedeckung (Nagel), welcher Plattnagel heißt, wenn er flach, breit und vorn abgerundet ist (bei Menschen); Kuppennagel, wenn er schmäler, lang, stumpf und nach Länge und Breite etwas gewölbt ist und nur oben dem Nagelgliede aufliegt (bei den meisten Affen); Kralle, wenn er mit seinem Grunde das Ende des Nagelgliedes fast rings umgiebt, zusammengedrückt, gebo-

gen und spitz ist (bei reißenden Thieren); Hufe, wenn er kurz und stumpf ist und das ganze Nagelglied schuhartig einhüllt (Wiederkäuer ꝛc.). §. 25.

c) In Hinsicht des Skelets (s. vorher Fig. 2.): 1): Kiefern mit eingekeilten (eingeschobenen, nicht fest verwachsenen), an Form, Größe, Zahl und Stellung nach Nahrung und Lebensart sehr verschiedenen Zähnen (§. 11,1); 2) Meist 7 Halswirbel; 3) Ein Schlüsselbein nur bei den grabenden, fliegenden und greifenden Säugethieren. 4) Die 4 Gliedmaßen sind verschieden gebildet zum Laufen, Springen, Fliegen, Schwimmen, Greifen, doch meist mit 5 Zehen. Eine verkümmerte Zehe heißt Stummel, eine kürzere, die Erde nicht berührende Zehe Afterzehe, Afterklaue (Wiederkäuer). Ein Fuß mit verlängerten Zehen und entgegensetzbarem Daumen heißt Hand; ein Fuß mit fehlendem Daumen Pfote. Ein Flossenfuß hat mit Schwimmhaut verbundene Zehen, an welchen nur noch die hervorragenden Nägel erkennbar sind (Fig. 18.). Zehengänger berühren nur mit den Zehen den Boden (Katze, Hund); Sohlengänger, Plattfußgänger mit der ganzen Sohle (Mensch, Bär).

d) In Hinsicht der weichern Körpertheile: 1) Zitzen und zwar α) Brustzitzen (Affen und Fledermäuse); β) Bauchzitzen (Schweine, Hunde); γ) Leistenzitzen (Wiederkäuer, Beutelthiere §. 38.). Zahl der Zitzen: 2 bis 18; Dauer des Säugens: 6 bis 22 Wochen; Zeit der Trächtigkeit verschieden: bei Mäusen 21 Tage, bei Elephanten 21 Monate; Zahl der Jungen: Affen, Elephanten ꝛc. haben 1 und Schweine 10 bis 12. Die größern Säugethiere begatten sich 1 mal im Jahre, die Hasen 4 mal, Kaninchen noch öfterer (§. 21, d.). 2) Zwerchfell (§. 15.); 3) Backentaschen (Affen, Hamster); 4) Magen der Wiederkäuer (§. 51.); 5) der Nahrungskanal (vom Munde bis After) ist bei Säugethieren am längsten, und zwar hier bei der Speckfledermaus am kürzesten (von doppelter Körperlänge), bei den Zweihufern am längsten (beim Schafe 27mal länger als der Körper). 6) Besondere Stoffe absondernde Drüsen beim Bisamschweine (§. 48,6), Moschusthiere (§. 53,5), Stinkthiere, bei der Ziebethkatze, dem Iltisse (§. 37.), Biber (§. 43,15), Hirsche (§. 53,4) und den Spitzmäusen (§. 37,4). Bezoarstein (§. 53,9). Keine regelmäßige Wanderungen wie bei Vögeln, aber Streifzüge (Lemming §. 43,8) und Winterschlaf (§. 21 a,5). **Männliche Säugethiere** zeichnen sich aus: 1) durch Größe und Stärke (Katzen); 2) durch besondern Haarschmuck (Mähne des Löwen, Bart des Mannes); 3) durch Hörner (Hirsche); 4) durch stärkere Eckzähne (das ♂ Schwein). **Anzahl der bekannten Arten und deren Verbreitung:** an 2067 (in Europa nach Minding, der nur 1230 Arten aufzählt, etwa 160, unter welchen etwa 66 eigenthümliche; in Afrika 262, in Asien 420, in Amerika 553, in Australien 70—78 Arten). Affen leben nur in der heißen Zone (keine in Neuholland, keine ursprünglich in Europa); Wiederkäuer leben überall (nicht in Neuholland, am häufigsten in Südafrika); Schnabelthiere und Früchte fressende Beutelthiere nur in Australien; die meisten zahnarmen in Südamerika. Die Zahl der fossilen Säugethiere beträgt etwa 700 (von Dickhäutern an 157, von Raubthieren etwa 133) Arten, von denen manche mitunter ganze Gebirgsschichten, die Knochenbreccie bilden.

Nutzen. Man benutzt **A.** die **Kräfte** und **Dienste** der Säugethiere: **a)** zum **Lasttragen:** Esel, Maulthiere und Maulesel, Kameele, Lama, Elephanten, Rennthiere und Hunde; **b)** zum **Ziehen:** Pferde, Esel und Maulthiere, Ochsen und Büffel, Rennthiere, Kameele und Hunde; **c)** zum **Reiten:** Pferde, Esel und Maulthiere, Ochsen, Büffel, Rennthiere, Lama, Kameele und Elephanten; **d)** zur **Jagd:** Hunde, Frettchen, Hauskatzen, Luchse, Jagdleoparde, Pferde und Elephanten.

B. Die **Körperstoffe,** welche uns liefern: **1) Nahrungsmittel** und zwar **a) Fleisch** (frisch, geräuchert und gesalzen): α) Rindfleisch und Kalbfleisch von Ochsen (Zuchtochsen, Mastochsen), Kühen, Rindern und Kälbern (eingesalzenes Rindfleisch oder Pökelfleisch, Ochsenzunge, Rinderwurst, Rinds- und Kälbskalbaunen, Kälberfüße, Kalbsgeschlinge, Kalbsgekröse, Kalbsköpfe ꝛc.); β) Schweinefleisch (Würste, Mettwürste, Cervelatwürste ꝛc., Schinken, Speck, Schweinefüße ꝛc.); γ) Schaf- und Hammel- oder Schöpsenfleisch; δ) Wildpret (Fleisch von Hirschen, Antilopen, Rehen, Hasen, Wild-

§. 25. schweinen, Bibern, Siebenschläfern, Beutelthieren); ε) Pferdefleisch (Hippophagen-Gesellschaften); ζ) auch das Fleisch von Kaninchen, Stachelschweinen, Murmelthieren und einigen Fischsäugethieren (Pottwall und Finnfische) wird gegessen, so wie von Bären (Bärentatzen sogar Leckerbissen); ja das Fleisch der meisten Säugethiere ist eßbar.

b) Milch von Kühen, Ziegen und Schafen (Sahne, Molken, Plundermilch, Kälberlab); Sauer- und Süßmilchkäse, Butter ꝛc.

c) Knochen, Sehnen, Knorpeln ꝛc. liefern unter gehöriger Behandlung nahrhafte thierische Gallerte (Papin'scher Topf, von Papin erfunden) zu Bouillontafeln, Gelatine zu kräftigen Brühen ꝛc.

d) Fett (Rinderfett, Talg, Unschlitt, Schmalz ꝛc.) zum Fetten der Speisen ꝛc. Thran von Wallrossen, Robben, vom Narval, so wie von Finnfischen und Wallfischen.

2) Arzneimittel: Moschus oder Bisam, Bibergeil, Wallrath (auch zu Wallrathlichten), Talg (Hirschtalg), Schmalz (unter dem Namen von Bärenfett, Schlangenfett, Seejungfernfett ꝛc.) u. Leberthran. Wenig oder gar nicht mehr, oder nur höchstens äußerlich oder zur Bereitung minder wichtiger Heilmittel gebraucht man: Ambra (vorzüglich zum Räuchern), Zibeth, Bezoar, Gemsenkugeln, Hirschhorn (zur Bereitung des Hirschhornöls ꝛc.), Ochsengalle, Rinderblasen, Elendsklauen, Bocksblut ꝛc.

3) Kleidungsstoffe: a) Pelz- oder Rauhwerk (Häute d. h. von größern; Felle d. h. von kleinern Thieren, und Bälge d. h. unaufgeschnitten abgezogene) zu Oberröcken, Mänteln, Kragen, Palatinen, Muffs, Pelzmützen, Pelz-Handschuhen, Boa's ꝛc. liefern uns: Zobel, Hermeline, Biber, Eichhörnchen, Fischottern, Seeottern, Tiger, Panther, Luchse, Bären, Füchse (Eisfuchs, Graufuchs ꝛc.), Schafe, Lämmer, Rennthiere, Kälber, Hunde (Pudelmützen), Wölfe (Wildschur), Katzen, Wiesel, Marder, Hasen, Seidenhasen, Kaninchen, Viscache und Chinchille, Bisamratten, Zieselmäuse, Hamster ꝛc.

b) Leder (§. 14, 1) und zwar als α) lohgares, durch den Roth- oder Lohgerber mit Lohstoffen bereitetes; β) alaun- oder weißgares, durch den Alaun- oder Weißgerber mit Alaun; γ) sämischgares Leder vom Sämischgerber mit Fett durch Walken; δ) als Pergament vom Pergamentmacher durch Schleifen und Einreiben mit Kreide verfertigtes Leder. Zu α benutzt man vorzüglich die Häute von Ochsen (am meisten gesucht werden Häute aus Buenos-Ayres), Kühen, Rindern, Kälbern, Schafen (Rind-, Kalb-, Schafleder), Büffeln, Pferden, Eseln, Maulthieren, Ziegen, Böcken, Schweinen, Hunden ꝛc. Die größern Thiere liefern Sohlleder und Brandsohlleder, Schmal- und Fahlleder, Corduan (rauh und glatt), Saffian, Juften ꝛc. Kalb-, Schaf- und Ziegenfelle ꝛc. dienen nur zu dünnen, geschmeidigen Ledersorten. Zu β und γ gebraucht man vorzüglich die Häute von Hirschen, Rehen, Elenthieren, Gemsen, Schafen, Lämmern, Ziegen ꝛc. Zu δ die Häute von Kälbern, Schafen und Ziegen. Die Ledersorten werden zu verschiedenen Kleidungsstücken ꝛc. von Schuhmachern, Handschuhmachern, Sattlern, Buchbindern ꝛc. verarbeitet.

c) Haare von Schafen (Wolle), Vicognenziegen, Lama's, Kameelen, angorischen Ziegen (Kämelgarn), Kaninchen, Hasen ꝛc. werden von Webern, Hut- und Knopfmachern, Bortenwirkern ꝛc. zu Tüchern, Shawls, Teppichen, Tapeten, Wollzeugen, Flanell, Frieß, Felbel, Plüsch, so wie zu Hüten, Strümpfen, Bändern, Schnüren, Troddeln, Fransen, Matratzen, Haarbecken, Helmbüschen ꝛc.; die Haare des Menschen von Perückenmachern zu Locken, Uhrbändern, Perücken ꝛc. verarbeitet.

4) Verschiedene Geräthschaften und Stoffe zu mancherlei Waaren und deren Bereitung: a) Haare von Rehen, Kälbern, Kühen, Schweinen, Bibern, Pferden ꝛc. werden von Bürsten-, Pinselmachern, Sattlern ꝛc. verarbeitet zu Pinseln, Bürsten, Polstern, Haarsieben, Seilen, Violinbögen ꝛc.

b) Knochen, Zähne, Hörner und **Hufe**, besonders die Hörner von Büffeln, Ochsen, Kühen, Schafen, Ziegen, Hirschen, so wie die Zähne vom Elephanten, Mammuth, Narval, Wallrossen ꝛc. werden von Kammmachern und Drechslern ꝛc. verarbeitet zu Jagd- und Pulverhörnern, zu Tabackspfeifen, Dosen, Dinten-

fässern, Knöpfen, Kämmen, Laternen, so wie zu Griffen an Hirschfänger, Messer, Gabeln, Regenschirme, Stöcke ꝛc. Besonders werden aus den Knochen und Zähnen der größeren Thiere α) die sogenannten Bein- oder Knochenwaaren bereitet: Nadelbüchsen, Becher, Messer- und Gabelgriffe, Knöpfe, Würfel, Schnitzwerke ꝛc., β) das Bein- oder Knochenschwarz (gebranntes Elfenbein), γ) Knochenmehl zum Düngen, δ) Knochenleim ꝛc.

c) Fischbein zu Schirmstangen, Corsets, Halsbinden ꝛc.

d) Fett (Talg oder Unschlitt vom Rindviehe und Hirsche; Wallrath vom Pottfische; Thran oder gereinigtes Fett vom Wallfische, Narval, Delphine ꝛc.) dient zum Lederbereiten, zur Fabrikation der Seife (grüne Seife, Waschseife, Sodaseife, Toilettenseife), zu Lichten (Talg-, Stearin-, Wallrath- oder Spermacetlichte), zu Haarpomaden (besonders aus Ochsenmark und Schöpstalg mit wohlriechenden Oelen) ꝛc.

e) Gedärme α) zu feinern Darmsaiten für musikalische Instrumente von Schafen, Lämmern, Gemsen, Ziegen, Katzen; zu gröbern Saiten von Pferden, Esel ꝛc.; β) zu Goldschlägerhäutchen aus Ochsengedärm zur Verfertigung der Goldblättchen (Blattgold), zu kleinen Luftballons ꝛc.

f) Blut, besonders Rinderblut und thierische Kohle überhaupt α) als Klärungs- und Entfärbungsmittel für verschiedene Flüssigkeiten, vorzüglich als Klärungsmittel in Zuckerraffinerien; β) zur Bereitung des Berlinerblaues (mit Salpeter und Pottasche; 1704 von Diesbach in Berlin entdeckt), der Blausäure ꝛc.

g) Hörner, Hufe, Knorpel, Sehnen, Ohren ꝛc., so wie die Abfälle bei der Lederbereitung dienen zur Bereitung des Leims (Tischlerleim, Lederleim, Pergamentleim ꝛc).

C. Die **thierischen Auswürfe** fast aller Säugethiere, besonders der Hausthiere, dienen **a)** zum Düngen; **b)** als Brennmaterial (Kameelmist in Afrika); **c)** zur Bereitung des Salmiaks (Afrika); **d)** der Harn noch besonders zur Bereitung der Orseille, zur Indigoküpe (II. §. 336.) und überhaupt zur Herstellung verschiedener Farben ꝛc.

Schaden, gegen den Nutzen von keiner Bedeutung:

1) die größern Raubthiere aus dem Katzengeschlechte können dem Leben des Menschen gefährlich werden und vertilgen nutzbare Thiere;

2) manche schaden den Pflanzenanlagen (Affen, Elephanten, Hirsche, Wildschweine, Mäuse ꝛc.); verzehren die Nahrungsvorräthe (Ratten, Mäuse). Obgleich kein Säugethier an und für sich giftig ist, so gefährden doch wuthkranke Hunde und Katzen so wie milzkranke Kühe das Leben der Menschen sehr.

Uebersicht der XII Ordnungen und deren Familien.

A. Digitāta. Zehensäugethiere. Vorder- und Hinter- §. 26a.
gliedmaßen mit freien, beweglichen Zehen mit Plattnägeln oder Krallen.

Alle 3 Zahnarten (Fig. 1.)	Zitzen frei	mit Händen	2 Hände u. 2 Füße	I. Bimăna, Zweihänder. §. 28.
			4 Hände	II. Quadrumăna, Affen. §. 29.
		ohne Hände	Brustzitzen; Flughäute	III. Cheiroptĕra, Fledermäuse. §. 32.
			Bauchzitzen; keine Flughäute; Zehen mit Krallen	IV. Carnivŏra, Raubthiere. §. 35.
Nur 2 Zahnarten (Fig. 11) oder gar keine Zähne	Zitzen nicht frei, am Bauche in einem Beutel od. hinter Hautfalten			V. Marsupialĭa, Beutelthiere. §. 38.
	Eckzähne fehlen; Vorderzähne ½ ...			VI. Glires, Nagethiere. §. 41.
	Eck- und Vorderzähne od. alle Zähne fehlen			VII. Edentăta, Zahnarme. §. 44.

§. 26a. **B. Ungulāta. Hufsäugethiere.** Zehen in 1 oder mehre Hufe verwachsen.

- In beiden Kiefern Vorderz. (Fig. 14): Zehen mehr als 2 Hufe bildend..... VIII. Multungŭla, Vielhufer. §. 46.
- In beiden Kiefern Vorderz. (Fig. 14): Zehen nur 1 Huf bildend..... IX. Solidungŭla, Einhufer. §. 49.
- Nur im Unterkiefer Vorderz. (Fig. 16): Zehen 2 Hufe bildend (Fig. 16.)..... X. Bisŭlca, Wiederkäuer. §. 51.

C. Pinnipedĭa. Flossen- oder Wassersäugethiere. Vorder- und Hintergliedmaßen flossenartig verwachsen.

- Flossenfüße (Fig. 17.); Hintergliedmaßen horizontal nach hinten..... XI. Pinnipedĭa, Seehunde. §. 54.
- Flossen (Fig. 18.); Hintergliedmaßen fehlend oder vielmehr eine Schwanzflosse bildend... XII. Cetacĕa, Wale. §. 57.

§. 26b. **II.*) Affen.** 3 Familien. §. 30.

- Gesicht kahl; Plattnägel; 4 Hände: 1. eigentliche Affen. Nasenscheidewand schmal; Backenzähne ⅔. — (Orang-Utang): 1a. Affen der alten Welt.
- Gesicht kahl; Plattnägel; 4 Hände: 1. eigentliche Affen. Nasenscheidewand breit; Backenzähne ⅔. — (Kapuzineraffe).: 1b. Affen der neuen Welt.
- Vorn Pfoten, hinten Hände; Krallnägel. — — (Löwenäffchen)..... 2. Krallenaffen.
- Gesicht behaart; hintere Zeigefinger mit Krallnagel; Kopf zugespitzt [Fuchskopf]. — — (Katzenmaki)..... 3. Halbaffen.

III. Handflügler. 2 Familien. §. 34.

- Flughaut nicht zurückschlagbar; Füße fast gleich lang. — — (Fliegender Hund)..... 1. Pelzflatterer.
- Flugh. zurückschlagbar; Vorderfüße mit sehr langen Zehen. 2. Fledermäuse. Nase ohne blattförmigen Aufsatz. — (Gemeine Fledermaus) 2a. Glattnasen.
- Flugh. zurückschlagbar; Vorderfüße mit sehr langen Zehen. 2. Fledermäuse. Nase mit blattförmigem Aufsatz. (Fig 9.) — — (Vampyr) 2b. Blattnasen.

IV. Raubthiere. 8 Familien. §. 35.

A. Insektenfresser:

- Mit Schlüsselbeine (F. 2, d); Zahnbau verschieden; Körper behaart; Rücken mit Stacheln. — — (Gemeiner Igel)..... 1. Igel.
- Mit Schlüsselbeine (F. 2, d); Zahnbau verschieden; Körper behaart; 4 Gangfüße. — — (Wasserspitzmaus) 2. Spitzmäuse.
- Mit Schlüsselbeine (F. 2, d); Zahnbau verschieden; Körper behaart; Vorderfüße Grabfüße — — (Gemeiner Maulwurf)..... 3. Maulwürfe.

B. Raubthiere:

- Ohne Schlüsselb.; Vorderz. ⅚; Eckz. ¼ (Fig. 1.); Sohlengänger: treten mit ganzer Sohle auf; 5 Zehen mit Krallen an allen Füßen. — (Landbär) 4. Bären.
- Ohne Schlüsselb.; Vorderz. ⅚; Eckz. ¼ (Fig. 1.); Zehengänger: treten nur mit den Zehen auf; Körper gedrungen; Beine lang; keine Stinkdrüsen; Krallen unbeweglich; Zunge glatt — — (Hund).... 5. Hunde.
- Ohne Schlüsselb.; Vorderz. ⅚; Eckz. ¼ (Fig. 1.); Zehengänger: treten nur mit den Zehen auf; Körper gedrungen; Beine lang; keine Stinkdrüsen; Krallen zurückziehbar; Zunge rauh. — — (Hauskatze). 6. Katzen.
- Ohne Schlüsselb.; Vorderz. ⅚; Eckz. ¼ (Fig. 1.); Zehengänger: treten nur mit den Zehen auf; Körper gestreckt; Beine kurz; mit Stinkdrüsen; Krallen unbeweglich; Zunge glatt — (Hausmarder) 7. Marder.
- Ohne Schlüsselb.; Vorderz. ⅚; Eckz. ¼ (Fig. 1.); Zehengänger: treten nur mit den Zehen auf; Körper gestreckt; Beine kurz; mit Stinkdrüsen; K. etwas zurückziehbar; Zunge rauh — (Zibethkatze).. 8. Viverren.

V. Beutelthiere. 2 Familien. §. 38.

- Gebiß der Raubthiere (F. 1.); Eckz. stark; Fleischnahrung. — (Opossum) 1. Fleischfresser.
- Gebiß der Nagethiere (Fig. 11.); Eckzähne fehlend oder sehr klein; Pflanzennahrung. — — (Känguruh)..... 2. Fruchtfresser.

---

*) Die erste Ordnung enthält wie die neunte nur eine, mit der Ordnung gleichnamige Familie; beide sind deshalb hier fortgelassen.

VI. Nagethiere. 8 Familien. §. 41.

§. 26b.

- Körper behaart
  - Beine fast gleich lang
    - alle Zehen frei
      - mit Krallen
        - ein äußeres Ohr
          - Ohren, Schwanz u. Pfoten dicht behaart; Augen groß; Bckz. ¼. — — (Eichhörnchen) . . . . . 1. Eichhörnchen.
        - kein äußeres Ohr
          - Ohren, Schwanz u. Pfoten fast nackt; Augen klein; Bckz. ⅓. — — (Wanderratte) . . . . . 2. Mäuse.
          - kein äußeres Ohr; Schwanz kurz od. fehlend; Körper maulwurfsähnlich. — — (Blindmaus) . . 3. Maulwurfsmäuse.
      - mit hufartigen Nägeln; Ohren u. Schwanz kurz. — — (Meerschweinchen) . . . . . 4. Halbhufer.
    - Hinterzehen mit Schwimmhäuten; Schwanz schuppig. (Fig. 11.) — — (Biber) . . . . . 5. Schwimmfüßer.
  - Hinterbeine viel länger
    - Schwanz sehr kurz oder fehlend. — (Gemeiner Hase) . . . . . 6. Hasen.
    - Schwanz sehr lang, mit Endquaste. — — (Zerboa) . . . . . 7. Hasenmäuse.
- Körper mit Stacheln. — — (Stachelschwein) . . . . . 8. Stachelschweine.

VII. Zahnlückige Säugethiere. 4 Familien. §. 44.

- Schnauze kurz; Körper behaart; lange, zurückschlagbare Krallen. — — (Faulthier) . . . . . 1. Faulthiere.
- Schnauze lang
  - spitz, nicht schnabelartig
    - Körper mit Gürteln; Zunge nicht weit vorstreckbar. — (Gürtelthier) . . . . . 2. Gürtelthiere.
    - Körper mit Schuppen oder Haaren; Zunge der langen Schnauze weit vorstreckbar. — (Schuppenthier) . . . . . 3. Wurmzüngler.
  - schnabelartig, mit eigenthümlicher Haut. — — (Schnabelthier) . . . . . 4. Schnabelthiere.

VIII. Vielhufer. 3 Familien. §. 47.

- Haut mit Haaren
  - Rüssel sehr lang; Stoßzähne. (Fig. 12.) — (Elephant) . . . . . 1. Rüsselthiere.
  - Rüssel kurz oder fehlend; keine Stoßzähne — — (Nashorn) . . . . . 2. Eigentliche Dickhäuter.
- Haut mit Borsten; Rüssel kurz; 4 Hufe oder Klauen, deren 2 kleiner u. höher (Afterklauen). — (Hausschwein) 3. Schweine.

X. Wiederkäuer. 4 Familien. §. 51.

- Ohne Hörner und Afterklauen. — — (Kameel) . . . . . 1. Schwielensohler.
- Mit Hörnern
  - Vorderbeine viel länger. — — (Giraffe) . . . 2. Abschüssige.
  - Nicht so
    - Hörner solid, abwerfbar. — (Edelhirsch) 3. Hirsche.
    - Hörner hohl, nicht abwerfbar. — (Stier) 4. Hornthiere.

XI. Ruderfüßer. 2 Familien. §. 54.

- Eckzähne des Oberkiefers weit vorragend. — — (Wallroß) . . . . . 1. Wallrosse.
- Eck- und Vorderzähne von Lippen bedeckt. — (Gemeiner Seehund). . 2. Robben.

XII. Wale. 3 Familien. §. 57.

- Mit Zähnen
  - Zähne von verschiedener Bildung. — — (Seekuh) . . . 1. Seekühe.
  - Zähne alle gleich lang und klein (Fig. 19.), oder einer sehr lang, wagerecht. — — (Delphin) . . 2. Delphine.
- Mit Barten statt der Zähne (Fig. 18.). — — (Wallfisch) . . . . . 3. Wallfische.

§. 27. **A. Digitāta.** Zehen- oder Nagelsäugethiere.

Vollkommenste Ausbildung der Extremitäten (können greifen, klettern); Körper schlank; meist thierische Nahrung, daher große Lebhaftigkeit: VII Ordnungen.

§. 28. **I. Ordnung.** *Bimāna.* **Zweihänder.** Hände und Füße; nur Plattnägel; Gang aufrecht; Vdz. $^4/_4$; Eckz. $^1/_1$; Bckz. $^5/_5$. Alle Zähne gleich lang und ohne Lücken; Gesichtswinkel*) 75—90°. Sprache und Vernunft (§. 21, b.). Nur 1 Familie, 1 Gattung und 1 Art (gegenwärtig etwa 1000 Millionen auf der ganzen Erde).

* *Homo sapiens* L. Der Mensch. Unterscheidet sich körperlich selbst vom menschenähnlichsten Affen **a.** durch den aufrechten Gang (alle Affen stehen mit gebogenen Knien); **b.** durch zwei Hände; **c.** durch das vorragende Kinn und den Gesichtswinkel von wenigstens 75° (bei Affen von 30 bis höchstens 65°); **d.** durch Bildung u. perpendiculäre Stellung der Zähne. Der Mensch wird als sehr hülfsbedürftiges Geschöpf geboren, erhält am Ende des ersten Jahrs die Milchzähne (§. 11.), welche bis zum 8ten Jahre mit neuen vertauscht (geschichtet) werden. Vom 18—20sten Jahre erscheinen die 4 letzten Backenzähne (Weisheitszähne). Beim Menschen sind die körperlichen Fähigkeiten in der gleichmäßigsten Entwickelung, bei ihm waltet keine der 4 Lebensverrichtungen (Empfindung, Bewegung, Ernährung, Fortpflanzung) vor den übrigen vor, kein Sinn überragt wesentlich die andern an Schärfe wie bei den übrigen Thieren (beim Hunde ist der Geruch, bei Raubvögeln das Gesicht, bei Amphibien die Verdauung, bei Fischen die Fortpflanzung stärker). Er ist an keine bestimmte Nahrung und an kein Klima gebunden, gedeihet in allen Zonen (Cosmopolit, Weltbürger), zeigt aber in Hautfarbe (§. 14, 1), Schädel- und Haarbildung große erbliche Verschiedenheiten, nach welchen Blumenbach 5 Raçen unterscheidet: **a.** Kaukasischer Stamm mit hoher, sanft gewölbter Stirn, **weißer** Hautfarbe und weichem Haupthaare (fast ganz Europa, Süd- und Westasien und Nordafrika bewohnend); **b.** Mongolischer Stamm mit **gelb**brauner Hautfarbe, eckigem Kopfe, flachem Gesichte mit vorstehenden Backenknochen, mit kleiner, stumpfer Nase und mit schwarzem, straffem Kopfhaare (Mittel- und Ostasien, so wie den Norden Europas und Amerikas bewohnend); **c.** Aethiopischer Stamm mit **schwarzer** Hautfarbe, flacher Stirn (Gesichtswinkel 75°), stumpfer, breiter Nase, aufgeworfenen Lippen und mit schwarzem, wolligem Haupthaare (Mittel- und Südafrika, Neuholland und Neu-Guinea bewohnend); **d.** Amerikanischer Stamm mit **roth**brauner Hautfarbe, mit breitem Gesichte und niedriger Stirn und mit schwarzem, straffem Haar (früher fast das ganze, jetzt nur noch das nicht cultivirte Amerika bewohnend); **e.** Malaischer Stamm mit **brauner** Hautfarbe, breiter, stumpfer, kleiner Nase, mit großem, aufgeworfenem Munde und mit schwarzem, lockigem Haupthaare (vorzüglich die Südseeinseln bewohnend). — Creolen nennt man die Nachkommen von einem Europäer u. Eingebornen in den außereuropäischen Colonien; Mulatten die Kinder von einem Europäer oder Creolen und einer Negerin; Mestizen die Kinder von Europäern und Amerikanern; Zambo oder Sambo die Kinder von Negern und Amerikanern. — Gefleckte Individuen, Kakerlaken oder Albino's (von unnatürlich weißer Haut und mit rothen Augen §. 14, 2, b.) finden sich unter jeder Raçe; Sirenen indeß, Centauren, geschwänzte Menschen, Riesen- und Zwergnationen gehören zu den Fabeln der Alten. Als schädliche Thiere leben **a.** ausschließlich am und im menschlichen Körper: mehre Läuse (§. 194.), Krätzmilben (§. 200.), Spul- und Bandwürmer (§. 216. und 218.); **b.** schaden zufällig oder können doch sehr lästig werden: **Hunde** durch die Wuthkrankheit (§. 25.), Kühe durch Milzbrand (§. 53, 9), Kreuzottern

*) Der Gesichtswinkel wird von 2 Linien gebildet, deren eine von der Stirn herabläuft und deren andere von der Ohröffnung zu den Wurzeln der Vorderzähne sich hinzieht.

und Klapperschlangen durch ihren giftigen Biß (§. 93.), ferner Wespen und Bienen (§§. 153. und 154.), Prozessionsraupen (§. 164, 24), Mücken (Moskito's, Columbatscher Mücken, Kriebelmücken §. 170, 1 und 5), gemeiner Floh und Sandfloh (§. 171.), Wadenstecher, Stubenfliegen, Brechfliegen, Blindbremsen und Regenbremsen (§. 172.), Bettwanzen (§. 189.), Scorpione (§. 197.), Holzböcke (§. 200.), und Nestelwürmer (§. 216.).

II. Ordnung. *Quadrumăna.* Vierhänder oder Affen. §. 29.

Vier Hände, meist 5fingerig, mit Plattnägeln, wenigstens auf hinterm Daumen; nach vorn gerichtete Augen; Brustzitzen; Vrdz. meist $^4/_4$; Augenz. $^1/_1$; Bckz. $^5/_5$ bis $^6/_6$. Sind dem Menschen in Körperbau, Gelehrigkeit und Betragen am ähnlichsten (§. 28.), unterscheiden sich aber **a.** durch den Gesichtswinkel; **b.** durch Behaarung des Körpers; **c.** durch Stellung und Bildung der Zähne; **d.** durch 4 Hände ꝛc. Sie leben nur in der heißen Zone, fast immer auf Bäumen, meist truppweise, fast alle von Früchten, nur wenige von Insekten, Eiern ꝛc. Sie sind sehr lebhaft, gewandt, listig, unreinlich, sehr gelehrig, durch keine Strafe zu bessern. Die größern Arten gehören zu den Schmalnasen, welche eine schmale Nasenscheidewand und nach vorn gerichtete Nasenlöcher haben, sich nur in der alten Welt finden und im Alter vorzüglich tückisch und hinterlistig sind. Die Breitnasen, d. h. mit breiter Nasenscheidewand und mit seitlichen Nasenlöchern, leben wie die Krallenaffen in den Urwäldern des tropischen Amerika, wo ihnen die Raubthiere des wohlschmeckenden Fleisches wegen oft nachstellen; sie sind, wie die auf die alte Welt eingeschränkten Halbaffen, meist kleiner, leichter zähmbar und weniger boshaft. — 3 Familien (S. 30, II.):

1) Simĭae. Eigentliche Affen. §. 30.

Gesicht kahl; Vdz. $^4/_4$; Bckz. stumpfhöckerig; an allen Fingern Plattnägel (§. 25 b).

- **Schmalnasen; Bckz. $^6/_6$**
  - Kopf rundlich; Gesichtswinkel nicht unter 45°
    - ohne Backentaschen und ohne Schwanz
      - Keine Gefäßschwielen; Arme höchstens bis über die Kniee hinaus; Gesichtswinkel 65°. — Orang... 1) *Pithēcus* Geoffr.
      - Gefäßschwielen; Arme fast bis zur Erde; Gesichtswinkel 60°. — Langarm. 2) *Hylobătes* Jll.
    - Backentaschen, Schwanz und nackte Gefäßschwielen; Eckzähne nicht viel stärker
      - Schwanz höchstens ½ der Körperlänge oder nur ein Knötchen; Gesichtswinkel 45°. — Magot..... 3) *Inŭus* C.
      - Schwanz sehr lang; Gesichtswinkel 60°. — Meerkatze..... 4) *Cercopithēcus.*
  - Kopf länglich (Hundskopf); Gesichtswinkel 30°; Eckzähne sehr groß und stark; Schwanz kurz oder körperlang. — Pavian..... 5) *Cynocephălus* Briss.
- **Breitnasen; Bckz. $^5/_5$**
  - Greifschwanz (unter der Spitze nackt und gekrümmt)
    - Vorderhände mit Daumen; eine Schallblase am Gaumen; Gesichtswinkel 30° — Brüllaffe..... 6) *Stentor* Geoffr.
    - Vorderhände ohne Daumen; keine Schallblase; Arme dünn und lang; Gesichtswinkel 50 bis 60°. — Klammeraffe 7) *Atĕles* Jll.
  - Roll- od. Wickelschwanz (ganz behaart); Kopf klein, rundlich. — Winselaffe..... 8) *Cebus* Geoffr.

2) Arctopithēci. Krallenaffen, Uistiti (wegen ihres Geschreies).

Gesicht kahl; Vorderzähne $^4/_4$; vorn Pfoten, hinten Hände; Krallnägel, nur der hintere Daumen mit einem Plattnagel; Schwanz buschig, über Körperlänge.

- Ohren mit Haarbüschel, Schwanz geringelt. — Pinselaffe 9) *Hapăle* Jll.
- Ohren ohne Haarbüschel, Schwanz nicht geringelt. — Tamarin..... 10) *Midas* Geoffr.

3) Prosimĭi. Halbaffen.

Gesicht behaart; Vorderzähne verschieden; 4 Hände mit Plattnägeln, nur der hintere Zeigefinger mit spitzem Krallnagel; Kopf zugespitzt (Fuchskopf).

Ohren klein { Schwz lang, stark behaart; Vbrz. $\frac{2-2}{6}$ — Katzenmaki 11) *Lemur* L.
Schwz kurz oder fehlend; Vbrz. $\frac{2-2}{4}$ — Indri..... 12) *Lichanōtus* Jll.
Ohren groß; Schwz. lang, buschig; Augen groß; Vbrz. ⅞ od. ⅞ — Ohraffe..... 13) *Otolĭcnus* Jll.

§. 31. **1. Eigentliche Affen.** Die meisten, größten und gelehrigsten Arten hierher.

1. ***Pithēcus satyrus*** L. Orang-Utang (d. h. Waldmensch), Jocko. Kastanienbraun; Gesicht kahl, bläulich; Arme bis über die Knie herabreichend. Haare am Vorderarme rückwärts gerichtet; bis 5′ hoch. Auf Borneo; selten und deshalb erst einige Male lebend nach Europa gebracht. Sein Gebiß vergrößert sich nach der Schichtung (§. 11,1) sehr und wird dann pavianartig. Wurm's Pongo ist ein ausgewachsener Orang.

Fig. 8. Schädel des Orang-Utang.

P. troglodȳtes Blbch. Schimpanse. Schwarzbraun; Arme die Knie nicht erreichend; Ohren größer als beim Orang; 3′. In Congo und Guinea.

2. ***Hylobātes lar*** Jll. Schwarzer Gibbon. Schwarz; Gesicht mit weißlichem Haarkreise; $1\frac{1}{2}$′; Ostindien; selten.

3. ***Inŭus sylvānus*** L. Gemeiner, türkischer Affe. Gelbgrau; Gesicht fleischfarbig; statt des Schwanzes ein kleines Knötchen; 2—3′; Nordafrika. Häufig zu uns gebracht; auf Gibraltar's Felsen verwildert (einziger Europäer).

I. ***cynamōlgus*** L. Makako. Oben grünlich; Ohren und Hände schwarz; $1\frac{1}{2}$′; Java; häufig in Menagerien.

4. ***Cercopithēcus fuliginōsus*** Geoffr. Weißhäugige Meerkatze. Tief schiefer- oder rußfarbig, unten graulichweiß; $1\frac{3}{4}$′; Schwanz $1\frac{1}{2}$′. Kongo; häufig in Menagerien.

C. ***sabāeus*** L. Grüne Meerkatze. Oben gelbgrünlich, unten weißlich; Gesicht schwarz; Schwanzspitze meist gelblich; $1\frac{1}{2}$′; gemein am Senegal; häufig in Menagerien.

5. ***Cynocephălus mormon*** L. Mandril, Waldteufel. Graubraun ins Grünliche; Backen hellblau und gefurcht; Schnauze sehr lang; Scheitel mit starkem Haarwulste; Nase beim erwachsenen ♂ feuerroth (C. maimon); 2—4′; Guinea; häufig in Menagerien.

6. ***Stentor senicŭlus*** L. Rother Brüllaffe. Rostfarbig; Glieder und Schwanz kastanienbraun; $1\frac{3}{4}$′; Guiana; in den Wäldern furchtbar brüllend durch Hülfe einer Knochenblase oder Schallblase am Zungenbeine.

7. ***Ateles Belzĕbuth*** L. Schwärzlich; Pfoten und Schwanzende rothbraun; 17″; Schwanz 2′; am Orinoko; wird von Indianern häufig gegessen.

8. ***Cebus capucīnus*** L. Kapuzineraffe. Braun; Scheitel, ein Stirnstreif und Hände schwarzbraun; Umkreis des Gesichts weißlich; 14″; Guiana; häufig.

2. Krallenaffen. Kleine Südamerikaner, gesellig auf Bäumen von Früchten lebend.

9. ***Hapăle Jacchus*** L. Weißköpfiger Seiden- oder Pinselaffe. Grau; Ohrbüschel weiß, lang; Schwanz braun- und weißgeringelt; 8″; Schwanz 10″; Südamerika; häufig.

10. ***Midas rosalĭa*** L. Löwenäffchen, Marikina. Goldgelb; Kopfmähne lang; 9″; Schwanz 11″; Brasilien; häufig in Menagerien.

3. Halbaffen. Nur in der alten Welt, auf Bäumen lebende Affen.

11. ***Lemur catta*** L. Mokokko, Katzenmaki. Aschgrau; Schwanz weißgeringelt; 14″; Schwanz 18″; Madagascar.

12. *Lichanōtus Indri* L. Indri. Schwärzlich, mit grauem Gesichte; fast schwanzlos; 3′; Madagascar; selten.

13. *Otolicnus senegalensis* Geoffr. Gemeiner Galago. Grau, unten heller; Ohren länger als der Kopf; 7″; Schwanz 8″; am Senegal; selten.

III. Ordnung. *Cheiroptĕra.* **Handflügler.** Eine große Flughaut zwischen Vorder- und Hintergliedmaßen; Brustzitzen; starke Schlüsselbeine; Gebiß verschieden, meist alle 3 Zahnarten. Meist Nachtthiere; 18 deutsche Arten. — 2 Familien (S. 30, III.): §. 32.

1) Dermatoptĕra. Pelzflatterer. Flughaut beiderseits behaart, nicht zurückschlagbar gegen den Leib; Vorderfüße kaum länger als die Hinterfüße. §. 33

- Vorderfüße mit Krallen an allen Zehen, von gleicher Länge der Hinterfüße. — Pelzflatterer ..... 1) *Galeopithēcus* Pall.

2) Vespertilionĕa Fledermäuse. Flughaut meist nackt, zurückschlagbar; Vorderfüße mit sehr langen Zehen und einer Kralle am Daumen; Hinterfüße mit kurzen Zehen.

a. Glattnasen. Nase ohne blattförmigen Aufsatz.

- Ohren ohne Deckklappen; Krallnägel am Daumen und Zeigefinger. — Rüsselte ..... 2) *Ptcrŏpus* Briss.
- Ohren mit Deckklappen; Krallnägel nur am Daumen
  - Ohren getrennt
    - kürzer oder etwas länger als der Kopf
      - Deckel nach innen gerichtet; Bckz. ⅞ oder ⅚ ..... 3) *Vesperūgo* Blas.
      - Deckel nach außen gerichtet od. gerade; Bckz. ⅚. — Federm. 4) *Vespertilio* L.
    - fast 2mal länger als der Kopf; Bckz. ⅚. — Großohr ..... 5) *Plecōtus* Geoffr.
  - Ohren über dem Scheitel zusammengewachsen, kürzer als der Kopf; Bckz. ⅘ ..... 6) *Synōtus* Blas.

b. Blattnasen. Nase mit blattförmigem Aufsatze (s. Fig. 9.).

- Nase mit doppeltem Aufsatze, der vordere hufeisenförmig, der hintere spitz. — Vampyr ..... 7) *Phyllostŏma* Geoffr.
- Nase mit einfachem, hufeisenf. Aufsatze. — Hufeisennase 8) *Rhinolŏphus* Geoffr.

1. Pelzflatterer. Nahrung: Früchte u. Insekten; Flughaut nur als Fallschirm. §. 34.

1. *Galeopithēcus rufus* (*Lemur volans* L.). Fliegender Maki. Rothgrau, unten rostfarbig: 1′; Molukken.

2. **Fledermäuse,** ausgezeichnet durch feinen Tastsinn (§. 14, 1) in den Flughäuten, Nasenblättern und Ohren; fliegen sehr gut; klettern mit Hülfe des Daumens, halten in alten Gemäuern oder in hohlen Bäumen Winterschlaf und sind nützlich, weil sie nur von Insekten leben.

2. *Pterŏpus vulgāris* (*Vespertilio canīnus* L.). Fliegender Hund. Schwanzlos; bräunlich; klaftert 3′; Ostindien; Fleisch wohlschmeckend.

* 3. *Vesperūgo noctŭla* Daub. Frühfliegende oder Speckfledermaus. Mit 34 Zähnen; Ohrdeckel halbherzförmig; rothbraun; Körper 3″, Schwanz 1½″; in Deutschland gemein.

* *V. serotīnus* Daub. Spätfliegende Fl. Mit 32 Zähnen; Ohrdeckel schmal; rauchbraun, mit hellern Haarspitzen; Körper 2⅓″, Schwz 1⅔″; Deutschland.

* 4. *Vespertilio murīnus* L. Gemeine Fl. Ohren länger als der Kopf, mit 9 Querfalten; Ohrdeckel lanzettl.; rauchbraun; Körper 2⅔″, Schwz 1⅓″; Deutschland.

* 5. *Plecōtus aurītus* L. Großohr. Ohren mit 22—24 Querfalten; Körper 1⅔″, Schwanz 1⅓″; ganz Europa; bei uns sehr häufig.

* 6. *Synōtus barbastĕllus* Daub. Ohren mit 4 Querfalten; braunschwarz, unten graubraun; Körper 2″; Deutschland, selten.

7. *Phyllostŏma spectrum* L. Vampyr od. Blutsauger. Kastanienbraun; Körper 7″; klaftert 2′. Südamerika. Die Zunge ist mit Papillen zum Saugen

besetzt. Saugt Nachts größern Säugethieren, auch wohl schlafenden Menschen Blut aus, indem er sich letztern vorzüglich gerne an die Fußzehe setzt, wodurch er wohl beschwerlich, aber nie tödtlich wird. Volkssagen von blutsaugenden Gespenstern.

* 8. *Rhinolóphus ferrum equīnum* Buff. Große Hufeisennase. Die querstehende Haut an der Stirn etwas kürzer als das Hufeisen; Körper 2½″, Schwanz 2″. Deutschland.

Fig. 9. Große Hufeisennase.
Zeigt die Bildung der Blätter auf der Nase und zur Seite die Vorderzähne ¾.

§. 35. **IV. Ordnung.** *Carnivŏra.* **Raubthiere.** Vorder- und Hintergliedmaßen gleichgebildet; freie Bauchzitzen; Zehen an Zahl verschieden, mit Krallen; alle 3 Arten Zähne; Backenzähne nach der Nahrung (Fleisch, Aas, Insekten, selten Früchte) verschieden (Fig. 11,1). Werden blind und nackt geboren; sind über alle Zonen verbreitet. 18 Arten in Deutschland.

Die Insektenfresser sind kleine, meist nächtliche, unterirdische, den Nagern (§. 41.) ähnliche Thiere, welche von Insekten und Würmern, höchstens von kleinen Mäusen leben und deshalb nützlich sind; viele werden lethargisch (§. 21,5).



Fig. 10. Gebiß des Hundes.

Unterkiefer: a Gelenkkopf; b Kronfortsatz; c vier Lückenzähne; etwa unter dem ersten ein Loch für einen Nerv, welcher aus dem Zahnkanale kommt; d Reißzahn; e Mahl- oder Querzahn; f Kronzahn; a drei Vorderzähne.

Oberkiefer: a drei Vorderzähne im Zwischenkiefer i; b Eckzahn; c drei Lückenzähne; d—f wie unten; b Schläfenbein; c äußerer Gehörgang; d Pauke; e Jochbein; g Augenhöhlenloch für einen Nerv.

Die Fleischfresser oder eigentlichen Raubthiere sind die stärksten, größten und gefährlichsten, durch starkes Gebiß (Fig. 10.) ausgezeichneten Räuber. Die den Eckzähnen zunächst stehenden Backenzähne sind spitz und zusammengedrückt (falsche Backenzähne, Lückenzähne), der darauf folgende große Backenzahn hat mehrere Spitzen und meist einen Höckeransatz (Reiß- oder Fleischzahn) und die letzten Backenzähne haben 1—2 Höcker und dienen zum Käuen (Mahlzähne). Je mehr die Höckerbildung vorherrscht, desto mehr können diese Thiere von Pflanzen leben (wie z. B. der Bär). Die Insektenfresser haben schwache Zähne, ihre Schneidezähne sind in Zahl schwankend, die Eckzähne oft klein und undeutlich. — 8 Familien (Uebersicht S. 30, IV.):

A. Insectivŏra. Insektenfresser oder Erdwühler. §. 36.

Zahnbau verschieden; Schnauze meist rüsselförmig; Schlüsselbeine. Unterirdisches Leben.

1) Erinacĕi. Igel. Rücken mit Stacheln; 4 Gangfüße.

Mit Stacheln; Schwz kurz; Eckz. klein. — Igel..... 1) *Erinaceus* L.
Mit Stacheln u. Borsten; Schwz fehlt; Eckz. groß. — Tenrek... 2) *Centētes* Ill.

2) Soricīna. Spitzmäuse. Körper behaart; 4 Gangfüße.

Ohrmuscheln fehlen; Zehen mit Schwimmhäuten; Vdrz. ¾. — — Rüsselmaus..... 3) *Myogăle* C.
Ohrmuscheln groß; Zehen frei; Vorderzähne ½. — Spitzmaus... 4) *Sorex* L.

3) Talpīna. Maulwürfe. Körper behaart; Vorderfüße Grabfüße; Augen und Ohren im Pelze versteckt.

Alle Füße mit 5 Krallen; Vorderzähne ⅔. — Maulwurf..... 5) *Talpa* L.
Vorderfüße mit 3 Krallen; Vorderzähne ¾. — Goldmaulwurf.. 6) *Chrysochlŏris* C.

B. Ferae. Raubthiere. Vdz. $^6/_6$; Eckz. $^1/_1$, sehr stark; keine Schlüsselbeine.

a. Sohlengänger (plantigrăda). Treten mit dem ganzen Fuße auf.

4) Ursīna. Bären. An allen Füßen 5 Zehen u. Krallen; viele Höckerzähne.

Schnauze stumpf: Schwz kurz; neben dem After keine Hautfalten. — — Bär..... 7) *Ursus* L.
Schnauze stumpf: Schwz kurz, buschig; neben dem After 2 schmierlose Hautfalten. — Vielfraß..... 8) *Gulo.*
Schnauze etwas vorragend: Schwz kurz, kurzhaarig; neben dem After eine tiefe Drüsentasche. — Dachs..... 9) *Meles.*
Schnauze etwas vorragend: Schwz über halbe Körperlänge und schlaff. — — Waschbär..... 10) *Procyon.*
Schnauze lang, rüsselförmig; Schwz von Körperlänge. — — Nasenthier..... 11) *Nasŭa.*

b. Zehengänger (digitigrăda). Treten nur mit den Zehen auf.

5) Canīna. Hunde. Körper gedrungen; Beine lang; keine Stinkdrüsen; Krallen unbeweglich; Zunge glatt.

Rücken nicht abschüssig; Vorderfüße mit 5, Hinterfüße mit 4 Zehen. — Hund..... 12) *Canis* L.
Rücken abschüssig; alle Füße mit 4 Zehen. — Hyäne..... 13) *Hyaena* Briss.

6) Felīna. Katzen. Körper wie vorher, aber keine Stinkdrüsen; Krallen zurückziehbar; Zunge rauh.

Kopf rund, mit starkem Gebisse. Nur 1 Gattung. — Katze..... 14) *Felis* L.

7) Mustelīna. Marder. Körper gestreckt; Beine kurz; zwei Stinkdrüsen; Krallen unbeweglich; Zunge glatt.

Schnauze spitz; Zehen frei: mit kurzen Krallen; Schwz buschig. — Marder... 15) *Mustēla* L.
Schnauze spitz; Zehen frei: mit langen Grabkrallen; Schwz buschig; Leib langhaarig. — Stinkthier..... 16) *Mephītis* C.
Schnauze stumpf; Zehen mit Schwimmh.: Zehen der Vorderfüße sehr lang, nicht verwachsen, aber mit Schwimmhäuten verbunden. — Fischotter 17) *Lutra* Ray.
Schnauze stumpf; Zehen mit Schwimmh.: Zehen der Vorderfüße sehr kurz, durch eine schwielige Haut verwachsen. — Seeotter..... 18) *Enhÿdris.*

8) Viverrīna. Viverren. Körper wie vorher; Drüsentasche (Stinkloch) in der Aftergegend; Krallen etwas zurückziehbar; Zunge rauh.

Zwei Stinkdrüsen am After außer der Drüsentasche. — Zibeththier. 19) *Viverra* L.
Keine Stinkdrüse am After, sondern nur eine Drüsentasche. — — Ichneumon..... 20) *Herpēstes* Ill.

1. Igel. Nächtliche, langsame, in Höhlen Winterschlaf haltende Thiere. §. 37.

* 1. ***Erinacĕus europaeus*** L. Gemeiner Igel, Schweinigel. Ohren kurz; Stirn ohne Stacheln; Körper 10″; kann sich einkugeln. Ganz Europa. Lebt von Insekten, kleinen Säugethieren, auch wohl von Früchten; nützt durch

§. 37. Vertilgung von Mäusen und Schaben (§. 182.), frißt Kreuzottern ohne Nachtheil, ist aber nicht giftfest. Die Römer benutzten die Felle zum Karden der Wolltücher.

2. *Centētes ecaudātus* L. Der schwanzlose Tenrek oder Borstenigel. Nur am Halse, Nacken und Hinterkopfe mit Stacheln; 1′; kann sich nicht einkugeln; Madagascar. Hält Sommerschlaf (§. 21, 5).

2. Spitzmäuse. Nächtliche, in Erdlöchern von Insekten und Würmern lebende, sehr gefräßige, nützliche Thiere. Die eigentlichen Spitzmäuse werden von Hunden und Katzen nicht gefressen, weil aus einer Seitenbrüse des Leibes sich eine ihnen unangenehme Feuchtigkeit absondert.

3. *Myogāle moschāta* L. Bisamratte, Desmann. Rothbraun mit weißem Ohrflecke; 14″; an Gewässern Südrußlands; riecht nach Moschus; Pelz gesucht.

* 4. *Sorex fodiens* Gm. Wasserspitzmaus. Zahnspitzen braun; schwarzbraun, unten weißlich; Zehen mit steifen Borstenhaaren zum Schwimmen; 3″. Häufig an Gewässern.

* *S. aranēus* L. Gemeine oder Acker-Sp. Zähne weiß; bräunlich grau, unten weißlich; Zehen ohne Schwimmborsten; 2″. In Erdlöchern; gemeinste Art.

* *S. pygmaeus* Pall. (*exīlis* L.) Zwergspitzmaus. Kleinstes Säugethier; 1½″.

3. Maulwürfe. Nur von Insekten u. Würmern unter der Erde lebend.

†* 5. *Talpa europaea* L. Gemeiner Maulwurf. Blauschwarz; Füße fleischfarbig; Augen im Pelze versteckt; 5″; schadet durch Aufwerfen der Erde und wird durch Maulwurfsfallen gefangen oder durch übelriechende Dinge (Häringsköpfe, Theer ꝛc.), welche man in die frischen Gänge oder Haufen steckt, auf kurze Zeit verscheucht. Asien und Europa, aber nur bis Toscana, von wo an *T. coeca*, der blinde M., lebt, dessen Augen von der Körperhaut fast ganz überzogen sind.

6. *Chrysochlōris capēnsis* C. Goldmaulwurf. Braun; Haarspitzen metallisch glänzend (einziges Beispiel unter den Säugethieren); 4½″; am Cap.

4. Bären. Meist nächtliche, plumpe Thiere mit vielen Höckerzähnen und deshalb auch Vegetabilien fressend.

† 7. *Ursus marītimus* L. Eisbär. Einfarbig weiß; 6—8′; schwimmt gut, ist kühn, greift Menschen an. Polarküsten. Gutes Pelzwerk.

† *U. arctos* L. Landbär, brauner oder gemeiner B. Braun, ins Gelbliche (Honigbär) oder Silbergraue (Silberbär); 4—6′; größtes Raubthier Europa's; zähmbar; erklettert Bäume; frißt auch Obst, Honig und Insekten. Die Jungen kommen nicht unförmlich zur Welt. Gutes Pelzwerk; Fleisch eßbar (Bärentatzen Leckerbissen). Nur noch in Ost- und Westeuropa, in den Alpen und Pyrenäen; früher über ganz Europa verbreitet.

† *U. americānus* Pall. Baribal, amerikanischer Bär. Meist schwarz; Stirn flach; Schnauze gelblich; 5′. Nordamerika.

* *U. spelaeus* Blbch. Höhlenbär. Vorweltlicher Bär, dessen Knochen häufig fossil in Höhlen (z. B. in der Baumannshöhle) sich finden.

8. *Gulo boreālis.* Gemeiner Vielfraß (d. h. Höhlenbewohner). Braun, mit dunklerm, sattelförmigem Rückenstreife; 2½′. Wälder Nordeuropa's. Raubgierig, überwältigt sogar Rennthiere. Daß er nach unmäßigem Fressen sich durch Einklammern zwischen 2 Bäume entleere, ist Fabel.

G. mellivōrus. Der Honigdachs. Verräth wie der Honigkukkuk (§. 67, 4) den Hottentotten am Cap die Nester der wilden Bienen.

* 9. *Meles taxus* Schb. Gemeiner Dachs. Gelblich weiß, unten schwarz; ein schwarzer Streif über Augen und Ohren; 2′. Europa und Asien. Zu Pelzwerk, Jagdtaschen, Haarpinseln. Lebt Tags in Erdhöhlen (Dachsbau); hält Winterschlaf ohne zu erstarren. Das einzige Säugethier, bei welchem der Unterkiefer aus der Gelenkpfanne des Oberkiefers ohne Zerbrechen des Knochens nicht zu trennen ist. Dachsfett als Volksmittel.

10. ***Procyon lotor*** L. Gemeiner Waschbär, Schupp. Schwarzbraun; Schnauze weiß: über den Augen ein brauner Querstreif; Schwanz gelblichweiß geringelt; 2′. Nordamerika. Taucht nicht jeden Fraß erst ins Wasser, plätschert aber gern im Wasser und fischt sich mancherlei Futter aus demselben. §. 37.

11. ***Nasŭa sociālis*** Pr.M. Geselliger Cuati. Braun; ein weißer Kreis ums Auge; Schwanz braungeringelt; $1\frac{1}{2}$′. Südamerika; gesellig.

5. Hunde. Ueber alle Zonen verbreitet, von frischem Fleische od. Aas lebend.

†* **12.** ***Canis vulpes*** L. Fuchs. Pupille länglichrund; hellrostroth (Birken- oder Goldfuchs) oder dunkler (Brandfuchs), unten weißlich; $2\frac{1}{2}$′. In Höhlen (Bauen) Nordeuropa's und Nordasiens. Eine Drüse oben am Grunde des Schwanzes nennen die Jäger Viole. Raubsüchtig und listig, der Jagd und den Hühnerhöfen schädlich, aber durch Vertilgung von Mäusen und durch seinen Pelz nützlich.

C. aurĕus L. Schakal, Goldwolf. Pupille rund; rostgelblich grau, mit schwärzlichem Anfluge; Kehle weiß; Ohrenrand rostroth; $2\frac{1}{2}$′. Gefräßig, leicht zähmbar. Heerdenweise in Asien (Simson's Füchse), Afrika und Griechenland; in Europa jetzt nur noch auf eine Insel des adriatischen Meers beschränkt.

C. lagōpus L. Polar-, Eis- oder Blaufuchs, im Norden Europa's und Asiens, und dessen Spielart, der schwarze Silberfuchs in Nordamerika, liefern sehr kostbares Pelzwerk (50,000 Pelze jährlich).

†* *C. lupus* L. Wolf. Pupille rund; Beine und Hals kräftiger als beim Hunde; gelbgrau mit schwärzlichem Anfluge; Vorderbeine mit schwarzem Streife; Ohrenrand schwarz; $3\frac{1}{2}$′. Nebst dem Luchse das schädlichste und gefährlichste Raubthier Europas; jetzt in Deutschland fast, in England gänzlich ausgerottet. Gutes Pelzwerk und festes Leder.

* *C. familiāris* L. Hund. Pupille rund; Schwanz nach oben, meist links gekrümmt; Größe und Färbung sehr verschieden. Durch Gelehrigkeit (§. 21 b.), Gutmüthigkeit, Treue, Schnelligkeit, Stärke und scharfen Geruch ausgezeichnet Er säuft lappend, schwitzt kaum, trägt 63 Tage, wirft 4—8 blinde Junge. Eins der nützlichsten Thiere und das einzige, welches dem Menschen als Hausthier überall hin gefolgt ist als Wächter, als Kampf- und Jagdgenosse (Schweiß-, Leit-, Parforce-, Hatzhund, Windspiel, Vorstehehund, Dachshund, Saubeller), als Retter in den Schneefeldern, als Zugthier in den Polarzonen, als fettes Mastvieh in der Südsee; nur durch die Wuthkrankheit dem Menschen oft gefährlich. Vaterland und Stammart der vielen Racen (Schäferhund, Spitz, Pommer, Windhund, Hühnerhund, Dogge, Mops, Dachshund, Fleischerhund, Pudel, Neufundländer 2c.) unbekannt. Einige Spielarten haben ihre Stimme verloren. Verwilderte Hunde in Aegypten und Nordamerika.

13. ***Hyaena striāta*** Briss. Gestreifte Hyäne. Graugelb, mit schwarzbraunen Querstreifen. — *H. maculāta* Thunb. Gefleckte H. Ebenso, aber schwarzbraun gefleckt. Beide 3′; beide in Afrika; letztere das häufigste Raubthier am Cap. Zähmbar. Ihre schonungslose Grausamkeit sehr übertrieben. Gefräßige, aber feige, vorzüglich von Aas lebende Nachtraubthiere.

6. Katzen. Ueber alle Zonen (Neuseeland ausgenommen) verbreitete, durch scharfes Gesicht und Gehör ausgezeichnete, von Fleisch lebende Nachtraubthiere mit runder Schnauze und langem Knebelbarte (Spürhaare). Ueberhaupt die gewandtesten und kräftigsten Räuber; schlau, falsch, blutgierig, die Beute im Sprunge erhaschend. Gutes Pelzwerk. Im Handel unterscheidet man Pantherfelle und Tigerfelle, je nachdem sie geringelt sind oder gestreift.

a) **Löwen:** ungefleckt.

‡ **14.** ***Felis leo*** L. Gemeiner Löwe. Einfarbig braungelb; Schwanz mit Endquaste; 6—8′; ♂ mit Mähne. Asien, Afrika; früher auch in Griechenland. Springt 30′ weit; greift besonders fliehende Menschen und Thiere an; bereitet seinen Sprung erst dadurch vor, daß er sich niederlegt. Früher zu Kampfspielen der Römer benutzt.

§. 37. † *F. concolor* L. Amerikanischer Löwe, Puma, Cuguar. Einfarbig rothbraun oder undeutlich gefleckt (*f. discolor*); weder Mähne noch Schwanzbüschel; 3—4′; Mittelamerika. Blutgierig, aber feig; Menschen und größere Thiere nicht angreifend; vorzüglich Schafen gefährlich.

β) **Tiger:** gestreift.

‡ *F. tigris* L. Tiger. Rothgelb, mit Querbinden und Schwanzringeln; 5—9′. Der furchtbarste Räuber; hat in Ostindien schon aus mehreren Dörfern die Menschen vertilgt. Treibjagden der indischen Fürsten zur Ausrottung derselben.

†* *F. catus* L. Wilde Katze. Graubraun, dunkler gewellt; Ohren inwendig dicht behaart; Schwanz unter halber Körperlänge, bis zur Spitze gleich dick, letztes Drittel schwarz geringelt; 1′ 3″. Wälder Europa's. Dem Wildstande schädlich; gutes Pelzwerk.

* *F. domestica* Briss. Hauskatze. Färbung veränderlich; Ohren inwendig dünn behaart; Schwanz über halbe Körperlänge, nach der Spitze zu dünner. Etwas kleiner; nach Rüppel von *Felis maniculata* in Nubien abstammend. Die Cyperkatze ist schwarzgestreift, die spanische K. schwarz, weiß und roth gefleckt, die Karthäuserk. ist bläulichaschgrau bis bläulichschwarz, mit schwarzen Lippen und Fußsohlen; die angorische K. durch langes, weißes Haar ausgezeichnet. Gegen Ende der Kreuzzüge erst in Europa allgemeiner, und mit Verbreitung des Getreidebaues und in Folge dessen der Mäuse, zur Vertilgung der Letzteren immer weiter als Hausthier, auch nach Amerika verbreitet; nicht in kältern Ländern. Eigenthümlichkeiten: Elektricität, Schnurren (durch 2 gespannte, zarte Häute im Kehlkopfe hervorgebracht); Begierde nach Baldrian, Katzengamander und Katzenminze (II. §. 253. §. 230, 9); Abscheu gegen Gartenraute (II. §. 118.); Concerte beim Bolzen im Sommer und vorzüglich im März (§. 21, d).

γ) **Panther:** dunkel geringelt, ohne Ohrpinsel.

F. pardalis L. Ozelot, Pardelkatze. Weißgelblich, mit großen, schwarzeingefaßten Flecken; 2′ 10″. Mittelamerika.

† *F. pardus* C. Panther, Parder, afrikanischer Tiger. Rothgelb, seitwärts mit 6—7 Reihen Rosetten, deren jede aus 3—6 einfachen, runden Flecken besteht; 4′. Afrika.

† *F. leopardus* C. Leopard. Vorigem ähnlich, vielleicht nur Abart desselben, mit 10 Reihen kleinerer, zu 3—4 stehenden Flecken; 3′. Afrika.

‡ *F. onça* L. Jaguar, Unze, amerikanischer Tiger. Rostgelb, mit 4—6 Längsreihen großer, schwärzlicher Ringflecken um einen Mittelfleck; 4—5′. Größtes und gefährlichstes Raubthier des heißen Amerika; Menschen, verwilderten Pferden und Hirschen gefährlich.

δ) **Luchse:** gefleckt, weder Ringel noch Streifen, aber mit einem Ohrpinsel; Schwanz kurz.

†* *F. lynx* L. Gemeiner Luchs. Röthlich grau, unregelmäßig rostbraun gefleckt; Schwanz von Kopflänge, fast zur Hälfte schwarz. Europa; in Deutschland nur noch im baierischen Hochgebirge; auf dem hannoverschen Harze 1818 der letzte erlegt. Schädlicher als der Wolf. Gutes Pelzwerk.

F. jubata Schb. Guepard, Jagdleopard. Graugelb, mit vielen kleinen, schwärzlichen Flecken; Nackenhaar etwas länger; 3′; Schwanz 22″; Afrika und Asien. Sanft; gezähmt zur Jagd brauchbar.

7. Marder. Ueber alle Zonen (Australien ausgenommen) verbreitet.

†* **15.** *Mustela* L. Marder. Muthige Nachtraubthiere; Iltis und Hausmarder besonders dem Hausgeflügel gefährlich. Fressen Vögel, Eier, Mäuse; der Hausmarder auch Kirschen und Weintrauben. Das Frettchen wird in Europa als Hausthier zum Kaninchenfange gehalten; der Zobel liefert den kostbaren Zobelpelz, das Hermelin die Hermelinkragen; auch Steinmarder und besonders Edelmarder liefern gutes Pelzwerk. Marder werden in Marderfallen gefangen; am leichtesten aber getödtet, indem man ihnen Eier hinlegt, in welche

man Strichnin (II. §. 220.) durch ein kleines, in die Mitte des Eies gebohrtes Loch gesteckt hat.

- Schwanz über ½ der Körperlänge
  - Schwanz braun, wie der ganze Körper
    - Kehle und Unterhals gelb; Sohlen behaart; 18″. In Wäldern Europa's. — Edel- oder Baummarder..... †* *M. martes* L.
    - Kehle und Unterhals weiß; Sohlen nackt; 16″. In Städten und Dörfern ganz Europa's. — — Haus- oder Steinmarder..... †* *M. foïna* L.
  - Schwanz an der Spitze immer schwarz, der Körper übrigens braun, im Winter zuweilen weiß; 10″. Europa und Asien, vorzüglich Sibirien. — Hermelin, Harmeken..... †* *M. erminĕa* L.
- Schwanz unter ½ der Körperlänge
  - Körper einfarbig weißgelb; Augen röthl.; vielleicht ein Kakerlak (§. 28.) des Iltis; 18″. Nordafrika. — Frettchen *M. furo* L.
  - Körper braun
    - unten immer weiß, zuweilen im Winter ganz weiß; 6—7″. Europa; in Steinhaufen. — — Wiesel..... †* *M. vulgāris* L.
    - unten schwarzbraun wie der ganze Körper
      - Schnauze und Ohrspitzen weiß; Grundwolle gelblich; 16″; Europa, in hohlen Bäumen u. Gemäuer. — Iltis, Ilk... †* *M. putorĭus* L.
      - Kopf und Kehle weißlichgrau; 18″. Sibirien. — Zobel... *M. zibellĭna* L.

16. ***Mephītis putorĭus*** Gm. Gemeines Stinkthier. Schwarzbraun; Rücken weiß (meist mit weißen Längsstreifen); 16″; Nordamerika, wo sie von kleinen Säugethieren, Vögeln ꝛc. leben, sich Höhlen graben und willkührlich ihren Feinden eine furchtbar stinkende, den Athem hemmende Feuchtigkeit entgegenspritzen.

†* **17.** ***Lutra vulgāris.*** Gemeine Fischotter, Flußotter. Dunkelbraun; 2′; Europa und Sibirien. Leben in Uferlöchern, schwimmen gut, fressen Fische, Amphibien und Krebse; den Fischereien schädlich. Kostbares Pelzwerk. Fastenspeise.

18. ***Enhÿdris lutris*** L. Meerotter. Sammetschwarz; Kopf weißlich; 4′. In Gewässern zwischen Asien und Nordamerika. Sehr kostbares Pelzwerk. Die Russen vergolden die Haarspitzen und verkaufen solche Pelze den Chinesen sehr theuer.

8. Viverren. Nur über Südasien und Afrika verbreitete Räuber.

19. ***Vivĕrra zibētha*** L. Asiatische Zibethkatze. Aschgrau, schwarz gefleckt und gestreift; Schwanz schwarz geringelt; 2½′; Ostindien. Früher in Käfichen gehalten des Zibeths wegen, welcher zur Arznei und Parfümerie gebraucht wurde, aber jetzt durch Moschus (§.53,5) u. Ambra (§.59.) entbehrlich geworden ist.

V. ***civētta*** Buff. Afrikanische Z. Ebenso, aber Schwanz nicht geringelt und eine sträubbare Mähne; Mittelafrika. Wurde ebenso benutzt.

20. ***Herpēstes ichneumon*** L. Pharaonsratte, Ichneumon. Grau, 21″; Schwanz 18″, mit schwarzem Endquaste. Ägypten, wo er von kleinen Säugethieren, Amphibien und Krokodilen lebt, auch als Hausthier zum Mäusefangen gehalten wird. Häufig auf Denkmälern der Alten; kriecht dem Krokodile nicht in den Hals, um die Eingeweide auszufressen (§. 150.).

H. ***mungos*** Ill. Manguste. Lebt in Ostindien von Schlangen; wird aber durch die Schlangenwurzel (***Ophiorrhīza mungos***) nicht vom Bisse der Giftschlangen geheilt.

V. Ordnung. *Marsupialia.* Beutelthiere.

Bauchzitzen §. 38.

hinter Hautfalten oder in einem Beutel, in welchem die sehr unvollkommen geborenen Jungen an den Zitzen hangend weiter ausgebildet werden und auch nachher noch Schutz suchen. Gebiß, Fußbildung und Lebensart sehr verschieden. Eine Uebergangsgruppe von den Raub- zu den Nagethieren. Bewohner Neuhollands und Amerika's. — 2 Familien:

1) Carnivŏra. Raubthierähnliche B.

Gebiß der Raubthiere; §. 39.
Eckz. stark, Bckz. spitzhöckerig. Animalische Nahrung.

Hinterfüße ohne Daumen; Schwanz langhaarig, buschig; Vbrz. $^{1}/_{6}$. — Rauhschwanz . . . . . 1) *Dasyūrus* Jll.
Hinterf. mit nagellosem, abgesetztem Daumen (wahre Hände); Schwz dünn behaart, schuppig; Vbrz. $^{1}/_{4}$. — Beutelratte. 2) *Didēlphys* L.

2) Frugivŏra. Fruchtfressende B. Gebiß der Nagethiere; Vbrz. $^{2}/_{3}$ od. $^{6}/_{2}$; Eckz. $^{0}/_{0}$ od. $^{1}/_{0}$ und klein; Bckz. stumpf. Vegetabilische Nahrung.

Schwz fehlend; Vorderfüße greifend (die innere Zehe den 2 äußern daumenartig entgegensetzbar). — Koala . . . . . 3) *Phascolārctos* Blainv.
Schwz dick und lang; Vorderfüße nicht greifend; Hinterbeine sehr lang. — Känguruh . . . . . 4) *Halmatūrus* Jll.

§. 40. **1.** ***Dasyūrus macrūrus*** Schb. Langschwänziger Rauhschwanz. Braun, weißgefleckt; Schwanz von Körperlänge; Katzengröße. Neuholland. Leben von kleinen Säugethieren und Insekten; schleichen sich in die Wohnungen und stehlen Lebensmittel.

2. ***Didēlphys opōssum*** L. Opossum, Vierauge. Beutel vollkommen; kastanienbr.; ein weißlicher Fleck über jedem Auge; 10″; Schwz 8″. Paraguay.

D. dorsigĕra L. Surinamscher Äneas. Nur seitliche Hautfalten; graugelb; Stirn und Wangen weiß; 9″. Tragen die Jungen auf dem Rücken.

3. ***Phascolārctos cinerĕus*** Blainv. Aschgrauer Koala. Aschgrau, mit dickem Wollpelz; 2′; nächtliches Thier; auf Bäumen od. in Höhlen. Neuholland.

4. ***Halmatūrus gigantĕus*** Gm. Känguruh. Bräunlich grau; 4′; Schwz 3′. Springen über 24′ weit; vertreten in Neuholland die Stelle der fehlenden Wiederkäuer; leben dort heerdenweise. Das gewöhnlichste Wildpret der Neuholländer.

§. 41. **VI. Ordnung.** ***Glires.*** **Nagethiere, Nager od. Pfotenthiere.** Vbrz. $^{2}/_{1}$, lang, meißelartig gebogen (Nagezähne), von der hohlen Wurzel aus nachwachsend; Eckz. $^{0}/_{0}$; Bckz. meist $^{4}/_{4}$, schmelzfaltig (§. 11, 1); Bauchzitzen frei; Ohrmuscheln, Schwanz- und Fußbildung verschieden. Nagen aus Bedürfniß, um die immer fortwachsenden Vorderzähne abzuwetzen. Leben meist von Vegetabilien; werfen mehrmals jährlich viele nackte, blinde Junge. Erinnern durch Schnelligkeit, Munterkeit, Furchtsamkeit, Hüpfen, zugespitzte Kiefern, Nagen und Nestbau an die Vögel. 15 deutsche Arten. — 8 Familien (Uebersicht S. 31, VI.):

§. 42. **A. Körper behaart; Beine an Länge wenig verschieden.**

a. **Alle Zehen frei, mit Krallen; Vorderfüße 4-, Hinterfüße 5zehig.**

1) Sciurīna. Eichhörnchen. Ueberall dicht behaart; Augen groß; Bckz. $^{4}/_{4}$.

Daumen der Hinterfüße nicht entgegensetzb. (wahre Pfoten) — Krallen klein — ohne Flughaut — ohne Backentasch.; Schwz wenigstens von Körperl. — Ohren lang; Schwz zweizeilig behaart; Daumwarze mit Nagel. — Eichhörnchen. . . . 1) *Sciūrus* L.
Ohren kurz; Schwz gleichmäßig behaart; Daumwarze ohne Nagel. — Siebenschläfer. . . 2) *Myōxus* Schb.
mit Backent.; Schwz kürzer als der Körper; Ohren kurz. — Backenhörnchen . . 4) *Tamĭas* Jll.
mit Flughaut zwischen den Extremitäten als Fallschirm. — Flughörnchen . . . . . 3) *Pterŏmys* Jll.
Krallen groß, zum Graben von Höhlen; Ohren kurz; Schwz unter $^{1}/_{3}$ der Körperlänge. — Murmelthier 5) *Arctŏmys* Schb.
Daumen der Hinterf. entgegensetzbar; Zehen der Vdrf. lang u. dünn 6) *Chirŏmys* Geoffr.

2) Murīna. Mäuse. Ohren, Schwanz u. Pfoten fast nackt; Augen klein; Bckz. $^{3}/_{3}$.

Bckz. mit Wurzeln; Schnauze kurz, abgerundet: Wühlmäuse — Fußsohlen nackt; Schwz von $^{1}/_{4}$—$^{1}/_{3}$ Körperlänge. — Wühlmaus . . . . . 7) *Hypudaeus* Jll.
Fußsohlen behaart; Schwz etwa von $^{1}/_{10}$ der Körperlänge. — Lemming . . . . . 8) *Lemmus.*
Bckz ohne Wurzeln; Schnauze zugespitzt: Mäuse — ohne Backentaschen; Schwz von 1—1½ Körperl. fast nackt. — Maus . . . . . 9) *Mus* L.
mit B.; Schwz ¼—¼ Körperl., dicht behaart. — Hamster . . . . . 10) *Cricētus* Pall.

b. Alle Zehen frei, mit Krallen; Vorder- und Hinterfüße 5zehig.

3) Cunicularĭa. Maulwurfsmäuse. Kein äußeres Ohr; Schwz kurz oder fehlend; Körper maulwurfsähnlich, mit dickem Kopfe, aber stumpfer Schnauze; Bckz. 2/3 oder 4/4.

Kein Schwanz; Augen unter der Haut; obere Vdrz. schwach längsgefurcht. — Blindmaus . . . . . 11) *Spalax* Jll.
Kurzer Schwanz; Augen klein; obere Vdrz. ohne Längsfurche. — Zokor . . . . . 12) *Aspălax* Oliv.

c. Alle Zehen frei, mit hufartigen Nägeln; Hinterfüße meist 3zehig.

4) Subungulāta. Halbhufer. Ohren und Schwanz kurz oder letzterer auch fehlend; Nagel dick, stumpf, fast hufartig; Bckz. 4/4.

Hinterfüße ohne Schwimmhäute; Bckz. mit 2—3 Lamellen, gleich lang; kein Schwanz. — Meerschweinchen . . . 13) *Cavĭa* L.
Hinterf. mit halben Schwimmhäuten; Bckz. mit 10—11 Lamellen, der hinterste sehr lang; kein Schwanz . . . . . 14) *Hydrochoerus* Briss.

d. Füße mit Schwimmhäuten.

5) Palmipedĭa. Schwimmfüßer. Körper dicht behaart; Hinterfüße mit Schwimmhäuten.

Schwanz mit großen Schuppen; ganze Schwimmh.; Bckz. 4/4. (Fig. 11.) — Biber . . . . . 15) *Castor* L.
Schwz dünn behaart; halbe Schwimmh.; Bckz. 3/4. — Zibethmaus . . . . . 16) *Fiber* C.

B. Körper behaart; Hinterbeine meist viel länger.

6) Leporīna. Hasen. Schwanz sehr kurz oder fehlend; Vdrz. 4/2 (hinter den obern noch 2 kleine Stiftzähne); Vdrfüße 5-, Hinterfüße 4zehig.

Hinterbeine viel länger; Ohren von Kopflänge; Schwz sehr kurz — Hase . . . . . 17) *Lepus* L.
H. kaum länger; Ohren sehr kurz; Schwz fehlend — Pfeifhase 18) *Lagōmys* C.

7) Lagostŏmi. Hasenmäuse. Schwanz sehr lang, mit Endquaste; Vdrz. 2/2; Zehenzahl verschieden.

Ohren lang, behaart; Hinterbeine an 2mal länger — Chinchilla 19) *Eriŏmys* Licht.
Ohren kurz, fast nackt; H. über 2mal länger. — Springmaus 20) *Dipus* Gm.

C. Körper mit Stacheln.

8) Aculeāta. Stachelschweine. Körper mit Stacheln; Bckz. 4/4; Zehenzahl verschieden.

Stacheln rund; Schwz kurz, mit Stacheln. — Stachelschwein 21) *Hystrix* L.
Stacheln breit; Schwz lang, mit Schuppen und Haaren — Stachelratte . . . . . 22) *Lonchēres* Jll.

1. Eichhörnchen. Ueber alle Erdtheile (Neuholland ausgenommen) verbreitet; Repräsentanten der Affen in unsern Wäldern. §. 43.

* 1. *Sciūrus vulgāris* L. Gemeines Eichhörnchen. Fuchsroth, unten weiß (im hohen Norden Winters bläulich aschgrau — Grauwerk der Pelzhändler), selten ganz schwarz; Ohren mit Haarpinsel; 7—8″. Häufig in unsern Wäldern.

‡ *S. cinerĕus* L. Aschgraues E. Aschgrau, größer, ohne Haarpinsel; den Maisfeldern Nordamerika's sehr schädlich; Pelzwerk schlecht.

* 2. *Myōxus glis* L. Gemeiner Siebenschläfer, Reitmaus. Hellgrau; Augenkreis schwarzbraun; 6″. Mittel- und Südeuropa. Nächtliches Thier. Langer Winterschlaf; von den Römern gemästet als Leckerbissen gegessen.

* *M. avellanarĭus* L. Haselschläfer, Haselmaus. Gelbroth; 3″. Daselbst häufig. **M. nitēla* Schb. Gartenschläfer. Rothbraun; ein schwarzer Augenkreis setzt sich unter dem Ohre hinaus fort; 5 1/2″. Frankreich; Harz.

3. *Pterŏmys volans* L. Fliegendes Eichhörnchen. Bläulichgrau; Flughaut am Vorderarm mit abgerundeten Lappen; 6 1/2″; Rußland und Sibirien. Die Flughaut erleichtert nur das Springen. — *P. petaurista* hat spitze Lappen.

4. *Tamĭas striātus* L. Gestreiftes Backenhörnchen. Rothbraun, mit 5 schwärzlichen Längsstreifen; 5 1/2″. Nordamerika und Sibirien.

§. 43. 5. *Arctomys marmota* L. Alpen-Murmelthier. Stirn und gelblichweiße Schnauze flach; Körper gelblichgrau, oben schwarzbraun gemischt; 16″. In Höhlen auf den höchsten Alpenweiden; leicht abrichtbar; Fleisch eßbar.

Ar. ludovicianus. Prairie-Hund, Murmelthier der nordamerikanischen Auen, wo deren zu Gruppen vereinigte, 1½′ hoch aufgeworfene Wohnungen Hundedörfer heißen, weil ihr Ruf dem Bellen eines jungen Hundes ähnlich ist.

6. *Chiromys madagascariensis.* Das Aye-Aye. Gelbgrau; 1′; Madagascar; sehr selten. Nachtthier; steht in der Mitte zwischen Maki und Eichhörnchen; hat hinten wahre Hände; bringt seine Nahrung, Würmer und Insekten, mit dem langen Mittelfinger zum Munde.

2. Mäuse. Schädliche Nachtthiere. Nahrung der Wühlmäuse: vorzüglich Pflanzen; der eigentlichen Mäuse alles Eßbare.

†* 7. *Hypudaeus amphibius* L. Wasserratte. Graubraun, zuweilen schwarz; Körper 6—7″; Schwanz 3″; Ohren durch einen Deckel verschließbar. In Löchern an Gewässern. Schädlich durch Benagen von Früchten und Baumwurzeln; führt wie folgende ein entschieden unterirdisches Leben. Ganz Europa.

†* *H. terrestris* L. Scheermaus, Hamaus, Reitmaus (weil sie die Erde auffurcht). Etwas kleiner; Schwanz kürzer; vielleicht nur Spielart der Wasserratte und eben so schädlich.

†* *H. arvalis* Pall. Feldmaus. Gelblichgrau; Aftergegend weißlich; 3″; Schwanz 1″. Die schädlichste und fruchtbarste aller Mäuse (jährlich 5—6mal 4—12 Junge); ganz Europa; oft Landplage auf Feldern (1832). Wandern zuweilen Nachts. Vertilgung durch den englischen Erdbohrer.

† 8. *Lemmus norwegicus* (*Mus lemmus* L.) Nordischer Lemming. Rostgelb, mit schwarzen Feldern; 5½″. Gebirge Schwedens und Norwegens. Wandern, vorzüglich Nachts, instinktmäßig (§. 21b.) etwa alle zehn Jahre in gedrängten Zügen in unzähliger Menge die Gebirge herab, stets eine gerade Richtung verfolgend, durch Schwimmen über die Flüsse setzend und Felsen und Wohnungen, welche sie nicht erklettern können, umgehend. Obgleich viele auf ihren Wanderungen zu Grunde gehen, so ist doch ihre Zahl noch so groß, daß sie durch ihre Züge unermeßlichen Schaden anrichten, alle und jede Vegetation zerstören und so eine wahre Geißel für Norwegen und Lappland sind.

†* 9. *Mus decumanus* Pall. Wanderratte. Röthlichgrau; zwischen den kurzen Haaren doppelt längere Borstenhaare; 10″, Schwanz 7½″. Erst gegen 1727 aus Asien eingewandert; durchschwamm nach Pallas 1727 in großen Zügen die Wolga, erreichte 1770 von Polen her Deutschland und ist jetzt über die ganze Erde verbreitet. Hat überall die Hausratte vertrieben. Die schädlichste aller; frißt alles Eßbare, schwimmt gut und lebt gern am Wasser (fälschlich Wasserratte genannt). Rattenkönig, Rattenjäger.

†* *M. rattus* L. Hausratte. Dunkel schwarzbraun; 7″, Schwanz 7″ 3‴. Durch die Wanderratte schon an vielen Orten vertrieben; im Alterthume noch nicht bekannt; vielleicht aus Persien stammend; nach Linné und Pallas aus Nordamerika.

†* *M. musculus* L. Hausmaus. Mäusegrau, unten heller; 2½—3″, Schwanz fast von Körperlänge. Ueberall in den Wohnungen lästig und schädlich; über die ganze Erde als Weltbürgerin im Gefolge der Europäer verbreitet; ♀ wirft jährlich 3—4mal 5—8 Junge. Die weißen Mäuse sind Kakerlaken (§. 28.) von dieser.

†* *M. sylvaticus* L. Waldmaus. Bräunlich grau, unten stark abgesetzt weiß; 4½″; Schwz 4″. In Wäldern, Feldern und Gärten von ganz Europa schädlich.

†* *M. agrarius* Pall. Brandmaus. Zimmtbraun, meist mit schwarzem Rückenstreife; 3½″; Schwanz 2½″. Auf Feldern und Wiesen von Nord- und Mitteldeutschland besonders schädlich.

†* 10. *Cricetus frumentarius* Pall. Hamster, Kornferkel. Rothgelb, unten schwarz; Halsseiten mit 3 gelblichen Flecken; 9″. Muthig und bissig; trägt in seinen großen Backentaschen Wintervorräthe (meist 15—20 Pfund) für seinen unterbrochenen Winterschlaf ein, ist deshalb in manchen Gegenden Deutsch-

lands oft Landplage (♀ wirft jährlich 2—3mal 6—12 Junge). Seine Wohnung hat immer zwei Ausgänge, der eine, in schiefer Richtung, dient zum Auswerfen des Schutts, der andere senkrechte, zum Aus- und Eingehen. Diese Gänge führen zu mehren breiten, runden, durch horizontale Gänge verbundenen Höhlen, deren eine mit getrockneten Kräutern als Wohnung dient, während die übrigen Magazine bilden für die Mundvorräthe. §. 43.

3. Maulwurfsmäuse. Leben unterirdisch von Wurzeln.

11. ***Spalax typhlus*** Pall. Blindmaulwurf, Blindmaus, Slepetz. Röthlich aschgrau; Kopf breiter als der Rumpf; Vorderkopf mit 3 weißlichen Binden; 8″; lebt unterirdisch von Wurzeln und wirft die Erde auf wie der Maulwurf. Augen unter der Haut von Mohnkorngröße (§. 14, 2); kleinäugigstes Säugethier. Südrußland und Ungarn.

12. ***Aspálax zokor.*** Der Zokor. Rothgrau; Vorderfüße mit sichelförmigen Krallen; 5″. Sibirien; in Bau und Lebensart dem Slepetz ähnlich.

4. Halbhufer. Plumpe Thiere Südamerika's; Fleisch wohlschmeckend.

13. ***Cavĭa cobāya*** Pall. Meerschweinchen. Unregelmäßig weiß, schwarz und rothgelb; 8—9″. Südamerika, aber nicht mehr wild daselbst; bei uns muntere und gesellige Hausthiere. Grunzen und kamen übers Meer zu uns; daher der Name.

14. ***Hydrochoerus capybāra*** L. Flußschwein. Gelbgrau, schwanzlos; 3½′. Größtes Nagethier; gesellig an den Flußufern Amerikas; Fleisch den Jaguaren (S. 40.) und Indianern angenehm.

5. Schwimmfüßer. Leben an Gewässern und schwimmen gut.

15. ***Castor fiber*** L. Gemeiner Biber. Gelblich braun; 2—3′; größtes Nagethier Asiens und Europas (der nordamerikanische verschieden?). Leben an Flußufern (in Deutschland nur noch an der Donau) von Blättern und Baumrinden, Sommers einzeln in Uferlöchern, Winters in besondern, oft fabelhaft beschriebenen Bauen, welche sie gemeinschaftlich, oft in 200—300 Individuen starken Gesellschaften, aus Holzstücken, Zweigen und Schlamm in den einsamsten Gegenden Nordamerikas aufführen. Ihr Wollpelz liefert das feinste Haar zu Hüten (Castorhüte), ihr Drüsensack neben den Geschlechtstheilen das theure Bibergeil (castoreum), ein vorzügliches Arzneimittel (das sibirische das beste, das canadische wenig wirksam und deshalb zur Arznei unbrauchbar). Fleisch eßbar, früher beliebte Fastenspeise.



Fig. 11. Biberschädel oben; Vorder- u. Hinterfuß in der Mitte; Biberschwz unten.

16. ***Fiber zibethĭcus*** L. Canadische Bisamratte. Rothbraun; 1′. Leben von Wurzeln in Backöfen ähnlichen Bauen an Flüssen Nordamerikas; Fleisch eßbar; Haare wie Biberhaare benutzt.

Myopotămus coypus. Südamerikanische Bibermaus, Racunda. 1½′. Die Felle zu Biberhüten ꝛc. unter dem Namen Affen-, Nutria- oder Racundafelle einen bedeutenden Handel bildend (jährlich 20,000 Pelze).

6. Hasen. Furchtsame, mehr Nacht- als Tagthiere.

* **17.** ***Lepus timĭdus*** L. Gemeiner Hase. Ohren (Löffel) länger als der Kopf, mit schwarzer Endspitze; Schwanz (Blume) aufgerichtet, oben schwarz; 2′.

Mittel- und Südeuropa. Schläft mit offenen Augen, weil ihm die Nickhaut fehlt; sieht schlecht, aber riecht und hört gut. Oberlippe gespalten (Hasenscharte); Mund inwendig und Fußsohlen unten behaart. Sehr feige; Hasenfuß sprichwörtlich. Nützt durch Fleisch und Wollpelz (Hauptgegenstand der niedern Jagd); schadet durch Abnagen der Rinden junger Bäume. Gehörnte Hasen nur Fabel.

* *L. cuniculus* L. Kaninchen. Ohren kürzer als der Kopf, einfarbig; wild gleichmäßig rothbraun; als Hausthier verschieden gefärbt; sich stark vermehrend; 15″. Süd- und Westeuropa; verwildert in den Dünen der Nordsee. Schädlich durch Unterwühlen der Erde; nützlich durch Fleisch und Felle (zu Pelzfutter). Der Seidenhase (angorisches Kaninchen) mit langen Seidenhaaren, ist Abart. Frettchen (§. 37, 15.).

18. *Lagomys alpinus* Pall. Schoberthier, Pfeifhase. Rothgelb; 7—9″; Sibirien. Sammelt im Herbste die Kräuter, deren er während des Winters zu seiner Nahrung bedarf, breitet sie an der Sonne zum Trocknen aus, trägt sie in große Haufen (Schober) zusammen und gräbt von seiner Wohnung aus bis zu jedem Schober einen unterirdischen Gang. Solche Schober sind den Zobeljägern oft ein erwünschter Fund (§. 21, 6).

7. Hasenmäuse od. **Wollhasen.** Unterirdisches Leben; Winterschlaf (§. 21, 5).

19. *Eriomys lanïger* D'Orb. Cinchilla, Wollmaus. Grau, oben schwarzgrau gewellt; 6—10″; Peru und Chili. Das feinste und weichste aller Pelzwerke.

20. *Dipus sagitta* Gm. Jerboa. Braungelb, unten weiß; Hinterfüße 3zehig; Ohren von halber Kopflänge; 6″; Schwanz über 6″; Südrußland.

8. Stachelschweine. Nachtthiere warmer Zone; Nahrung vegetabilisch.

21. *Hystrix cristata* L. Gemeines Stachelschwein. Borstenmähne im Nacken; Stacheln schwarz und weiß geringelt, sträubbar, aber nicht fortschießbar; 2′; Italien, Afrika. Fleisch eßbar; Stacheln zu Malerpinselstielen.

22. *Lonchères chrysurus* Licht. Goldschwänzige Stachelratte. Braun; Scheitel und Schwanzende goldgelb; über 20″. Guiana.

§. 44. VII. Ordnung. *Edentata.* Zahnlückige Säugethiere.

Vdrz. fehlen im Unterkiefer immer, häufig alle Vdrz., so wie Eckz. und Bckz.; Zehen meist verwachsen, ungleich, mit langen Krallen zum Klettern, Graben und Vertheidigen. Tropische, langsame, stumpfsinnige Thiere, von Pflanzen, Insekten oder von beiden lebend. — 4 Familien. (Uebersicht S. 31, VII.)

- Schnauze kurz; Körper behaart; Krallen lang, zurückschlagbar: I. Bradypoda, Faulthiere.
  - Vorderfüße mit 3 Krallen; Vorderbeine viel länger. — Faulthier . . . . 1) *Bradypus* L.
  - Vorderfüße mit 2 Krallen; Vorderbeine wenig länger. — Krüppler . . 2) *Choloepus* Ill.
- Sch. lang
  - nicht schnabelartig
    - Körper mit Gürteln: II. Cingulata, Gürtelthiere.
      - Panzer über Kopf und Rücken, nur in der Mitte Gürtel. — — Gürtelthier . . . . . 3) *Dasypus* L.
      - P. nur auf dem Rücken, aus lauter Gürteln. — Panzerthier . . . . 4) *Chlamydophorus.*
    - Körper mit Schuppen oder Haaren; Zunge weit vorstreckbar: III. Vermilinguia, Wurmzüngler.
      - Körper lang- u. zottig behaart. — — Ameisenfresser . . . . . 5) *Myrmecophaga* L.
      - K. mit tannenzapfenart. Schuppen. — Schuppenthier . . . . . 6) *Manis* L.
  - schnabelartig, mit einer eignen Haut wie bei den Vögeln bedeckt u. mit Saugrohr ähnlicher Endöffnung; nur eine Mündung für die Ausleerungen: IV. Monotremata, Schnabelth.
    - Schnauze platt; Wollpelz; Schwimmhäute. — Wasser-Schnabelthier . . . . . 7) *Ornithorhynchus* Blbch.
    - Sch. rund; oberhalb Stacheln; Grabkrallen. — — Land-Schnabelth. . 8) *Echidna* C.

1. Faulthiere. Langsame, fast nur von Blättern auf Bäumen in Südamerikas Wäldern lebende Thiere. §. 45.

1. ***Bradўpus tridactўlus*** L. Aï (nach seiner Stimme). Haar braungrau, dürr; Stirnhaar weißlich; 2—3′; Brasilien; Fleisch eßbar.
2. ***Choloepus didactўlus*** L. Unau. Graubraun; 3′; Brasilien.

2. Gürtelthiere. In Erdhöhlen in Südamerika lebende Thiere.

3. ***Dasўpus tricīnctus*** L. Apar. Mit 3 Gürteln; Vorderfüße 4zehig; kann sich einkugeln; 17″; in Erdhöhlen Brasiliens; Fleisch schmackhaft; Panzer zu Körben.
4. ***Chlamydophŏrus truncātus.*** Küraßthier. Bauchseite mit weißen, seidenartigen Haaren; nur 6″; Chili, unter der Erde; selten.
Megatherĭum Cuviĕri. Das vorweltliche Riesenfaulthier. Ueberreste an den Flüssen Südamerikas; war 12′ lang und 6—7′ hoch.

3. Wurmzüngler. Leben von Ameisen, welche sie mit ihren großen Krallen ausscharren.

5. ***Myrmecophăga jubāta*** L. Ameisenbär oder großer Ameisenfresser. Schwanz nicht wickelnd; langhaarig, graubraun, mit weißem Längs-Schulterstreife; Vorderfüße mit 4 Krallen; 4′. Urwälder Paraguay's. Langsam, scheu; nützlich durch Insektenvertilgung, welche sich an die lang vorstreckbare Zunge festbeißen.
6. ***Manis brachyūra*** (***pentadactўla*** L.). Phatagin. Schwanz 1′; Leib 2′; selten, in Indien, namentlich auf der Insel Formosa (formosanisches Teufelchen).
M. macroūra (***tetradactўla***). Pangolin. Schwanz 2′; Leib 1′; Westafrika.

4. Schnabelthiere. Nur auf Neuholland beschränkt.

7. ***Ornithorhўnchus paradŏxus*** Blbch. Haare röthlich, schlicht (*O. rufus*) oder schwarzbraun, kraus (*O. fuscus*); 1½′; ♂ am Hinterfuße mit durchbohrtem, spitzem Sporn, welcher höchstens entzündlich verwunden kann; ♀ mit Milchdrüsen, gebiert, wie alle Säugethiere, lebendige Junge. Fleisch eßbar.
8. ***Echĭdna hystrix.*** Ameisenigel. Rückenstacheln gelbweiß; Igelgröße; Haut als Kopfbedeckung der Wilden.

B. Ungulāta. Hufsäugethiere. §. 46.

Zehen mit Hufen umgeben. Haben in Vergleichung der Zehensäugethiere a) weniger ausgebildete Extremitäten (nur als Stütze; daher keine Schlüsselbeine); b) geringere Lebhaftigkeit, plumpern, an Masse größern Körper; c) einen Zahnbau (§. 11, 1) nur für Pflanzennahrung; d) einen mehr ausgebildeten Magen; daher Ernährungs- und Bauchsystem vorherrschend und Knochen, Fleisch, Milch und Fett mehr entwickelt. III Ordnungen. S. 30 B.

VIII. Ordnung. *Multungŭla* od. *Pachydermăta.* **Vielhufer** oder **Dickhäuter.** Zehen 3—5, kaum noch äußerlich zu erkennen und sich durch die Zahl der oberwärts angehefteten Hufe andeutend; Gebiß verschieden, Bkz. groß, schmelzfaltig oder zusammengesetzt (§. 11, 1), mit breiter Kaufläche; Haut dick, dünnbehaart oder mit Borsten. Pflanzennahrung. Die größten Landsäugethiere und meisten fossilen Wirbelthiere. — 3 Familien (§. 26b. VIII):

§. 47.

- Haut mit Haaren
  - Rüssel sehr lang; Stoßzähne; Füße 5zehig: I. Proboscidēa, Rüsselthiere.
    - Stoßzähne nur im Oberkiefer; Bkz. lamellirt. — Elephant (Fig. 12.) . . 1) *Elĕphas* L.
    - Stoßz. in beiden Kiefern; Bkz. höckerig oder zitzenförmig. — Mastodon (vorweltlich) . . . . . 2) *Mastŏdon* L.
  - Rüssel kurz od. fehlend; keine Stoßz.; Füße 3—4zehig: II. Pachydermăta, eigentliche Dickhäuter.
    - Rüssel kurz; vorn 4, hinten 3 Zehe. — Tapir . . . . . 3) *Tapīrus* L.
    - Rüssel fehlend
      - Nase mit 1—2 Hörnern; überall 3 Zehe. — Nashorn 4) *Rhinocĕros* L.
      - Nase ohne Hörner; Schnauze breit und dick; überall 4 Zehe. — Nilpferd . . . 5) *Hippopotămus* L.
- Haut mit Borsten; Rüssel kurz; Beine 4zehig, die 2 Seitenzehe höher und nach hinten gerichtet (Afterzehe): III. Setigĕra, Schweine.
  - Wangen ohne Hautlappen
    - Eckz. 3kantig, vorragend, die obern aufwärts; Vbz. ⅞. — Schwein . . . . 6) *Sus* L.
    - Eckz rund; Vbrz. ⅞
      - Eckz vorragend, alle aufwärts — Hirschеber (Fig. 13.). 7) *Porcus* Wagl.
      - Eckz. von gewöhnlicher Stellung; eine Drüse auf dem Kreuze. — Pekari . . . . 8) *Dicotўles* L.
  - Wangen mit schwieligen Hautlappen. — Emgalo oder Warzenschwein . . . . . 9) *Phacochoerus* C.



Fig. 12.

Schädel des indischen Elephanten.

Dessen Unterkiefer, durch wellenförmige Schmelzleisten der Backenzähne die Art charakterisirend.

Unterkiefer des afrikanischen Elephanten, durch rautenförmige Schmelzleisten charakterisirt.



Oberkiefer von Mastŏdon mit zitzenförmigen Backenzähnen.

§. 48. **1. Rüsselthiere.** Die größten Landsäugethiere.

1. *Elĕphas indĭcus* Blbch. Indischer Elephant. Kaufläche der Backenzähne mit wellenförmigen, querlaufenden Schmelzleisten (*E. africānus* mit rautenförmigen Fig. 12,3); 8—9′, selten 12′ hoch; an 7000 Pfund schwer. Süd-

aſten. Wird benutzt zur Bearbeitung der Reisfelder und Plantagen, zum Lasttragen, Reiten, früher auch im Kriege. Leicht zähmbar (ein dreſſirter Elephant 5000 bis 15000 Gulden werth), mit feinen Sinnen, aber den Hund an Klugheit nicht übertreffend. Am Ende des Rüſſels die Naſenlöcher und ein fingerförmiger Fortſatz zum Greifen. Saufen mit dem Rüſſel, heben Geldſtücke mit demſelben auf, löſen Knoten ꝛc. Stoßzähne (Elfenbein) an 180 Pfund ſchwer.

* *E. primigenius* Blbch. Mammuth. Nicht ſelten foſſil in allen Zonen. Zähne als Elfenbein benutzt (das ſibiriſche beträgt faſt 1/3 alles in Handel kommenden).

2. *Mastodon giganteum* C. Ohiothier; am Ohio foſſil; war 14—15′ lang und 10′ hoch.

2. Dickhäuter. Durch Skelet u. mehrfachen Magen den Wiederkäuern ähnlich.

† 3. *Tapirus americanus* L. Anta oder amerikaniſcher Tapir. Einfarbig braun; ſtarke Nackenmähne. Eſelsgröße. An den Gewäſſern Amerikas; den Zuckerpflanzungen ſchädlich; Fleiſch ſchmackhaft.

4. *Rhinoceros indicus* C. Indiſches Nashorn. Mit einem Horne; Haut faltig, ohne Höcker; 12′ lang, 6—7′ hoch; Oſtindien. Friedlich; Elephanten nicht feindlich; Horn zu Trinkgefäßen; Haut zu Schildern, Spazierſtöcken; Fleiſch eßbar.

† 5. *Hippopotamus amphibius* L. Fluß- oder Nilpferd. Schwärzlich; 12′ lang, 7′ hoch. In Strömen Afrikas, nicht mehr im Nile; Tags häufig im Schilfe verſteckt. Plump, mit ſchleppendem Bauche; ſcheu, den Fruchtfeldern ſchädlich; durch Fleiſch und die 2″ dicke Haut nützlich.

3. Schweine. Sumpfgegenden liebende, mit dem Rüſſel wühlende, alles Genießbare freſſende Thiere (*Omnivŏra*). §. 47.

†* 6. *Sus scrofa* L. Eber, Sau, Wildſchwein, Schwarzwild. Schwarzbraun, mehr oder weniger mit Gelb oder Weiß gemiſcht; 6′. Wild und muthig. ♂ heißt Keiler, Eber, ♀ Bache; die ſchwarz und braun geſtreiften Jungen Friſchlinge. Rudelweiſe in Wäldern; ſchaden durch Wühlen, nützen durch Fleiſch und Speck unter der Haut (Schwarte).

* *S. sc. domesticus.* Hausſchwein. Stammt vom vorigen ab und variirt ſehr. Nützlichſtes, durch dicke Fettlagen (Speck) ausgezeichnetes Hausthier. a) Frißt alles Eßbare; b) wird leicht fett; c) iſt ſehr fruchtbar (10—14 Junge); d) hat ſchmackhaftes Fleiſch (friſch und geſalzen S. 27 β). Das chineſiſche od. ſiameſiſche Schwein mit kürzern Beinen ſchon hier und da bei uns als Hausthier.

7. *Porcus babirŭssa* L. Hirſcheber. Graubraun; Schwanz mit buſchiger Spitze; hochbeinig; Hirſchgröße. Molukken; ſelten; Fleiſch ſchmackhaft.

Fig. 13. Schädel vom Hirſcheber.

† 8. *Dicotyles labiātus* Cuv. Weißſchnauziges Biſamſchwein, Nabelſchwein, Pekari. Braunſchwarz; Unterlippe weiß; 3 1/2′; Südamerika, wo ſie in Rudeln von 10—100 oft die Pflanzungen verwüſten, aber ein wohlſchmeckendes Fleiſch haben. Die Drüſe auf dem Kreuze ſondert eine ſtark riechende Flüſſigkeit ab.

† 9. *Phacochoerus africānus* Gm. Emgalo, Warzen- oder Larvenſchwein. Vom grünen Vorgebirge mit 2/6 Vdz., vom Cap mit 0/0 oder verkümmerten Vdz.; Borſten braun; 5′ 6″. Boshaft und gefährlich.

IX. Ordnung. *Solidungŭla.* **Einhufer.** Nur ein Huf, die Mittelzehe vorſtellend; unter der Haut die Rudimente der 2 äußern Zehen (Kaſtanien). Nur 1 von Pflanzen lebende Familie, *Solidungŭla*, mit 1 Gattung: *Equus*. §. 49.

Bdrz. 2/3; Eckz. 1/1, klein, dem ♀ faſt immer fehlend; Bckz. 6/6; eine Mähne im Nacken. — Pferd (Fig. 14.) . . . . . *Equus* L.

§. 50. * *Equus cabăllus* L. Pferd, Roß. Ohren unter halber Kopflänge; Schwanz (Schweif) vom Grunde an langhaarig. Gezähmt; in Mittelaſiens und Oſteuropas Steppen und in Südamerika ꝛc. (oft in Heerden von 10,000 Stück) verwildert. Viele Varietäten: arabiſches Pferd, engliſches Pf., Vollblutspferd ꝛc. Das Alter wird nach den Zähnen beſtimmt. Maulthier heißt der Baſtard vom Pferde-♀ und Eſel-♂; Maulеſel vom Eſel-♀ und Pferde-♂. Dem Menſchen in vielen Lagen nützliches, ja unentbehrliches, gelehriges, muthiges und deshalb faſt über die ganze Erde verbreitetes Hausthier.



Fig. 14. Schädel des Pferdes.
Unterkiefer zeigt die Zähne mit den Kauflächen.

* *E. asĭnus* L. Eſel. Ohren von halber Kopflänge; Schwanz mit langer Wurzel, nur am Ende langhaarig; grau, mit ſchwarzem Kreuze auf den Schultern; in Mittelaſiens Wüſten wild (*E. onăger* Pall.); bei uns geduldiges und genügſames Hausthier.

E. zebra L. Zebra. Ueberall mit ſchwarzen und weißen Querſtreifen; etwas über Eſelsgröße; Südafrika; ſchwer zähmbar.

E. quagga Gm. Quagga. Kaſtanienbraun, nur am Kopfe, Halſe und an den Rumpfſeiten mit dunkelbraunen Querſtreifen; Südafrika.

§. 51. **X. Ordnung.** *Ruminantĭa* oder *Bisŭlca.* **Wiederkäuer, Spalthufer** oder **Zweihufer.** Zwei große, mit Hufen umkleidete Zehen (Fig. 16.) und meiſt noch 2 kleinere, nicht auftretende dahinter (Afterklauen). Vdrz. $^0/_8$, ſelten $^2/_6$; Eckz. $^0/_0$, ſelten $^1/_1$; Bckz. meiſt $^6/_6$, immer ſchmelzfaltig (Fig. 16.); Magen (Fig. 15.) aus 4 getrennten Säcken beſtehend: 1. der Panſen oder Wanſt *a*, der größte, nimmt das grobgekaute Futter auf und theilt es 2. der Haube oder dem Netzmagen *b* mit, in welchem es erweicht und durch die Speiſeröhre *f* wieder ins Maul getrieben ruminirt wird und dann 3. in den Pfalter, Blättermagen *c* gelangt, der aus blätterartigen Falten beſteht und das Futter endlich zur völligen Verdauung 4. dem Lab-, Fett oder eigentlichen Magen *h* mittheilt. Die Kameele haben noch eine fünfte Abtheilung des Magens, den ſogenannten Waſſermagen.



Fig. 15.
Magen der Wiederkäuer.

Die Pfeile 1, 2 und 3 zeigen durch die Linien den Weg, welchen das Futter durch die Speiſeröhre f u. den Magenmund e nimmt; a, b, c, h bezeichnen die 4 Maagenſäcke: a Panſen; b Haube; c Blättermagen; h Labmagen. d bedeutet den Pförtner und g den Darm, durch welchen das Unverdauete endlich ausgeworfen wird.

Bei saugenden Jungen ist nur der Labmagen ausgebildet und nimmt die Milch sogleich auf; wenn die übrigen Magen sich entwickelt haben, hören die Jungen von selbst auf zu saugen. Friedliche, gesellige, ausschließlich von Pflanzen lebende, mit Ausnahme Australiens über die ganze Erde verbreitete Thiere; die nützlichsten für die Menschen (§. 23. B). — 4 Familien: §. 52.

- Ohne Hörner: I. Tylopoda, Kameele oder Schwielensohler.
  - mit Fetthöcker; Zehen durch breite, schwielige Sohlen verwachsen. — Kameel . . . . . 1) *Camēlus* L.
  - ohne Fetthöcker; keine schwielige Sohlen, aber längere Hufe. — Lama . . . . . 2) *Auchenia* Ill.
- Mit Hörnern
  - Rücken abschüssig: II. Devexa, Abschüssige.
    - Stirnhörner bei ♂ und ♀ mit Haut überzogen, nicht abwerfbar. — —
    - Giraffe (Fig. 16.) . . . . . 3) *Camelopardālis* L.
  - Rücken nicht abschüssig
    - Hörner solid (Geweihe), periodisch abwerfbar, dem ♀ häufig (beim Moschusthiere ♂ und ♀) fehlend: III. Cervina, Hirsche
      - Geweihe ästig, nur bei ♂ (beim Rennthiere bei ♂ und ♀) — Hirsch . . . . . 4) *Cervus* L.
      - Geweihe fehlend, aber ♂ mit langen Eckz. im Oberkiefer. — Moschusthier. . . . . 5) *Moschus* L.
    - Hörner hohl, nicht abwerfbar: IV. Cavicornia, Hornthiere, Hohlhörner.
      - Hörner drehrund (nur beim Büffel etwas kantig)
        - meist geringelt, gerade oder verschieden gekrümmt. — — Antilope . . . . . 6) *Antilŏpe* Pall.
        - glatt
          - auf der Stirn zusammenstoßend, nach vorn herabgekrümmt, mit nach oben gebogenen Spitzen. — Gnu . . . . 7) *Catoblĕpas.*
          - angelförm. rückwärts gekrümmt — Gemse . . . 8) *Capella* Blas.
          - halbmondförmig nach außen gebogen; Hals m. hängend. Wamme. — Rind . 9) *Bos* L.
      - Hörner seitlich zusammengedrückt
        - glatt oder knotig, sichelförmig nach hinten gebogen; Kinn gebärtet. — Ziege . . 10) *Capra* L.
        - vorn stumpfkantig, hinten flach, schraubenförmig gewunden; kein Bart. — Schaf 11) *Ovis* L.

1. Kameele. Nützliche, aber wegen des langen Halses, der gespaltenen Oberlippe, der vorstehenden Augenhöhlen ꝛc. häßliche Thiere. §. 53.

1. ***Camēlus bactriānus*** L. Kameel, Trampelthier. Zwei Fetthöcker; 12′ lang, 6′ hoch; in Mittelasiens Steppen verwildert; in Ost- und Mittelasien Hausthier.

*C. **dromedarius*** L. Dromedar, gemeines K. Ein Fetthöcker; etwas kleiner; Vaterland? In Südasien und Nordafrika Hausthier. Seit den ältesten Zeiten gezähmt und als Lastthier den Karavanen unentbehrlich (Schiff der Wüste), weil sie nur geringer Nahrung bedürfen, mit den breiten Sohlen auf dem Sande gut gehen und 8 bis 14 Tage dursten können (Wassermagen §. 51.). Haar zu groben Zeugen und zu Garn (Kameelgarn, nicht Kämelgarn S. 53, 10.); Fleisch und Milch als Nahrungsmittel; getrockneter Mist zur Feuerung und Bereitung des Salmiaks (III. §. 152.). Die in Europa zur Schau herumgeführten stammen meist aus der Kameelstuterei bei Pisa.

2. ***Auchenia lama*** L. Das Lama oder Schafkameel. Kastanienbraun und grobhaarig bei dem wilden (*Guanāco*), aber verschieden gefärbt bei dem domesticirten (*Paco*); Hirschgröße. Lastthiere in den Gebirgen Perus; Fleisch und Milch als Nahrungsmittel; Wolle und Haut zur Kleidung.

§. 53. *A. vicūnna* L. Vicognethier. Braungelb, sehr feinwollig; Kopf und Ohren kleiner; Schafsgröße. Auf den höchsten Anden, rudelweise; noch nicht als Hausthier. Wolle sehr kostbar, zu den feinsten Zeugen. In den Eingeweiden der occidentalische Bezoar, wie bei der Bezoarziege der orientalische (S. 53, 10).

2. Abschüssige. Durch Länge des Halses u. der Vorderbeine ausgezeichnet.

3. ***Camelopardālis giraffa*** L. Giraffe. Gelbweiß, rostbraun gefleckt; Schwanz mit Endquaste; 6′ lang und vorn 18—20′ hoch; also höchstes Landthier; Afrika; trabt nicht, galoppirt nur; lebt von Baumblättern.



Fig. 16. Giraffenschädel seitlich und von oben; daneben ein Vorderfuß der Giraffe.

3. Hirsche. Schnelle, furchtsame Thiere; Hauptgegenstand der hohen Jagd (§. 26 b. X).

* **4.** ***Cervus capreŏlus*** L. Reh. Nase kahl; fast schwanzlos; Geweihe dreisprossig, aufrecht; bräunlich; $3\frac{1}{2}$′ lang, vorn 2 und hinten 2′ 4″ hoch. Paarungszeit (Blattzeit) im Juli und August; wird nicht erst bei der zweiten Paarung im November und December trächtig (Ricke, Geis); trägt 9 Monat. Wie die folgenden Arten durch Fleisch, Haut, Haare und Geweihe nützlich.

* *C. elāphus* L. Edelhirsch, Rothhirsch, Rothwild. Nase kahl; Schwz von halber Ohrlänge; Geweihe vielsprossig, zurückgebogen; bräunlich, Sommers ins Röthliche (Brandhirsch); Schwanz blaßgelb; Thränengrube mit Hirschbezoar; $3\frac{1}{2}$—4′ hoch; wirft sein Geweih im Februar ab (daher dieser Hornung genannt); ist im August oder Anfang Septembers brünstig; trägt 8—9 Monate und wirft im Mai oder Juni. Europa und Mittelasien. Das einjährige Kalb heißt Spießer, das zweijährige Gabler. Bies- und Bremsfliege (§. 172, 31).

* *C. dama* L. Dammhirsch. Geweihe an der Spitze breit, schaufelförmig; Rücken weißgefleckt, Winters einfarbig; Südeuropa; bei uns in Thiergärten.

C. tarandus L. Rennthier. Nase behaart; Geweihe am Grunde rund, an der Spitze handförmig-ästig; Hals mit langer Mähne; braungrau, Winters weiß; 4′ hoch; im hohen Norden wild und gezähmt. Einziges Hausthier unter den Hirschen, den Lappen unentbehrlich zum Ziehen, Lasttragen, zur Nahrung (Milch, Fleisch), Kleidung ꝛc. Früher selbst in Deutschland einheimisch und von Cäsar und Plinius als ***Scytārum tarandus*** beschrieben.

C. alces L. Elch, Elennthier. Nase behaart; Geweihe schon vom Grunde an flach, dreieckig-schaufelförmig; ♂ mit einem Barte an der Kehle; aschgrau; Pferdegröße, aber hochbeiniger. Nordosteuropa; zu Cäsars Zeit und auch noch bis 1025 über ganz Deutschland verbreitet. Gutes Leder.

5. ***Moschus moschiferus*** L. Moschusthier. Graubraun; 2 weiße Halsstreifen; Rehgröße. Gebirge Nordasiens. Der Drüsenbeutel des ♂ liefert Moschus zu Arzneien und Parfümerien.

M. pygmaeus L. Zwerghirsch. Kaum 9″ lang; kleinster Wiederkäuer.

4. Hornthiere. Enthalten die zahlreichsten Wiederkäuer und die unentbehrlichsten Hausthiere, unser Hornvieh.

6. ***Antilŏpe leucŏryx*** Pall. (*A. gazella* L.) Milchweiße Antilope. Milchweiß, Hals bräunlich; Hörner etwas zurückgekrümmt; Hirschgröße; Arabien.

A. beisa. Beisa-Antilope. Isabellfarbig; Hörner gerade; am rothen Meere. Neuerdings wieder aufgefunden und vielleicht die wahre, auf ägyptischen Denkmälern oft abgebildete Oryx der Alten.

A. monocĕros. Einhorn. Mit einem aufrechten Horne auf der Stirne (im Wappen der Engländer). Von Hogdson in Tibet neuerdings aufgefunden. §. 53.

A. dorcas L. Gemeine Gazelle. Hellbraun, mit dunkelbraunen Längsstreifen, unten weiß; Rehgröße; Nordafrika. Gewöhnliche Nahrung der Panther und Löwen.

7. *Catoblĕpas gnu* Gm. Das Gnu. Braun; eine Mähne im Nacken; ein Pferdeschweif; weißliche Borsten ums Auge; Eselsgröße; Südafrika.

8. *Capella rupicăpra* L. Gemse. Dunkelbraun; Kopf weiß, mit brauner Binde vom Auge bis zur Schnauze; Ziegengröße. Auf Felsen der europäischen Alpen. Schönes Leder; in Eingeweiden deutscher Bezoarstein oder Gemsenkugeln.

* 9. *Bos taurus* L. Ochs, Stier. Gleichmäßig kurz behaart; Schnauze nackt; Stirn flach; Hörner nach außen und vorn gekrümmt. In vielen Varietäten, zu welchen auch der Buckelochs oder der Zebu mit einem Fetthöcker auf dem Rücken gehört; weit (auch nach Amerika) verbreitet. Das ♀ (die Kuh) begattet sich (rindet) im April, Mai oder Juni, trägt 9 Monate, wirft ein Junges (Kalb), welches im zweiten Jahre Rind heißt. Das Kalb wird mit 4 Vorderzähnen geboren, zu denen in 14 Tagen noch 2 und im ersten Vierteljahre die zwei letzten kommen; von diesen 8 Milchzähnen werden im ersten Jahre die 2 mittelsten, im zweiten die 2 folgenden und im dritten die 4 letzten gewechselt; nach 10 Jahren sind die Zähne stumpfer und ungleicher. Bulle oder Zuchtochs. Verschneiden. Dummheit des Hornviehs und Kuhgang sprichwörtlich. Nutzen (§. 25. B.) sehr groß; in Spanien auch zu Stiergefechten. Plagen und Feinde: Rinderbremse (§. 172, 31), Stechfliege (§. 172, 19), Kolombatzscher Mücke (§. 170, 5); Kuhlaus (*pedicŭlus vitŭli*); Leberegel (§. 217.) in der Leber; Fadenwürmer (§. 216.) in den Lungen; Milzbrand ꝛc.

B. bubălus L. Büffel. Ebenso, aber Stirn gewölbt, kraushaarig. Größer als unser Ochs; in Ostindien wild, in Ungarn und Italien (besonders in pontinischen Sümpfen) domesticirt; kaum durch den Nasenring zu bändigen. Milch und Leder gut; Fleisch schlecht.

B. urus L. Auerochs, Wiesent, Bison, Zubr. Vorderleib mit langen, krausen, zottigen Haaren; Schnauze nackt; Stirn gewölbt; Hals ohne Wamme; 9′ lang, 6′ hoch; größtes Säugethier Europas; früher in ganz Deutschland, jetzt nur noch in einigen hundert Exemplaren in Lithauen.

B. americānus (*bison* L.). Amerikanischer Büffel oder Bison. Hörner kurz, weit auseinander stehend; Vorderleib langzottig; Höcker auf dem Widerrüst; 8′ lang und 5′ hoch; in Heerden von 20,000 Stück in Nordamerika, wo jährlich gegen 300,000 getödtet werden.

B. moschātus. Bisamstier. Schnauze wie der Leib überall mit langen schwarzbraunen Haaren; die Hörner auf der Stirn mit breiter Wurzel zusammenstoßend; Beine kurz; Schwanz sehr kurz (zu Mützen der Eskimos); Rehgröße. Hoher Norden Amerikas. Fleisch wegen des Geruchs ungenießbar.

* 10. *Capra hircus* L. Hausziege. Mit ziemlich glatten, stark zusammengedrückten, gekielten Hörnern und langem Barte. In vielen Varietäten durch die alte Welt, vorzüglich in Gebirgsgegenden verbreitet, durch Milch und Haut (§. 25. B) nützlich; durch Abschälen der Baumrinden schädlich. Die Angoraziege, Kämelziege ist eine merkwürdige Varietät, ausgezeichnet durch langes Seidenhaar, welches zu Kämelgarn und Kamelots gebraucht wird. Die Kaschmirziege und Tibetziege, Spielarten der Ziege, werden schon in Südeuropa gezogen und liefern in der feinen Wolle unter den langen Haaren das Material zu den kostbaren Kaschmir-Shawls.

C. aegăgrus Gm. Wilde oder Bezoarziege, der Pasang. Auf Persiens Gebirgen und dem Caucasus. Stammrace unserer Hausziege. In den Eingeweiden findet sich eine, aus concentrischen Lagen bestehende, früher als Arznei berühmte Concretion, der orientalische Bezoar wie beim Vicunna (§. 53, 2) der weniger geschätzte occidentalische.

C. ibex L. Alpen-Steinbock. Mit knotigen Hörnern; graugelb, unten weißlich; $3\frac{1}{2}$′ lang; nur noch auf den unzugänglichsten Felsen der europäischen Alpen.

* **11.** ***Ovis aries*** L. Hausschaf, Widder. Hörner mit den Spitzen nach außen, dem ♀ oft fehlend; Haar meist kraus. Vom Oriente aus in zahlreichen Varietäten durch die Europäer gezähmt über den ganzen Continent, ganz Amerika und die Südsee-Inseln verbreitet. Schon Abel besaß Schafheerden. Hammel oder Schöps nennt man den verschnittenen Schafbock. Das Merinoschaf hat die feinste Wolle und soll durch Mauren von Afrika nach Spanien gebracht sein (*trans marinus*, Merino); von Electoralschafen (1765 aus Spanien ins Kurfürstenthum Sachsen eingeführt) stammen die meisten veredelten Schafheerden Deutschlands ab. Die Haidschnucken (in der Lüneburger Haide) haben schwarze Beine und grobe Wolle. Ob das Hausschaf indeß vom mittelasiatischen Argali (*O. ammon*) oder vom sardischen Muflon (*O. musimon*) abstammt, oder eigne Art ist, bleibt noch unentschieden. Plagen: Schafläus und Schafbiesfliege (§§. 173,[38] und 172,[31]), Quese und Leberegel (§§. 218 und 217.). Nützt durch Milch, Fleisch und besonders durch Wolle.

§. 54. C. Pinnipedia. Flossenfäugethiere.

Meerthiere mit Flossenfüßen oder Flossen. Extremitäten am wenigsten ausgebildet, nur zum Schwimmen tauglich. Die größten Säugethiere; nur im Meere von Meerthieren lebend; müssen jedoch wenigstens von 15 zu 15 Minuten an die Oberfläche des Wassers kommen, um zu athmen. II Ordnungen.

XI. Ordnung. *Pinnipedia.* Robben, Ruderfüßer.

Fußzehen durch derbe, bis über das Nagelglied hinausreichende Schwimmhäute verbunden (Flossenfüße, Fig. 17.); Hinterbeine horizontal und einander genähert; Leib kurz behaart; alle 3 Zahnarten. Gesellige Meerthiere mit langen Bartborsten; schwimmen gut, kriechen nur schwerfällig auf dem Lande und kommen nur dahin, um sich zu sonnen oder ihre Jungen zu säugen. — 2 Familien:

§. 55.

- Eckz. des Oberkiefers weit vorragend: I. Trichechoïdea, Wallrosse. — Nur 1 Gattung und 1 Art. — Wallroß . . . . . 1) *Trichechus* L.
- Eckz. und Vrdz. von Lippen bedeckt: II. Phocina, Robben.
  - Keine Ohrmuscheln; Schwimmhaut der Hinterfüße nicht über die Zehen hinausreichend — Robbe . . . . . 2) *Phoca* L.
  - Kurze Ohrmuscheln; Schwimmhaut über die Zehen hinaus riemenförmig verlängert. — Ohrrobbe . . . . . 3) *Otaria.*

§. 56. **1.** ***Trichechus rosmarus*** L. Wallroß. Gelbbraun; 18—20′ lang und 1500—2000 Pfund schwer; Hauer 2′. Eismeer. Liefert Speck, Fett, Leder und Zähne (dem Elfenbein gleich benutzt).

* **2.** ***Phoca vitulina*** L. Gemeiner Seehund (Fig. 17. ein Hinterfuß). Gelbgrau, mehr oder weniger bräunlich gefleckt und gewellt; 3—4′. In allen nördlichen Meeren; bei Neufoundland werden jährlich über 300,000 getödtet; daher ihre Zahl sehr im Abnehmen. Dieser, so wie die vielen, noch wenig genau unterschiedenen Arten sind den Bewohnern des Nordens, namentlich den Grönländern, deren einziges Studium besonders der Fang des grönländisches Seehundes (*Ph. groenlandica*) ist, unentbehrlich, da sie 1) deren Fleisch und Fett zu Nahrung, Licht und Feuerung; 2) deren Felle zu Kleidungen und Ueberzügen für Kähne; 3) deren Sehnen zu Zwirn, deren Gedärme zu Segeln und Fenstern und 4) deren Knochen zu mancherlei Werkzeugen gebrauchen.

3. ***Otaria jubata*** L. Seelöwe. Braungelb; Vorderfüße schwärzlich; ♂ mit krauser Halsmähne; 15—20′; stilles Meer.

§. 57. **XII. Ordnung.** *Cetacea.* **Fischfäugethiere** oder **Wale.** Körper fischähnlich; die Vordergliedmaßen bilden Armflossen; statt der Hin-

tergliedmaßen ein kräftiger Schwanz, der als Flosse zum Schwimmen dient (Ruderschwanz, Fig. 18.). Weit verbreitete Meerthiere. — 3 Familien:

- Mit Zähnen
  - Zähne von verschiedener Bildung; kein Spritzloch: I. Sirēna, Seekühe.
    - dünn behaart; nur Vrdz. und Bckz.; Schwanzflosse abgerundet. — Manati . . . . . 1) *Manātus* C.
    - nackt; Haut einer rissigen Borke ähnlich; nur Bckz. — Vorkenthier . . . . . 2) *Rytīna* Jll.
  - Zähne entweder alle gleichlang, kegelförmig oder einer sehr lang; ein Spritzloch: II Delphinoděa, Delphine.
    - Zähne zahlreich, klein, nicht wagerecht
      - in beiden Kiefern 9—50 kleine Zähne (Fig. 19.). — — Delphin . . . . 3) *Delphīnus* L.
      - nur im Unterkiefer Zähne; Kopf sehr groß; Körper wallfischähnlich. — — Pottwall . . . 4) *Physēter* L.
    - 1 oder 2 große, wagerecht vorstehende, schraubenförmige Eckz. im Oberkiefer. — Narwall . . . 5) *Monŏdon* L.
  - Mit 300—1000 am Rande faserigen Hornplatten (Fischbeinbarten, Fig. 18.) statt der Zähne; 2 Spritzlöcher: III. Balaenoděa, Wallfische.
    - mit hoher, 3kanter Rückenflosse (Finne). — Finnfisch . . . . . 6) *Balaenoptĕra* Lacep.
    - Ohne Rückenflosse (Fig. 18.). — Wallfisch . . . . . 7) *Balaena* L.

§. 58.

1. Seekühe. Gesellige, von Meerpflanzen lebende, sich oft an Küsten sonnende Thiere, deren Kopfform die Fabeln von Meerjungfern, Tritonen ꝛc. veranlaßte. §. 59.

1. ***Manātus australis.*** Seekuh, Seeweibchen, Lamantin. In den Tropengegenden des atlantischen Oceans; 8—20′ lang; Fleisch eßbar.

2. ***Rytīna Stellĕri*** C. Steller's Seekuh oder Borkenthier. Braun; 23′ lang. Die aus senkrechten Fasern gebildete, auf dem Durchschnitte dem Ebenholze ähnelnde Haut zu Kähnen brauchbar. 1741 an der Berings-Insel bei Kamtschatka von Bering entdeckt und daselbst so häufig, daß man 27 Jahre hindurch die nach den amerikanischen Küsten gehenden Schiffe auf der Berings-Insel mit deren Fleische verproviantirte. 1768 sah man das letzte Exemplar.

2. Delphine. In allen europäischen Meeren häufige, kühne, von Seethieren lebende, noch wenig genau bekannte Räuber.



Fig. 18. Grönländischer Wallfisch.

Fig. 17. Hinterfuß vom Seehunde.

Fig. 19. Schädel vom gemeinen Delphin.

3. ***Delphīnus delphis*** L. Gemeiner Delphin, Tümmler. Kiefern schnabelförmig, 3mal länger als der Kopf, von der Stirn abgesetzt; $\frac{4}{4}$ bis $\frac{4}{7}$ Zähne jederseits; oben und unten schwärzlich; häufig schaarenweise im mittelländischen und

atlantischen Meere. Alle Delphine haben unter der nackten Haut eine dicke Specklage, wegen welcher man sie häufig fängt.

D. phocaena L. Meerschwein, Braunfisch. Kiefern nicht schnabelförmig, von Kopflänge; $\frac{2}{3}$ bis $\frac{4}{5}$ Zähne jederseits; schwarzbraun, unten weißlich; 4—5′, die kleinste Cetacee; in allen europäischen Meeren gemein.

4. *Physēter macrocephălus* L. Gemeiner Pottfisch, Cachelot. Schwarz, unten weißlich; Spritzloch am Rande des etwa $\frac{1}{3}$ des Körpers ausmachenden Kopfes; 60—70′ lang; im nördlichen und atlantischen Meere; der Schrecken aller Meerthiere. In den großen Schädelzellen findet sich eine ölige, an der Luft gerinnende Flüssigkeit, der Wallrath (*sperma ceti*) zu Lichten ꝛc.; im Darmkanale der graue Amber, wenig als Arznei, häufig zum Räuchern benutzt.

5. *Monŏdon monocĕros* L. See-Einhorn. Gelbweiß, braungefleckt; 20′ lang; Zahn 10′; truppweise im Eismeere. Der Zahn, bei den Alten für das Horn des Einhorns (S. 53.) gehalten, wird wie Elfenbein verarbeitet. Ihr Kämpfen mit dem Wallfische ist Fabel.

3. Wallfische. Die größten Säugethiere; wegen des engen Schlundes nur von kleinen Fischen und Weichthieren lebend (Jonas nicht im Wallfische).

6. *Balaenoptĕra boops* L. Finnfisch, Jubarte. Bauch gefurcht; Spritzlöcher auf einem Höcker nahe bei einander, durch gemeinschaftliche Klappe verschließbar, vor derselben 3 Reihen rundlicher Erhabenheiten. Brustflosse etwa von $\frac{1}{3}$ der Körperlänge, ganzrandig, zugespitzt; Unterkiefer kürzer als der obere, schmal; bis 54′ lang. Nördliche Meere.

7. *Balaena mysticētus* L. Grönländischer Wallfisch, Nordkaper, Bartenwall (s. Fig. 18.). Kopf von $\frac{1}{3}$ der Körperlänge, von den Spritzlöchern aus nach vorn und hinten abschüssig; 60—70′ lang und 1000 bis 1500 Centner schwer; Spritzlöcher 1′ im Durchmesser; also größtes aller lebenden Thiere u. auch von keinem fossilen an Größe u. Umfang übertroffen. Schwimmt 4 Meilen weit in einer Stunde; kann mit dem Schwanze ganze Schaluppen fortschleudern. Sein Unrath zinnoberroth. Man erlegt ihn mit gewöhnlichen Harpunen, Kanonenharpunen und in neuerer Zeit auch mit Harpunen, welche an der Spitze mit Blausäure (II. S. 112.) gefüllt sind. Nur noch im nördlichen Polarmeere u. Hauptgegenstand des Wallfischfanges; ein mittelmäßiger liefert 120 Tonnen Thran aus dem Specke, über 300 Barten (Fischbeinplatten), jede 10—13′ lang. Mittelwerth 1000 bis 5000 Thaler. Fleisch der jungen Thiere eßbar. Die Gedärme benutzen die Eskimos zu Fensterscheiben, die Knochen zu Harpunen und Stützen der Zelte; besonders dienen die großen Unterkieferknochen, fälschlich Wallfischrippen, in den Seestädten zu Prellsteinen. Wallfischläuse (S. 206.) in großer Menge auf der Haut, von welcher sie durch Möven und andere Seevögel abgelesen werden.

B. australis. Südsee-Wallfisch, liefert den Südseethran. Nach Reynolds werden im Südmeere jährlich über 10,000 Wale getödtet.

S. 60.

II. Klasse. Aves. Vögel.

Warmblütige, hartschalige Eier legende, befiederte Rückgrathsthiere. Wegen ihres übereinstimmenden Aufenthalts in der Luft ist ihre Bildung sehr gleichförmig und deshalb die Classification, welche fast nur in der Bildung des Schnabels, der Füße und Flügel ihre Hauptanhaltspunkte findet, sehr schwierig. Alle Vögel und nur die Vögel sind mit **Federn** bedeckt, an welchen man **a.** den Schaft, **b.** die Spuhle mit einer faltigen Haut (Seele), **c.** die Fahne oder den Bart unterscheidet. Die Federn heißen: **1. Deckfedern, Conturfedern,** die großen, steifen Federn mit innig verbundenen Fahnenstrahlen und zwar **a.** Schwungfedern, Schwingen, Ruderfedern, die steifen Flügelfedern, welche in einfacher Reihe längs dem Rande des Armes sitzen (die größern, meist 10, heißen Schwingen erster, die übrigen Schwingen zweiter Ordnung);

b. Schwanz- oder **Steuerfedern**, die steifen Schwanzfedern, 10 bis 18, welche einen Scheerenschwanz oder Schwalbenschwanz (Schwalben), Gabelschwanz (Gabelweihe), ausgerandeten (Pieper), zugerundeten (Wendehals), keilförmigen (Spechte) oder dachig zusammengedrückten Schwanz (Hühner) bilden; **c.** eigentliche **Deckfedern**, die größern, Schwanz und Flügel oben und unten bedeckenden Federn. **2. Flaumfedern** oder **Dunen**, die kleinen, weichen Federn mit wenig zusammenhängenden Fahnenstrahlen. **3. Bartborsten, Schnurrborsten**, die haarähnlichen, fast strahlenlosen Federn am Schnabelgrunde. Die Deckfedern stehen in symmetrisch vertheilten Federfeldern (*pteryläe*) und werden bei vielen Vögeln durch das Fett der Bürzeldrüse (oben auf dem Schwanze über den Schwanzwirbeln) wasserdicht gemacht, indem sie diese Drüse mit dem Schnabel drücken und die Federn dann einzeln durch den Schnabel ziehen. Alle Vögel wechseln ihre Federn (mausern) gewöhnlich nur einmal, am Ende des Sommers (manche Wasservögel, als Gänse und Enten, im Vorsommer); manche Vögel (Wachteln ꝛc.) mausern im Frühjahr noch einmal (doppelte Mauser). Bei manchen Vögeln verändert sich im Frühling ihr Federkleid dadurch, daß die Conturfedern sich an den Rändern abbärten (die meist unrein gefärbten Federränder verlieren) und so schöner werden. Den neuen und schönern Federschmuck zwischen Frühjahr und Herbst nennt man Hochzeitskleid, Sommerkleid; zwischen Herbst und Frühjahr Herbstkleid oder Winterkleid. Auch nach Alter und Geschlecht ändert das Farbenkleid vielfach ab und heißt bei jungen Vögeln bis zum Herbste Jugendkleid. Alte Weibchen, welche aufgehört haben Eier zu legen und zu brüten, bekommen nicht selten männliches Federkleid, wie alte Ricken (§. 53, 4) zuweilen Geweihe und alte Weiber Bärte. Man hat dies Virilescenz genannt. Mit Ausnahme der Pinguine und Laufvögel (§. 75.) fliegen alle Vögel und zwar **1.** durch Hülfe der Schwungfedern der Flügel, welche wir als Schwingen erster und zweiter Ordnung unterscheiden, je nachdem sie länger und unter sich ungleich, oder kürzer, unter sich gleich sind und die langen Schwungfedern bedecken (bei Enten mit auffallender Zeichnung, dem Spiegel, versehen). **2.** Durch die Pneumaticität der Knochen (Luftknochen, Röhrenknochen), welche mit den Lungen in Verbindung stehen (nur noch nicht flügge Junge haben Mark in den Knochen); **3.** durch die Luftbehälter, Luftsäcke in der Brust- und Bauchhöhle. Diese Einrichtung macht die Vögel leichter, befördert so ihren Flug und erhöhet die Temperatur des Bluts auf 30° bis 35° R., eine Temperatur, die bei Menschen nur im heftigen Fieberzustande angetroffen wird. **Schnelligkeit und Ausdauer des Fluges**: ein Jagdfalke Heinrichs II. entfloh von Fontainebleau bis Malta in 24 Stunden (210 geographische Meilen, also stündlich 9 Meilen); der nur in Südamerika einheimische Maguaristorch ist schon einige Male in Frankreich getödtet (im günstigsten Falle 220 Meilen im ununterbrochenen Fluge); Brieftauben fliegen in 1 Stunde $8\frac{1}{2}$ geographische Meilen weit. Des Flugvermögens wegen sind die Vögel auch weiter verbreitet als die übrigen Thiere. Mehre Eulen, z. B. Schleiereulen, finden sich in ganz Europa und Nordamerika; mehre Seevögel, z. B. den Tölpel (§. 82, 10) hat Europa und Neuholland gemein und die Bekassine (§. 79, 16) ist fast über die ganze Erde verbreitet. Raub-, Sing-, Wad- und Schwimmvögel finden sich überall, die andern Ordnungen mehr auf einzelne Länder beschränkt. Die Kolibri's z. B. gehören dem wärmern Amerika, die Papageien der heißen Zone überhaupt an. §. 60.

Am Schnabel unterscheidet man **1.** die beiden Kiefern; **2.** die Dille, den durch Vereinigung der Kieferäste gebildeten Schnabeltheil; **3.** die Dillenkante, die untere Kante der Dille; **4.** die Firste, den Schnabelrücken; **5.** die Kuppe, das durch Bildung ausgezeichnete Vorderende des Oberschnabels; **6.** die Zügel, die Gegend zwischen Augen und Schnabelwurzel; **7.** die Nasenlöcher, welche durchgehend heißen, wenn sie ohne Scheidewand sind; **8.** die gelbe oder blaue Wachshaut an der Schnabelwurzel, am deutlichsten bei den Tagraubvögeln (bei den Enten den ganzen Schnabel bekleidend und zugleich Tastorgan); **9.** den Zahn, ein eckiger Vorsprung des Oberschnabels bei den Raubvögeln.

§. 61. Die **Beine**, nach dem Aufenthaltsorte sehr verschieden gebildet, bestehen **1.** aus dem kurzen, so dicht am Leibe liegenden Oberschenkel, daß das Knie nicht sichtbar wird und **2.** aus dem Unterschenkel (Schienbein, Wadbein, *tibia*), welcher oft fälschlich Schenkel, so wie das Fersengelenk, Hackengelenk oder die Fußbeuge fälschlich Knie genannt wird; **3.** aus dem Fuße, nur aus einem Knochen, dem Laufe (*tarsus*) mit den Zehen bestehend. Wir unterscheiden **a.** die Beine nach der Befiederung und **b.** die Füße nach Richtung und Verwachsung der Zehen.

a.
- Schienen bis zur Fußbeuge befiedert — (alle Singvögel, die meisten Raub- und Hühnervögel) . . . . . **Gangbeine.** (Fig. 22—25.)
- Schienen über der Fußbeuge nackt — (Lauf-, Sumpf- und Wasservögel) . . . . . **Wadbeine.** (Fig. 21. u. 27.)

b. Zehen weder mit Hautanhängen, noch mit Häuten verbunden, höchstens am Grunde mit kleiner Bindehaut, nicht über das erste Zehenglied hinaus
- ohne Hinterzehe
  - mit zwei Vorderzehen — (Strauß) **Rennfüße.**
  - mit drei Vorderzehen — (Trappe, Regenpfeifer ꝛc.) . . . . . **Lauffüße.** (Fig. 21.)
  - mit vier Vorderzehen — (Mauerschwalbe) . . . . . **Klammerfüße.** (Fig. 20.)
- mit Hinterzehe
  - 2 Vorder- u. 2 Hinterzehen — (Spechte) **Kletterfüße.** (Fig. 22.)
  - 3 Vorder- u. 1 Hinterzehe
    - eine der Vorderzehen willkührlich nach hinten wendbar — (Eulen u. Kuckuke) **Wendezehefuß.** (Fig. 20.)
    - alle Zehe immer nach vorn
      - Gangbeine ohne Bindehaut
        - Gangbeine mit kurzer Bindehaut am Grunde der 3 Zehen — (Hühner, Raubvögel) . . . . . **Sitzfüße.** (Fig. 23.)
        - die 2 äußern Zehen bis üb. d. Mitte verwachsen — — (Eisvogel) . . **Schreitfüße.** (Fig. 24.)
        - die 2 äußern Zehe nur am Grunde des ersten Zehengliedes verwachsen — — (Singvögel) **Gang- oder Wandelfüße.** (Fig. 25.)
        - alle Zehen bis zum Grunde frei — (Tauben) . . . . . **Spaltfüße.**
      - Wadbeine mit kurzer Bindehaut zwischen den Zehen: Geheftete Füße
        - nur die 2 äußern Vorderzehe m. kurz. Bindehaut — (Trompeter) . . . **Halbgeheftete Füße.** (Fig. 21.)
        - alle 3 Vorderzehe m. kurz. Bindehaut — (Storch) . **Doppeltgeheftete Füße.**

Zehen durch Häute verbunden od. mit Hautanhängen: Schwimmfüße
- Zehen mit Hautanhängen
  - an den Seiten mit ganzrandigem Hautsaume — (Kleiner Steißfuß) . . . . **Spalt-Schwimmfüße.** (Fig. 26.)
  - an den Seiten mit lappigem Hautsaume — — (Wasserhuhn) . . . . . **Lappenfüße.** (Fig. 27.)
- Zehen verbunden
  - nur 3 Zehen verbunden
    - bis zur Spitze — (Gänse) . . . . **ganze Schwimmfüße.** (Fig. 28.)
    - nur bis zur Hälfte — (Löffelreiher) **halbe Schwimmfüße.**
  - alle 4 Zehen verbunden — (Pelekan) . . . . . **Ruderfüße.** (Fig. 29.)

§. 61.

Fig. 20.
Rauher Klammerfuß der Mauerschwalbe (die kurze Zehe eine Wendezehe).



Fig. 21.
Stelzenbein u. Wadbein mit halbgeheftetem Lauffuße vom Strandreuter.



Fig. 22.
Kletterfuß vom Wendehalse (der Lauf vorn getäfelt, hinten gestiefelt).

Fig. 23.
Sitzfuß eines Falken

Fig. 24.
Schreitfuß vom Eisvogel.



Fig. 25.
Gangfuß der Rabenkrähe.

Fig. 26.
Spalt-Schwimmfuß vom Steißfuße.



Fig. 27.
Wadbein mit Lappenfuße vom Wasserhuhne (Lauf vorn quergeschildet).



Fig. 28. Ganzer Schwimmfuß vom weißen Sägetaucher.

Fig. 29.
Ruderfuß vom Pelekan.

Die Strauße können nur laufen, die meisten Singvögel hüpfen, die Schwimmvögel schwimmen gut, gehen aber nur watschelnd, Pinguine am schwerfälligsten. Hinsichtlich der **Sinnesorgane** sind **1.** die Augen verhältnißmäßig groß, haben 2 Augenlieder und eine Nickhaut. **2.** Das Ohr ist ohne Ohrmuschel, welche bei den Eulen durch einen Federkranz ersetzt wird. Gesicht, Gehör (die einzigen Thiere, welche vorgepfiffene Melodien nachpfeifen) und **3.** Geruch der Vögel ist sehr scharf, aber **4.** der Geschmack schwach. Die verschieden gestaltete, oft hornige, wenig warzige, bei den Spechten weit vorstreckbare Zunge dient wenigen zum wirklichen Schmecken, mehr zur Hervorbringung der Stimme, die keinem Vogel fehlt und bei keinem Thiere so mannigfaltige Modificationen für die verschiedenen Empfindungen (Hunger, Furcht, Sehnsucht, Liebe ꝛc.) hat. Nur gesunde Vögel, nur ♂ singen, und im Freien nur zur Begattungszeit. **5.** Der Tastsinn ist wegen der Befiederung und Hornbekleidung des Körpers am schwächsten, nur einige Sumpf- und Schwimmvögel (Enten und Schnepfen) haben einen Tastapparat d. h. kleine, mit empfindlicher Wachshaut bekleidete Löcher an der Schnabelspitze.

§. 62. Ihre **Nahrung** ist sehr verschieden: alle Pflanzentheile (den Holzkörper ausgenommen), so wie die meisten thierischen Körper, selbst stinkendes Aas. Gräten, Haare und Federn werden als Gewölle willkührlich wieder ausgebrochen. Nur die ganze Körner verschluckenden Vögel haben einen Kropf an der Speiseröhre, worin die Körner vorher erweicht werden, alle aber haben einen Vormagen, eine starke, drüsige Erweiterung am untern Ende der Speiseröhre. Die **Fortpflanzung** geschieht durch Eier, welche an Gestalt und in Färbung sehr verschieden sind. Das Ei besteht aus 3 Häuten, welche Dotter und Eiweiß einschließen und von einer fein durchlöcherten Kalkschale umgeben sind. Seitlich im Dotter liegt eine linsenförmige Narbe, in deren Mitte eine grauliche Stelle (Hahnentritt) den Keim zum künftigen Vogel bildet. Hochnordische Wasservögel (Fischfresser) legen 1, große Raubvögel 2, Sumpfvögel und Raben 4, Sing- und Waldvögel 6—10, Meisen 8—20, Haushühner 40—50 Eier. Die meisten Vögel bauen, immer instinktmäßig aus demselben Materiale, ein mehr oder weniger künstliches Nest (Weber-, Schneiderbogel, Republikaner. §. 69.); Lerchen, Uferschwalben ꝛc. scharren nur Löcher in die Erde; hochnordische Seevögel legen die Eier auf kahle Felsen. Die meisten Vögel brüten jährlich nur einmal, einige bei uns zweimal, andere in wärmern Gegenden 3—4mal; bei einigen hilft das ♂ hierbei oder sorgt wenigstens für Nahrung; die in Polygamie, d. h. mit mehren Weibchen lebenden ♂ überlassen dem ♀ alle Sorge. Die meisten leben zur Paarungszeit in einzelnen Paaren, später in Schaaren; manche leben außer der Paarungszeit immer einzeln (große Raubvögel), manche immer monogamisch d. h. paarweise (Tauben). Die meisten nisten einzeln, wenige gesellig (Dohlen); nur der Kuckuck, welcher etwa alle 6 Tage 1 Ei legt, und der Kuhvogel (§. 67,3) legen in fremde Nester. Nach dem **Wohnorte** unterscheiden wir: **1.** Standvögel, welche Winter und Sommer bleiben (die meisten Körnerfresser, wie Sperlinge, Meisen, so wie viele Raubvögel). **2.** Strichvögel, welche der Nahrung wegen in benachbarte Gegenden, meist nur wenige Meilen weit ziehen (Zeisige, Stieglitze, mehrere Enten). **3.** Zugvögel, welche der Kälte und Nahrung wegen gegen den Herbst nach der Mauser häufig in großen Zügen meist des Nachts instinktmäßig (§. 21 b.) dem Aequator zu weit übers Meer, meist nach Nordafrika oder auch nur nach Südeuropa, ziehen (Störche, manche Schwimmvögel u. vorzüglich diejenigen von Insektenfressern, welche Insekten nur im Fluge fangen, wie die Schwalben ꝛc.). Manche nordische Wasservögel kommen auch Winters zu uns. Der Albatroß (§. 82,13) ist der einzige Vogel, welcher auf seinen Zügen den Aequator überschreitet und jährlich zweimal die heiße Zone durchzieht, um den laichenden Fischen auf beiden Halbkugeln zu folgen. Kein Vogel hält regelmäßigen Winterschlaf, doch können Schwalben zufällig Winterschläfer werden; denn man hat dieselben zuweilen in Erdlöchern an Ufern von Gewässern und unter Thurmdächern in England, Deutschland und Frankreich erstaart gefunden; in einer Berghöhle im Thale von Maurienne, auf der Straße von Italien nach Frankreich findet man (nach Bronn)

sogar regelmäßig fast alle Jahre viele Schwalben wie Bienenschwärme an der Decke aufgehängt im Winterschlafe.

Die **Eigenthümlichkeiten im innern Bau** beziehen sich meist auf das Flugvermögen: **1.** die Zahl der Halswirbel 9—23; **2.** der hohe Brustbeinkamm (*crista sterni*), nur den Luftvögeln fehlend; **3.** das Gabelbein, ein V-förmiger Knochen zwischen den Schlüsselbeinen. **4.** Mangel des Zwerchfells und der Windungen auf dem Gehirne. **5.** Mangel der Harnblase, weshalb sich Mastdarm, Harnleiter und Geschlechtstheile bei allen (den Strauß jedoch ausgenommen) in die Kloake öffnen, so daß Urin und Excremente sich mischen.

Der unmittelbare **Nutzen** der Vögel für den Menschen ist geringer als der der Säugethiere, aber ihr mittelbarer Nutzen in der Oekonomie der Natur größer. Sie nützen uns **1.** als Nahrungsmittel durch ihr **Fleisch** (keine Art ungenießbar, die meisten gut eßbar) und **Eier:** Hühner, Tauben, Gänse (gepökelte und geräucherte Gänsebrüste, Gänsekeulen, Gänsepfeffer), Enten, Auerhähne, Puter, Perlhühner, Rebhühner, Birkhühner, Haselhühner, Fasanen, Wachteln, Schnepfen, Lerchen (Leipziger), Krammetsvögel, Gartenammer (indianische Schwalbennester); **2.** durch ihre **Federn:** Federn von Gänsen, Schwänen ꝛc. zum **Schreiben,** von Raben zum **Zeichnen;** Daunen von Schwänen, Gänsen, Enten, besonders Eiderenten, zu **Bettfedern;** Federn von Reihern, Marabu, von Paradiesvögeln, Straußen ꝛc. als **Kopfputz;** vom Kleidervogel zu Mänteln; von Schwänen zu Halskragen ꝛc.; **3.** durch ihre **Abrichtbarkeit** zur Jagd und zum Fischfange (Jagdfalken, Uhu, Pelikane, Scharben); **4.** durch ihren **Gesang** (Drosseln, Wachteln, Lerchen, Nachtigallen so wie überhaupt viele Singvögel) und ihr **schönes Gefieder** (Papageien) zum Vergnügen; **5.** durch ihren **Mist** als Dünger (Guano, §. 70.); **6.** durch **Vertilgung** vieler **Insekten** und deren Eier, Larven und Puppen (Singvögel, Spechte, Schwalben, Staare, Fliegenschnäpper ꝛc.); **7.** durch Aufzehrung von Aas und Wegfangen von Mäusen (Raubvögel, Störche, Reiher).

Schaden verursachen die Vögel etwa nur durch Vertilgung nützlicher Thiere und Gewächse; nur die größern Raubvögel können der Jagd, auch wohl manche kleinere schon unserm Hausgeflügel schädlich werden, so wie Wasservögel und Sumpfvögel den Fischen und deren Laiche. Bei den kleinern Singvögeln, wie beim Sperlinge (§. 69, 17) ꝛc. gleicht sich bei uns Nutzen und Schaden ziemlich aus, dagegen sind in Indien und Amerika manche Vögel (Reisdieb, Reisvogel, Trupial, Wandertauben) dem Ackerbaue ꝛc. sehr schädlich. Kein Vogel ist giftig. Von den etwa 7000 bekannten Arten leben ungefähr 500 in Europa (nur 40 eigenthümliche) und 320—400 in Deutschland. Fossile Vögel kennt man etwa 150 Arten.

Uebersicht der VIII Ordnungen und deren Familien. §. 63a.

A. Nesthocker. Die fast nackten, blind gebornen Jungen werden von den Alten gefüttert (geätzt) bis sie flügge sind; hüpfen oder fliegen, sitzen im Schlafe hockend.

I. Aves aërĕae. Luftvögel. Fliegen geschickt mit angezogenen Gangbeinen.

- Nasenlöcher flach geraudet; Nagel scharf
  - Schnabel am Grunde mit Wachshaut, kurz, Spitze stark hakig abwärts gekrümmt . . . . . I. Rapäces. Raubvögel. §. 64.
  - Schnabel bis zur Wurzel mit hornig. Scheide
    - ohne Singmuskelapparat (§. 68.); meist Kletterfüße . . . . . II. Scansŏres. Klettervögel. §. 66.
    - mit Singmuskelapparat; meist Gang-, selten Schreitfüße . . . . . III. Passĕres. Singvögel. §. 68.
- Nasenlöcher oben mit bauchiger Schuppe bedeckt; Schnabel am Grunde weich; Hinterzehe in gleicher Höhe eingelenkt; Vorderzehen ohne Bindehäute IV. Columbae. Tauben. §. 70.

B. Nestflüchter oder **Pippel.** Die mit weichen Dunen (Flaumkleide) sehend aus dem Ei kriechenden Jungen werden nicht geätzt und suchen sich bald selbst ihre Nahrung; fliegen meist viel seltner, schwimmen oder gehen schreitend, nie hüpfend; stehen im Schlafe oder sitzen auf der Erde oder auf einem dicken Aste, nie auf Zweigen, welche umklammert werden müssen.

II. Aves terrēstres. Landvögel. Fliegen entweder schlecht, mit angezogenen Gangbeinen, oder können gar nicht fliegen und haben Wadbeine (§. 61.).

- Gangbeine kurz; Flügel mit steifen Schwingen zum Fliegen; 4 Zehen: Hinterzehe höher eingelenkt als die vordern; Vorderzehen mit Bindehäuten . . . . . V. Gallĭnae. Hühner. §. 73.
- Wadbeine meist lang, immer stark zum Laufen; Flügel ohne steife Schwingen und deshalb zum Fliegen untauglich; Zehenzahl verschieden, 2—4 . . VI. Cursōres. Laufvögel. §. 75.

III. Aves aquatĭcae. Wasservögel. Fliegen geschickt mit nach hinten gestreckten Wadbeinen und leben auf oder neben Gewässern.

- Wadbeine so lang od. länger als der Rumpf; Schienbeine meist aus dem Rumpfe hervortretend; Zehen meist ohne Schwimmhäute; leben in Sumpfgegenden VII. Grallae. Sumpfvögel. §. 79.
- Wadbeine immer kürzer als der Rumpf; Schienbeine meist im Rumpfe versteckt; Zehen mit Schwimmhäuten oder Hautlappen . . . . . VIII. Palmipĕdes. Schwimmvögel. §. 80.

§. 63b.

I. Raubvögel. 3 Familien. §. 64.

- Kopf und Hals nackt oder unvollkommen befiedert; Schnabel am Grunde dünner (zusammengeschnürt), gestreckt, mit gewölbter Spitze (Kuppe); Krallen stumpf — (Condor) . . . . . 1. Geier.
- Kopf und Hals dicht befiedert; Schnabel am Grunde dicker, kurz, von der Wurzel an gekrümmt, ohne Kuppe; Krallen scharf
  - Augen seitlich, ohne Federkranz; Gesieder anliegend — (Gabelweihe) . . . . 2. Falken.
  - Augen nach vorn, mit einem Federkranze (Schleier); Gefieder locker — — (Perleule) . . . . . 3. Eulen.

II. Klettervögel. 8 Familien. §. 66.

- Aechte Kletterfüße (Fig. 22.): A. Paarzeher.
  - Schnabel ungezähnelt
    - Oberkiefer nicht hakig übergreifend
      - Schnabel gerade; Schwz kurz, steif —(Schwarzspecht) 1. Spechte.
      - Sch. auf der Firste schwach gebogen; Schwz lang; eine Wendezehe — (Kuckuk) . . . . . 2. Kuckuke.
    - Oberkiefer hakig übergreifend
      - Sch. ohne Bartborsten, kurz, sehr dick, stark hakig übergreifend; Unterkiefer sehr kurz —(weißer Cacadu) 3. Papageien.
      - Sch. mit 5 Bündeln Bartborsten, länger, dick, schwach gebog. u. schwach übergreifend — — (großer Bartvogel) 4. Bartvögel.
  - Schnabel am Rande gezähnelt
    - Schnabel kürzer als der Kopf — (violetter Pisangfresser) . . . 5. Pisangfresser.
    - Schnabel 3mal länger als der Kopf, sehr dick und hohl — — (gemeiner Pfefferfraß) . . . . . 6. Großschnäbler.
- Schreitfüße mit verwachsenen Zehen (Fig. 24.): B. Heftzeher.
  - Schnabel oben mit hornartigem Aufsatze, sehr dick und groß — (Nashornvogel) . . . . . 7. Nashornvögel.
  - Schnabel ohne Horn, lang, kantig — (gemeiner Eisvogel) . . . 8. Eisvögel.

III. Singvögel. 6 Familien. §. 69. §. 63b.

- Schnabel wie gewöhnlich gespalten
  - Schnabel an der Spitze etwas übergreifend, meist mit einem Zahne — (großer Würger) . . . 1. Zahnschnäbler.
  - Sch. nicht so
    - Schnabel stark, nicht dünn, fast gerade
      - Schnabel fast pfriemlich — (weiße Bachstelze) . . . 2. Pfriemenschnäbler.
      - Schnabel kegelförmig, dicker, kürzer, gerade oder mit schwachem Haken — (Sperling) . . . 3. Kegelschnäbler.
      - Schnabel etwas gebogen, kräftig; Nasenlöcher mehr od. weniger mit Federn — (Kolkrabe) . . . 4. Raben.
    - Schnabel sehr dünn, gebogen, meist länger als der Kopf — (Wiedehopf) . . . 5. Dünnschnäbler.
- Schnabel weit gespalten (daher Rachen groß), kurz, mit hakiger Spitze; Flügel lang, spitz — (Hausschwalbe) . . . 6. Spaltschnäbler.

IV. Tauben. Nur 1 gleichnamige Familie. §. 71.

V. Hühner. 2 Familien. §. 74.

- Schwanz groß; Hinterzehe den Boden berührend; Schnabel kurz, dick — (Pfau) . . . 1. Hühner.
- Schwanz fehlend oder sehr kurz; Hinterzehe nicht so oder fehlend; Schnabel dünn — (Wachtelhuhn) . . . 2. Steißhühner.

VI. Laufvögel. 2 Familien. §. 76.

- Beine lang, 2—3zehig — (Strauß) . . . 1. Strauße.
- Beine kurz, 4zehig — (Dronte) . . . 2. Dronten.

VII. Sumpfvögel. 5 Familien. §§. 78—80.

- Schnabel überall hart, nach der Stirn zu allmählig stärker: A. Hühnerform.
  - Zehen mit kleinen Bindehäuten; Sch. so lang oder kürzer als der Kopf; Oberkiefer übergreifend, mit gewölbter Kuppe, d. h. Hühnerschnabel — (Trappe) . . . 1. Hühnerstelzen.
  - Zehen mit Hautlappen oder Hautsäumen; Schnabel meist kürzer als der Kopf, gerade, seitlich zusammengedrückt — (Bläßhuhn) . . . 2. Wasserhühner.
- Schnabel an der Wurzel weich, schlank, vom Kopfe abgeschnürt: B. Schnepfenform.
  - Stirn kuglig gewölbt; Schnabel um die länglich ovalen Nasenlöcher verengt oder eingedrückt, kürzer oder bis 2mal länger als der Kopf — (Kiebitz) . . . 3. Regenpfeifer.
  - Stirn nach der Firste hin verschmälert; Schnabel um die ritzenförmigen Nasenlöcher nicht verengt oder eingedrückt, länger als der Kopf, dünn, biegsam — (Waldschnepfe) . . . 4. Schnepfen.
- Sch. an der Wurzel hart, nicht abgeschnürt, so hoch und breit als der Schädel: C. Reiherform.
  - Schnabel immer länger als der Kopf; Hals und Beine lang und dünn — — (weißer Storch) . . . 5. Reiher.

VIII. Schwimmvögel. 6 Familien. §§. 80—82.

I. Kiefern am Innenrande mit Querlamellen:
- Schnabel kaum von Kopflänge, am Ende mit stumpfem Nagel — (Singschwan) . . . 1. Enten.

II. Kiefern ohne Querlamellen:
- a. Ruderfüße; Schnabel meist über Kopflänge, mit spitzem Nagel; Nasenlöcher in schmalen Spalten — — (gemeiner Pelekan) . . . 2. Ruderfüßer.

b. Keine Ruderfüße.

- Flügel u. Schwanz lang
  - Nasenlöcher sich in vorstehende Röhren öffnend; Hinterzehe oft fehlend — (Albatroß) 3. Sturmvögel.
  - Nasenlöcher sich seitlich in freistehende Gruben öffnend; Hinterzehe nur bei einer Art (dreizehige Möve) fehlend . . . . . 4. Möven.
- Flügel u. Schwanz kurz oder letzterer fehlend
  - Hinterzehe mit breit herabhängendem Saume; Schnabel gerade — (kleiner Steißfuß) . . . . . 5. Taucher.
  - Hinterzehe fehlt oder ist nach vorn gerichtet (Pinguin); Schnabel gerade oder gewölbt, seitlich zusammengedrückt . . . . . 6. Alken.

§. 64. ## I. *Aves aërĕae*. Luftvögel, Nesthocker.

Leben meist auf Bäumen, können weder schwimmen, noch laufen, viele nicht einmal gehen, sondern nur hüpfen. Gangbeine; Füße nie mit Schwimmhäuten. Vegetabilische und animalische Nahrung. Meist Monogamisten. IV Ordnungen. (§. 63a.)

1. Ordnung. *Rapāces.* **Raubvögel.** Schnabel kurz, stark, hakig abwärts gekrümmt, mit Wachshaut; Beine (Fänge) kräftig, mit großen, gebogenen Krallen; Zunge weich, nicht ausstreckbar. Leben meist von Wirbelthieren, speien Gewölle wieder aus, bauen kunstlose Nester (Horste), leben in Monogamie und legen wenige Eier. ♀ fast immer größer. Im Norden Zug-, im Süden Stand- und Strichvögel. Nutzen (§. 62.). — 3 Familien:

1) Vulturīnae. Geier. (§. 63b. I.) Feige, gesellige, stumpfsinnige, meist Aas fressende Vögel warmer Gegenden.

- Kopf u. Hals ganz od. theilweise ohne Deckfedern
  - Nasenlöcher längsliegend; nur Stirn, Zügel und Kehle nackt — Aasvogel . . . . . 1) *Cathărtes* Ill.
  - Nasenlöcher querliegend; Kopf u. Hals nackt; eine Halskrause
    - Stirn ohne Hautkamm — Geier 2) *Vultur* L.
    - Stirn mit hohem Hautkamme — Kammgeier . . . . . 3) *Sarcorămphus* Dum.
- Kopf und Hals dicht befiedert; Unterkiefer mit Federborstenbarte — Bartgeier . . . . . 4) *Gypaëtos.*

2) Accipitrīnae. Falken. (§. 63b. I.) Muthige, in Färbung sehr veränderliche, fast nur vom Raube lebende Vögel.

- Läufe wenig länger als Mittelzehe
  - Schnabel gerade beginnend, zahnlos; Kopf u. Halsfedern lanzettlich: *Aquĭla* Bech.
    - ohne Wendezehe
      - Läufe bis zur Zehenwurzel befiedert; Zehen mit großen Bindehäuten — Adler 5) *Aquĭla* Briss.
      - Läufe bis zur Hälfte befiedert; Zehen ohne Bindehaut — Fischadler . . 6) *Haliaëtus.*
    - mit Wendezehe; Läufe bis zur Zehenwurzel nackt; Zehen ohne Bindehäute — Flußadler . . . . . 7) *Pandĭon.*
  - Schnabel schon von der Wurzel an hakig, mit oder ohne Zahn; Kopf- und Halsfedern rundlich: *Falco* Bech.
    - Schnabel mit tiefem Ausschnitte vor der Spitze — Falke . . . . . 8) *Falco* C.
    - Schnabel ohne Ausschnitt
      - Schwanz gegabelt — — Milan . . . . . 9) *Milvus* Briss.
      - Schwanz abgerundet
        - Läufe kaum so lang als die Mittelzehe — — Habicht . . . . . 10) *Astur* C.
        - Läufe länger als die Mittelzehe — Bussard . . . . 11) *Butĕo* Bech.
- Läufe 3mal länger als die Mittelzehe, daher einem Sumpfvogel ähnlich — Sekretär . . . . . 12) *Serpentarĭus* C.

3) Strigĭdae. Eulen. (§. 63b. I.) Schnabel und Krallen wie bei den Falken aber meist bis zu den Zehen herab befiedert und mit einer Wende-

zehe. Geräuschlos fliegende, scharf hörende Raubvögel, welche Tags sich verbergen, Nachts und in der Dämmerung vom Fange kleiner Vögel, von Mäusen und Insekten leben und also **nützlich**, aber durch ihr Geschrei verhaßte sind.

| Ein Federbusch über den Ohren — Ohreule . . . . . 13) *Strix* L.
| Kein Federbusch; Schleier vollkommen — Kauz . . . . . 14) *Syrnium*.

1. Geier. Feige Räuber. §. 65.

1. ***Cathártes percnoptérus*** L. Aegyptischer Geier. Schmutzigweiß; Schwungfedern schwärzlich; im Jugendkleide dunkelbraun, im Uebergangskleide gefleckt; Rabengröße; Aegypten; im Alterthume daselbst als heilig verehrt, noch jetzt geschützt und durch fromme Vermächtnisse verpflegt; kommt in Städte und Dörfer, auch nach Südeuropa.

2. ***Vultur cinerĕus*** Tem. Grauer Geier (Fig. 30.). Schwarzbraun; hinter d. Ohre steife, aufgerichtete Federn; Halskragen rings um d. Hals; $3\frac{1}{2}$′; klaftert 5′. Gebirge Südeuropas. *V.* ***fulvus*** Gm. (***leucocephălus*** Meyer). Weißköpfiger Geier. Graubraun; Kopf und Hals weißlich; 3—4′. Ganz Afrika und Südasien, selten in Deutschland. Verbreitetster Geier.

Fig. 30. Schnabel §. 64, 2.

3. ***Sarcorāmphus gryphus*** Tem. Kondor, Vogel Greif. Blauschwarz; Halskragen weiß; ♂ mit ungezähntem Fleischkamme; 4′, klaftert 10—13′; größter fliegender Vogel; fliegt über 30,000′ hoch, stürzt in wenigen Minuten durch alle Klimate auf Aas, Schafe und Kälber herab; greift Menschen nicht an. Nur auf den Anden, nahe der Schneegrenze.

† 4. ***Gypaëtos barbātus*** L. Lämmergeier. Rostgelblich, Mantel kastanienbraun; 4′; klaftert 10′; größter Raubvogel der alten Welt; in den Pyrenäen u. Alpen; lebt von Gemsen, Rehen u. Hasen; hat auch schon Kinder geraubt.

2. Falken. Muthige Räuber.

†* 5. ***Aquĭla chrysaëtos*** L. Gemeiner Adler, Goldadler, Steinadler. Dunkelbraun; Hinterkopf u. Nacken rostfarbig; Schwanzwurzel weiß; 3′, klaftert 7′; Nordasien, Nordamerika, Deutschland und Schweiz. Wildbahnen schädlich. — *A.* ***imperiālis*** Bech. Königsadler, Kaiseradler. Südeuropa.

6. ***Haliaëtos leucocephăla*** Briss. Weißköpfiger Fischadler. (Fig. 31.) Kaffeebraun; Hals und Kopf der Alten milchweiß; Schwanz ganz weiß, abgerundet, über die Flügel 2″ vorragend; etwas kleiner als folgender; nur im höchsten Norden.

Fig. 31. Schnabel §. 64, 6.

†* *H.* ***albicĭlla*** L. Großer od. weißschwänziger Meer- oder Fischadler. Kaffeebraun; Kopf braun oder weißgrau; im Alter weißschwänzig; Läufe und Wachshaut gelb; Schwanz keilförmig, kaum 1″ vorragend; 3′; klaftert 7′; Nordeuropa, besonders an der Ostsee; selten bis zum Harze hinauf.

†* 7. ***Pandĭon haliaëtos*** L. Fischaar, Entenstößer, Blaufuß. Braun; Kopf und Unterseite weiß; Läufe und Wachshaut blau; 2′. Mit Ausnahme der Tropenländer überall; Fischereien schädlich.

8. ***Falco vespertīnus*** L. Rothfüßiger Falke (Fig. 32). Rücken schieferblau (♂) oder aschgrau und schwarzbunt; Scheitel, Nacken und Unterseite rostfarbig (♀); Füße und Wachshaut rothgelb; 13″; Osteuropa.

* *F.* ***subbutĕo*** L. Baum-, Lerchen-, Stoß- oder Blaufalke. Einfarbig schwarzbraun (im Alter bläulich), unten weißgrau, fein braungestreift; Backenstreif

Fig. 32. Sch. §. 64, 8.

schwarz, Hosen gelblichroth; 13″; gemäßigtes Europa, in Deutschland gemein. Lerchen sind seine liebste Nahrung.

* *F. tinnunculus* L. Thurmfalke, Rütteifalke. Oberseite hellrostroth, schwarzgefleckt; Unterseite röthlich weiß, braungefleckt; 14″; ganz Europa. Zugvogel, 5—10.

F. islandicus Briss. Jagdfalke. Lebt in Nordeuropa und wird zur Jagd abgerichtet.

†* 9. *Milvus regalis* (*Falco milvus* L.). Gabelweihe. Rostbraun; Gabelschwanz rostroth; 2′ 2″. Mittel- u. Südeuropa; in Deutschland gemein. Zug- und Standvogel.

* 10. *Astur nisus* L. Sperber, Finkenhabicht. Oben bläulichgrau, unten weiß, mit schwarzgrauen u. rostfarbigen Querwellen; übrigens in Färbung sehr veränderlich; fast auf der ganzen Erde; hier Stand-, Strich- u. Zugvogel.

* 11. *Buteo vulgaris* Bech. (*Falco buteo* L.) Gemeiner oder Mäusebussard. Läufe unten nackt; Körper braun; Bauch mit mehren od. wenigern dunkelbraunen, herzförmigen Flecken od. Wellenlinien; Schäfte der Schwanzfedern u. Schwingen weiß; Schwz mit 10—14 Querbinden; übrigens in Färbung sehr veränderlich; 1′ 10″; ganz Europa; unser gemeinster u. nützlichster Raubvogel, vorzüglich durch Vertilgung von Mäusen. Zug-, selten Standvogel; 3. 4—9. 10.

* *B. lagopus* L. Läufe bis auf die Zehen befiedert; 19—25″; Strichvogel.

12. *Serpentarius secretarius* Gm. Sekretär. Hellgrau; Hinterhaupt mit langem, steifem Federbusche; 3′; lebt in Südafrika von Amphibien.

3. Eulen. Nützliche Nachtraubvögel; Kosmopoliten.

†* 13. *Strix bubo* L. Großer Uhu. Dunkel rostgelb, mit schwarzen Kreuzflecken; über 2′; größte Art; fast ganz Europa. Standvogel. Schadet den Wildbahnen; auf dem Vogelheerde die gewöhnlichste Eule; schreiet puhu, puhu; veranlaßte die Fabel von Hackelberg.

* *St. otus* L. Mittlere Ohreule. Rostgelb, braungefleckt; Ohrbüschel mit 6 langen Federn; 13—14″; Europa; Standvogel.

* *St. brachyotos* L. Sumpf-Ohreule. Ebenso, aber Ohrbüschel nur mit 3—4, kaum längern Federn; Zugvogel; kommt im September zu uns.

* 14. *Syrnium aluco* L. Gemeiner Kauz, Brandeule. Grau (♂) oder rostbraun (♀), unten mit sägerändigen, dunkelbraunen Streifen; 16″; ganz Europa; hier gemeiner Standvogel; schreiet hu — hu — hu hu hu hu.

* *S. flammea* L. Perleule. Oben rostfarbig, aschgrau gewässert, mit weißen Tropfenflecken, unten gelblichweiß, mit braunen Tropfenflecken; 14″; fast ganz Europa; unsere schönste und gemeinste Eule. Standvogel.

* *S. noctua* Retz. (*passerina* Bech.). Steinkauz, Leichhuhn. Graubraun, weiß betropft; Schwingen weiß querfleckig; unten weißlich, braungefleckt oder -gestreift; 9″; Europa; hier gemeiner Standvogel, leichtgläubigen Landleuten durch ihr Geschrei (kuiwitt, kuiwitt) ein Vorbote des Todes.

§. 66. **II. Ordnung.** *Scansores.* **Klettervögel.** (§. 63a.) Schnabel verschieden, aber bis zur Wurzel mit horniger Scheide; meist Kletterfüße; Lauf hinten mit maschig-netziger Haut oder mit kleinen Täfelchen und diese dann zahlreicher als vorn. Meist Bewohner warmer Gegenden; Nahrung: Insekten oder Früchte. — 8 Familien (§. 63b, II.):

A. Paarzeher. Mit ächten Kletterfüßen (Fig. 22.).

1) Picidae. Spechte. (§. 63b. II.) Schnabel gerade. Sehr verbreitete, in Baumlöchern nistende, nur auf Bäumen lebende, nützliche Thiere. Die ächten Spechte klopfen, auf den kurzen, steifen Schwanz gestützt, mit dem Schnabel an die Bäume (Zimmerer, Holzhacker), um die dann hervorkriechenden Insekten und Insektenlarven mit der weit vorstreckbaren, wurmförmigen, an der Spitze hornigen Zunge aufzuspießen und zu fressen.

Schnabel nicht unter Kopflänge, 4kantig; Schwanz keilförmig, steif — — Specht (Fig. 33.) . . . . . 1) *Picus* L.
Schnabel etwas kürzer als der Kopf, rundlich; Schwanz abgerundet, nicht steif — Wendehals . . . . . 2) *Jynx* L.

2) Cuculĭdae. Kuckucke. (§. 63 b. II.) Schnabel auf der Firste schwach gebogen, mäßig stark; eine Wendezehe; Schwanz lang.

Schnabel von Kopflänge, mit scharfen Rändern; Lauf kürzer als die Mittelzehe — Kuckuck (Fig. 34.) . . . . . 3) *Cucŭlus* L.
Schnabel kürzer als der Kopf: fast kegelförmig, von oben 3seitig — — Honigkuckuck . . . . . 4) *Indicător.*
Schnabel kürzer als der Kopf: dick, stark zusammengedrückt, mit scharfer Firste — Madenfresser . . . . . 5) *Crotophăga* L.

3) Psittacīnae. Papageien. (§. 63 b. II.) Schnabel sehr dick, kurz, hakig übergreifend, ohne Bartborsten. Zahlreiche, schön gefärbte, dickzüngige, schlecht fliegende, gut kletternde, gelehrige und lärmende (Pappelgeier) Vögel innerhalb der Wendekreise.

Ohne Federholle: Schwanz lang, keilförmig; Wangen nackt — Ära . 6) *Ara* Briss.
Ohne Federholle: Schwanz kurz, abgerundet: Wangen befiedert — Papageichen. 7) *Psittacŭla* Briss.
Ohne Federholle: Schwanz kurz, abgerundet: Wangen nackt und bepudert — Papagei. . . . . 8) *Psittăcus* L.
Mit einer willkührlich aufrichtbaren Federholle auf dem Kopfe — Cacadu . . . . . 9) *Cacătus* C.

4) Bucconĭdae. Bartvögel. (§. 63 b. II.) Schnabel sehr dick, auf der Firste schwach gebogen, am Grunde mit 5 Bündeln Borstenfedern; keine Wendezehe.
Mit kegelförmigem Schnabel ohne Zähne — Bartvogel. . . . . 10) *Bucco* L.

5) Musophăgae. Pisangfresser. (§. 63 b. II.) Wie vorher, aber keine Borstenfedern; eine Wendezehe; bilden den Uebergang zu den Hühnern.

Kopf mit einer Federhaube — Helmkuckuck . . . . . 11) *Corythăix* Jll.
Kopf ohne Federhaube; Schnabel eine die Stirn theilweise ganz lose bedeckende Scheide — Kappenvogel . . . . . 12) *Musophăga.*

6) Ramphastĭdae. Großschnäbler. (§. 63 b. II.) Schnabel 3mal länger als der Kopf, sehr dick und hohl; Zunge hornartig, an den Seiten zerschlissen; gern Pimentpfeffer (II. §. 152.) fressend. Amerikaner.
Schnabel breiter u. höher als die Stirn, stark zusammengedrückt — Tukan 13) *Ramphastos* L.

B. Heftzeher. Schreitfüße mit verwachsenen Zehen. (Fig. 24.)

7) Bucerĭdae. Nashornvögel. (§. 63 b. II.) Schnabel sehr groß, hohl, oben mit hornartigem Aufsatze. Einzige Gattung Nashornvogel 14) *Buccros* L.

8) Halcyonĭdae. Eisvögel. (§. 63 b. II.) Schnabel ohne Horn. In beiden Welten, die meisten in warmen Ländern lebend und durch glänzende Farben ausgezeichnet.

Schnabel gerade, zugespitzt, 4kantig; Flügel, Schwanz und Beine kurz; Kopf dick — Eisvogel (Fig. 24.) . . . . . 15) *Alcēdo* L.
Schnabel schwach gebogen, seitlich zusammengedrückt, dem der Raben ähnlich; Zehen frei, wahre Spaltfüße — Racke . . . . . 16) *Coracĭas* L.

1. Spechte. Nützliche Insektenfresser. §. 67.

* **1. *Picus* L.** Specht. Schwarz-, Grün- und Buntspechte nach dem Gefieder. Der Schwarzspecht lebt vorzüglich in Nadelwäldern als Standvogel, die übrigen in Laubwäldern Deutschlands als Stand- und Strichvögel. Sie schreien meist jük jük jük oder glük glük glük; besonders machen die ♀ zur Begattungszeit mit dürren Zweigen einen schnurrenden Ton: ärrrr.; daher Rademacher genannt.

Fig. 33. Schwarzspecht. Schnabel §. 66, 1.

§. 67. Gefieder schwarz (Schwarzspechte); nur der Scheitel (♂) oder nur das Genick (♀) roth; 1½′ — Schwarzspecht (Fig. 33.) . . . . . * *P. martius* L.

Gefieder grün (Grünspechte); Hinterkopf roth; ein rother (♂) oder schwärzlicher (♀) Backenstreif; 12½″ — Grünspecht . . . . . * *P. viridis* L.

Gefieder oberseits weiß und schwarz; Schwingen weiß gebändert: Buntspechte — mit 4 Zehen (Standvögel) — Hinterleib roth; Unterrücken und Bürzel schwarz — ein schwarzer Halsstreif vom Mundwinkel herab; Hinterkopf roth (♂) od. nebst dem Scheitel schwarz (♀); 9″ — — großer Buntspecht * *P. major* L.

Gefieder oberseits weiß und schwarz; Schwingen weiß gebändert: Buntspechte — mit 4 Zehen (Standvögel) — Hinterleib roth; Unterrücken und Bürzel schwarz — ein schwarzer Halsstreif erst unterhalb des Ohrs beginnend; Hinterk. roth (♂); 8½″ — Mittlerer Buntspecht . * *P. medius* L.

Gefieder oberseits weiß und schwarz; Schwingen weiß gebändert: Buntspechte — mit 4 Zehen (Standvögel) — Unterseite ohne Roth, weißlich; Unterrücken weiß und schwarz gebändert; Scheitel roth (♂) oder weißlich (♀); 5½″ — Kleiner Buntspecht . . . * *P. minor* L.

Gefieder oberseits weiß und schwarz; Schwingen weiß gebändert: Buntspechte — mit 3 Zehen; Südbeutschland; 9″ — Dreizehiger B. *P. tridactylus* L.

* 2. ***Jynx torquilla*** L. Wendehals. Aschgrau, gesprenkelt, mit braunschwarzen Wellenlinien; 7″; Europa; in Deutschland Zugvogel; 4—9 bei uns. Klettert nicht, dehnt und drehet den Kopf sehr geschickt.

2. Kuckucke. Von Insekten lebende, nützliche Zugvögel.

* 3. ***Cuculus canorus*** L. Gemeiner Kuckuck. (Fig. 34.) Aschgrau od. rothbraun (noch nicht ausgewachsen); Bauch weiß, dunkel gewellt; Schwanz weißgefleckt; Beine gelb; 12″; Deutschland; Zugvogel; 4—8 bei uns. Nebst dem Kuhvogel (§. 69,25) der einzige, welcher seine Eier (ihrer ungleichzeitigen Entwickelung wegen, §. 62.) von kleinern Vögeln (Bachstelzen, Grasmücken ꝛc.) ausbrüten läßt. Sobald der junge Kuckuck sein Nest verlassen kann, setzt er sich auf einen nahen Baum und läßt seine schnarrende Stimme hören; dann kommen alle kleinere Vögel der Umgegend instinktmäßig zusammengeflogen, um dem Stiefkinde so viel Nahrung zuzutragen, daß es den Schnabel nicht oft genug öffnen kann. Verwandelt sich nicht in einen Sperber.

Fig. 34. Schnabel §. 66,3.

4. ***Indicator minor*** C. Honigkuckuck. Olivengrün, oben gelblich, unten ins Graue; 7″. Afrika, wo er den Bewohnern durch sein Schreien die Nester der Waldbienen (seine Nahrung) verräth.

5. ***Crotophaga ani.*** Madenfresser. Schwarz; Schwz u. Flügel bläulich; 12″. Südamerika; dem Rindviehe das Ungeziefer absuchend; schreiet: ani.

3. Papageien. Lärmende Bewohner der heißen Zone.

6. ***Ara ararauna*** L. Blauer Ara. Blau, unten gelb; Stirn und Scheitel grün; Schnabel und Kehle schwarz; Backen weiß; 3′; Brasilien; häufig.

7. ***Psittacula passerina*** und ***pullaria etc.*** Die Unzertrennlichen (*inseparables*). Nur 6—7″; Guinea; leben gern, aber nicht nothwendig paarweise; häufig in Menagerien.

8. ***Psittacus erithacus*** L. Grauer Papagei. Ganz aschgrau; Schwanz roth; Taubengröße; Westafrika; sehr gelehrig.

9. ***Cacatua cristatus*** L. Weißer Cacadu. Ganz weiß, unter den Flügeln gelblich; 1′; lernen leicht sprechen; Molukken.

4. Bartvögel. Gesellige Vögel der heißen Zone.

10. ***Bucco grandis.*** Großer Bartvogel. Grün und blau schillernd; untere Schwanzfedern roth; China.

5. Pisangfresser. Leben nur in Afrika.

11. *Corythăix persa* L. Helmkuckuck. Grün, mit einigen rothen Flügelfedern; am Cap; Taubengröße; wird leicht zahm.

12. *Musophăga violacĕa.* Violetter Pisangfresser. Violett; Hinterkopf und große Flügelfedern roth; 16″; Guinea. Leben vorzüglich von Pisangfrüchten (II. §. 292.).

6. Großschnäbler oder **Pfefferfresser.** Nur in Amerika.

13. *Ramphăstos toco* Vaill. Gemeiner Pfefferfraß. Schwarz; Kehle weißgelb; Augenkreis und After roth; Schnabel gelb, an der Wurzel schwarz; 19″; Brasilien; häufig. Fressen fast Alles, wie die Raben.

7. Nashornvögel. Tropische, meist Früchte fressende Vögel.

14. *Bucĕros rhinocĕros* L. Gemeiner Nashornvogel. Schwarz; Bauch, Hosen und Schwanz weiß; Horn des Schnabels mit beiden Enden nach vorn gerichtet; 4′; Java; häufig.

8. Eisvögel. Geschickte Fischer und Insektenfänger.

* **15.** *Alcēdo ispĭda* L. Gemeiner Eisvogel. Blau, Unterseite nebst Füßen hell rostfarbig; 7″; Europa; in Deutschland Strichvogel. Lebt an Gewässern von kleinen Fischen und Wasserinsekten; Nest an Ufern in festem Lehmboden.

* **16.** *Coracĭas garrŭla* L. Blauracke, Mandelkrähe. Blaugrün; Rücken braun; 13″; Norddeutschland; Zugvogel; 4—8 bei uns; zieht nach Afrika; schreiet rack; lebt von Insekten und Körnern; sitzt gern auf Getreidemandeln.

III. Ordnung. *Passĕres.* **Singvögel.** (§. 63a.) Schnabel bis zur Wurzel mit horniger Scheide; vor allen andern Vögeln durch einen, den Kolibrien und Wiedehopfen jedoch fehlenden Singmuskel-Apparat (bald 1 und bald 5—6 Muskelpaare am Kehlkopfe) zur Hervorbringung des Gesanges ausgezeichnet, obgleich nicht alle singen (z. B. Krähen und Schwalben); Läufe hinten mit quer nicht unterbrochener oder in Täfelchen schwach unterbrochener Haut, an Zahl denen der Vorderseite entsprechend. Zahlreiche, gesellige, über die ganze Erde verbreitete, meist kleine und bunt befiederte, Insekten, Würmer und Körner fressende, in Monogamie lebende, künstliche Nester bauende Vögel. — 6 Familien (§. 63b. III.): §. 68.

1) Dentirōstres. Zahnschnäbler. (§. 63b. III.) Schnabel mit einem Zahne und mit hakig übergreifender Spitze; starke Bartborstenfedern; Wandelfüße. Die Räuber unter den Sängern, zank- und mordsüchtig, durch Vertilgung von Mäusen und vorzüglich Insekten nützlich, durch Tödten kleiner Vögel schädlich.

Schnabelgrund höher als breit; Rückenfirste gebogen; Haken und Zahn stark — Würger (Fig. 36.) . . . . . 1) *Lanius* L.
Schnabelgrund breiter als hoch; Schnabel an der Spitze etwas übergebogen, aber nicht hakenförmig, ohne Zahn — — Fliegenschnäpper (Fig. 37.) . . . . . 2) *Muscicăpa* L.

2) Subulirōstres. Pfriemenschnäbler. (§. 63b. III.) Schnabel fast pfriemlich, an der Spitze nicht hakig, nur seicht ausgeschnitten; schwache Bartborstenfedern; Wandelfüße. Leben von Beeren und Insekten; sind deshalb nützlich; auch als die angenehmsten Sänger beliebt.

§. 68. 9 Schwingen in den ſtark zugeſpitzten Flügeln, die erſte faſt von Länge der 2ten u 3ten (Fig. 35.a.)

- Schwanz lang, gerade abgeſchnitten; Gefieder nicht fleckig; Hinterzehe gewöhnlich — Bachſtelze . . . . . 3) *Motacilla* Bech.
- Schwanz kürzer, ausgeſchnitten; Bruſt gefleckt; Hinterzehe lang — Pieper . . 4) *Anthus* Bech.

10 Schwingen:

- Flügel zugeſpitzt; die 1ſte Schwinge kaum ⅓ ſo lang als die 2te, die 3te die längſte (Fig. 35.c.)
  - Schnabel etwa von Kopflänge, ſeitlich zuſammengedrückt: Droſſeln
    - Mundſpalte länger als der Lauf, dieſer kürzer als die Mittelzehe — Pirol . . 5) *Oriolus* L.
    - Mundſpalte höchſtens ſo lang als der Lauf, dieſer länger als die Mittelzehe — — Droſſel (Fig. 38.) . . . 6) *Turdus* L.
    - Mundſpalte viel kürzer als der Lauf, dieſer länger als die Mittelzehe; Schnabel vor den Naſenlöchern ſtark zuſammengedrückt — — Waſſeramſel . . . . 7) *Cinclus* Bech.
  - Schnabel kürzer, an der Wurzel breit, platt gedrückt; Mundſpalte viel länger als der Lauf: Sänger
    - Schnabel an d. Wurzel breiter als hoch
      - ſtark, an der Spitze ſchwach gebogen, m. etwas eingebogenen Rändern — Braunelle (Fig. 39.) . . . . 8) *Accentor* Bech.
      - 3kantig, vorn zuſammengedrückt; obere Schwzdeckfedern weiß; Schwz m. 12 Federn — Steinſchmätzer . . . 9) *Saxicola* Bech.
    - Schnabel an der Wurzel höher als breit, rundl.; obere Schwanzdeckfedern grau; Schwanz mit 10 Federn — Sänger (Fig. 40.) . . . 10) *Sylvia*.
- Flügel abgerundet; die 1ſte Schwinge über ⅓ ſo lang als die 2te, die 4te und 5te die längſten (Fig 35. b.)
  - Schwanz kurz, abgerundet, aufrecht — Zaunkönig . . . . . 11) *Troglodytes*.
  - Schwanz lang, aufrecht, keilförmig (♀) oder leierförmig (♂) — — Leierſchwanz . . . . . 12) *Maenura*.

Fig. 35. Schwingen der Pfriemenſchnäbler.

3) Conirōstres. Kegelſchnäbler. (§. 63b. III.) Schnabel kegelförmig, viel dicker, kürzer und härter als bei vorigen, ganz gerade oder an der Spitze mit ſchwachem Haken oder mit kleiner Kerbe. Freſſen Beeren und Körner, auch Inſekten, womit ſie die Jungen ätzen.

a. Schnabel ohne Kerbe; Naſenlöcher unter Federn verſteckt: **Körnerfreſſer.**

- Schnabel von der Wurzel an allmählich verdünnt, gerade; Gefieder locker: Meiſen
  - Naſengrube mit mehren, buſchig getheilten Federn bedeckt; Zunge in 4 Borſten endend — Meiſe (Fig 41) . . . . . 13) *Parus* L.
  - Naſengrube mit einer einzelnen Borſtenfeder bedeckt; Scheitel hochgelb — Goldhähnchen 14) *Regulus* C.
- Schnabel dicker, an der Wurzel meiſt ringsum wulſtig aufgetrieben, gerade oder mit etwas gekrümmter Spitze; Gefieder dicht anliegend: Finken
  - Nagel der Hinterzehe länger als die Zehe, faſt gerade — Lerche (Fig. 42.) . . . . . 15) *Alauda* L.
  - Nagel der Hinterzehe kürzer als die Zehe, gekrümmt
    - Oberkinnlade ſchmäler als die untere — Ammer . . . . . 16) *Emberiza* L.
    - Oberk. wenigſtens eben ſo breit als die untere — Finke (Fig. 43 u. 44) 17) *Fringilla* L.
    - beide Kiefern ſich mit den Spitzen kreuzend — Kreuzſchnabel . 18) *Loxia* L.

b. Schnabel vor der Spitze mit kleiner Kerbe: **Beerenfresser.** §. 68

- Nasenlöcher frei
  - Nur eine Kerbe vor der Spitze des Oberkiefers — Prachtmeise . . . 19) *Tanăgra* L.
  - Mehre Kerben vor der Spitze des Oberkiefers — — Organist . . . 20) *Euphŏne* Jll.
- Nasenlöcher unter Federn versteckt!
  - Scheitel mit fächerförmigem, hohem Federkamme — Felsenhuhn . . . 21) *Rupicŏla* Briss
  - Scheitel mit einer Federholle; Schwingen mit pergamentartigen Anhängseln — Seidenschwanz . . . 22) *Bombycĭlla* Briss.

4) Corvīnae. Raben. (§. 63b. III.) Schnabel fast gerade, kräftig, so lang als der Kopf; Nasenlöcher mehr oder weniger mit Federn bedeckt; kräftige Wandelfüße. Lebhafte, gesellige, über die ganze Erde verbreitete, laut schreiende, nicht singende (einige lernen Worte nachsprechen), von Insekten, Beeren, kleinen Vögeln, Aas ꝛc. lebende Vögel.

a. Nasengruben dicht befiedert; Nasenlöcher sichtbar; Mundwinkel herabgezogen: **Staare.**

- Schnabel flachrund; Oberkiefer breiter als hoch — Staar . . . . . 23) *Sturnus* L.
- Schnabel seitlich zusammengedrückt; Oberkiefer höher als breit — Viehvogel oder Heuschreckenvogel . . . . . 24) *Pastor* Tem.
- Schnabel genau kegelförmig, vorn scharf zugespitzt — Trupial . 25) *Cassĭcus* C.

b. Ebenso, aber Mundwinkel gerade: **Paradiesvögel.**

- Schnabel vorn stark zusammengedrückt, etwas gebogen — Paradiesvogel . . . . . 26) *Paradiseă* L.
- Schnabel dick, angeschwollen, an der Spitze plötzlich gebogen, Unterkiefer stark — Madenhacker . . . . . 27) *Buphăga* Briss.

c. Nasengruben mit borstlichen, die Nasengruben bedeckenden Federn: **Raben.**

- Schwanz ganz od. fast ganz von Flügeln bedeckt; Schnabel kegelförmig, oben gewölbt, mit zusammengedrückter, gebogener Spitze — Rabe (Fig. 45.) . . . . . 28) *Corvus* L.
- Schwz höchstens halb von Flügeln bedeckt
  - gerundet, weit unter Körperlänge
    - keilförmig, von Körperlänge — Elster . . . . . 29) *Pica* Briss.
    - Schnabel länger als der Lauf — — Tannenhäher . . . . . 30) *Nucifrăga* Briss.
    - Schnabel weit kürzer als der Lauf — — Häher . . . . . 31) *Garrŭlus* Briss.

5) Tenuirŏstres. Dünnschnäbler. (§. 63 b. III.) Schnabel meist sehr dünn u. gebogen, scharf zugespitzt, meist länger als der Kopf; Wandelfüße. Leben von Insekten und Blumenhonig.

- Schnabel gerade, stark, kaum länger als der Kopf, pfriemlich — Spechtmeise (Fig. 46.) . . . . . 32) *Sitta* L.
- Schnabel gebogen, schwach, länger als der Kopf
  - Zunge flach, nicht ausstreckbar
    - Kopf ohne Federholle
      - Schwzfedern steif; Nagel der Hinterz. gewöhnlich — Baumläufer (Fig. 47.) . . . . . 33) *Certhĭa* L.
      - Schwzf. nicht steif; Nagel der Hinterz. sehr lang — Mauerläufer . . 34) *Tichodrŏma* Jll.
    - Kopf mit einer aufrichtbaren, 2reihigen Federholle — Wiedehopf . 35) *Upŭpa* L.
  - Zunge rund, zweispaltig, weit vorstreckbar
    - Schnabel fast in einen Halbzirkel gekrümmt, 1½mal so lang als der Kopf — Honigsauger . . . . . 36) *Melithreptus* C.
    - Schnabel gerade oder etwas gebogen, über Kopflänge — Kolibri . . . . 37) *Trochĭlus* L.

6) Fissirŏstres (longimănae). **Spaltschnäbler** (Langhänder). (§. 63 b. III.) Schnabel kurz, dreieckig, flach, mit hakiger Spitze; Rachen weit; Flügel lang, spitz, daher gute Flieger, welche über die ganze Erde verbreitet sind u. fast beständig nach Insekten haschend in der Luft schwimmen.

Kein Schnurrbart; Schwanz gablig; Gefieder dicht anliegend	Wandelfüße mit schwachen Zehen und Nägeln — Schwalbe	38) *Hirūndo* L.
	Klammerfüße mit starken, mondförmig gekrümmten Nägeln (Fig. 20.) — Segler	39) *Cypsĕlus* Jll.
Ein Schnurrbart; Schwz nicht gablig; Gefieder locker	Schnabel schwach, breit niedergedrückt; Mittelzehen-Nagel kammartig gezähnt — Nachtschwalbe (Fig. 48.)	40) *Caprimūlgus* L.
	Schnabel ebenso, aber stärker; Mittelz. nicht gezähnt, platt — Tagschläfer	41) *Podărgus* C.

§. 69. **1. Zahnschnäbler.** Kleine, muthige Räuber.

Fig. 36. Schnabel §. 68, 1.

* **1.** ***Lanĭus excubĭtor*** L. **Großer Würger.** Rücken aschgrau; Bauch weiß, Stirn grau; 9″; Strich- und Standvogel. Spießt wie die Artgenossen, Insekten an Dornen auf und frißt sie dann stückweise; tödtet aber nicht gerade erst 9 Thiere (Neuntödter), ehe er zu fressen anfängt. Schreiet: schaeck schaeck.

* ***L. mĭnor*** L. Kleiner W. (Fig. 36.) Rücken aschgrau; Bauch röthlich; Stirn schwarz; 8″; Zugvogel; 5—8 bei uns.

* ***L. collurĭo*** L. Rothrückiger W. Rücken rostbraun; 6″; Zugvogel; 4—8.

* ***L. rufus*** L. Rothköpfiger W. Hinterkopf und Nacken rostroth; 7″; Zugvogel; 4—9 bei uns.

Fig. 37. Schnabel §. 68, 2.

* **2.** ***Muscicăpa grisŏla*** L. Grauer Fliegenschnäpper. (Fig. 37.) Aschgrau, unten weißlich; Brust mit grauen Längsflecken; Scheitel mit dunklerem Streife; 6″; Zugvogel; 4—9 bei uns. Kommt oft in die Städte und nistet in Obstgärten.

* ***M. atricapĭlla*** L. Schwarzrückiger Fl. Schwarz, nur Stirn, Unterseite u. Spiegel weiß; 5″; Zugvogel; 4—8 bei uns. Wird in Italien gegessen.

2. Pfriemenschnäbler. Beste Sänger und häufigste Stubenvögel.

* **3.** ***Motacĭlla alba*** L. Weiße Bachstelze, Ackermännchen. Aschgrau; Stirn und Unterseite weiß; Brust schwarz; 7″; Zugvogel; 2—10 bei uns; gemeinste der 3 deutschen Arten; gern in der Nähe von Wasser und Menschen; wippen fortwährend mit dem Schwanze (Wippstert) und lesen im Frühlinge gern Insekten und deren Larven aus frisch umgebrochenen Ländereien.

* **4.** ***Anthus arborĕus*** Bech. Heidelerche, Baumpieper. Olivengrün; Kehle weiß; Brust rostgelb, schwarzbraun gefleckt; $5\frac{1}{2}$″; Zugvogel; 3—10.

* **5.** ***Orĭŏlus galbŭla*** L. Goldamsel, Pirol. Hochgelb, mit schwarzen Flügeln (♂), oder zeisiggrün, unten weißlich (♀); 9″; Zugvogel; 5—8; nützt durch Vertilgung von Insekten, frißt aber auch gern Kirschen (Kirschvogel).



Fig. 38. Krammetsvogel. Schnabel §. 68, 6.

* **6.** ***Turdus.*** Drossel. Zugvögel; überall in Europa und schon bei den Römern beliebt; in Deutschland 10 Arten, welche in Südeuropa überwintern u. schaarenweise bei uns im October durchziehen und im März und April wieder aus Südeuropa zurückkommen. Als Stubenvogel des Gesanges wegen (Schwarzdrossel, Singdrossel) gehalten und besonders des angenehmen Fleisches wegen meist im Herbste in Dohnen gefangen; fressen Insekten, Würmer und auch Beeren: die Misteldrossel oder Schnarre besonders gern Mistеln (II. §. 210.) und die Wachholderdrossel oder der Krammetsvogel (Fig. 38.) vorzüglich Wachholder- od. Krammetsbeeren (II. §. 278.), welche dem Fleische einen angenehm bittern Geschmack geben. Der Krammetsvogel heißt bei uns auch Schakker wegen seiner Locktöne: schak schak schak. Sein Fang ist Hauptgegenstand der Vogelstellerei bei uns; auch nennt man nach ihm alle

Droſſeln im Handel Krammetsvögel. Die Zahl der jährlich im mittlern Deutſchland gefangenen iſt ſeit 60—80 Jahren auf 1/10 herabgeſunken. §. 69.

- Gefieder einfarbig, ſchwarz; Schnabel gelb: Amſeln
  - Oberbruſt mit weißer Querbinde, übrigens mattſchwarz; 10½"; wandert 3 und 9. — Schildamſel . . . . *T. torquātus L.
  - Oberbruſt wie der ganze Körper tiefſchwarz (♂) oder ſchwarzbraun, dunkelbraun gefleckt (♀); 9½"; bei uns 3—10. — Schwarzdroſſel . . . . . *T. merŭla L.
- Gefieder buntfarbig, heller oder dunkler braun: Droſſeln
  - Untere Flügeldeckfedern ſchwarzgrau oder weißlich
    - Flügel mit 2 hellen Querbinden; Schwz braun; Körper oberſeits olivengrau; 11"; Strichvogel. — Miſtelbroſſel . . . . *T. viscivŏrus L.
    - Flügel ohne Querbinden; Schwz ſchwärzlich; Kopf und Bürzel bläulich aſchgrau: 10"; kommt 10 u. 11. — Krammetsvogel *T. pilāris L.
  - Untere Flügeldeckfedern roſtfarbig; Unterſeite weißl. gefleckt
    - Weichen roſtfarbig; Augenſtreif deutlich, roſtgelb; 8"; kommt 10. — Weinvogel . . *T. iliăcus L.
    - Weichen weißlich; Augenſtreif undeutlich; 8½"; zieht 3 u. 9. — Singdroſſel oder Graudroſſel . . . . . *T. musĭcus L.

* 7. *Cinclus aquaticus* Briss. Waſſerſtaar. Schwarzbraun; Bruſt und Hals weiß; 7"; Standvogel; häufig an Flüſſen; guter Taucher.

* 8. *Accēntor alpīnus* L. Alpen-Flüevogel. (Fig. 39.) Aſchgrau; Kehle weiß, ſchwarz getüpfelt; Bauch roſtroth gefleckt; 6 2/3" Vorzüglichſter Sänger auf den Alpen.

Fig. 39. Schnabel §. 68, 8.

* *A. modulāris* L. Graukehlchen, Braunelle. Zimmtbraun, ſchwarzbraun gefleckt; Hals und Bruſt ſchiefergrau; Flügeldeckfedern mit weißen Spitzen; 5½"; Zug- und Strichvogel; ſingt angenehm.

* 9. *Saxicŏla oenanthe* L. Graurückiger Steinſchmätzer. Oben aſchgrau (beim ♀ roſtgrau); Unterſeite röthlichweiß; ein Augenſtreif und das Schwanzende ſchwarz; 5"; Zugvogel; 3—10 bei uns.

* *S. rubētra* L. Braunkehlchen. Schwarzbraun, mit roſtbräunlich gerandeten Federn; unten braunroth; ein Streif über den Augen und ein Fleck auf den Flügeln weiß; 4½"; Zugvogel; 4—9 bei uns.

* *S. rubicŏla* L. Schwarzkehlchen. Unterkopf und Kehle ſchwarz; Halsſeiten u. Flügeldeckfedern weiß; Bruſt roſtgelb; 4½"; Zugvogel; 3—11 bei uns.

10. *Sylvia.* Sänger. Ueber 30 deutſche **Zugvögel,** welche in Wäldern und Gebüſchen von Inſekten und Beeren leben.

a) Mit geſtiefelten, langen Läufen; leben und niſten in der Nähe des Bodens.

* *S. luscinia* L. Nachtigall. Dunkelroſtgrau; Schwanz roſtfarbig; Unterſeite weißgrau; 6". Faſt ganz Europa; 4—8 bei uns; frißt Inſekten; ♂ ſchlägt nur bis Johannis (Nachtſchläger, Tagſchläger, Repetirvögel). Der Sproſſer (*S. philomēla*) iſt 7" groß und lebt mehr öſtlich, namentlich in Polen.

* *S. rubecŭla* L. Rothkehlchen. Olivenbraun; Kehle und Bruſt gelbroth; 5½"; 3—10 bei uns.

* *S. suecĭca* L. Blaukehlchen. Graubraun; Kehle ſmalteblau; 5½"; ſelten.

b) Ebenſo; Gefieder oben aſchgrau; Bürzel und Schwanz roſtroth; niſten in Baum- und Mauerlöcher: Röthlinge.

* *S. phoenicūrus* L. Garten-Rothſchwänzchen. Bruſt roth, Kehle ſchwarz (♂) oder Kehle und Bruſtmitte weiß (♀); 5½"; 4—9 bei uns.

* *S. tithys* L. Haus-R. Unten ganz ſchwarz (♂) oder aſchgrau (♀, *erythăcus* L.); 5½"; überall häufig; 3—10 bei uns.

c) Mit kürzern, vorn getäfelten Läufen; Schwanz gerundet; Gefieder grau oder graubraun; leben und niſten in Gebüſchen und Hecken: Grasmücken.

* *S. currūca* oder *garrŭla* Bech. Weißkehlchen oder Haus-Grasmücke. Kopf grau; Rücken bläulich aſchgrau; Unterſeite und Außenfahne der äußern Schwanzfedern weißlich; 5¼"; 4—9 bei uns.

* *S. atricapīlla* L. Mönch. Oberkopf ſcharf abgeſetzt ſchwarz (♂) oder braun (♀); 5¾"; 4—9 bei uns; häufig; ſchlägt ſehr ſchön.

§. 69. * *S. cinerĕa* Briss. Graue G. Oben grau, unten röthlich weiß; Flügelfedern breit roſtfarbig geſäumt; äußerſte Schwanzfeder mit weißer Außenfahne; $5^3/_4$"; 4—8.

d) Läufe ebenſo; Schwanz ausgeſchnitten; oben grünlichgrau, unten und ein Streif über den Augen gelblich; in Laubwäldern: Laubvögel.

* *S. sibilātrix* Bech. Grüner Laubvogel, Weidenzeiſig. Oben gelblich grasgrün; unten weiß; Füße röthlichgelb; $4^1/_2$"; 4—9 bei uns.

e) Ebenſo, aber Schwanz keilförmig; an Gewäſſern im Schilfe: Rohrſänger.

* *S. salicaria* Bech. Binſenſänger. (Fig. 40.) Oben roſtgelb mit ſchwarzbraunen Längsflecken; unten gelblichweiß, ungefleckt; über der Scheitelmitte und den Augen eine roſtgelbliche Längsbinde; $4^1/_2$"; Südeuropa und Deutſchland.

Fig. 40. Schnabel §. 68, 10.

Zu den Sängern gehört auch noch der Schneiderbogel (*sylvia sutoria*), ein kleiner weſtindiſcher Vogel, welcher Baumwolle von der Baumwollenſtaude ſammelt und mit Schnabel und Füßen zu einem Faden ſpinnt, um damit an den Enden der Baumzweige Blätter für ſein Neſt zur Sicherheit vor Schlangen und Affen zuſammenzunähen.

* 11. *Troglodȳtes parvŭlus.* Zaunkönig. Rothbraun, ſchwarzbraun gewellt; unten roſtgrau; $3^1/_2$"; ſtreicht 3 und 9. Nächſt dem Goldhähnchen der kleinſte Europäer.

12. *Maenūra superba.* Das ſchöne Schweifhuhn. Dunkelbraunroth; Körper von Form und Größe der Hühner; Neuholland.

3. Kegelſchnäbler oder Hopfer.

Fig. 41. Schnabel §. 68, 13.

* 13. *Parus* L. Meiſe. Kleine, lebhafte, liſtige, muthige, alles Genießbare freſſende, zankſüchtige Vögel, welche ſogar andere kleine, beſonders kranke Vögel morden. Die Bartmeiſe (Fig. 41.) lebt in Süddeutſchland. Die Hauben- und Schwanzmeiſe ſind bei uns Stand-, die übrigen Strichvögel. Schwanzmeiſe od. Pfannenſtiel bauet ein beutelförmiges Neſt

- Keine Haube
  - Scheitel mit zugeſpitzter Federhaube; $4^1/_2$". — Haubenmeiſe . . . * *P. cristātus* L.
  - Schwanz länger als der Körper, an 4". — Schwanzmeiſe * *P. caudātus* L.
  - Schwz kürzer als der Körper
    - ohne Knebelbart
      - mit ſchwarzem Längsſtreife über dem gelben Bauche; Kopf ſchwarz, Wangen weiß; $5^1/_4$". — Kohl- od. Speckmeiſe * *P. mujor* L.
      - Bauch ganz gelb; Stirn u. Wangen weiß; Körper grünblau; $4^1/_2$". — Blaumeiſe * *P. cœrulĕus* L.
    - mit ſchwarzem Knebelbarte; $6^1/_3$" — — Bartmeiſe (Fig. 41.) . . . . . *P. biarmĭcus* L.

* 14. *Regŭlus cristātus.* Goldhähnchen. Zügel und Augengegend weiß (*R. ignicapillus* mit ſchwarzem Zügel und Streife durchs Auge); $3^1/_2$"; Standvögel der Nadelwälder.

15. *Alauda calandra* L. Kalanderlerche. (Fig. 42.) Lerchengrau, unten weißlich; Bruſt gelb, braungefleckt; am Halſe jederſeits ein ſchwarzer Fleck; $6^3/_4$"; Süddeutſchland.

* *A. cristāta* L. Haubenlerche. Braungefleckt; Scheitel mit ſpitzer Federholle; $6^3/_4$"; Stand- und Strichvogel.

* *A. arvēnsis* L. Feldlerche. Braungefleckt, ſehr veränderlich; die zwei äußeren Schwanzfedern jederſeits weiß, mit ſchwärzlicher Innenkante; 7"; Zugvogel; 2—9 bei

Fig. 42. Schnabel u. Zehennagel §. 68, 15.

uns. Wird des wohlschmeckenden Fleisches wegen, besonders in Sachsen (Leipziger Lerchen), häufig gefangen. S. 69.

* 16. ***Emberiza citrinélla*** L. Goldämmer. Oben rostbraun, schwarzbraun gefleckt; Bürzel rostroth; Bauch (und Kopf des ♂) goldgelb; $6\frac{1}{2}$″; Strichvogel; Winters in Dörfern zwischen Sperlingen.

* ***E. schoenícius*** L. Rohrsperling, Rohrammer. Oben wie bei vorhergehendem; Bürzel grau; unten weißlich, schwarzbraun gefleckt; äußere Schwanzfedern bis zur Hälfte weiß; Kopf und Kehle schwarz (♂) oder Kopf braun, Kehle weißlich (♀); $5\frac{1}{2}$″; Standvogel. An Sümpfen und Teichen.

* ***E. hortulána*** L. Gartenammer, Ortolan. Selten; häufiger in Süden. Seit den ältesten Zeiten gemästet und vorzüglich von Cypern aus im Handel.

* 17. ***Fringílla*** L. Finke. Ueber 130, überall verbreitete, meist 2mal mausernde Arten.

a) Schnabel sehr dick, genau kegelförmig: *Coccothraustes* C. Kernbeißer.

* ***C. vulgáris*** Pall. Kirschfink. Rücken braun; Nacken grau; Kehle schwarz; $7\frac{1}{2}$″; Strichvogel; frißt Buchennüsse und Kirschkerne, auch Insekten.

† ***C. oryzivóra*** L. Reisvogel. Aschgrau; Scheitel schwarz; Wangen weiß; 5″; Indien; Reisfeldern schädlich.

b) Schnabel kaum länger als hoch, allseits gewölbt; Firste stark gebogen: *Pyrrhúla* Briss. Gimpel.

* ***P. rubrícilla*** Pall. Dompfaff. (Fig. 43.) Hellgrau; Kopf und Schwingen schwarz; unten roth (♂) od. blaugrau (♀); $6\frac{1}{4}$″; Strichvogel. Geselliger, gelehriger Stubenvogel.

Fig. 43. Schnabel S. 68, 17.

c) Schnabel länger als hoch; Firste schwach gebogen: *Passer* Pall. Spatz.

†* ***P. domesticus*** L. Haussperling. Mit schwarzer Kehle (♂), mit gelblichweißer Linie hinter den Augen (♀); Flügel mit einer weißen und einer gelblichen Querbinde; 5″. Schlauer Standvogel; brütet 3mal; schadet Kornfeldern, nützt Obstgärten, obgleich daselbst für Kirschen und Erbsen schädlich. Von Portugal bis Sibirien, am Senegal, am Cap und auf Java zu Hause. Seine Verbreitung hängt mit der Verbreitung der Saatfelder zusammen; früher auf Mitteleuropa beschränkt; nach Gloger zur Zeit der Römer noch nicht in Deutschland. Nach Bradley's Berechnung vertilgt ein Sperlingspaar, welches seine Jungen ätzt, wöchentlich über 3300 Raupen.

†* ***P. montánus*** L. Feldsperling. Ebenso, aber Wangen mit schwarzem Mondflecke und Flügel mit 2 reinweißen Querbinden; 5″; meist auf Feldern.

P. petrónius L. Steinsperling, Graufink. (Fig. 44.) Oben graubraun, unten mit Weiß gemischt; ein weißgelblicher Streif über den Augen; ein gelblicher Gurgelfleck; $5\frac{3}{4}$″; Süddeutschland.

Fig. 44. Schnabel S. 68, 17.

d) Schn. weit länger als hoch, zweimal so hoch als breit, Firste gerade: *Fringílla* C. Finke.

* ***F. spinus*** L. Zeisig. Gelblichgrün; Spitzen der Flügeldeckfedern u. Schwanzfedern nach außen gelb; ♂ mit gelber, ♀ mit weißer Brust; $4\frac{1}{2}$″; Strichvogel; frißt gern Baumsamen, besonders von Erlen (Erlenfink), aber auch Insekten.

* ***F. carduélis*** L. Stieglitz. Schnabelwurzel hochroth; Schwingen mit goldgelber Binde; buntester Vogel Europas; $5\frac{1}{2}$″; Standvogel; frißt gern Distelsamen (Distelfink).

e) Schnabel ebenso, aber kaum höher als breit: *Linóta* Bonap. Bluthänfling.

* ***L. cannabína*** L. Artsche oder Grauartsche. Zimmtbraun; Schwanz-

§. 69. federn schwarz und wie die Schwingen weiß gerandet; Schnabel grau; ♂ mit karminrothem Scheitel; 5″; Strichvogel. Gelehrig u. als Stubensänger sehr beliebt.

* *L. chloris* L. Gelbartsche. Grünlich (♀ mit Grau gemischt); Flügelrand, Außenfahne der großen Schwingen und Wurzel der äußern Schwanzfedern gelb; 6″; Standvogel.

* *L. coelebs* L. Blutfink, Buchfink. Flügel mit gelblicher und weißlicher Querbinde; ♂ unten roth, ♀ unten röthlich grau; 6½″; Zug- und Strichvogel; lockt: pink, pink oder fink, fink.

* *L. montifringilla* L. Bergfink, Harznachtigall, Quäker. Flügel fast ebenso; unten röthlich, seitwärts länglich-schwarz gefleckt; ♂ mit schwärzlichem, ♀ mit rothgrauem Kopfe; 6½″; Tannenwälder Nordeuropas; kommt Winters vom Harze zu uns. Gefieder sehr veränderlich; lockt: quaeaek.

L. canaria L. Kanarienvogel. Fast ganz grün mit gelblichem Schimmer; bei uns in der Gefangenschaft mehr oder weniger gelb; 5″. Kanarische Inseln; frißt gern Kanariensamen (II. §. 322.⁶). Häufigster Stubenvogel, welcher sich leicht mit Finken, besonders mit Grauartschen verbastert; auf Elba verwildert.

Von Ausländern hierher noch:

Vidua paradisea C. Paradies-Wittwe. Schwarz; Hals mit rothem Bande; Schwanz des ♂ mit 2 sehr langen Steuerfedern; 4″. Afrika.

Ploceus socius. Republikaner. Etwa 6″; bauen nach Vaillant gesellig zu mehren Hundert ihre Nester klumpenweise unter ein gemeinschaftliches Dach auf Bäumen in den Umgebungen des Caps der guten Hoffnung.

Ploceus textor Gm. der Webervogel, ist unserm Gimpel ähnlich; lebt in Indien und bauet ein flaschenförmiges Nest, hängt es an einen Baumzweig auf, der so biegsam ist, daß weder Schlangen noch Affen dahin gelangen können, ja er macht den zahlreichen Feinden den Zutritt dadurch ganz unmöglich, daß er den Eingang unten anlegt, so daß er selbst nur fliegend hineinschlüpfen kann.

† *Gracula quiscala* L. Reisdieb, weil er in zahlreichen Schwärmen die Reisfelder in Amerika verwüstet. Schwarz mit violettem Schimmer.

18. *Loxia* L. Kreuzschnabel. Gesellige, plumpe Vögel; leben in Nordeuropas Nadelwäldern von Nadelholzsamen.

* *L. curvirostra* L. Tannenpapagei. Unterkieferspitze über den Rücken des Oberkiefers vorragend; 7″; Standvogel am Harze; brütet zu allen Jahreszeiten, meist Winters. Im frühesten Alter kreuzen sich die Kieferspitzen nicht.

19. *Tanagra rubra* L. Canadische Merle. Roth; Schwanz und Flügel schwarz (♂), oder olivengrün, unten citrongelb (♀); 5″.

20. *Euphone musica* Licht. Der Organist. Oben violett, unten orangefarbig; Schwanz schwarz. Auf den Antillen. Soll die ganze Octav durchsingen.

21. *Rupicola aurantia* L. Orangegelbes Felsenhuhn. Der Saum des Kammes und abgestutzten Schwanzes braun; 10″; Guiana.

* 22. *Bombycilla garrula* L. Seidenschwanz, Sterbevogel. Rothgrau; Schwanzspitze und Schwingen nach außen gelb; Anhängsel scharlachroth; 7½″; dumm, gesellig, oft Winters aus hohem Norden truppweise bei uns; frißt vorzüglich Vogelbeeren.

4. Raben. Die größten unter den Singvögeln.

* 23. *Sturnus vulgaris* L. Gemeiner Staar, Sprehe. Schwarz, violett und goldgrün schillernd, spitzfleckig weiß; 8—9″; Zugvogel, 2—11; gesellig; sucht Weidevieh Insekten ab; eßbar; lernt sprechen und singen.

24. *Pastor roseus* L. Rosendrossel. Rosenroth; Kopf, Schwanz und Schwingen schwarz; 8″; berühmt als Vertilger der Heuschrecken in Afrika.

† 25. *Cassicus phoeniceus*. C. Rothflügliger Staar. Schwarz, nur Flügelschultern roth. Die Geißel der nordamerikanischen Ackerbauer.

C. Baltimore C. Baltimore-Vogel. In Nordamerika; berühmt durch sein 7—8″ weites, zusammengefiztes und mit Zwirnfäden durchwebtes Hängenest, selbst an Baumzweigen in Städten.

† *C. pecoris* Tem. Kuhvogel. Violettschwarz; 7″. Paraguay; schadet dem Welschkorne; lebt auf Viehweiden u. legt wie der Kuckuck seine Eier in fremde Nester.

26. ***Paradiseа apoda*** L. Gemeiner Paradiesvogel. Gelb und braun; Kehle goldgrün; Weichenfedern des ♂ verlängert, weiß; 8″. Die ausgestopften ♂ kommen mit ausgerissenen Beinen als Damenputz an Hüte zu uns in Handel von den Südsee-Inseln, wo auch die übrigen, sämmtlich durch einzelne, ungewöhnlich entwickelte Federn sich auszeichnenden Arten leben. S. 69.

27. ***Buphaga africana*** Briss. Afrikanischer Madenhacker. Bräunlich; 8″; am Cap. Drückt mit seinem starken Schnabel den Gazellen (S. 53, 6) und Rindviehe die Oestruslarven (S. 172.) aus der Haut, um solche zu fressen.

* **28.** ***Corvus monedula*** L. Dohle. Schwärzlichgrau; Scheitel, Rücken, Flügel und Schwanz tiefschwarz; $13\frac{1}{2}$″; Strichvogel; leben und bauen gesellig, besonders auf alten Thürmen. Fressen Insekten, Beeren (Kirschen, Pflaumen), auch Mäuse und junge Vögel; lernen sprechen.

* *C. cornix* L. Nebelkrähe od. schwedischer Rabe. (Fig. 45.) Aschgrau; Kopf, Flügel und Schwanz tiefschwarz; $1\frac{1}{2}$′; Zugvogel; kommt Winters von Norden her zu uns.

Fig. 45. Schnabel S. 68, 28.

* *C. corone* L. Krähe, Rabenkrähe. Einfarbig schwarz; Schnabel kürzer als der Lauf; $1\frac{1}{2}$′; Zug-, auch Standvogel.

† * *C. corax* L. Kolkrabe. Einfarbig schwarz; Schnabel von der Länge des Laufs, Firste stark gebogen; 2′; Strich- und Standvogel. Wird leicht zahm und lernt sprechen, ist räuberisch und listig; frißt wie die meisten Gattungsverwandten fast Alles, vorzüglich gern Aas, selbst vom Rabenstein (Hochgerichten). Nützt durch Wegfangen der Feldmäuse; schadet dem kleinen Jagdgeflügel. Hauptgegenstand des Augurium der Alten; Rabenfedern zum Zeichnen.

* *C. frugilegus* L. Saatkrähe. Schnabel ebenso, aber nur an der Spitze schräg herabgebogen; schwarz, bläulich und grün schillernd; Federn über der Nasengrube bei Alten abgerieben; $1\frac{1}{2}$′; Zug- und Standvogel.

* **29.** ***Pica caudata*** Briss. Elster, Häkster. Schwarz; Bauch und Schultern weiß; 18″; Standvogel.

* **30.** ***Nucifraga caryocatactes*** L. Tannenhäher. Dunkelbraun, weiß getropft; Schwanz schwarz; 12″; Nordeuropa; Strichvogel.

* **31.** ***Garrulus glandarius*** L. Holzhäher, Markolf. Grauroth; Flügeldeckfedern lasurblau u. schwarz gebändert; 13″; Stand- u. Strichvogel; zerstört Sommers viele Singvögelnester; frißt gern Eicheln (*glandes*) u. Nüsse (Nußhäher).

5. Dünnschnäbler. Hierher die kleinsten Vögel.

* **32.** ***Sitta europaea*** L. Blaufpecht, Spechtmeise. (Fig. 46.) Bläulichgrau, unten rostroth; Augenstreif schwarz; 6″; Standvogel. Klettert ohne Kletterfüße; hängt sich an Zweige wie die Meisen, frißt Eicheln, Buchennüsse, Sämereien, im Sommer Insekten; nistet in hohle Bäume u. verklebt den Eingang bis auf ein rundes Loch mit Thon (daher Kleiber genannt).

Fig. 46. Schnabel S. 68, 32.

* **33.** ***Certhia familiaris*** L. Gemeiner Baumläufer. (Fig. 47.) Grau, weißtropfig; unten weiß; $5\frac{1}{2}$″; Strichvogel; lebt in Obstgärten von Insekten.

34. ***Tichodroma muraria*** L. Mauerfpecht. Aschgrau; Flügeldeckfedern karminroth; Kehle des ♂ schwarz; $6\frac{1}{2}$″; Südeuropa.

Fig. 47. Schnabel S. 68, 33.

* **35.** ***Upupa epops*** L. Gemeiner Wiedehopf. Roströthlich; Hauben- und Schwanzspitze so wie mehre Querbinden der Flügel schwarz; 1′; Zug-

vogel; 3—9; schreiet hup hup hup; ein nützlicher Maden- und Insektenvertilger; im üblen Rufe (Stinkhahn), weil er in hohlen Bäumen brütend den Unrath der Jungen und seinen eigenen im Neste liegen läßt.

36. ***Melithreptus vestiarius.*** Kleidervogel. Nur 5″. Aus den scharlachrothen Federn machen sich die Sandwichs-Insulaner die kostbarsten Federmäntel.

37. ***Trochilus*** L. Kolibri. Zahlreiche, durch Kleinheit und Farbenpracht ausgezeichnete, mit Pflanzenwolle bauende und Insekten fressende Vögel des tropischen Amerika. Die Vogelspinne (§. 108.) ist ihnen nicht gefährlich.

T. colubris Wils. Gemeiner Kolibri. Schnabel gerade; goldgrün; Kehle rubinfeuerfarbig (♂) oder weiß (♀); $3\frac{1}{2}$″.

T. minimus L. Fliegenvogel oder Mückenvogel. Schnabel gerade; goldgrün, unten graulich; 16‴; kleinster Vogel (*T. gigas*, größter K., 7″), nur 20 Gran schwer; Nest von Wallnuß-, Eier von Erbsengröße.

6. Spaltschnäbler. Wahre, durch ihre Nahrung nützliche Luftthiere, unter welchen auch die einzigen Winterschläfer unter den Vögeln (S. 60.).

* 38. ***Hirundo urbica*** L. Hausschwalbe. Läufe und Zehen befiedert; schwarzblau; Bürzel und Unterseite weiß; 5″; Zugvogel; 5—8 bei uns; Nest außerhalb an Gebäuden.

* *H. rustica* L. Rauchsch. Läufe und Zehen nackt; Kehle und Stirn roth; Unterseite weiß; $6\frac{1}{2}$″; Zugvogel; 4—9 bei uns; Nest innerhalb der Gebäude.

* *H. riparia* L. Uferschwalbe. Aschgrau; unten weiß, mit aschgrauem Brustgürtel; 5″; Zugvogel; 5—8; graben sich gesellig mit dem Schnabel Nester in Uferabhänge und Steinbrüche, 10—40′ vom Boden entfernt.

H. esculenta L. Salangane. Braun; Unterseite und Schwanzspitze weiß; $3\frac{1}{2}$″; von Ostindien bis China; bauet in Felsenhöhlen weißliche, hellem Leime ähnliche, gallertartige Nester, die als Leckerbissen (indianische Vogelnester) in Handel kommen (Batavia führt jährlich an 4 Millionen auf den benachbarten Inseln gesammelte Nester aus). Das Nest wird aus Tangarten und Fischlaich, durch zwei große Speicheldrüsen mit Speichel und Magensaft vermischt, gebauet.

* 39. ***Cypselus apus*** L. Mauer- oder Thurmschwalbe. Einfarbig braunschwarz; Kehle weiß; 7″; Zugvogel; 4—8 bei uns. Nest in Löchern an Felsen und Gebäuden, inwendig mit gummiartigem, dem Salanganenneste ähnlichem Leime überzogen. Kann nicht von flacher Erde emporfliegen.

* 40. ***Caprimulgus europaeus*** L. Nachtschwalbe, Ziegenmelker. (Fig. 48.) Asch-grau, rostgelb und weiß gefleckt und punktirt; 11″; bei uns von 4—9; zieht nach Afrika; schon Aristoteles fabelte von ihm, daß er Ziegen die Milch aussöge; nützlich als Insektenvertilger.

Fig. 48. Schnabel §. 68,40.

41. ***Podargus cornutus*** C. Gehörnter Tagschläfer. Mit 2 großen Ohrfederbüschen; $8\frac{1}{2}$″; Java.

42. ***Steatornis caripensis*** Humb. Nachtpapagei. Gesellig in der Höhle Guacharo im Thale Caripe in Südamerika (daher *caripensis*); liefert den Indianern das eßbare Guacharo-Oel.

§. 70. **IV. Ordnung.** *Columbae.* **Tauben.** Schnabelgrund und Nasenklappen weich; Schneiden des Oberkiefers nicht übergreifend; Hinterzehe in gleicher Höhe mit den vordern eingelenkt, diese ohne Bindehäute; Läufe kurz; Flügel lang und spitz; Flug leicht. Trinken saugend, fressen Sämereien und Körner, leben streng monogamisch, brüten abwechselnd, ätzen die anfangs blinden Jungen erst mit einem käseartigen, im Kropfe bereiteten Stoffe (Futterbrei), später mit Körnern. Nützlich durch ihr Fleisch. Der Mist einiger Tauben (**Columbine**) so wie mancher Wasservögel (**Guano** oder indianischer Vogelmist), ist sehr reich an Stickstoff (§. 6.) und deshalb als Düngungsmittel neuerdings ein wichtiger Handelsartikel geworden. Nur eine Familie, als Uebergangsglied zu den Hühnern:

Columbinae. Tauben. Nur eine Gattung mit mehr als 100 Arten. §. 71.

†* *Columba palumbus* L. Ringeltaube. Blaugrau; Flügel am Bug und Vorderrande weiß; $17\frac{1}{2}$''. Bei uns von 3—9; Winters in Afrika; Nahrung: Nadelholz-, vorzüglich Fichtensamen, daher Nadelholz-Aussaaten schädlich.

* *C. oenas* Gm. Holztaube. Blaugrau; Halsseiten grünschillernd; Flügel mit 2 schwarzen Fleckenreihen; 13''; Zugvogel; 3—9 bei uns.

Fig. 49. Holztaube.

* *C. livia* Briss. Wilde Taube, Feldflüchter, Haustaube. Ebenso, aber Unterrücken weiß und Flügel mit 2 durchgehenden schwarzen Querbinden; 12''; in Südeuropa an felsigen Seeküsten noch wild, bei uns Hausthier in mehr als 100 Spielarten (Brieftaube, S. 57.); bis zum Nordcap verbreitet; nützlich durch ihr Fleisch und ihren Dünger, schädlich auf Feldern durch ihre Nahrung.

* *C. turtur* L. Turteltaube. Rostfarbig; Halsseiten mit einem Flecke von schwarzen Federn mit weißen Spitzen; Flügeldeckfedern schwarz, rostroth gerandet; $10\frac{1}{2}$''; Zugvogel; 4—9; häufig als Hausthier. Sie girren: turtur, turtur; gelten als Bild der Zärtlichkeit.

† *C. migratoria* L. Wandertaube. Durchziehen zu Millionen die vereinigten Staaten, verwüsten alle Saaten, werden dann in Menge an ihren Ruheplätzen getödtet (jährlich zu 100,000) und zum Verkauf zu Markte gefahren. Wilson schätzt die Anzahl eines Zuges, den er in der Nähe von Indiana gesehen hat, auf 2000 Millionen u. Audubon erzählt, daß er den Mist an ihren Ruheplätzen wie Schneeflocken herabfallen u. den Boden mehre Zoll hoch damit bedeckt gesehen habe.

II. *Aves terrēstres.* Erdvögel. §. 72.

Fliegen schlecht und mit angezogenen Beinen wie die Luftvögel oder können gar nicht fliegen. Flügel kurz abgerundet; Gang- oder Wadbeine stark; Zehen 2—4, Hinterzehe oft fehlend oder schwach und höher eingelenkt; Krallen fast immer kurz, stumpf; Füße oft mit Schwimmhäuten; Kippel (S. 62.). Meist vegetabilische Nahrung. II Ordnungen.

V. Ordnung. *Gallīnae.* **Hühner.** §. 73. Schnabelgrund und Nasenklappen hart; Schneiden des Oberkiefers übergreifend; Hinterzehe höher eingelenkt als die vordern, diese mit Bindehäuten; Gangbeine; Läufe lang, stark; Flügel kurz; Flug schwerfällig; am Kopfe oft nackte Hautstellen. Trinken schöpfend, fressen meist Körner, selten Insekten, welche sie ausscharren (Scharrer); leben meist polygamisch, nur das ♀ brütet; laufen schrittweise und fliegen selten. Meist Standvögel; viele Hausthiere; die nützlichsten Vögel durch Eier und Fleisch. — 2 Familien:

1) Gallinacĕae. Hühner. Hinterzehe berührt den Boden; Schnabel kurz, dick; Flügel muldenförmig ausgehöhlt; Schwanz groß.

- Kopf ohne fleischige Auswüchse
  - Kopf ohne nackte Hautstellen; ♂ ohne Sporn; monogamisch: Feldhühner
    - Wachshaut und Läufe befiedert; Zehen nackt; Schwanz abgerundet oder gegabelt — Waldhuhn . . . . . 1) *Tetrão* L.
    - Wachshaut, Läufe und Zehen unbefiedert — Feldhuhn . . . . . 2) *Perdix* Briss.
  - Kopf mit nackten Hautstellen; ♂ mit Sporn; polygamisch: Fasanen
    - Gefieder mit Augenflecken; Kopf mit Federbusche
      - ♂ mit verlängerten Bürzelfedern; 1 Sporn — Pfau . . . . . 3) *Pavo* L.
      - ♂ mit verläng. Schwanzfedern; 2—3 Sporen 4) *Polyplectron* Tem.
    - Gefieder ohne Augenflecken; Schwanz mit sich dachig deckenden Federn — Fasan . . . . . 5) *Phasianus* L.
- Kopf mit fleischigen Auswüchsen; polygamisch: Hühner.
  - Kopf und Oberhals nackt
    - Stirn und Kehle mit Fleischzapfen — Truthahn . . . . . 6) *Meleagris* L.
    - Scheitel mit schwieligem Helme; Oberkiefer mit 2 Hautlappen — Perlhuhn . . . . . 7) *Numida* L.
  - Kopf und Hals befiedert; Scheitel mit vertikalem Hautkamme; Unterkiefer mit 2 Hautlappen — Huhn . . . . 8) *Gallus* L.

2) Crypturĭdae. Steißhühner, Halbhühner.

Hinterzehe fehlt oder berührt den Boden nicht; Schnabel dünn, fast von **Kopflänge**; Schwanz fehlend oder unter Bürzelfedern versteckt. Einsam von Sämereien und Insekten lebende süd- und außereuropäische Vögel, welche gleich unsern Rebhühnern gejagt und gegessen werden.

Cryptūrus rufescens Tem. Großes Rebhuhn. 15½″; Brasilien.
Hemipodĭus andalusĭcus L. Wachtelhuhn. Spanien.

§. 74. †* **1.** ***Tetrão urogăllus*** L. Auerhahn. Schwanz abgerundet; Schnabel blaßgelb, mit einem Barte; Flügel ohne Weiß; ♂ 3′, ♀ 2′; unzähmbarer Standvogel; am Harze; balzt im März; frißt vorzüglich gern junge Fichtensprossen und ist deshalb schädlich, aber nützlich durch sein zähes Fleisch, für Reiche eine Delicatesse. Das Auerwild gehört zur hohen Jagd.

* *T. tetrix* L. Birkhahn. Schwanz gegabelt; Schnabel schwarz, ohne Bart; Flügel mit weißer Doppelbinde; fast 2′, ♀ kleiner; Standvogel; in Birkenwäldern mit Sandboden; schaden durch Abbeißen der Baumknospen; nützen durch Insektenvertilgung und ihr zartes Fleisch.

* *T. bonasia* L. Haselhuhn. Schwanz abgerundet, vor dem weißen Endsaume mit schwarzem Querbande; eine Kopfhaube; Gefieder rostfarbig, schwarzbraun und weiß gefleckt; Kehle des ♂ schwarz; 15″, ♀ etwas kleiner; Standvogel in Wäldern Nordeuropas; delicates Wildpret (*bona assa*, guter Braten).

T. cupido Gm. Heidenhuhn oder Cupidohuhn. Nackte, citronartige Hautbeutel an den Halsseiten des ♂. Amerika's dürre Ebenen (Heiden).

* **2.** ***Perdix dactylisŏnans*** M. Wachtel. Braun mit gelbweißen Schaftstrichen; unten weiß ins Röthliche; über Augen u. Scheitel ein gelbweißer Streif; Kehle des ♂ schwarz; 7″. Einziger Zugvogel dieser Familie; bei uns von 5—8; viele überwintern schon in Italien; nützen durch Fleisch u. Schlag (Wachtelschlag).

* *P. cinerĕa* Briss. Gemeines Rebhuhn. Hellaschgrau, fein schwarz gewellt; Flügel mit weißen Längsflecken; Bauch des ♂ mit braunem Hufeisenflecke; 12″; Standvogel; familienweise (Volk, Kette) auf Feldern (Feldhühner), u. des Fleisches wegen von Hühnerhunden gejagt; vertilgen Gewürm u. Insekten.

* **3.** ***Pavo cristātus*** L. Gemeiner Pfau. Federbusch mit dünnschäftigen, nur an der Spitze ästigen Federn; 4½″; schreit pāo. Seit Alexander d. Gr. aus Indien eingeführt; in der Krimm verwildert.

4. ***Polyplectron bicalcarātum*** Tem. Pfauenfasan mit 2 Sporen. Federbusch mit dichten Federn; Lauf mit 2 Sporen; über 2′; China.

* **5.** ***Phasiānus colchĭcus*** L. Gemeiner Fasan. Rothbraun; Hals und Kopf grün; Oberrücken und Schulterfedern mit scharf abgesetzten, breiten Schaftflecken; 2½—3′; am Caucasus; bei uns wegen des geschätzten Fleisches domesticirt; soll durch die Argonauten vom Flusse Phasis aus Colchis mitgebracht sein.

Ph. pictus L. Gold-F. Federbusch goldgelb; Brust scharlachroth; $2\frac{1}{2}'$; China; Federn zum Putze theuer; Phönix des Plinius. Der Silber-F. ist weiß, mit feinen, schwarzen Wellenlinien; Bauch und Federbusch schwarz.

* 6. ***Meleāgris gallopāvo*** L. Puter, Truthahn, Calcuttischer Hahn. Brust des ♂ mit einem Büschel pferdehaarähnlicher Federschäfte; 4'; Nordamerika, nicht Calcutta; seit 1542 als Hausthier in ganz Europa. Dumm, zänkisch; rothe Gegenstände und scharfes Pfeifen bringen ihn zum Kullern. Fleisch sehr schmackhaft.

* 7. ***Numĭda meleāgris*** L. Perlhuhn, numidische Henne. Bläulich grau, mit weißen, dunkel begrenzten Perlflecken; 2'; Südafrika; in Amerika verwildert; bei uns des schmackhaften Fleisches wegen auf Hühnerhöfen.

* 8. ***Gallus domesticus*** L. Haushahn. Mit dachig zusammengelegtem, meist aufrechtem Schwanze, welcher beim ♂ 2 sichelförmig gebogene Federn hat. Stammt vom Bankiva-Hahn (***Gallus Bankīva***) aus Java ab; ist in den an Größe, Färbung und Körperbildung verschiedensten Spielarten (in Virginien ohne Schwanzfedern) über die ganze Erde (durch Spanier nach Amerika) als das nützlichste Hoffedervieh (an 150 Eier; zartes Fleisch) verbreitet. Kastrirte Hähne (Kapaunen); kastrirte Hennen (Poularden). Hahnengefechte der Engländer. Brutöfen der Aegypter.

VI. Ordnung. *Cursōres.* Laufvögel. §. 75.

Flügel ohne steife Schwingen, daher zum Fliegen untauglich; Beine stark, zum geschickten Laufen; Füße 2—4zehig. Die größten, in Ebenen von Pflanzenstoffen lebenden Vögel. — 2 Familien:

Beine lang, 2—3zehig: **1. Struthionidae, Strauße.**	Beine 2zehig, nackt; Kopf u. Hals mit Borstenfedern — Strauß	1) *Struthĭo* L.
	Beine 3zehig: Schenkel, Kopf und Hals befiedert — Nandu	2) *Rhea* Briss.
	Beine 3zehig: Schenkel, Kopf u. Hals nackt; Scheitel mit hornigem Helme — Kasuar	3) *Casuarĭus* Briss.
Beine kurz, 4zehig: **2. Inepti, Dronten.**	Schnabel dick, mit gebogener Kuppe — Dronte	4) *Didus* L.
	Schnabel dünn und mit Wachshaut wie bei Schnepfen — Waldstrauß	5) *Aptĕryx.*

1. ***Struthĭo camēlus*** L. Afrikanischer Strauß. Schwarz; Flügel- und Schwanzfedern weiß (♂) oder grau (♀); größter Vogel, 6—8'; heerdenweise in Sandwüsten Afrikas und Südasiens. Legen und brüten gemeinschaftlich; am Vorgebirge der guten Hoffnung brüten sie Tag und Nacht, am Senegal, wo das Klima heißer ist, brüten sie nur des Nachts und überlassen am Tage die Eier der Sonnenhitze. Die 3 Pfund schweren Eier eßbar; Schalen zu Gefäßen; die krausen Flügel- u. Bürzelfedern als Putz an Hüte. Urinirt (§. 62, 5). §. 76.

2. ***Rhea americāna*** L. Amerikanischer Str. Grau; ♂ mit schwarzem Scheitel und Unterhalse; 6'; gesellig in Südamerika; Federn zu Fliegenwedeln.

3. ***Casuarĭus indĭcus*** Briss. Indischer Kasuar. Schwarz; Federn doppelschäftig, borstig zerschlitzt; Hals blau; Kehllappen roth; 6'. Ostindien.

4. ***Didus ineptus*** L. Dronte, Dudu. Grau, mit gelben Flügel- und Schwanzfedern; über 2'; auf Madagascar und Isle de France 1598 in großen Gesellschaften zusammen entdeckt, seit 1750 ausgerottet; nur noch 1—2 Füße und 1—2 Köpfe davon vorhanden. Die 1830 auf Bourbon aufgefundenen und dem Dudu zugeschriebenen Knochen stammen von einem andern ebenfalls ausgerotteten Vogel, dem Solitaire (***Didus solitarĭus***).

5. ***Aptĕryx australis*** Tem. Kiwi (nach seinem Geschrei). Nur schlaffe Borstenfedern und weder Flügel- noch Schwanzfedern; Nasenlöcher nur bei diesem Vogel durch den ganzen Schnabel hindurch bis zur Spitze desselben gehend; Knochen nicht pneumatisch (§. 60, 2); $2\frac{1}{2}'$; Neuseeland; nächtlicher, von Insekten und Würmern lebender, erst seit 1812 bekannter, sehr seltner und dem Erlöschen naher Vogel.

§. 77. III. *Aves aquaticae.* Wasservögel.

Fliegen sehr geschickt mit nach hinten gestreckten Beinen; Hals lang, dünn; Schnabel meist mit Wachshaut. Lieben ihrer Nahrung wegen die Nähe des Wassers, waden in demselben (Wadbeine §. 61 a.) oder schwimmen auf demselben (Schwimmfüße). Pippel (§. 63.). II Ordnungen:

§. 78. VII. Ordnung. *Grallae.* Sumpfvögel oder Wadvögel.

Beine meist länger als der Rumpf, in der Mitte des Körpers eingelenkt u. nur bis auf die Mitte des meist aus dem Rumpfe hervortretenden Schienbeins befiedert (Wadbeine); Zehen selten mit Schwimmhäuten und dann wegen der Länge des Laufes zum Schwimmen untauglich; Schnabel verschieden, meist lang, immer mit Wachshaut; Schwanz kurz. Monogamische, meist große, in allen Zonen in Sumpfgegenden, meist von Wasserthieren lebende Vögel. — 5 Familien (Uebersicht §. 63 b.):

I. Schnabel kürzer oder höchstens etwas länger als der Kopf, nie kahnförmig.

- Schnabel nicht abgeschnürt, hart, nach der Stirn zu allmählig breiter
  - Zehen m. keinen oder schwachen Bindehäuten; Hühnerschnabel (Kuppe gewölbt, Oberkiefer übergreifend): **1. Alectorídes, Hühnerstelzen.**
    - Füße 3zehig; Schnabel und Beine kurz und dick — Trappe . . . . . 1) *Otis* L.
    - Füße 4zehig
      - Zehen sehr lang; Handgelenk des Flügels mit 2 Sporen — Wehrvogel . . . . . 2) *Palamedéa* L.
      - Zehen gewöhnlich
        - Kopf und Hals befiedert — Trompeter . . . . . 3) *Psophía* L.
        - Kopf mit nackten Stellen — Kranich (Fig. 50.) . . 4) *Grus* Pall.
  - Zehen mit Hautlappen oder schmalen Hautsäumen; Schnabel gerade, seitlich zusammengedrückt: **2. Fulicárine oder Rallídae, Wasser- od. Sumpfhühner.**
    - Stirn mit kahler Platte
      - Zehen mit Fiederlappen (Fig. 27) — Wasserhuhn (Fig. 51.) 5) *Fulica* L.
      - Zehen nur mit schmalem Hautsaume — Rohrhuhn . . 6) *Gallinúla* Briss.
    - Stirn ganz befiedert
      - Schnabel gerade
        - etwas länger als der Kopf; Flügel länger als der Schwanz — Ralle . . . . 7) *Rallus* L.
        - kürzer als der Kopf; Flügel kürzer als der Schwanz — Sumpfhuhn . 8) *Ortygométra* L.
      - Schnabel etwas gebogen
        - kürzer als der Kopf; Hinterzehe von ¼ Lauflänge — — Schnarrer . . 9) *Crex* Bech.
        - etwas länger als der Kopf; Zehen und deren Nägel sehr lang — Spornflügler . . . . 10) *Parra* L.
- Schnabel vom Kopfe abgeschnürt, schlank, am Grunde weich; Stirn kugelig gewölbt: **3. Charadriádae, Regenpfeifer.**
  - Füße 3zehig; Schnabel gerade — — Regenpfeifer . . . . . 11) *Charadrius* L.
  - Füße 4zehig
    - Schnabel kürzer als der Kopf, unten vor der Spitze mit einem Höcker — Kiebitz . . . . . 12) *Vanéllus* Briss.
    - Schnabel von Kopflänge, ohne Höcker; ♂ zur Paarungszeit mit Federkragen — Kampfhahn . . . . . 13) *Machétes* C.

II. Schnabel immer länger, meist 2—3mal so lang als der Kopf oder kürzer und dann kahnförmig.

- Schnabel vom Kopfe abgeschnürt, dünn, an der Wurzel weich und biegsam: **4. Scolopacidae, Schnepfen.**
  - Füße 4zehig
    - Stirn nach d. Spitze hin verschmälert; Schnabel mit Tastapparat (§ 61,5)
      - gerade; Zehen getrennt — Schnepfe (Fig 52.) . . 14) *Scolŏpax* L.
      - in der Endhälfte bogig abwärts gekrümmt; Zehen am Grunde geheftet — Brachvogel . . 15) *Numenius* Briss.
    - Stirn kugelig gewölbt; Schnabel ohne T.
      - an d. Spitze schwach abwärts gekrümmt — Wasserläufer od. Strandläufer (*Tringa* L.) . . . . . 16) *Totānus* Briss.
      - in d. Höhe gekrümmt — Säbler . . . 17) *Recurvirŏstra* L.
  - Füße 3zehig; Stirn kuglig gewölbt
    - Schnabel länger als der Lauf; Beine kurz, kräftig — Austerfischer . . . . . 18) *Haematŏpus* L.
    - Sch. kürzer als der Lauf; Beine sehr lang und dünn (Fig 21.) — Strandreuter . . . . . 19) *Himantŏpus* Briss.
- Schnabel nicht abgeschnürt, sondern so hoch u. breit als der Schädel, an der Wurzel hart; Hals u. Beine lang und dünn: **5. Ardeadeae, Reiher.**
  - Schnbl kahnförmig
    - in der Mitte geknickt; ganze Schwimmhäute — Flamingo . . . . . 20) *Phoenicopterus* L.
    - in der Mitte nicht geknickt; Zehen frei — Kahnschnabel. . 21) *Cancrŏma* L.
  - Schn. platt, spatelförmig (vorn doppelt breiter); halbe Schwimmhäute — Löffelreiher . . . . . 22) *Platalea* L.
  - Schnbl weder kahn-, noch spatelförmig
    - gebogen
      - Schnabel schwach abwärts gebogen; ohne Nasenfurche — Nimmersatt 23) *Tantălus* L.
      - Sch. stark abwärts gebogen; Nasenfurche bis zur Spitze — Ibis . 24) *Ibis* C.
    - gerade
      - Läufe überall mit netzartiger Haut — Storch (Fig. 53.) 25) *Ciconia* Bech.
      - L. hinten mit netzartiger, vorn mit getäfelter Haut — Reiher . . . . . 26) *Ardea* L.

1. Hühnerstelzen. In sumpfigen Gegenden oder trockenen Ebenen. §. 79.

* 1. ***Otis tarda*** L. Große Trappe. Kopf und Hals grau; Mantel rostfarbig, schwarz gewellt; Flügel mit weißer Querbinde; ♂ mit Schnurrborsten (§. 60,3); $3\frac{1}{2}$'; schwerster Vogel Deutschlands; 1845 im Winter hier häufig; gesellig und scheu. Fleisch wohlschmeckend.

2. ***Palamedea cornuta*** L. Kamichi. Schwärzlich, mit rostrothem Schulterflecke; Scheitel mit 3" langem, dünnem Horne; $2\frac{1}{2}$'; Südamerikas Ebenen.

3. ***Psophia crepitans*** L. Trompetenvogel. Schwarz-violett; Schultern rostroth; 20"; gesellig in Südamerikas Wäldern. Lassen durch eigenthümlichen Bau der Luftröhre tiefe Baßtöne hören.

* 4. ***Grus cinerea*** Bech. Gemeiner Kranich. Aschgrau; Kopf mit nacktem, beim ♂ rothem Scheitel; Bürzelfedern kraus; 4'; Europa und Nordafrika; fliegen in keilförmigen Reihen im October und November südlich und kehren im März u. April zurück. Schaden durch Abfressen der Aussaat auf frisch besäeten Aeckern, wenn sie sich in Menge niederlassen; nützen aber durch Vertilgung schädlicher Thiere (Insekten, Würmer, Mäuse).



Fig. 50. Kopf des Kranichs. Schnabel §. 78,4.

§. 79. **2. Wasserhühner.** Geschickte Taucher und Schwimmer, an und auf Gewässern lebend.

* 5. ***Fulica atra*** L. Bläß-Huhn, Bläßse. Schieferschwarz, jung olivenbraun; Stirn weiß; 16″; nützlicher, häufiger Zugvogel; 3—11 bei uns; reinigt die Teiche von Insekten, Wasserlinsen und Wasserfäden.

Fig. 51. Kopf des Bläß-Huhns. Schnabel §. 78, 5.

* 6. ***Gallinula chloropus*** L. Grünfüßiges Rohrhuhn. Olivenbraun; Unterseite, Kopf und Hals grau; Stirn roth; Beine gelblichgrün; 12″; häufiger Zugvogel; 3—9 bei uns; Nahrung und Nutzen des Bläß-Huhns.

* 7. ***Rallus aquaticus*** L. Wasserralle. Olivenbraun, schwarz gefleckt; Seiten des Unterleibes schwarz und weiß gebändert; Schwanz unten weiß; Schnabel und Beine röthlich; 9″; nützlicher Zug-, auch Standvogel; Fleisch wohlschmeckend; Nahrung des Bläß-Huhns.

* 8. ***Ortygometra porzana*** L. Punktirtes Sumpfhuhn. Olivenbraun; weiß punktirt; Brust aschgrau; Schnabelwurzel roth; 8½″; nützlicher Zugvogel; 4—9 bei uns.

* *O. pusilla* L. Kleines Sumpfhuhn. Olivenbraun; Hals, Bauch u. Brust hellgrau; Beine und Schnabel grün; 7″; nützlicher Zugvogel; 5—9 bei uns.

* 9. ***Crex pratensis*** Bech. Wiesenknarre, Wachtelkönig. Schwarzbraun, mit braungelb gerandeten Federn; Schwingen braunroth; 10″; nützlicher Zugvogel; 5—9 bei uns; trifft mit den ihm ähnlichen Wachteln auf dem Zuge oft zusammen; lebt auf Wiesen und frißt Insekten, Larven, Schnecken und Würmer; schreiet arp-scharp, kraep-kraep, oder aerrp-aerrp.

10. ***Parra jacana*** L. Chirurg, Jassana. Ein scharfer Sporn am Flügelbug; schwarz; Mantel kastanienbraun; 10″; häufig im tropischen Amerika auf schwimmenden Wasserpflanzen nach Insekten umherlaufend. Fleisch schmackhaft.

3. Regenpfeifer. Geschickte Läufer und Flieger; an Gewässern von Insekten und Würmern lebend.

* 11. ***Charadrius pluvialis*** L. Gold-Regenpfeifer, Tüte. Oben schwärzlich, grüngelb gefleckt; Sommers unten ganz schwarz, Winters gelblich; Deckfedern unter den Flügeln weiß; 10—11″; Zugvogel; lebt wie die übrigen Arten im Norden; zieht 9—11 nach Südeuropa, kehrt 3—4 zurück (Wintervogel); frißt Insektenlarven und Regenwürmer. Hat wohlschmeckendes Fleisch.

* *Ch. hiaticula* L. Halsband-R. Graubraun, unten weiß; Stirn und Hals mit weißem und schwarzem Bande; 6″; Zugvogel; 8—10 und 4 bei uns.

* 12. ***Vanellus cristatus*** M. et W. Kiebitz. Dunkelgrün ins Purpurne; Hals und Federbusch schwarz; Bauch weiß; Bürzel roth; 13″; Zugvogel; 3—9 bei uns; brütet auf sumpfigen Wiesen; schreit kibit. Eier Leckerbissen.

13. ***Machetes (Tringa) pugnax*** L. Kampfhahn. Gefieder sehr veränderlich; Männchen während der Paarungszeit mit einem Halskragen; sehr streitsüchtig; 8—11″. An feuchten Küsten Nordeuropas; Winters im Süden.

4. Schnepfen. An Gewässern von Insekten und Würmern lebende Zugvögel des Nordens; streichen in Wäldern u. sumpfigen Ebenen Morgens u. Abends umher; ziehen Winters südlich. Schnepfenstrich. Fleisch und Schnepfendreck (meist Eingeweidewürmer §. 218.) geschätzt als Leckerbissen.

Fig. 52. Kopf der Moorschnepfe. Schnabel §. 78, 14.

* **14.** ***Scolŏpax*** L. Schnepfe. Zugvögel; 5 Europäer. §. 79.

- Schnabel mit gerundeter Spitze: Waldschnepfen: Scheitel und Stirn aschgrau; Hinterkopf mit rostgelben Querbinden; Schwingen mit 3eckigen, gelben Randflecken; 14″; bei uns 3 und 9—11. — Waldschnepfe . . . . . * *Sc. rusticŏla* L.
- Schnabel mit flachgedrückter Spitze: Bekassinen
  - Scheitel schwarzbraun, mit hellem Längsstreife
    - Flügeldeckfedern m. weißem, am Schafte nicht unterbrochenem Spitzenflecke; 16 Schwanzfedern; 10″; bei uns 4. 5 und 8. 9. — Mittel-, Moor- oder Doppelschnepfe (Fig. 52.) . * *Sc. major* L.
    - Flügeldeckfedern mit rostgelblichem, am Schafte unterbrochenem Spitzenflecke; 14 Schwanzfedern; 9″; bei uns 3. 4 u. 8—10. — Heerschnepfe, Bekassine . . . . . * *Sc. gallinăgo* L.
  - Scheitel schwarzbraun, ohne hellen Mittelstreif; Mantel mit 2 rostgelben Längsbinden; Unterleibsmitte weiß; 12 Schwanzfedern; 7″; bei uns 3—5 u. 8. 9. — Kleine Bekassine . . . . . * *Sc. gallinŭla* L.

* **15.** ***Numenĭus arquātus*** L. Doppelschnepfe, Keilhaken. Scheitel rostgelb, schwarzbraun gefleckt; Unterkiefer seitlich weiter befiedert als beim Oberkiefer, bis unter die Nasenlöcher; 2′; Zugvogel; 4. 5. u. 8. 9. Fleisch geschätzt.

* **16.** ***Totănus hypoleucos*** L. Trillernder Uferläufer. Olivengrün, schwärzlich gewellt, unten weiß; 7″; Zugvogel; 4. 5 und 8. 9 bei uns.

17. ***Recurvirŏstra avocētta*** L. Gemeiner Säbler. Weiß; Kopf und Mantel theilweise schwarz; 15″; an der Nord- und Ostsee.

18. ***Haematŏpus ostrealĕgus*** L. Austernbieb. Schwärzlich; Bauch, Schwanzwurzel und Flügelbinde weiß; Beine und Schnabel roth; $15\frac{1}{2}$″; Sommers im Norden, Winters im Süden Europas.

19. ***Himantŏpus rufĭpes*** Bech. Schwarzflügliger Strandreuter. Weiß; Nacken und Mantel schwarz; Beine roth, 7—8″ lang (Fig. 21.); Schnabel schwarz; 14″; Vaterland wie vorher.

5. Reiher. Große Sumpfvögel, welche im Wasser waten, aber nicht schwimmen. Leben von Fischen, Amphibien und kleinen Wasserthieren.

20. ***Phoenicoptĕrus ruber*** L. Gemeiner Flammingo. Rosenroth; Schwingen schwarz; Beine roth; 4—5′; ums Mittelmeer, zuweilen am Rheine; fischt mit nach unten gedrehetem Oberschnabel Mollusken und Seegewürm; brütet auf dem hohen Schlammneste reitend. Die Zunge den alten Römern ein Leckerbissen.

21. ***Cancrōma cochlearĭa*** L. Löffelreiher. Weißlich; Rücken grau; Bauch rostroth; Scheitel, Federbusch des alten ♂, Schnabel und Beine schwarz; 20″; Brasilien; lebt von Fischen.

22. ***Platalĕa leucorodĭa*** L. Weißer Löffelreiher. Weiß; Hinterkopf mit einem Federbusche; $2\frac{1}{2}$′; Südeuropa. Schnabel zu Messerscheiden.

23. ***Tantălus ibis*** L. Afrikanischer Nimmersatt. Weiß; Schwanz und Schwingen schwarz; Schnabel gelb; Beine roth; $3\frac{1}{2}$′; Nordost-Afrika. Lange fälschlich für den ächten oder geheiligten Ibis gehalten.

24. ***Ibis religiōsa*** C. Geheiligter Ibis. Weißlich; Kopf, Hals, Beine u. Schnabel schwärzlich; 2′; Afrika; von Aegyptern früher in Tempeln aufgezogen und dann einbalsamirt. Sein Erscheinen kündigt das Steigen des Nils an.

* **25.** ***Ciconĭa alba*** Bech. Weißer Storch. Kopf u. Hals befiedert; weiß; Schwanz u. Schwingen schwarz; Beine u. Schnabel roth; $3\frac{1}{2}$′; Europa, Afrika; Zugvogel: 3—7. Klappern mit dem Schnabel (Klapperstorch); fressen Frösche, nackte Schnecken u. Regenwürmer, Mäuse u. Insekten, aber auch kleines Geflügel; nisten auf Häusern und Bäumen, wenden aber weder Blitz noch Feuersgefahr von Häusern ab.

* ***C. nigra*** L. Schwarzer Storch. Ebenso, aber Gefieder schwarzbraun; Unterseite weiß; 3′; Osteuropa und Deutschland; Zugvogel; 3, 4—8 bei uns; klappert, nistet auf Bäumen; schadet vorzüglich der Fischbrut und dem Jagdgeflügel.

Fig. 53. Kopf des schwarzen Storchs. Schnabel §. 78, 25.

C. marăbu Tem. Marabu. Kopf und Hals nackt; 6—7′; Indien; berühmt wegen der Steißfedern (Marabufedern), die ihrer Kostbarkeit wegen nur von sehr reichen Damen als Putz getragen werden.

†* 26. *Ardĕa cinerĕa* L. Gemeiner Reiher, Fischreiher. Bläulich aschgrau, unten weiß, Vorderhals reihenfleckig schwarz; Hinterkopf mit schwärzlichem Federbusche; 3′; ganz Europa, in Sumpfgegenden; Zugvogel; 4—9 u. 10 bei uns; schadet durch seine Fischnahrung; spritzt den Unrath weit von sich; wurde früher mit Falken gebeizt (Reiherbeize). Colonien von 15—100 Nestern nennt man einen Reiherstand. Kopffedern ein Putzartikel.

* *A. stellāris* L. Gemeiner Rohrdommel. Ochergelb, schwarzbraun marmorirt; Schwingen schiefergrau, rostgelb bandirt; Hals mit abstehenden Federn; $2^1/_2$′; ganz Europa, an fischreichen Sumpfstellen; Zugvogel; 3, 4—9, 10; brüllt Nachts: ü prumb (Moorochse); steckt aber den Schnabel dabei nicht ins Wasser; Nahrung der Störche; vertilgt auch Fische und Fischbrut, lebt aber einzelner als der Fischreiher.

§. 80. **VIII. Ordnung.** *Palmipĕdes* od. *Natatōres.* **Schwimmvögel.** Beine kürzer als der Rumpf, außerhalb der Körpermitte, nach hinten gerückt, fast bis ans Hackengelenk befiedert; Schienbein im Rumpfe versteckt; Zehen mit Schwimmhäuten oder Hautlappen; Schnabel verschieden, meist mit Wachshaut; Hals immer länger als die Beine; Steiß mit großer Fettdrüse (§. 60.). Auf oder am Wasser lebende, gute Schwimmer. Tauchen schwimmend den ganzen Körper unter (Schwimmtaucher) oder stürzen aus der Luft herab ins Wasser (Stoßtaucher) oder tauchen mit dem Vorderkörper während der Hinterkörper senkrecht über dem Wasser bleibt (sie gründeln). Fast über die ganze Erde verbreitet; durch Eier, Fleisch und Federn nützlich. — 6 Familien (Uebersicht §. 63b. VIII.):

§. 81. **A. Kiefern am Innenrande mit Querlamellen** (Fig. 55.).

1) Anatĭdae. Enten. Schnabel kaum länger als der Kopf, am Ende mit stumpfem Nagel; Hinterzehe frei.

- Hinterzehe ohne Hautsaum: schwimmende Enten
  - Schnabel an der Wurzel höher als breit
    - nach vorn breiter; Nagel von halber Kinnladenbreite (Fig. 54b.); Lauf kürzer als die Mittelzehe; Hals sehr lang — Schwan . . . . . 1) *Cygnus* Bech.
    - nach vorn etwas schmäler; Nagel von Kinnladenbreite (Fig. 54a.); Lauf länger als die Mittelzehe; Hals kürzer — Gans . . . . . 2) *Anser* Briss.
  - Schnabel an der Wurzel breiter als hoch, gleichbreit oder vorn etwas breiter; Nagel sehr schmal; Lauf nicht länger — Ente (Fig. 55) . . . . . 3) *Anas* L.
- Hinterzehe mit breitem, herabhangendem Saume: tauchende Enten
  - Mit 2 nackten Stirnschwielen; Schnabel am Grunde höher; Nagel von Kinnladenbreite — Eiderente 4) *Somateria* Leach.
  - Ohne Stirnschwielen
    - Schnabel am Grunde breiter; Nagel schmäler als die Kinnlade — Moorente . . . . . 5) *Fuligŭla* Leach.
    - Schnabel fast walzig, beide Kinnladenränder lang gezähnt — Sägetaucher (Fig. 56.) . . . . . 6) *Mergus* L.

B. Kiefern ohne Querlamellen; Ruderfüße (§. 61., Fig. 29).

2) Pelecanĭdae. Pelekane oder **Ruderfüßer.** Schnabel meist länger als der Kopf, mit spitzem Nagel am Ende; Nasenlöcher nur schmale Spalten.

- Nagel des Oberkiefers herabgekrümmt
  - Kiefernrand ungekerbt
    - Kehle und Läufe befiedert; Schwz gabelig, sehr lang — Fregattenvogel 7) *Tachypĕtes* Jll.
    - Kehle und Läufe nackt; ein Kehlsack
      - Kehlsack klein; Schwz abgerundet, lang — Scharbe . . . . . 8) *Carbo* M.
      - Kehlsack groß; Schwz abgerundet, kurz — Kropfgans . . . . . 9) *Pelecānus* L.
  - Kiefernrand gekerbt
    - Schwanz keilförmig zugespitzt; Gesicht u. Gurgel nackt — Tölpel . . . . . 10) *Sula* Briss.
    - Schwanz kurz, mit 2 sehr langen Federn; Kopf ganz befiedert — Tropikvogel 11) *Phaëton* L.

C. Kiefern ohne Querlamellen; keine Ruderfüße; Flügel und Schwanz lang.

3) Procellarĭae. Sturmvögel oder Röhrennasen.

Schnabel verschieden, aber immer am Ende mit einem Haken und mit in **vorstehende Röhren** sich öffnenden Nasenlöchern (Fig. 57.).

- 4 Zehen; Schnabel von Kopflänge; Nasenlöcher oben in eine Röhre vereinigt — Sturmvogel (Fig. 57.) . . . . . 12) *Procellaria* L.
- 3 Zehen; Schnabel über Kopflänge; Nasenlöcher in einer Furche seitlich an der Schnabelwurzel — Albatroß . . . . . 13) *Diomedea* L.

4) Larĭdae. Möven, Seeschwalben.

Schnabel verschieden, stark seitlich zusammengedrückt; Nasenlöcher sich seitlich in **freistehenden Nasengruben** öffnend (Fig. 58.).

- Schwanz abgestutzt; Oberkiefer hakig herabgebogen — Möve (Fig. 58.) 14) *Larus* L.
- Schwanz gabelig:
  - Kiefern gleichlang; Oberkiefer längs der Firste schwach gebogen — Seeschwalbe . . . . . 15) *Sterna* L.
  - Oberkiefer weit kürzer und niedriger als der untere — Scheerenschnabel . . . . . 16) *Rhynchops* L.

5) Colymbĭdae. Taucher.

Hinterzehe mit breit herabhangendem Saume; Schnabel gerade.

- Ganze Schwimmfüße; Schwanz kurz — Seetaucher . . . . . 17) *Colymbus* L.
- Lappenfüße (§. 61.); Schwanz fehlend — Steißfuß . . . . . 18) *Podiceps.*

6) Alcĭdae. Alken.

Hinterzehe fehlend oder frei nach vorn gerichtet; Schnabel gerade oder gewölbt.

- 3 Zehen; Flügel mit wahren Federn:
  - Schnabel mit starkgewölbter Spitze, seitlich stark zusgedrückt, über 4 mal höher als breit und mit Querfurchen — Alk (Fig. 59.) . . . . . 19) *Alca* L.
  - Schnabel pfriemlich zugespitzt; seitlich stark zusammengedrückt, aber ohne Querfurchen — Lumme . . . 20) *Uria* Briss.
- 4 Zehen, die hintere nach vorn gerichtet; Flügelfedern gefranzten Hornschuppen ähnlich; Schnabel gerade, ziemlich rund; Beine ganz am Steiße — Pinguin . . . . . 21) *Aptenodytes.*

1. Enten. Leben in allen Zonen von Würmern und Vegetabilien. §. 82.

* **1. *Cygnus musĭcus* Bech.** Singschwan. Weiß, gelbschwarzschnäblig; Schnabelwurzel ohne Höcker; 4½′; gesellig an den Nord- und Ostseeküsten; zieht Winters südlich bis zum Mittelmeere und läßt dabei hoch in der Luft angenehme Töne hören, doch gehört der sogenannte Schwanengesang zu den Fabeln; frißt wie die übrigen Arten Wasserpflanzen und kleine Wasserthiere, schwimmt gut, taucht nie, geht schlecht, gründelt. Die Dunen ein bedeutender Handelsartikel; die mit den Federn gar gemachte Haut ein köstliches Pelzwerk; Schwingen zum Schreiben.



Fig. 54. a. Gans- u. b. Schwankopf. §. 81, 1 und 2.

* ***C. olor* Jll.** Stummer Schwan, Höckerschwan. Weiß, rothschnäblig; Schnabel mit aufgetriebenem, schwarzem Höcker; 4½′; Nordeuropa; kommt selten nach Deutschland, wird aber häufig auf Teichen gehalten; ist nicht stumm; Nahrung und Nutzen wie vorher.

* **2. *Anser segĕtum* L.** Saatgans. Grau; Flügel länger als der Schwanz; Beine und Mitte des Schnabels orangegelb; Schnabelwurzel und Nagel schwarz; 2½′; Nordküste der alten Welt. Ziehen im September in >förmigen Reihen südlich und kehren im Frühlinge zurück; gesellig, deshalb der Saat schädlich. Fleisch und Dunen geschätzt.

* ***A. cinerĕus*** M. et W. Graugans, wilde Gans. Grau; Flügel kürzer

§. 82. als der Schwanz; Schnabel ganz orangegelb; Beine blaß fleischfarbig; fast 3′. Lebensart, Vaterland, Durchzüge, Schaden und Nutzen wie vorher. Stammmutter unsrer Haus- oder Hofgans (*A. c. domesticus*).

3. *Anas* L. Ente. Zugvögel; meist sich im Norden fortpflanzend u. Winters auf ihren Zügen nach Süden auf unsern Landgewässern; von Würmern u. Vegetabilien lebend; tauchen schlecht, gründeln gut; durch Fleisch, Dunen u. Eier nützlich.

a) Schnabel des ♂ mit einem Höcker am Grunde.

* *A. tadorna* L. Brandente. Spiegel grün; Kopf und Oberhals schwarzgrün; Brust mit rostrother Binde; fast 2′; an Europas Seeküsten gemein.

* *A. moschata* L. Bisamente. Schwarzbraun, oben grünlich; Flügeldeckfedern weiß; Gesicht nackt, mit rothen und schwarzen Warzen; 2½′; Brasilien; als Hausthier bei uns; fälschlich türkische Ente genannt.

b) Schnabel ohne Höcker.

* *A. clypeata* L. Löffelente. Schnabel vorn doppelt so breit als hinten; Spiegel grün; Beine orangefarbig; 17″.

Fig. 55. Kopf der Löffelente. Querlamellen u. Nagel §. 81, 3.

* *A. boschas* L. Wilde Ente, Stock- od. Hausente. Spiegel grün, weiß eingefaßt; Kopf und Hals grau (♀) oder grün und mittlere Schwanzfedern zurückgeschlagen (♂, Erpel, Enterich); fast 2′; häufigste Art, Stammmutter unsrer gezähmten Enten u. Hauptgegenstand des Entenfanges; brütet bei uns.

* *A. crecca* L. Krickente. Spiegel grün, oben und unten schwarz, weiß eingefaßt (♂) oder halb schwarz, halb grün, hinten und vorn weiß (♀); ♂ mit goldgrünem Halsstreife; 14″; unsere kleinste Art und häufig.

4. *Somateria mollissima* L. Eiderente. Kein Spiegel; Schnabel und Beine graugrün; Gefieder des ♂ schwarz, Hals, Gurgel und Mantel weiß, unter den Wangen ein seegrüner Streif; ♀ lerchenbraun, dunkler gefleckt; ♂ 2′, ♀ 22″. Nur im höchsten Norden; die Insel Widöe ist zur Brütezeit ganz mit ihnen bedeckt. Liefern den Grönländern ihre Hauptfleischspeise, durch ihren Balg die wärmsten Unterkleider. Ihre Nester enthalten die kostbarsten Dunen, von denen jährlich über 50 Centner (à Pfund 2—3 Thaler) an den verschiedenen Brutplätzen gesammelt werden.

* 5. *Fuligula ferina* L. Tafelente, Rothhals. Spiegel aschgrau; Kopf und Hals rostbraun; Schnabel schwarz, mit blauer (♂) oder lichtgrauer (♀) Querbinde; Beine blaugrau; 16—18″.

* *F. clangula* L. Schellente. Spiegel weiß; ♂ weiß mit schwarzem Rücken und Schultern; Kopf des ♂ schwarz, mit weißem Flecke am Mundwinkel, des ♀ rostbraun; 16″; häufig; läßt ein krähenartiges Geschrei hören.

†* 6. *Mergus merganser* L. Großer Sägetaucher. Beine und Schnabel roth; Spiegel weiß, ohne Querbinden: Kopf dunkelfarbig; Brust ungefleckt, weiß oder röthlich; 24—28″. Brüten wie folgende Arten im Norden, ziehen Winters südlich und sind auf unsern Fischteichen wegen ihres Fischfanges schädlich.

Fig. 56. Kopf v. weißen Sägetaucher. Schnabel §. 81, 6.

†* *M. serrator* L. Kleiner S. Wie vorher, aber der weiße Spiegel mit 2 (♂) oder einer (♀) schwarzen Querbinde; Kopf dunkelfarbig; Brust rothbraun gefleckt; 19—22″.

†* *M. albellus* L. Weißer Sägetaucher. Schnabel u. Beine bleigrau; Spiegel schwarz, mit weißer Querbinde und weiß umgrenzt; Gurgel reinweiß; 19—22″.

2. Pelekane. Tropische, von Fischen lebende Seevögel.

7. *Tachypetes aquilus* L. Fregattenvogel. Schwarz; Schnabel roth; klaftert 14′; Stoßtaucher; die besten Flieger, trotz allen Stürmen Tag u. Nacht auf dem Meere, oft 400 Meilen weit vom Lande entfernt u. allen Seefahrern

als Schneider bekannt, weil sie den Schwanz abwechselnd wie eine Scheere öffnen u. schließen; fressen fliegende Fische u. andern Seevögeln abgejagte Beute. §. 82.

† 8. *Carbo cormorānus* M. et W. Scharbe, Seerabe. Schwarz; 3′; im hohen Norden; Fischen sehr schädlicher Schwimmtaucher; schreit kra, kra, kra; soll sich wie die chinesische Scharbe zum Fischfange abrichten lassen.

9. *Pelecānus onocrotālus* L. Gemeiner Pelekan. Weiß ins Röthliche, Schwingen schwarz; Hinterhaupt im hohen Alter mit einem Federschopfe; 5′; am caspischen Meere; kommt selten an die Flüsse Südeuropas; unsern Vorfahren ein Symbol mütterlicher Liebe (füttert aber die Jungen nicht mit seinem Blute); in Ostindien zum Fischfange abgerichtet; Kehlsack als Tabacksbeutel.

10. *Sula alba* M. Bassansgans, weißer Tölpel. Weiß; Gesicht Beine u. Schwingen schwarz; 2½′; an den Meeren des Nordens; häufig auf der Insel Baß vor Edinburg, wo die Jungen frisch gegessen u. auch für den Winter eingesalzen werden. Dumm gegen seine Feinde (Tölpel); geschickter Stoßtaucher.

11. *Phaëton aetherĕus* L. Weißschwänziger Tropikvogel. Weiß; Bürzel und Flügeldeckfedern schwarz; 3′ mit den Schwanzfedern. Gute Flieger; nur auf den tropischen Meeren; zeigen den Schiffern die Nähe der Wendekreise an.

3. Sturmvögel. Seevögel; bei nahem Sturme sich auf d. Schiffe setzend.

12. *Procellaria pelagica* L. Sturmschwalbe. Schwärzlich; Bürzel weiß; 5½″, kleinster Wasservogel; überall auf dem atlantischen Ocean; geht mit Unterstützung der Flügel geschickt auf stürmischen Wellen (St. Petersvogel); brütet in Felsenspalten; die Jungen speien ihren Feinden eine thranige Flüssigkeit über 2′ weit entgegen. Die Nordländer ziehen durch den gerupften Vogel einen Docht, und benutzen ihn wegen seines Fettes auf diese Weise als Lampe. — Vom Eis-Sturmvogel (*Pr. glacialis*) werden auf Island jährlich 20,000 Junge eingesalzen.

Fig. 57. Schnabel der Sturmschwalbe, §. 82, 12.

13. *Diomedēa exŭlans* L. Albatroß, Kapschaf (am Strande sitzende einer Schafheerde ähnlich). Weiß; Flügel, Beine und Schnabel schwarz; 4′; fliegt, selbst beim starken Sturme, über 400 Meilen weit aufs Meer; nährt sich vorzüglich von fliegenden Fischen (s. S. 60 unten).

4. Möven. Von Fischen und Mollusken lebende Stoßtaucher.

* 14. *Larus ridibūndus* L. Lachmöve. Mantel grau; Schnabel und Beine roth; Schwingenschäfte weiß; Kopf schwarz, Winters weiß; 15″; an den deutschen Küsten, Winters an Flüssen; gemeinste Art; schreit: kaeckaeckaeck, einem Gelächter ähnlich; nützet durch Vertilgung von Gewürm und Insekten. Die Jungen werden gegessen; die Federn zu Betten.



Fig. 58. Schnabel einer Möve, §. 81, 14.

* 15. *Sterna hirundo* L. Gemeine Seeschwalbe. Weiß; Beine mit ganzen Schwimmhäuten und wie der an der Spitze schwarze Schnabel roth; 13″; Küsten Europas; Sommers an Flüssen; fressen Insekten und kleine Fische.

16. *Rhynchops nigra* L. Schwarzer Scheerenschnabel. Schwarz; Flügelbinde und Unterseite weiß; 14″; Antillen.

5. Taucher. Leben meist auf Süßgewässern; gehen wegen der in der Nähe des Afters eingelenkten Beine schlecht, fliegen gut u. tauchen sehr geschickt.

* 17. *Colymbus septentrionālis* L. Nordischer Seetaucher. Kehle roth; Mantel schwarzbraun; Hals grau; Bauch weiß; 20—25″; Polargegenden; kommt südlich tief ins Land. Kehlstücke zu Pelzkragen.

* **18.** *Podiceps minor* L. Kleiner Steißfuß. Kein Spiegel; dunkelbraun, unten aschgrau; Halsseiten braun; 10″; ganz Deutschland, auf Süßgewässern; Zugvogel; 3. 4 bis 10. 11 bei uns; frißt Wasserpflanzen, Insekten.

* *P. cristatus* L. Haubentaucher. Spiegel weiß; Schnabel länger als der Kopf; Hals mit rostfarbigem, unten schwärzlichem Kragen; Haube schwarzbraun; 20″; Europa, an Seen und Teichen; Zugvogel; 3. 4 bis 9. 10 bei uns; lebt von Wasserinsekten, seltener von Fischen.

6. Alken. Gehen beschwerlich, fast aufrecht, fliegen selten oder gar nicht, tauchen geschickt mit halbausgebreiteten Flügeln.

19. *Alca arctica* L. Papagei-Taucher. Schnabelwulst mit vertieften Punkten; weiß; Oberseite und Halsband schwarz; Beine roth; 11″; im arctischen Kreise; Winters an Frankreichs Küsten. Die Jungen werden mit langen Stangen aus ihren Höhlen gezogen u. gegessen, auch für Wintervorräthe eingesalzen.

Fig. 59. Schnabel des Papagei-Taucher §. 81, 19.

20. *Uria grylle* L. Gryll-Lumme. Schwarz; Spiegel weiß; Beine roth; 11″; im arctischen Meere; Winters einzeln an Deutschlands Küsten. Nutzen wie vorher; auch die Eier mit blutrothem Dotter sind wohlschmeckend.

21. *Aptenodytes patagonica* Gm. Riesen-Pinguin. Schiefergrau, unten weiß; Gesicht und Kehle schwarz, letztere gelb eingefaßt; 3′; Südmeer; häufig an der Magellanstraße, fast nur auf hohem Meere; können nicht fliegen; schwimmen mit den Flügeln zugleich rudernd. Häute zu Putz und Beuteln.

§. 83. **III. Klasse. Reptilia** (amphibia oder Beidleber), **Reptilien** oder **Lurche.**

Rückgraththiere mit kaltem, rothem Blute; athmen durch Lungen, legen Eier, sind mit Schildern oder Schuppen bedeckt oder nackthäutig; haben 4, 2 oder gar keine Beine (§. 23.) und gehen, hüpfen, schleichen, klettern od. schwimmen. Reptilien zeigen als Durchgangs- oder Verbindungsklasse vorzüglich in den Athmungs- und Bewegungsorganen die verschiedenste Bildung, wodurch eine allgemeine Schilderung und scharfe Eintheilung erschwert wird. **Skelet:** die **Zähne** (§. 11.), welche den Schildkröten und der Pipa fehlen, sind spitz, hakig, immer von einander entfernt stehend, fast überall gleich groß und gleich geformt, nur zum Ergreifen und Festhalten der Nahrung dienlich und heißen: **1) eingekeilt,** d. h. wie bei Säugethieren in Gruben des Kiefers steckend (Krokodile); **2) festgewachsen,** d. h. mit den Kiefern zusammengewachsen und zwar entweder auf einer ebenen Knochenfläche sitzend (eingewachsene wie bei Schlangen) oder mit ihrem untern Ende an der Innenseite des Kieferrandes befestigt (angewachsen wie bei Warneidechsen). **3) Gaumzähne,** d. h. im Gaumen befestigt (Frösche und Unken). Die Zähne der Schlangen heißen: **1) derbe,** d. h. ohne Höhlung; **2) Giftzähne,** d. h. hohle, längere, gekrümmte, stärkere, zurückschlagbare Zähne, nur in der Oberkinnlade sitzend (Giftschlangen, Fig. 60.). Die Giftzähne sind in der Jugend rinnenförmig u. schließen sich erst später, doch bei einigen Schlangen nie. Diese Zähne heißen **3) Rinnen-** oder **Furchenzähne,** verdächtige Zähne, weil man bei einigen Schlangen mit solchen Zähnen noch nicht weiß, ob sie giftig sind oder nicht (Trugnattern). **Rippen** an Zahl sehr verschieden, den Fröschen fehlend. Schlangen haben weder Brustbein noch Becken. Zahl der Zehen 2—5, oft mit Schwimmhäuten. **Körperbekleidung:** Schilder (Schildkröten); Schuppen (Eidechsen); nackte Haut (Frösche). Die Schuppen sind entweder **glatt** oder **gekielt** (Kielschuppen), d. h. ohne oder mit erhabener Linie. Sie heißen: **1) Tafelschuppen,**

d. h. kleine, rundum angeheftete, sich nicht deckende; **2) Schindelschuppen,** d. h. sich dachziegelartig deckende und nur am Vorderrande angewachsene; **3) Wirtelschuppen,** d. h. von langer und schmaler Form und ringförmig nebeneinander in geraden Querreihen stehende Schuppen; **4) Schildschuppen** (Schilder) sind von Schuppen nur relativ durch Größe verschieden. Alle Schlangen häuten sich wenigstens einmal jährlich, wobei die abgeworfene Haut oft ganz zusammenhängend bleibt (Natternhemd). Die Nackthäuter haben unter allen Wirbelthieren die bedeutendste Metamorphose (§. 94.). §. 83.

Respiration durch 1 oder 2 Lungen, welche große, häutige Säcke bilden und bei Schlangen an Größe sehr verschieden sind. Die **Nackthäuter** athmen in der Jugend Wasser durch meist **äußerliche** Kiemen am Halse (Fig. 63.), später Luft durch Lungen. Bei Kröten und Fröschen findet außer der Lungenathmung auch noch starke Respiration durch die Haut Statt, vermöge welcher sie lange unter Wasser ausdauern können. Bei doppeltem Kreislaufe des Bluts ist die Respiration doch unvollkommen und vom Kreislaufe meist unabhängig, weil die Lungen nur einen kleinen Pulsaderast (S. 16.) erhalten, daher die Reptilien das Athmen auch lange unterbrechen können. Durch das Athmen wird das Blut nur wenig verändert, weil das Herz mit halbgeschiedener Herzkammer und 2 Vorhöfen bei jeder Zusammenziehung nur einen Theil des Bluts in die Lungen sendet, während das übrige, ohne der Respiration unterworfen zu werden, wieder in die Körpertheile getrieben wird und sich daher das venöse Blut mehr oder weniger mit dem arteriellen im Herzen mischt. Von dieser unvollkommenen Respiration hängt **1)** die geringe Bluttwärme (+ 4° bis 5° R.), **2)** die Trägheit und Stumpfsinnigkeit, **3)** die Fähigkeit ab, die Respiration lange zu unterbrechen. Wegen der Größe des Rückenmarks im Verhältniß zum Gehirn ist auch das vegetative Leben (§. 10 u. 13, IV.) ausgezeichneter und zäher als das thierische; daher äußert auch das weniger entwickelte Gehirn geringern Einfluß auf den übrigen Körper; daher können Schildkröten ohne Gehirn noch Monate lang leben, wogegen bei den Warmblütern alle Verrichtungen der Nerven unter unmittelbarer Herrschaft des Gehirns stehen und daher dessen Zerstörung auch sogleich sämmtliche Verrichtungen stört. Diese Unabhängigkeit und Selbstständigkeit der Organe ist auch Ursache der großen Reproductionskraft, vermöge welcher sich Schwanz, Beine, ja sogar Augen wieder erzeugen können. Man findet selten Blindschleichen, denen der Schwanz nicht schon einmal abgebrochen und wieder gewachsen (reproducirt) wäre.

Sinnesorgane. Augenlieder fehlen nur den Schlangen und einigen Eidechsen; Blödaugen (§. 92.) haben verkümmerte, Blindwühlen (*Coecilia* §. 95.) gar keine Augen. Die **Zunge** (nur den Fehlzünglern fehlend) ist meist sehr beweglich, und vorzüglich Schlingorgan (§. 14, 3.), bei den Schlangen, bei denen die Basis der Zunge in einer Scheide steckt (Fig. 61.) und mit ihrer gespaltenen Spitze weit hervorgestreckt werden kann (Züngein), auch Tastorgan. Das **Ohr** ist immer ohne Ohrmuschel, das Paukenfell meist äußerlich in einer Höhle (Paukenhöhle) sichtbar. Fast alle haben eine Stimme: Frösche und Krokodile eine laute; Schlangen und Schildkröten und manche Eidechsen eine zischende. Die **Verdauungsorgane** weichen wenig ab, doch ist der Darm sehr kurz, weil sie (mit Ausnahme einiger Schildkröten) nur von thierischer Nahrung leben; der Magen sehr einfach und die Verdauung langsam; daher die Fähigkeit, lange zu fasten. Mastdarm, Harnleiter und Geschlechtsöffnung münden in eine gemeinsame Höhle (Kloake). **Fortpflanzung:** Alle Reptilien sind getrennten Geschlechts; sie pflanzen sich durch pergamenthäutige oder in Schleim gehüllte Eier fort, aus welchen bei einigen oft schon im Mutterleibe die Jungen kriechen (Vipern, lebendig gebärend). Eidechsen legen 8—12, Krokodile 20—60, Schlangen 10—50, Schildkröten 20—25, Salamander bis 50. Frösche und Kröten oft an 1200 Eier. Bei Schildkröten, Schlangen und Eidechsen findet eine eigentliche Begattung, bei den übrigen nur eine äußerliche Befruchtung Statt. **Wohnort:** Einige Reptilien können nur im Wasser, andere nur auf dem Lande, einige sowohl im Wasser als auf dem Lande leben (beidlebig). Großer **Einfluß des Klima:** Winterschlaf, Sommerschlaf (S. 20, 5.). Während des Winter-

schlafs ruhen fast alle Functionen, die Lebenskraft ist gebunden, und da kein Verbrauch Statt findet, ist auch kein Ersatz nöthig, bis die äußere Luft die Lebensthätigkeit plötzlich wieder weckt (Kröten in Baumstämmen lange eingeschlossen — erzwungener Winterschlaf? — im Eise zugefroren). Schlangen und Eidechsen ziehen sich zum Winterschlafe vorbereitet meist so tief in Erdlöcher zurück, daß der Frost sie nicht erreichen kann, von dem sie schon im geringsten Grade unbedingt getödtet würden. Der Froschregen, nicht zu verwechseln mit den plötzlich bei Regen aus den Verstecken hervorkriechenden Fröschen, ist neuerdings vielfach bestätigt und erklärt sich dadurch, daß diese Thiere vom Sturmwinde und von Wasserhosen emporgehoben wurden. Reptilien sind, den hohen Norden ausgenommen, über die ganze Erde verbreitet, vorzüglich zahlreich in den heißen und feuchten Tropenländern, ihrer eigentlichen Heimath. Von den etwa 1500 bekannten Arten leben $^8/_9$ in der heißen Zone, etwa 27 bis 30 Arten in Deutschland; von vorweltlichen kennt man etwa 390 Arten.

Nutzen und Schaden. Die meisten Reptilien sind ganz unschädliche, ja nützliche Thiere; nur Krokodile und Riesenschlangen sind uns durch ihre Größe, die Giftschlangen durch ihr Gift gefährlich. Die Reptilien sind den meisten Menschen wegen ihres kalten Körpers, ihrer schleichenden Bewegung und wegen ihres unheimlichen Aufenthalts verhaßte und unangenehme Thiere, deren mittelbarer Nutzen etwa in Vertilgung schädlicher Thiere (Mäuse, Insekten ꝛc.) besteht. Unmittelbaren Nutzen haben nur einige Batrachier (Axolotl und Froschkeulen) und Schildkröten, welche nebst ihren Eiern (Amazonen-Schildkröte) gegessen werden (Schildkrötensuppe) und die Carettenschildkröte, welche Schildpatt zu mancherlei Kunstsachen ꝛc. liefert. Als Heilmittel wurde früher die Viper (Vipernsuppe) und der Skink gebraucht, jetzt höchstens nur noch der Froschlaich zum Froschlaichpflaster. Statt des Schlangenfetts ꝛc. wird Landleuten von Apothekern meist Schweineschmalz im Handverkaufe gegeben.

§. 84a.

Uebersicht der IV Ordnungen und deren Familien.

- Leib mit Schildern od. Schuppen; keine Metamorphose: A. Squamäta. Schuppenreptilien
  - Kiefern zahnlos; Körper kurz und breit; Knochenpanzer mit unbeweglichen Rippen; 4 Beine . . . . . → I. Testudinäta. Schildkröten.
  - Kiefern mit Zähnen; Körper gestreckt
    - mit Brustbein u. Augenliedern; Unterkieferbogen vorn verwachsen; 4, selten 2 od. keine Beine . . . . . → II. Saurïa. Eidechsen.
    - ohne Brustbein und ohne Augenlieder; Unterkieferbogen vorn getrennt; keine Beine. . . . → III. Ophidïa. Schlangen.
- Leib nackt, mit schleimiger Haut; eine Metamorphose: B. Nuda. Nackthäuter.
  - Körper langgestreckt oder kurz; 4, selten 2 oder keine Beine. → IV. Batrachïa. Lurche (Froschreptilien)

§. 84b.

I. Schildkröten. 3 Familien. §. 86.

- Vorder- und Hinterbeine gleichlang
  - Zehen unbeweglich; Kopf und Beine unter den Schild zurückziehbar — (geometrische Schildkröte) . . . → 1. Landschildkröten.
  - Zehen beweglich, mit Schwimmhäuten; Kopf und Beine wenig oder gar nicht zurückziehbar — — (europäische Schildkröte). . . . . → 2. Süßwasserschildkröten.
- Vorderbeine länger als die Hinterbeine; Zehen zu flossenförmigen Ruderfüßen verbunden — (Riesenschildkröte) . . . . . → 3. Seeschildkröten.

II. Eidechsen. 3 Familien. §. 89.

- Körper oben mit Panzerschildern d. h. Knochentäfelchen — (Nilkrokodil) . . . . . → 1. Krokodile.
- Körper mit Schuppen, selten mit Warzen: 2. Eidechsen.
  - Zunge lang
    - dünn, zweispitzig; 4 Gangbeine (graue Eidechse) . . . . . → 2a. Spaltzüngler.
    - am Ende verdickt, klebrig; 4 Kletterfüße — (Chamäleon) . . . . . → 2b. Wurmzüngler.
  - Zunge kurz
    - dick, warzig; 4 Gangbeine — (amerikanischer Basilisk . . . . . → 2c. Dickzüngler.
    - vorn verdünnt, ausgeschnitten; 4, 2 od. keine Beine (Blindschleiche) . . . . . → 2d. Kurzzüngler.
- Körper mit weicher Haut, welche durch Querfurchen geringelt ist; Beine kurz oder fehlend — (Doppelschleiche). . . . . → 3. Ringeleidechsen.

(Eidechsen.)

III. Schlangen. 2 Familien. §. 93.

- Mundöffnung klein; Kopf nicht breiter als der Hals — (Wickelschlange) . . . . . 1. Engmäuler.
- Maul bis weit hinter die Augen klaffend; Kopf breiter als der Hals: 2. Großmäuler
  - nur derbe Zähne im Oberkiefer — (Ringelnatter) . . . . . 2a. Giftlose. } 2. Großmäuler.
  - Giftzähne (Fig. 60.) im Oberkiefer — (Kreuzotter) . . . . . 2b. Giftige. } 2. Großmäuler.

IV. Nackthänter, Nackt-Lurche. 3 Familien. §. 96.

- Körper mit Beinen
  - Körper schwanzlos, kurz, 4 Beine: 1. Froschlurche
    - ohne Zunge — (Pipa) . . . . 1a. Fehlzüngler.
    - mit Zunge
      - Haut glatt — (Grasfrosch) . . . . . 1b. Frösche. } 1. Froschlurche.
      - Haut warzig — (Feldkröte) . . . . . 1c. Kröten. } 1. Froschlurche.
  - Körper langgeschwänzt, eidechsenartig: 2 Schwanzlurche oder Molche.
    - Kiemen sich während der Metamorphose verlierend — — (Sumpfsalamander) . . . . 2a. Wassermolche. } 2. Molche.
    - Kiemen od. seitliche Kiemenspalte neben den Lungen bleibend — (Olm) . . . . . 2b. Fischmolche. } 2. Molche.
- Körper ohne Beine und ohne Schwanz, wurmförmig — — (Blindwühle) . . . . . 3. Schleichenlurche.

A. Reptilia squamāta. Beschuppte Reptilien. §. 85.

I. Ordnung. *Testudināta.* **Schildkröten.** Körper kurz, breit, 4beinig, von einem Knochenpanzer bedeckt, welcher mit Hornplatten oder Leder überzogen ist und mit den Rippen und der Wirbelsäule verwachsen fast den Körper ganz einschließt (äußerliches Skelet), so daß das gleichsam umgewendete Thier zwischen 2 Schilden sitzt, unter welche Kopf, Beine und Schwanz meist zurückgezogen werden können. Kiefern zahnlos. Langsame, von Pflanzen oder kleinen Thieren (Fischen, Mollusken) sich nährende Meer-, Fluß- und Landbewohner, vorzüglich der wärmern Länder. Die Weibchen legen ihre kalkig-pergamentschaligen Eier in selbst gegrabene Löcher in Sand, wandern deshalb oft weit; die eben ausgekrochenen Wasserschildkröten gehen direct dem Wasser zu. Schildkröten wachsen langsam, haben ein zähes Leben (§. 83.) und können 7—8 Monate fasten. 3 Familien (§. 84, b.)

- Extremitäten gleichlang
  - Zehen unbeweglich; Kopf und Beine unter das seitlich verknöcherte Rücken- u. Brustschild ganz zurückziehbar: 1. Cheroïnae, Landschildkröten. §. 86.
    - Brustschild ohne bewegliche Klappen; Beine 5zehig — — Landschildkröte . . . . . 1) *Testūdo* L.
  - Zehen beweglich, mit Schwimmhäuten: 2. Emydae, Süßwasserschildkröten.
    - Kopf u. Beine zurückziehbar; keine Lippen
      - Brustschild ohne bewegliche Klappen; 12 Brustschildplatten — — Flußschildkröte . . 2) *Emys* Al. Br.
      - Brustschild hinten u. vorn mit beweglichen Klappen; 11 Brustschildplatten — — Klappbrust . . . . 3) *Kinosternon* Spix.
    - Kopf u. Beine nicht zurückziehbar; fleischige Lippen
      - Rückensch. m. Hornplatten — Matamata . . . . 4) *Chelys.*
      - Rückensch. mit Haut überzogen — — Dreiklaue . . 5) *Triönyx* Geoffr.
- Vorderbeine länger; Zehen unbeweglich, zu flossenförmigen Ruderfüßen verbunden; Kopf und Beine unter das seitlich höchstens verknorpelte Rücken- und Brustschild nicht zurückziehbar: 3. Chelonae, Seeschildkröten.
  - Rückenschild, Brustschild u. Füße mit lederartigem Ueberzuge; keine Nägel — Lederschildkröte . . . . . 6) *Sphargis* Merr.
  - Rückenschild, Brustschild u. Füße mit Hornplatten; 1—2 Nägel an jedem Fuße — Seeschildkröte . . . . . 7) *Chelonïa* Al. Br.

§. 87. 1. ***Testūdo graeca*** L. Griechische Schildkröte. Rückenplatten gelblich, schwarz gefleckt, im Umkreise gefurcht; Brustschild vorn abgestutzt, hinten ausgerandet; bis 1′; gemeinste Art in Südeuropa. Nützt durch Vertilgung des Ungeziefers in Gärten und durch ihr Fleisch (Schildkrötensuppe).

T. geometrĭca L. Geometrische Schildkröte. Rückenplatten schwarz, jede mit gelbem Mittelflecke, von welchem gelbe Linien auslaufen und geometrische Figuren bilden; 4—8″; Ostindien, Südafrika.

2. ***Emys europaea*** Schn. (***orbicularis*** L.) Europäische Sch. Rückenplatten schwärzlich, mit gelben, strahlig gestellten Punkten; 8—10″; bis ins nördliche Deutschland in Gewässern verbreitet. Das Fleisch wird gegessen.

E. arrau Humb. Im Orinoko. Die zu Millionen abgelegten Eier liefern Oel zu Speisen und auf Lampen, sowie die Amazonen-Schildkröte den Anwohnern des Amazonenstroms ihre gewöhnliche Fleischnahrung verschafft.

3. ***Kinostĕrnon clausum*** Spix. Dosen-Schildkröte. Kugelig gewölbt; citrongelb, dunkelbraun gefleckt; 6″; Nordamerika.

4. ***Chelys fimbriāta*** Gm. Matamata-Schildkröte. Rückenschild braun, rund umher gezähnt; Platten pyramidal; 15″; Fleisch geschätzt; Amerika.

5. ***Trĭonyx aegyptiăca*** Geoff. Weiche Nil-Schildkröte. Dunkelbraun, weiß gefleckt; an 3′; verzehrt die eben ausgekrochenen Nil-Krokodile.

6. ***Sphargis coriacĕa*** L. Leder-Sch. Rückenschild mit rauhen Schüppchen und 5 vortretenden Längskielen; 7′; atlantisches Meer; liefert Brennöl.

7. ***Chelonĭa Midas*** L. Riesen-Schildkröte. Rückenplatten 13, grünlich, sich nicht dachzieglig deckend; 6—7′; 800 Pfund; in tropischen Meeren häufig. Fleisch zur Nahrung, Schild zu Badewannen, Fett zum Brennen.

Ch. imbricāta L. Aechte Carett-Schildkröte. Rückenplatten 13, gelb und braun, dachzieglig; 200 Pfund, kleiner; daselbst; Fleisch schlecht; liefert das beste Schildpatt (3—8 Pfund), welches durch Erweichen, Pressen und Biegen zu Kämmen, Dosen und Kunstgegenständen verarbeitet wird.

Ch. carētta L. Carett-Sch. Rückenplatten 15, mit erhabenem Kiele; Mittelmeer. Schildpatt wenig geschätzt, Fleisch schlecht; Fett als Brennöl.

§. 88. **II. Ordnung.** ***Saurĭa.*** **Eidechsen** (§. 84.). Körper langgestreckt, mit Schuppen oder Schildern; 4 Beine, selten 2 oder gar keine (schlangenartig). Rippen beweglich; Unterkiefern vorn verwachsen; Kiefern mit Zähnen; Paukenfell meist sichtbar; meist Augenlieder; Brustbein und Harnblase; Lungen oft groß und dann Hautfarbe veränderlich. Eine polymorphe Ordnung mit vielen Uebergangsformen; Krokodile nähern sich den Säugethieren, Blindschleichen den Schlangen, Haftzeher den Molchen. Leben von kleinern Thieren und Insekten, haben nie Giftzähne und Giftdrüsen. 3 Familien (§. 84, b.):

§. 89. **1) Loricāta. Krokodile.** Körper mit Panzerschildern; 4 Beine; Hinterfüße mit Schwimmhäuten; Zunge kurz, an der ganzen Unterfläche festgewachsen; Ohr mit Klappen verschließbar; keine Lippen; eingekeilte Zähne.

- Schnauze flach, fast von der Breite des Kopfes
  - Oberkiefer jederseits mit einer Ausbucht für den 4ten größern Zahn des Unterkiefers; Vorderfüße frei — Krokodil . . . . . 1) *Crocodĭlus* C.
  - Statt der Ausbucht nur eine Grube; Vorderfüße frei — Kaiman . . . . . 2) *Alligātor* C.
- Schnauze fast cylindrisch, viel schmäler als der Kopf; Zähne gleich groß; Vorderfüße mit halber Schwimmhaut — Gavial . . . . 3) *Rhamphostŏma* Wagl.

2) Squamāta. Eidechsen. Körper mit Schuppen, selten mit warziger Haut; 4 vollkommen oder unvollkommen entwickelte Beine, oder keine Beine und dann schlangenartig; Zunge beweglich; keine Ohrklappen, aber Lippen; Zähne nicht eingekeilt (Uebersicht §. 84b.).

4) *Monitor* C.
5) *Ameiva* C.
6) *Podinema* Wagl.
7) *Lacerta* L.
8) *Chamaeleon* Laur.
9) *Draco* L.
10) *Basiliscus* Laur.
11) *Stellio.*
12) *Tropidurus* Pr. Max.
13) *Ptyodactylus* C.
14) *Platydactylus* C.
15) *Sincus.*
16) *Zygnis* Ok.
17) *Anguis* L.
18) *Pseudopus* Merr.
19) *Ophiosaurus.*

3) Annulāta. Ringeleidechsen. Die weiche Haut statt der Schuppen durch Querfurchen in Ringel abgesetzt; Körper wurmförmig; Beine kurz oder fehlend.

Vorderbeine 5zehig; Hinterbeine fehlen — Strelfling . . . . . 20) *Chirotes* C.
Vorder- u. Hinterbeine fehlen; Kopf m. Schildern — Doppelschleiche 21) *Amphisbaena* L.

1. Krokodile. Große, Menschen und Thieren gefährliche Räuber der Süßgewässer heißer Länder; leben meist im Schilfe und Schlamme versteckt von Fischen und ans Ufer kommenden Landthieren, welche sie erst ersäufen und dann fressen; sind auf dem Lande furchtsam und schwerfällig. S. 90.

† 1. *Crocodilus niloticus* C. Nil-Krokodil. Rücken mit 6 Reihen Knorrenschilder; 4 Nackenschilder; 20′; Oberägypten, früher auch Unterägypten; jetzt selten; schon den Alten bekannt; viele Fabeln: Krokodilthränen; Ichneumon (§. 150.).

§. 90. † 2. *Alligător lucĭus* C. Kaiman mit der Hechtschnauze; 14′; südliches Nordamerika (Mississippi). Haut zu Satteln und Fußbekleidung.

† *A. sclerops* Schn. Brillen-Kaiman. An 10′; Südamerika; gemeinste Art im Orinoko; tödtet viele Menschen.

† 3. *Rhamphostŏma gangetĭcum* Gm. Gavial. An 20′; im Ganges und dessen Nebenflüssen; von Indiern verehrt.

2. Eidechsen. Meist kleine und sehr lebhafte, nicht gefährliche (einige hält man für giftig), von Insekten oder Würmern auf der Erde oder auf Bäumen lebende Reptilien.

4. *Monĭtor nilotĭcus* L. Nil-Warneidechse. Graubraun, mit Querreihen weißer, schwarz gerandeter Flecken und mit schwarzbrauner, netzförmiger Zeichnung; 5—6′; am Nile, wo sie Krokodileier vertilgt; auf ägyptischen Denkmälern.

5. *Ameĭva vulgāris* C. Gemeine Schienen- oder Warneidechse. Grün, schwarz gefleckt; Seiten braun oder blau und schwarz gefleckt; 20″; gemeinste Art im heißen Amerika; pfeift aus Furcht beim Erblicken eines Krokodils.

6. *Podinĕma Teguāxin* L. Das Teju, die große Warneidechse Schwärzlich, mit gelben Flecken und gelben Querbinden am Schwanze; 6′; sehr schnell; in Brasilien in Erdlöchern; frißt Mäuse, Reptilien und Insekten. Wird häufig des wohlschmeckenden Fleisches wegen gefangen.

* 7. *Lacerta agĭlis* L. Gemeine oder flinke Eidechse. Meist graugrün mit bräunlichem Rücken und weißen Flecken; Rückenschuppen gekielt; Bauch und Seiten weißlich (♀) oder grünlich (♂); 6—7″; fast in ganz Europa häufig; vertilgt Insekten. Variirt mit kupferrothem Rücken (*L. rubra*) oder mit safrangelbem Bauche (*L. croceа*).

L. vĭrĭdis u. *ocellāta*, grüne u. Perleidechse. Südeuropäer; 14—18″.

8. *Chamaelĕon africānus* Gm. Gemeines Chamäleon. Gewöhnlich hellgrau; Kopf spitz, dreiseitig, stumpf-pyramidal; Rücken- und Bauchkante gezähnelt; Schwanz und Füße machen sie zu wahren Kletterthieren; 12—18″; Aegypten und Südspanien. Leben von Insekten, welche sie mit der pfeilschnellen Zunge fangen; werden deshalb in Häusern gehalten; können jedes Auge unabhängig vom andern bewegen und den Körper wie die übrigen Reptilien mit großen Lungen, namentlich die Schlangen, stark aufblähen und durch Licht, Affekte und andere Lebenszustände die Farbe ändern, indem die untere der zwei, unter der Haut liegenden Farbenschichten mehr oder weniger in die darüber liegende getrieben wird.

9. *Draco volans* L. Grüner Drache. Grün, mit braunem Fallschirme, zur Erleichterung des Springens auf Bäumen nach Insekten; 1′; Java; gemein.

10. *Basilĭscus mitrātus* (*Lacerta basilĭscus* L.). Amerikanischer Basilisk. Bläulich; Hinterkopf mit häutiger, kapuzenförmiger Hervorragung; 3′; Guiana; selten; Lebensart wenig beobachtet.

11. *Stellĭo vulgāris* (*Lacerta stellĭo* L.). Gemeine Dorneidechse. Schwärzlich olivenbraun, auf dem weißlichen Rücken ochergelb gefleckt; Bauch gelb; Ohr mit Stachelschuppen umgeben; 1′; Griechenland, Westasien, Aegypten (Ritzen der Pyramiden), gemein. Die Excremente (*cordylĕa*) früher als Schminke benutzt.

12. *Tropidūrus torquātus* Pr. Max. Gemeine Kieleidechse. Bräunlich grau; Halsring u. Streif um die Augen schwarz; 14″; Brasilien; frißt Insekten.

13. *Ptyodactўlus lobātus* Geoff. Gemeiner Fächerfinger. Röthlichgrau, braun punktirt; Schuppen sehr klein; 6″; Aegypten. Nächtliches, langsames Thier; klebt sich mit dem Safte aus den Zehenfalten an Wänden fest; soll den Speisen durch Hinüberkriechen schädliche Wirkungen mittheilen.

14. *Platydactўlus murōrum* C. Gemeiner Gekko, Tarantola. Dunkelaschgrau; mit vielen, aus 3—4 Körnchen bestehenden Knötchen; Rücken mit Längsreihen großer Schuppen; 5″; ums Mittelmeer (Italien, Griechenl.), in Löchern u. gern unter Dächern in Häusern, wo sie sogar an Zimmerdecken hängend umherklettern. Lebensart des vorigen; nach Carl Bonaparte ganz unschädlich.

15. *Scincus officinālis* (*Lacerta scincus* L.) Apotheker-Skink. Gelbbraun, mit dunklern Querbinden; 6—8″; Aegypten; früher als *Aphrodisiăcum* in allen Apotheken.

16. *Zyngis chalcidica.* Cicigua. Grau mit 4 braunen Längsstreifen; 1′; auf Wiesen Südeuropas; gebärt lebendige Junge.

* 17. *Angŭis fragĭlis* L. Blindschleiche, Haselwurm. Glänzend kupferbraun, unten schwärzlich; Rücken mit 3 schwarzen Streifen (*A. eryx* L.), welche mit dem Alter immer undeutlicher werden u. sich endlich ganz verlieren; $1\frac{1}{2}$′. Schwanz von Körperlänge; bricht leicht ab (Bruchschlange); Europa; häufig.

18. *Pseudŏpus serpentīnus* Merr. Scheltopusik. Olivenbraun; Schuppen braun gerandet; Schwanz mit Kielschuppen; 2′; Südost-Europa.

19. *Ophiosaurus ventrālis* L. Gemeine Glasschlange. Graugelb, schwarz gefleckt; Schwanz über Körperlänge und leicht abbrechend; im Süden Nordamerika's.

3. Ringeleidechsen. Verbinden die Schlangen mit den Eidechsen.

20. *Chirōtes canaliculātus* C. Gemeiner Streifling. Bläulich; Augen unter der Körperhaut; 8—10″; Mexiko; in Ameisenhaufen; selten.

21. *Amphisbaena flavēscens* Pr. Max. Gelbe Doppelschleiche. Gelb, oben ins Braune; 21″; Brasilien.

4. Fossile Saurier. Von abenteuerlicher Form und Größe; meist aus der Jura-Formation bekannt:

Ichthyosauri. Fischeidechsen. Mit kurzem Halse und mit Flossenfüßen, ähnlich wie bei Seeschildkröten; waren bis 40′ lang; ihre fossilen Kothballen (Koprolithen) haben spiralförmige, gewundene Gestalt, woraus man auch auf ihre gewundene Darmröhre, wie wir sie jetzt nur bei Fischen, besonders Haifischen, finden, schließen und so vermuthen darf, daß sie gefräßige Seeungeheuer von der Lebens- und Ernährungsart der Haifische waren.

Plesiosaurī. Meerdrachen. Mit sehr langem Halse und mit Flossenfüßen.

Pterodactÿli. Vogeleidechsen. Kopf vogelartig; Hals lang; Rumpf und Schwanz kurz; Beine lang, die vordern mit sehr langer Zehe, vielleicht zum Ausspannen einer Flughaut. Man hält sie für fliegende Reptilien.

Mosaesaurus Hoffmānni. Moseleidechse. Aus der Kreide bei Maestricht; an 25′ lang.

Hydrarchus (*Basilosaurus*) Harlani. Harlan's Eidechsenkönig oder Meerkönig. 114′ lang und 1845 in Alabama entdeckt.

III. Ordnung. *Ophidia* (serpentes). **Schlangen.** Körper lang gestreckt, drehrund; Beine, Augenlieder, Brustbein und Paukenfell fehlen; Kopf mit Schildern, Leib mit Schuppen (§. 83.); Bauch meist mit Schildschuppen, welche oft ungetheilt quer über den ganzen Bauch gehen (Halbringe). Zähne eingewachsen (§. 83.). Unterkiefern vorn nur durch ein sehniges Band verbunden, wodurch beim Schließen des Maules eine Furche an der Kehle entsteht (**Kinnfurche**), welche jederseits mit 2 großen Schildern (Rinnenschildern) begränzt ist. Viele, oft an 200 falsche, bewegliche Rippen; zuweilen jederseits des Afters ein Haken (Fußstummel, Afterſporn); Zunge tief gespalten (Fig. 60.), in eine häutige Scheide zurückziehbar (Tastorgan); eine der 2 Lungen verkümmert; Genitalien doppelt. — In äußerer Form sehr übereinstimmende, fast über die ganze Erde (die größten, schönsten und giftigsten in heißen Ländern) verbreitete, auf Bäumen, auf der Erde, vorzüglich an steinigen Oertern und in Erdlöchern, selten im Wasser sich aufhaltende und nur von lebenden Thieren sich nährende Reptilien. Die kleinern Arten fressen Würmer, Insekten, Mäuse ꝛc.; die größern Vögel, Schafe, Ziegen, selbst Hirsche und Antilopen, welche erst durch Umschlingungen getödtet werden. Die nicht eingelenk- S. 91.

ten Kiefern, die vorn nicht verwachsenen Unterkieferäste, die hakig zurückgebogenen Zähne, die reichliche Absonderung des Speichels und die sehr große Ausdehnbarkeit aller Theile des Rachens erleichtern ihnen das Verschlingen von Thieren, welche viel dicker sind wie sie selbst. Schlangen sind den Menschen nur durch Größe oder Giftigkeit gefährlich und beißen selten ungereizt. Nur die Schlangen mit Furchen- oder Giftzähnen (kaum $^1/_3$ aller Schlangen) sind giftig. Die Zahl der Giftzähne (§. 83.) beträgt jederseits 1—5; nur der erste und größte dient zum Beißen; die übrigen kleinern sind Reservezähne, wenn die ersteren beim Beißen etwa ausgerissen werden. Das Gift wird in einer besondern Giftdrüse abgesondert, aus deren Mündung an der Zahnwurzel das Gift beim Bisse durch den hohlen Zahn in die Bißwunde (2 feine, wie mit einer Nadel gemachte Löcher) strömt. Schon einige Tropfen können tödten, aber nur, wenn sie ins Blut von Warmblütern kommen, wo dann sogleich Anschwellung des gebissenen Gliedes entsteht; für kaltblütige Thiere ist Schlangengift nicht gefährlich. Die Gefahr hängt ab: 1) von der Größe der Schlange; 2) von der Menge des ausgeströmten Giftes; 3) vom Klima und 4) von der gebissenen Stelle selbst. Kleine Giftschlangen und solche, welche vielleicht schon kurz vorher einen Theil ihres Giftes durch einen Biß verbraucht haben oder in kalter Jahrszeit an Stellen des Körpers beißen, wo wenige Blutgefäße liegen, sind deshalb auch minder gefährlich. Unterbinden des gebissenen Theils, Erweitern und Auswaschen der Wunde mit Branntwein, Lauge ꝛc., Scarificiren und Ausbrennen derselben durch Feuerschwamm und schnelle Anwendung von Schröpfköpfen an der gebissenen Stelle bleiben bis zur Herbeirufung eines Arztes immer die sichersten Mittel, um der Verbreitung des Giftes im Blute vorzubeugen.

Fig. 60.
Kopf der Kreuzotter mit aufgesperrtem Rachen.

p p Fleischige Taschen mit den Giftzähnen; *q* Mündung des cylindrischen Kehlkopfs, unter welchem die Zungenscheide mit der zweispaltigen Zunge *s*; *r r* zwei Reihen Gaumzähne.

Die Zauberkraft der Klapperschlangen erklärt sich durch die Furcht, welche die Thiere bei Erblickung ihres Feindes so bewegungslos macht, daß sie von ihren Mitteln zur Flucht keinen Gebrauch machen, weshalb denn auch durch Nachahmung jenes Klapperns kleine Vögel und Eichhörnchen im heißen Amerika von den Knaben der Wilden eben so bezaubert (!) werden sollen, so daß sie auf diese Weise herabfallen und gefangen werden können. Vielleicht trägt auch die eigenthümliche Ausdünstung der Schlangen zu dieser sonderbaren Wirkung etwas bei. Unsere deutschen Schlangen besitzen solche Zauberkraft, d. h. Furcht einflößende Eigenschaft, nicht; denn häufig tanzten Mäuse, welche ich mit Kreuzottern zusammen in einem Kasten mit Glasdeckel einsperrte, lustig auf diesen umher, bis sie gebissen wurden und starben. 2 Familien (§. 84, b.):

§. 92. **1) Stenostŏma. Engmäuler.** Mundöffnung klein; Kopf klein, nicht vom Rumpfe abgesetzt (nicht breiter als der Hals); überall mit Schuppen.

Augen punktförmig durch die Haut schimmernd; Leib wurmförmig, gleichmäßig beschuppt; Schnauze stumpf — Blödauge . . . . . 1) *Typhlops*
Augen klein, deutlich; Bauchschuppen etwas größer, in der Mittelreihe breit, sechseckig — Wickelschleiche . . . . . Schn. 2) *Ilysia.*

2) Eurystŏma. Großmäuler. Maul bis weit hinter die Augen klaffend; Kopf gegen den Rumpf stark abgesetzt; oben Schuppen, unten Schildschuppen (Schilder).

- Nur derbe Zähne im Oberkiefer: Giftlose
  - Mit Afterſporn (§. 91.); Kinnfurche undeutlich, nur mit Schuppen: Stummelfüßer, Rieſenſchlangen
    - Lippenſchilder ohne Gruben; Schwz unten mit ungetheilten Schildern (Halbringen); Schuppen glatt (Amerikaner) od. gekielt (Aſiaten) — Rieſenſchlange . . . . . 3) *Boa* Laur.
    - Lippenſchilder mit tiefer Grube; Schwz unten mit paarigen Schildern; Schuppen glatt (Aſiaten) — Schlinger . . . . . 4) *Python.*
  - Ohne Afterſporn; Kinnfurche deutlich, mit Schildern; Bauch mit Halbringen; Schwz mit paarigen Schildern: Nattern
    - Rückenſchuppen glatt — Glattnatter . . . . 5) *Coluber* L.
    - Rückenſchuppen gekielt — Kielnatter . . . . . 6) *Tropidonōtus* Wagl.
- Gift- od. Furchenzähne nebſt derben: Giftige
  - Furchenzähne u. Giftdrüſen im Oberkiefer; Kopf nach hinten wenig breiter; Körper peitſchenförmig — Baumſchlange 7) *Dryŏphis.*
  - Hohle Giftzähne u. Giftdrüſen im Oberkiefer; Kopf nach hinten ſehr breit
    - Schwanz rund; oben Schuppen, unten Halbringe
      - keine Grube zwiſchen Augen und Naſenlöchern
        - Rückenſchuppen glatt
          - Leib überall rund; Schuppen gleichartig — Prunkotter 8) *Elaps* Schn
          - Leib durch Bewegung d. Halsrippen ſchildförmig ausdehnbar; Rückenſchupp. ſchmal — Brillſchlange 9) *Naja* Laur.
        - Rückenſchuppen gekielt
          - Kopf nicht gehörnt
            - Kopf bis zum Scheitel mit Schildern — Giftotter 10) *Pelĭas* Merr.
            - Kopf oben überall mit Schuppen — Viper . . 11) *Vipĕra.*
          - Kopf gehörnt — — Hornſchlange . . 12) *Cerāstes* Merr.
      - eine tiefe, mit kleinen Schuppen eingefaßte Grube zwiſchen Augen und Naſenlöchern
        - keine Schwzklapper
          - Kopf mit Schuppen . 13) *Lachĕsis.*
          - Vorderkopf m. Schildern — Kufie . 14) *Trigonocephălus.*
        - eine Schwanzklapper von Horngürteln (Fig. 62.) — Klapperſchlange . . . . . 15) *Crotălus.*
    - Schwanz ſtark zuſammengedrückt (Ruderſchwanz); Rumpf mit glatten Tafelſchuppen — — Seeſchlange . . . . . 16) *Pelămys.*

1. Engmäuler. Giftloſe Schlangen; Maul ſehr enge. §. 93.

1. ***Typhlops lumbricālis*** L. Gemeines Blödauge. Braun; Schwanz ſehr kurz, ſtumpf; 1′ lang und 3‴ dick; Südamerika, in Ameiſenhaufen.

2. ***Ilysĭa scytăle*** L. Gemeine Roll- oder Wickelſchleiche. Blutroth, mit ſchwarzen Querringen; 2′; heißes Amerika.

2. Großmäuler. Giftige und nicht giftige, dann aber durch Größe (Rieſenſchlangen) oft gefährliche Schlangen mit ſtark abgeſetztem Kopfe und bis weit hinter die Augen klaffendem Maule.

† 3. ***Boa constrictor*** L. Gemeine Rieſen-, Königs- oder Abgottsſchlange. Kopf wie der übrige Körper mit kleinen Schuppen; graurothlich; Rücken mit einer gezackten Längsbinde von ſchwärzlichen, unregelmäßigen und blaſſen eiförmigen Flecken; 14—30′; Braſilien; häufigſte Art. Iſt wie die übrigen Rieſenſchlangen nur durch ihre Größe gefährlich, indem ſie Thiere bis zur Größe eines Rehes durch Umwindungen tödtet und dann verſchlingt. Nach einer ſtarken Mahlzeit iſt ſie wie alle Amphibien träge, wird dann häufig getödtet und die Haut zu Stiefeln, Satteleder ꝛc. benutzt.

† *B. scytăle* L. (*aquatica* Pr. Max.). Die Anakonda. Schnauze mit Schildern; braun; längs des Rückens paarweiſe ſtehende, runde, ſchwarze Flecke, an den Seiten Ringflecke; 20—40′ (größte Schlange); Braſilien; gern an Gewäſſern, wo ſie den zur Tränke kommenden Thieren gefährlich iſt.

4. ***Python tigris*** C. Getiegerter Schlinger. Schnauze fleiſchfarbig;

ten Kiefern, die vorn nicht verwachsenen Unterkieferäste, die hakig zurückgebogenen Zähne, die reichliche Absonderung des Speichels und die sehr große Ausdehnbarkeit aller Theile des Rachens erleichtern ihnen das Verschlingen von Thieren, welche viel dicker sind wie sie selbst. Schlangen sind den Menschen nur durch Größe oder Giftigkeit gefährlich und beißen selten ungereizt. Nur die Schlangen mit Furchen- oder Giftzähnen (kaum 1/3 aller Schlangen) sind giftig. Die Zahl der Giftzähne (S. 83.) beträgt jederseits 1—5; nur der erste und größte dient zum Beißen; die übrigen kleinern sind Reservezähne, wenn die ersteren beim Beißen etwa ausgerissen werden. Das Gift wird in einer besondern Giftdrüse abgesondert, aus deren Mündung an der Zahnwurzel das Gift beim Bisse durch den hohlen Zahn in die Bißwunde (2 feine, wie mit einer Nadel gemachte Löcher) strömt. Schon einige Tropfen können tödten, aber nur, wenn sie ins Blut von Warmblütern kommen, wo dann sogleich Anschwellung des gebissenen Gliedes entsteht; für kaltblütige Thiere ist Schlangengift nicht gefährlich. Die Gefahr hängt ab: 1) von der Größe der Schlange; 2) von der Menge des ausgeströmten Giftes; 3) vom Klima und 4) von der gebissenen Stelle selbst. Kleine Giftschlangen und solche, welche vielleicht schon kurz vorher einen Theil ihres Giftes durch einen Biß verbraucht haben oder in kalter Jahreszeit an Stellen des Körpers beißen, wo wenige Blutgefäße liegen, sind deshalb auch minder gefährlich. Unterbinden des gebissenen Theils, Erweitern und Auswaschen der Wunde mit Branntwein, Lauge ꝛc., Scarificiren und Ausbrennen derselben durch Feuerschwamm und schnelle Anwendung von Schröpfköpfen an der gebissenen Stelle bleiben bis zur Herbeirufung eines Arztes immer die sichersten Mittel, um der Verbreitung des Giftes im Blute vorzubeugen.



Fig. 60.
Kopf der Kreuzotter mit aufgesperrtem Rachen.

p p Fleischige Taschen mit den Giftzähnen; *q* Mündung des cylindrischen Kehlkopfs, unter welchem die Zungenscheide mit der zweispaltigen Zunge *s*; *r r* zwei Reihen Gaumzähne.

Die Zauberkraft der Klapperschlangen erklärt sich durch die Furcht, welche die Thiere bei Erblickung ihres Feindes so bewegungslos macht, daß sie von ihren Mitteln zur Flucht keinen Gebrauch machen, weshalb denn auch durch Nachahmung jenes Klapperns kleine Vögel und Eichhörnchen im heißen Amerika von den Knaben der Wilden eben so bezaubert (!) werden sollen, so daß sie auf diese Weise herabfallen und gefangen werden können. Vielleicht trägt auch die eigenthümliche Ausdünstung der Schlangen zu dieser sonderbaren Wirkung etwas bei. Unsere deutschen Schlangen besitzen solche Zauberkraft, d. h. Furcht einflößende Eigenschaft, nicht; denn häufig tanzten Mäuse, welche ich mit Kreuzottern zusammen in einem Kasten mit Glasdeckel einsperrte, lustig auf diesen umher, bis sie gebissen wurden und starben. 2 Familien (S. 84, b.):

S. 92. **1) Stenostŏma. Engmäuler.** Mundöffnung klein; Kopf klein, nicht vom Rumpfe abgesetzt (nicht breiter als der Hals); überall mit Schuppen.

Augen punktförmig durch die Haut schimmernd; Leib wurmförmig, gleichmäßig beschuppt; Schnauze stumpf — Blödauge . . . . . 1) *Typhlops* Schn.
Augen klein, deutlich; Bauchschuppen etwas größer, in der Mittelreihe breit, sechseckig — Wickelschleiche . . . . . 2) *Ilysĭa.*

2) Eurystŏma. Großmäuler. Maul bis weit hinter die Augen klaffend; Kopf gegen den Rumpf stark abgesetzt; oben Schuppen, unten Schildschuppen (Schilder).

arz,

§. 94.

:en.
eta=
:eim
oder
ären
:zlich
od.
urch

:aul=

:eisten
bens=
Lun=
:einen
quap=
inchen
Die
tigen,
:epro=
illien:

1. Frauenmauer.

wanz= §. 95.

aur.

: Wagl.

2. Frauenmauer.

aur.

Vagl.

'or
r.
Vagl.

r.

:ert,

§. 93. Körper iſabellgelb mit großen braunen Flecken längs des Rückens und einem gabelförmigen auf dem Hinterkopfe; über 10′; Oſtindien; oft in Menagerien.

* 5. ***Coluber laevis*** Merr. (***austriăcus*** Gm.). Glatte Natter. Röthlichgrau ins Grünliche, mit 2 Reihen brauner Rückenflecke und einem hufeiſenförmigen Nackenflecke; Schuppen mit braunem Pünktchen an der Spitze; bis 2′; faſt ganz Europa; hier häufig.

* 6. ***Tropidonōtus natrix*** L. Gemeine Natter, Ringelnatter, Unke. Graublau; Rücken mit 2 Reihen ſchwärzlicher Flecken; Bauchringe ſchwarz, beiderſeits weiß gefleckt; hinter den Schläfen beiderſeits ein ſchwarz geſäumter, weißlicher Mondfleck (vermeintliche Krone); bis 4′; überall in Europa. Schwimmt gut.

† 7. ***Dryŏphis ahaetulla*** L. Südamerikaniſche Baumſchlange. Perlgrau; Oberſeite blaugrün ſchillernd; nach der Schwanzſpitze hin ſehr dünn; 5′.

† 8. ***Elaps corallinus*** Pr. Max. Korallen-Prunkadder. Zinnoberroth, mit ſchwarzen, grün und weiß eingefaßten Ringen; 3′; Braſilien.

‡ 9. ***Naja tripudians*** Merr. Brillenſchlange. Gelblich, unten weiß; Nackenſcheibe mit brillenförmiger Zeichnung; 2—4′; Oſtindien; häufig und ſehr giftig. Gaukler reißen ihnen die Giftzähne aus und wiſſen ſie zu allerlei beluſtigenden Bewegungen abzurichten.

‡ *N. Haje* Geoffr. Aegyptiſche Aspis, Schlange der Kleopatra. Aegypten, wo man (nach Gallenus) Verbrecher durch ſie hinrichtete. Auch die Kleopatra ſoll ſich mit derſelben getödtet haben.

†* 10. ***Pelias berus*** L. Kreuzotter. (Kopf Fig. 61.) Hellgrau (♂) oder bräunlich (♀); ein Zickzackband längs des Rückens, neben welchem beiderſeits eine Reihe kleiner Flecken; auf dem Hinterkopfe 2 ſchmale, gekrümmte, ſchwarzbraune Linien; Lippenſchilder weiß; ſelten über 2′. Vorzüglich in Gebirgsgegenden unter Geſträuch und in Steinbrüchen; in den meiſten Gegenden Deutſchlands nicht ſelten. Leben vorzüglich von Mäuſen, freſſen aber in der Gefangenſchaft nicht; ihr Gift kann den Menſchen ſchon innerhalb einer Stunde tödten; doch beißen ſie nur gereizt und können mit ihren Zähnen nicht durch Stiefelleder dringen. Die Kupfernatter (*P. cherseă* L.) iſt ein noch nicht ausgewachſenes ♀ und die Höllennatter (*P. Prester* L.) eine ſchwärzliche Abart derſelben.

Fig. 61. Kopf der Kreuzotter mit aufgeſperrtem Rachen.

p p Fleiſchige Taſchen mit den Giftzähnen; *q* Mündung des cylindriſchen Kehlkopfs; unter welchem die Zungenſcheide mit der zweiſpaltigen Zunge *s*; *r r* zwei Reihen Gaumzähne.

† 11. ***Vipĕra ammodўtes*** L. Sandviper, Viper mit gehörnter Schnauze. In Zeichnung der Kreuzotter ähnlich, aber 2 weiche Hörnchen über der Schnauzenſpitze; 2′; Dalmatien, Ungarn.

† 12. ***Cerāstes cornūtus*** Wagl. Gehörnte Viper. Grau; über jedem Augenliede eine Hahnenſporn ähnliche Hervorragung; 2′; Aegypten; häufig auf ägyptiſchen Denkmälern dargeſtellt.

‡ 13. ***Lachĕsis rhombeāta*** Pr. Max. Rautenſchlange, Sukuruku. Gelblich; Rücken mit ſchwärzlichen Rautenflecken; 7′; Südamerika. Gift derſelben bei Homöopathen officinell.

‡ 14. ***Trigonocephălus atrox*** Merr. Scheußliche Kufie. Hellgraubraun, mit ſchwarzen, ſcharf abgeſchnittenen Flecken; 5—6′; Surinam, Braſilien; häufig.

‡ 15. ***Crotălus horridus*** L. Schreckliche Klapperſchlange. Graubraun, oben mit ſchwarzbraunen, weißlich geſäumten Rautenflecken; 4—6′; Südamerika; häufig u. ſehr gefährlich.

‡ *Cr.* ***durissĭmus*** L. Braun, mit ſchwärzlichen, ſchleifenförmigen, weißgerandeten Binden auf dem Rücken; 4—6′; wärmeres Nordamerika; ſehr häufig.

Fig. 62. Klapper der Klapperſchlange. §. 92, 15.

† 16. *Pelămys bicŏlor* Schn. Zweifarbige Seeschlange. Schwarz, unten gelb; 2′; im Meere bei Otaheiti.

B. Reptilĭa nuda. Nackthäuter (§. 84 a.). S. 94.

IV. Ordnung. *Batrachĭa.* Lurche oder Froschreptilien.

Körper kurz oder langgestreckt, immer nackt, glatt od. warzig; eine Metamorphose; 4, 2 oder keine Beine. Die ♀ legen ihre zahlreichen, mit Schleim umgebenen Eier in Klumpen (Frösche) oder an Schnüren hängend (Kröten) oder einzeln (Wassermolche) meist ins Wasser ab (der Erdmolch und Olm gebären lebendige Junge). Die aus den Eiern kriechenden Jungen sind anfangs gänzlich ans Wasser gebunden, haben keine Beine, sind fischähnlich (Kaulquappen od. Froschlarven), schwimmen mit Hülfe ihres Ruderschwanzes und athmen durch äußerliche Kiemen an den Seiten des Halses (Fig. 63.), bis die Lungen-Rudimente allmählig ausgebildet, die äußeren Kiemenäste verschwunden sind, der nicht von Knochen unterstützte Schwanz und hornige Schnabel sich verloren und die Beine sich entwickelt haben, wodurch sie ihren Eltern nach und nach immer ähnlicher werden. Die meisten Frösche und Lurche gehen, nachdem sie diese Metamorphose beendigt haben, ans Land; die meisten Molche bleiben im Wasser, sind deshalb als Frösche zu betrachten, welche lebenslang Kaulquappen bleiben; die Fischmolche behalten die Kiemen nebst den Lungen. Der Olm hat keine Metamorphose. Die Nackthäuter leben von kleinen Wasserthieren (Insekten, Würmern), fressen auch wohl Fischlaich, die Kaulquappen auch zarte Pflanzen. Bei einigen Froschlurchen schwellen dem Männchen zur Begattungszeit im Frühjahre die Daumen der Vorderfüße sehr an. Die Erd- und Wassermolche sondern aus den Hautdrüsen einen scharfen, milchartigen, aber ganz unschädlichen Saft ab; sie besitzen zugleich die größte Reproductionskraft unter den Reptilien, so wie die Frösche die lauteste Stimme. 3 Familien:



Fig. 63. Fast ausgewachsene Kaulquappe vom Triton.

1) Ecaudāta. Froschlurche. Körper kurz, breit, 4beinig, schwanzlos. Froschform (§. 84 b.): S. 95.

- Ohne Zunge: Fehlzüngler.
  - Haut rauh; Zehen nagellos — Wabenkröte . . . 1) *Pipa* Laur.
  - Haut glatt; die 3 Innenzehen mit Nägeln — Krallenfrosch . . . . . 2) *Xenŏpus* Wagl.
- Mit Zunge
  - Ohne Ohrdrüsen; Hinterbeine länger
    - Haut glatt (hüpfen)
      - Zehen mit Saugscheibe; halbe Schwimmhäute; ♂ mit einer Schallblase — Laubfrosch. . 3) *Hyla* Laur.
      - Zehen ohne Saugscheibe; ganze Schwimmhäute; Zunge hinten frei — Frosch . . . . . 4) *Rana* L.
    - Haut warzig (kriechen meist)
      - Zunge ganz angewachsen
        - halbe Schwimmhäute — Fesler. . . . . 5) *Alytes* Wagl.
        - ganze Schwimmhäute — Feuerkröte . . 6) *Bombinātor* Merr.
      - Z. hinten frei; ganze Schwimmhäute — Teichunke. . . . . 7) *Pelobates* Wagl.
  - Mit Ohrdrüsen; Haut sehr warzig; Hinterbeine kaum länger; Zunge hinten frei — Kröte . . . . . 8) *Bufo* Laur.

2) Caudāta. Schwanzlurche oder Molche. Körper verlängert, 4-, selten 2beinig, langgeschwänzt. Eidechsenform:

Vier Beine; Kiemen verlieren sich während der Metamorphose: **Wassermolche.**
- Schwanz drehrund; Ohrdrüsen groß (leben an feuchten Orten) — Erdmolch . . . 9) *Salamándra* Laur.
- Schwanz seitlich zsgedrückt; keine Ohrdrüsen (im Wasser) — Wassermolch 10) *Tritón* Laur.

Vier oder 2 Beine; Kiemen oder eine seitliche Kiemenspalte bleibt neben den Lungen: **Fischmolche.**
- Leib molchförmig (einem Triton ähnlich); Vorderfüße 4-, Hinterfüße 5zehig; mit Kiemenbüscheln — Axolotl . . . . . 11) *Sirédon* Wagl.
- Leib aalförmig; Kiemenbüschel
  - Vorderfüße 3-, Hinterfüße 2zehig — Proteus . . . 12) *Proteus* Laur.
  - Nur 2 vierzehige Vorderfüße — Armmolch . . . . . 13) *Siren* L.

3) Anguinĕa. Schleichenlurche. Körper schwanz- und beinlos, wurmförmig, mit Querfurchen; After am stumpfen Körperende. **Schlangenform:**

- Augen deutlich, punktförmig, vor denselben eine Grube — Lochwühle 14) *Siphónops* Wagl.
- Augen fehlen; zwischen den Nasenlöchern eine Grube — Blindwühle . . . . . 15) *Cæcília* L.

§. 96. **1. Froschlurche.** Beständig im Wasser oder auch auf dem Lande lebende, durch Wegfangen von Insekten nützliche, aber auch wohl Fischlaich fressende Reptilien mit lauter Stimme.

1. ***Pipa dorsigĕra.*** Pipa, Wabenkröte. Warzig; schwarzbraun; 6 bis 8″; Brasilien. ♂ streicht dem ♀ die Eier auf den Rücken und befruchtet sie; das ♀ geht dann ins Wasser, wo die Haut aufschwillt und Zellen bildet, in welchen die Jungen ihre Kaulquappenzeit abhalten und erst nach entwickelten Beinen herauskriechen.

2. ***Xenópus Bafĕt*** Wagl. Krallenfrosch. Braun; 3″; Südafrika.

* 3. ***Hyla arborĕa*** L. Europäischer Laubfrosch. Lebhaft grün, unten gelblich; Seiten mit gelber, schwarz begränzter Längslinie; 1½″. Ganz Europa (England ausgenommen). Laichen gegen Ende Aprils im Wasser; sind anfangs bräunlich, erst nach mehren Häutungen lebhaft grün; leben Sommers auf Gesträuchen, auf den Blättern sich festklebend; ♂ schreit, ist aber ein schlechter Wetterprophet.

* 4. ***Rana esculénta*** L. Grüner Frosch. Grün, schwarz gefleckt; Rücken mit 3 gelben Streifen; 3″; lebt fast überall in stehenden Gewässern; ist im Juni zur Laichzeit durch sein nächtliches Geschrei lästig. Froschkeulen als Speise; Froschlaich zum sogenannten Froschlaichpflaster in Apotheken; vertilgt Insekten.

* ***R. temporaria*** L. Brauner oder Grasfrosch. Röthlich oder gelbbraun, schwarzgefleckt, mit schwarzbraunem Ohrflecke; 3″; paart sich im Anfange des Frühjahrs, quakt weniger, lebt mehr auf dem Lande, ist häufiger wie voriger, und wird ebenso benutzt.

5. ***Alýtes obstetrícans*** Laur. Eiertragender Feßler, Höhlenkröte. Bläulich-aschgrau, schwärzlich gefleckt; 1½″; Süd- und Mitteldeutschland; nie im Wasser; laicht auch im Trocknen, wobei das ♂ sich die Eierschnur des ♀ um die Hinterbeine schlingt.

* 6. ***Bombinátor ignéus*** Merr. Feuerkröte. Grau oder bräunlich, unten schwarzblau mit orangegelben Flecken; 1½″; in stehenden Gewässern fast ganz Europas. — ****B. pachýpus*** Bonap. ist sehr ähnlich, hat aber dickere und kürzere Schenkel und kürzere Zehen. Am Harze.

* 7. ***Pelobátes fuscus*** Laur. Wasser- oder Knoblauchskröte. Schmutzig weißgrau und braun gefleckt; 2½″; fast nur in Sümpfen; häufig; hüpft.

* 8. ***Bufo cinerĕus*** (***rana bufo*** L.) Gemeine Kröte, Lork, Feldkröte. Grau, braungrau oder grünlich, braun gefleckt; unten weißlich; Ohrdrüse nierenförmig; 3—4″; laicht im März; kriecht Nachts hervor und nützt in Gärten durch Insektenfang; spritzt gereizt wie Frösche den Urin weit fort. Die weißliche Absonderung der Haut ist scharf, aber nicht giftig. Europa, Japan; häufig.

* ***B. calamíta*** L. Kreuzkröte. Olivengrünlich; Warzen röthlich; Rücken mit hellgelbem Längsstreife; 3″; laicht im Juni. In altem Gemäuer nicht selten.

2. Schwanzlurche. Im Wasser oder an feuchten Orten von Insekten lebende, gleichsam lebenslängliche Kaulquappen mit der größten Reproductionskraft (§. 83.).

* 9. ***Salamándra maculáta*** Laur. Gefleckter Erd- oder Feuersala-

mander, Erdmolch. Schwarz, mit hochgelben, großen Flecken; 5—6″; in bergigen Gegenden häufig und von den Alten, so wie noch jetzt vom Landvolke sehr gefürchtet. Durch Reiz spritzt aus den Hautdrüsen eine weißliche, nicht giftige Feuchtigkeit hervor, so daß das Thier wohl über glühende Kohlen wegkriechen kann, woher vielleicht der Glaube seiner Unverbrennlichkeit entstand. — Der von Scheuchzer für einen fossilen Menschen (*homo diluvii testis*) gehaltene Riesensalamander (*Salamandra gigantea* C.) aus dem Oeninger Stinkschiefer war 3′ lang; also nicht größer wie sein nächster Verwandter, *Salamandra maxima* oder *Cryptobranchus japonicus*, von Thunberg in Japan gefunden.

* **10.** *Triton palustris* L. Wasser- oder Sumpfsalamander. Haut körnig, schwarzbraun; Seiten mit weißen Punkten; unten unregelmäßig orangegelb gefleckt; ♂ zur Paarungszeit im Frühjahre mit violett gesäumtem Hautkamme (*T. cristatus* Laur.); 5½″; sehr häufig in stehendem Gewässer.

* *T. punctatus* Merr. Gefleckter Wassersalamander. Haut glatt, hellbraun; unten orangegelb mit schwarzen, runden Flecken; 3½″; daselbst häufig.

* *T. alpestris* Laur. Feuerbauchiger Wassersalamander. Haut körnig, schiefergrau; unten einfarbig orangeroth; 3½″; weniger häufig; in Bergbächen.

* *T. cinereus* Merr. Kleiner oder Teichsalamander. Haut glatt, olivenfarbig, mit dunkeln Längsstreifen; unten gelb mit schwarzbraunen Flecken; 3″. In Teichen und Pfützen; unsre gemeinste Art; wird von Einigen für das junge Thier des *T. palustris* gehalten.

11. *Sirēdon mexicanus* C. Kolbenmolch od. Axolotl. Grau, schwarz gefleckt; 6—10″; Excremente roth wie beim Wallfische. In den Seen um die Stadt Mexiko, wo er häufig gegessen und zum Verkaufe auf die Märkte gebracht wird. Cortez's Soldaten lebten längere Zeit von Kolbenmolchen.

12. *Proteus anguinĕus* Laur. Olm. Bleichroth; fingerdick; 1′; Augen unter der durchsichtigen Haut (§. 14, 2); im Bache in der Adelsberger Höhle. Die einzige wahre Amphibie Europas, da sie Lungen und Kiemen zugleich hat.

13. *Siren lacertina* L. Armmolch. Schwärzlich; jederseits mit weißlicher Längslinie; 3′; Sümpfe Carolina's; früher für eine Kaulquappe gehalten.

3. Schleichenlurche. Wühlen in feuchter Erde und stehen durch die kleinen, in den Hautfalten versteckten Schuppen den Eidechsen nahe.

14. *Siphonops annulata* Spix. Lochwühle. Schwärzlich, mit weißen Ringeln (über 80); tief unter Morasterde in Brasilien.

15. *Caecilia lumbricoidea.* Wurmschlange, Blindwühle. Schwärzlich; 2′ lang und 2½″ dick; Surinam, wo sie wie der Regenwurm in feuchter Erde lebt.

IV. Klasse. **Pisces. Fische.** §. 97.

Rückgrathsthiere mit rothem, kaltem Blute; athmen durch Kiemen, welche aber nie außerhalb des Halses liegen wie bei Froschlarven und Fischmolchen (§. 94. u. 95.); sind mit Schuppen oder Schildern bedeckt, selten nackt; leben nur im Wasser und bewegen sich durch ächte, d. h. mit Gräten und knorpeligen Fäden versehene Flossen (§. 54.). Ihr Skelet besteht gewöhnlich aus Knochen (Knochenfische), welche bei vielen aber faserigknorpelig oder knorpelig bleiben (Knorpelfische); nur bei einigen ist das Skelet sehr weich und fast häutig (einige Rundmäuler) und diese bilden den Uebergang zu den wirbellosen Thieren. Die **Gestalt** der Fische ist mannichfaltiger als die der übrigen Wirbelthiere, meist elliptisch und seitlich-, selten von oben und unten zusammengedrückt (Rochen) oder drehrund (Aale, Neunaugen); der **Hals** fehlt immer. **Athmungswerkzeuge:** Die mit vielen Blutgefäßen durchzogenen, aus kammförmig aneinander gereiheten Blättern (wie die Fahnen einer Feder), seltener aus büschligen oder franzenartigen Fäden bestehenden **Kiemen** (*branchiae*) liegen am Hinterkopfe und sind an bogenförmigen Knochen, **Kiemenbögen** (gleichsam Brustrippen) befestigt. Die Kiemen sind entweder mit einem **Kiemendeckel** (Fig. 64.) bedeckt, dessen dem Augenhöhlenrande zunächst liegender Theil **Vorderdeckel** heißt, oder an der äußern Haut festgewachsen, welche dann

§. 97. die Decke bildet u. äußerlich Spalten (Fig. 68.) zeigt, welche in die Kiemenhöhle führen. Sehr verschieden ist die innere Structur des Kiemen-Arterien-Stammes, auf welche neuerdings J. Müller ein neues System der Fische gebauet hat. Die Fische athmen, indem sie das Wasser verschlucken, den Mund schließen und das Wasser, aus welchem der Sauerstoff ans Blut abgegeben ist, wieder bei geöffnetem Kiemendeckel durch die weiten Oeffnungen zwischen den Kiemen heraustreiben. Die Fische sind also die einzigen Wirbelthiere, welche auf verschiedenem Wege ein- und ausathmen. Da ihnen die Lungen fehlen, können sie auch keine **eigentliche Stimme** haben; doch geben einige (Wetterfisch, Knurrhahn) mit Hülfe ihres Mundes oder Kiemendeckels einen Laut von sich. Bildung des Herzens und einfacher Kreislauf des Bluts (§. 18, D.). Ihre **Bedeckung** besteht in Schuppen, selten in Schildern (Störe Fig. 67.) oder Stacheln (Stachelbauch) oder Hautkörnern (Haie Fig. 68.), noch seltener ist die Haut nackt (Weise und Rundmäuler). Die Schuppen sind zuweilen sehr groß (Spiegelkarpfen), oft sehr klein u. in der Haut versteckt (Aale); häufig zeigen sie durch das unter ihnen liegende Schleimnetz die prachtvollsten, nach Klima, Alter, Geschlecht, Jahrszeit, Nahrung ꝛc. oft sehr verschiedenen Farben. Sie sind meist mit Schleim überzogen, welcher vorzüglich durch die Drüsen in der **Seitenlinie** (Fig. 64) in Menge abgesondert wird.



Fig. 64. Flußbarsch.

Ihre **Bewegungsorgane** sind die, den Hauptcharakter der Fische bildenden Flossen, welche nach ihrer Lage: **1)** Brustflossen a (bei den fliegenden Fischen sehr groß); **2)** Bauchflossen b; **3)** After- oder Steißflosse c; **4)** Rückenflossen e und f; und **5)** Schwanzflosse d heißen. **Stachelflossen** (Fig. 64 e) sind durch harte, ungegliederte Strahlen, dagegen **Weichflossen** (Fig. 64 d) durch weiche, ästig getheilte Strahlen gestützt; **Fettflossen** od. **falsche Flossen** sind ganz ohne Strahlen. **Brust- und Bauchflossen** sind immer paarig und den 4 Extremitäten der höhern Thiere analog. (S. 23, 2) Die Lage der Flossen gegen einander ist für die Klassification sehr wichtig. Die Schwanzflosse ist immer eine Weichflosse und steht als Steuerruder immer senkrecht am Ende des Schwanzes. Die mit Luft gefüllte einfache oder doppelte **Schwimmblase** ist entweder geschlossen oder häufiger durch einen eigenen Canal (Luftgang) mit dem Schlunde, selten mit dem Magen, in Verbindung. Durch beliebiges Zusammendrücken erleichtert sie den Fischen die Bewegung, namentlich das Steigen und Sinken im Wasser, wie beim cartesianischen Teufelchen. Vorzüglich haben die Süßwasserfische eine Schwimmblase; dagegen fehlt sie den mehr unten im Wasser lebenden oder sich in Schlamm einwühlenden Fischen (Rochen, Schollen) ganz oder ist doch nur sehr klein. Die **Sinnesorgane** sind sehr unvollkommen entwickelt. **Besondere Gefühlsorgane** fehlen; der Tastsinn liegt bloß in den Lippen und wird durch Bartfäden oft verfeinert, welche bestimmt zu sein scheinen, die Fische vor Berührung fremder Gegenstände zu warnen, auch wohl ihren Fang zu ködern. Die Augen haben keine Augenlieder, können nicht auf denselben Punkt gerichtet werden und fehlen dem Blindfische (§. 120.) ganz. Ein **äußeres Ohr** fehlt; nur bei Rochen und Haien ist die Lage des innern Ohres äußerlich durch eine Vertiefung angedeutet; doch hören Fische sehr gut und Karpfen können durch Pfeifen oder Klingeln gewöhnt werden, an die Oberfläche des Wassers zu kommen. Die einfachen oder gepaarten **Nasenlöcher** an der Spitze der Schnauze sind nach dem Rachen zu immer ver-

schlossen (Hauptunterschied von Amphibien). Die **Zunge** ist klein und wenig zum Schmecken geeignet (§. 14, 3), mehr wohl die schwammige, nervenreiche Rachenschleimhaut einiger Fische (sogenannte Karpfenzunge bei den Karpfen). Die in Zahl und Stellung sehr unregelmäßigen **Zähne** sind mit Ausnahme der an der Säge des Sägefisches (§. 118.) nie eingekeilt, sondern entweder mit den Kiefern verwachsen oder an allen Mundtheilen, am Schlunde, Gaumen, an der Zunge ꝛc. eingewachsen und daher mehr Rachen- als Kieferzähne. Bei einigen Fischen (Meerbrassen) sind die Zähne kurz und breit und stehen steinpflasterartig zusammen (Pflasterzähne); bei wenigen sind sie so fein, daß sie ein sammetartiges Ansehen haben (Borstenzähne); nur wenige Fische haben gar keine Zähne (mehre Karpfen). Bei den Haien haben die Zähne oft doppelte Wurzeln, sind durch Bandmasse an den knorpeligen Kieferrändern befestigt u. können aufgerichtet und niedergelegt werden. Fische nehmen ihre **Nahrung**, welche sie ungekäuet verschlucken, fast nur aus dem Thierreiche, indem sie von anderen Fischen leben (Raubfische) oder von Amphibien, Mollusken, Quallen, Insekten und deren Larven; nur wenige (z. B. Barsche und Karpfen) fressen auch Vegetabilien. Die meisten Fische sind sehr gefräßig und verschlingen ohne Auswahl alle kleinern Thiere, welche sie erhaschen können. Am gefräßigsten sind die Raubfische (Haie, Hechte), welche sogar unverdauliche Gegenstände verschlingen; manche Fische können dagegen auch lange fasten. Die Fische, vorzüglich die Meerfische, sind nächtliche Thiere, weshalb denn auch die vorzüglich von Fischen lebenden Völker des Nachts den Fischfang betreiben. Die Fische haben keinen bestimmten, täglichen Erholungsschlaf; ob sie einen Winterschlaf haben, ist nicht erwiesen, doch sind sie im Winter weniger munter, ja einige Süßwasserfische können (nach Bronn) wochenlang fest in Eis einfrieren, ohne zu erfrieren (Ersatz des Winterschlafes). Um ihre Nahrung zu erlangen, bedienen sich einige ihrer langen Bartfäden als Köder (Froschfisch, Sternseher §. 100, 7 ꝛc.); andere schießen die über dem Wasser schwebenden Insekten mit einem Wasserstrahle aus ihrem schnabelförmigen Maule herab (Spritzfisch §. 100, 18.); noch andere betäuben ihre Beute durch elektrische Schläge (§. 21, a. 3.). Der **elektrische Apparat**, welcher beim Zitteraale im Schwanze, beim Zitterwelse an der Unterseite des Körpers, bei den übrigen an den Seiten des Kopfes liegt, gleicht zahlreichen Platten einer voltaischen Säule (beim Zitteraale über 1 Million Platten). Sie können durch ihre Schläge selbst in einiger Entfernung (ohne unmittelbare Berührung) sogar größere Thiere lähmen und tödten. **Fortpflanzung.** Die Fische sind alle getrennten Geschlechts (bei den Karpfen hat man nur anomalisch Zwitter gefunden) und ohne äußere Fortpflanzungsorgane; bei manchen (z. B. Neunaugen) sind die ♀ ungleich zahlreicher als die ♂, weshalb man sie wohl für ☿ gehalten hat. Nur bei Rochen und Haien, welche Eier mit hornartiger Schale legen, findet eine wirkliche Paarung Statt; bei den meisten giebt das ♀ (Rogener) den Rogen noch unbefruchtet von sich (laicht) und das ♂ (Milchner) gießt dann den Saamen (Milch) darüber. Man hat auf solche Weise auch Lachsforellen künstlich vermehrt. Nur wenige Fische (Aale und Aalmutter §. 111. und 102.) gebären auch lebendige Junge. Die meisten Fische laichen im Frühjahre; der Hecht und Blei schon im Februar, der Barsch im April, doch der Stör erst im August, der Karpfen im October; manche, wie die Neunaugen, erst im December. Die **Vermehrung** der Fische ist sehr groß; ein Karpfen hat an 300,000, ein Stör, Kabeljau und mehre andere haben Millionen von Eiern. Das ganze Leben der Fische geht in der Sorge für Nahrung und in der Furcht vor ihren Feinden auf; ihre Fähigkeiten sind sehr eingeschränkt; man bemerkt an ihnen weder Kunsttrieb noch ausgezeichneten Instinkt; doch sollen Stichlinge und Meergrundeln ihren Laich bewachen. Ihr **Aufenthaltsort** ist das Meer (Meerfische) oder Flüsse, Seen und Teiche (Süßwasserfische). Außerhalb des Wassers fallen die Fische leicht in Asphyxie (Pulslosigkeit, der höchste Grad der Ohnmacht, mit der Unthätigkeit der Lungen oder Kiemen beginnend und sich zum Herzen und Gehirn fortpflanzend), nicht weil ihnen der Sauerstoff fehlt, sondern weil die Lamellen der Kiemen nicht mehr durch das Wasser in gehöriger Lage gehalten werden, zusammenfallen, das Blut nicht mehr durchströmen lassen und so

§. 97.

§. 97. vertrocknend ihre Function nicht mehr verrichten können. Fische mit stark gespaltenen Kiemen sterben daher leichter, als die mit engen Kiemenöffnungen (Aal) oder mit besondern Wasserbehältern (Wassersäcken) zum Befeuchten der Kiemen. Der Aal und Kletterfisch (§. 100, 20) kann deshalb sogar längere Zeit außer dem Wasser leben. Die meisten Fische leben nur im Meere; jedoch halten sich in großen Tiefen keine Fische bleibend auf, weil es ihnen dort an Nahrung fehlt, indem kleine Thiere und selbst Tange (II. §. 337.) selten unter 1000′ Tiefe hinabgehen; dagegen einige Forellenarten auf den Pyrenäen gegen 7000′ hoch in den Seen leben. Manche führen fast eine Sitzlebensart, indem sie immer da bleiben, wo sie geboren sind, andere dagegen irren stets umher; manche unternehmen sogar zu gewissen Zeiten mehr oder weniger lange Reisen und steigen namentlich in die Flüsse hinauf oder kommen an die Meeresküste, um zu laichen (Hechte und Störe). Besonders erscheinen Häringe, Schellfische und Makrelen oft in zahlloser Menge und machen weite Züge oder kommen aus der Tiefe herauf, um zu laichen. So wie die luftathmenden Thiere nicht in verdorbener Luft leben können, so können auch Fische nicht im Wasser leben, welches mit der Atmosphäre nicht in ununterbrochener Verbindung steht oder aus welchem die Luft schon abgesetzt ist. (Im Trüben ist gut zu fischen.) Durch Kockelskörner, Brechnüsse (II. §§. 205. u. 220.), Hanf, Flachs ꝛc. wird das Wasser für Fische verdorben. **Feinde:** Menschen u. Raubfische; letztere verfolgen sich unter einander selbst. Wallfische, Haifische, Krokodile u. besonders große Seesäugethiere wie manche Wasservögel fressen Fische und Fischlaich. Der Körper der Fische wird von Fischläusen (§. 212.), Eingeweidewürmern, namentlich Faden- und Saugwürmern (§. 216.) oft sehr geplagt, ja oft sind die Augen der Fische vom Doppelloche (§. 217.) so angefüllt, daß sie ganz weißgrau aussehen (grauer Staar). Auch zu große Hitze und Kälte schadet ihnen. **Nutzen:** Die Fische gehören als Nahrungs-, Gewinnungs- und Handelsgegenstände zu den wichtigsten Naturprodukten. **1)** Sie liefern meist gesunde **Nahrung** und sind in dieser Hinsicht so allgemein nützlich, daß nicht nur ganze Nationen fast einzig auf Fischnahrung beschränkt sind (Eskimos, Grönländer ꝛc.), sondern daß auch Fang, Zubereitung und Handel mit ihnen für Tausende von Menschen einen bedeutenden Nahrungszweig bildet. **Eintheilung im Handel:** See- oder Meerfische und Flußfische: **a)** frische oder grüne Fische (frische Fische, gute Fische, sprichwörtlich); **b)** marinirte, d. h. frisch auf dem Roste gebratene, mit Oel bestrichene und dann in eine Brühe von Essig, Salz ꝛc. gelegte; **c)** gedörrete (getrocknete), d. h. erst eingesalzene und dann getrocknete; **d)** geräucherte, d. h. erst eingesalzene und dann geräucherte Fische. Wichtig sind: **a)** wegen des Fleisches: 1) Häringe und Sardellen; 2) Schellfische; 3) Neunaugen und Lampreten; 4) Schollen; 5) Lachse und Forellen; 6) Barsche; 7) Karpfen; 8) Hechte; 9) Thunfische; 10) Störe; 11) Meerbarben ꝛc. **b)** Wegen der gesalzenen Eier (Caviar oder Bottagen): Störe, Hausen, Meeräschen ꝛc. **2)** Sie liefern **Fischleim, Hausenblasen,** d. h. **Leim** von Stören, Welsen ꝛc. (§. 116.). **3) Unächte Perlen** aus den Silberschuppen des Uklei (§. 107.). **4) Ueberzüge** für Koffer, Kästchen ꝛc., besonders aus den Häuten des Aals, mehrer Lachse (gegerbte Lachshäute, §. 107.), der Rochen und Haie (Chagrin). Die Haut der letztern auch zum Poliren. **5) Fett,** Fischthran, Häringsthran, zum Einschmieren des Leders in der Lohgerberei, zur Bereitung der schwarzen Seife ꝛc. Der Gicht- oder Leberthran (§. 109.) dient auch als Heilmittel. **Schaden.** Kein Fisch hat Giftzähne oder Giftorgane. Schädlich hält man das Fleisch einiger Fische, welche unter derbem Hautpanzer ein weiches Fleisch besitzen; schädlich wird der Genuß mancher Fische in Folge ihrer Nahrung oder eines krankhaften Zustandes wie bei Säugethieren (Milzbrand) oder wenn sie schon lange gefangen oder getödtet sind (Thunfisch, §. 100.); manche können auch mit ihren Stacheln schwer verwunden. Einige große Arten, besonders Haie (§. 118.) im Meere und Hechte im Süßwasser, schaden den übrigen Fischen durch ihre Freßgier; Haifische sind auch für Menschen gefährlich und elektrische Fische (§. 21, a. 3) theilen betäubende Schläge aus. Man kennt etwa 8000 verschiedene lebende und etwa 1461 fossile Arten; Deutschland hat etwa 90 Fluß- und 40 Meerfischarten.

Uebersicht der X Ordnungen und deren Familien. §. 98a.

I. Ostacānthi. Grätenfische. Skelet knochig; Körperhaut mit Schuppen; Maul meist am Schnauzenende.

A. Stachelflosser (acanthopterygii). Rückenflosse mit ungegliederten Stachelstrahlen.

- Kopf nicht verlängert
  - Bauchflossen meist unter od. gleich hinter den Brustflossen. — Brust-Stachelflosser (§. 99.) . . . I. Thoracici.
  - Bauchflossen vor den Brustflossen, an der Kehle — Kehl-Stachelflosser. (§. 101.) . . . . . II. Juguläres.
- Kopf in einen langen, röhrenförmigen Schnabel verlängert — — Pfeifenmäuler. (§. 103.) . . . . . III. Fistulāti.

B. Weichflosser (malacopterygii). Rückenflosse mit gegliederten, ästig getheilten und biegsamen Strahlen. §. 105.

- Mit Bauchflossen
  - Bauchflossen am Bauche, hinter den Brustflossen — Bauch-Weichflosser (§. 105.) . . . . . IV. Abdominäles.
  - Bauchflossen an der Kehlgegend — Kehl-Weichflosser (§. 108.) . . . . . V. Subbranchiäles.
- Ohne Bauchflossen, oft auch die übrigen Flossen mehr od. weniger fehlend — Kahlbäuche (§. 110.) . . . . . VI. Apödes.

II. Chondracānthi. Knorpelfische. Skelet knorpelig; Körperhaut ohne wahre Schuppen, rauh, stachlig oder mit Schildern; Maul ein runder Saugmund oder eine Querspalte unterhalb des Schnauzenendes. §. 112.

A. Freikiemer (eleutherobranchii). Kiemen an der Außenseite frei, mit Kiemendeckel.

- Ohne Bauchflossen — Haftkiefer (§. 113.) . . . . . VII. Plectognāthi.
- Mit Bauchflossen — Bedecktkiemer (§. 115.) . . . . . VIII. Branchiostĕgi.

B. Haftkiemer (pectinibranchii). Kiemen an der Außenseite festgewachsen, ohne Kiemendeckel.

- Maulöffnung quer; Bauch- u. Brustflossen — Quermäuler (§. 117.) IX. Plagiostŏmi.
- Maulöffnung rund; ohne Bauch- und ohne Brustflossen — Rundmäuler (§. 119.) . . . . . X. Cyclostŏmi.

I. Grätenfische. §. 98b.

I. Brust-Stachelflosser. 9 Familien. §§. 99—101. Meist Meerfische.

- Mit Zähnen und Stacheln am Rande des Kiemendeckels
  - Kopf gepanzert; Kopfknochen nicht grubig; Schuppen rauh; gewöhnliche Fischform. Meer- u. Süßwasserfische — (Flußbarsch Fig. 64.) . . . . . 1. Barsche.
  - Kopf beschuppt; Kopfknochen grubig. Meerfische. — (Seeadler) . . . . . 2. Umberfische.
- Ohne Zähne und Stacheln am Rande des Kiemendeckels
  - Haut mit kleinen, glatten od. körnigen Schuppen od. schuppenlos. Meerfische.
    - Klein- u. glattschuppig, selten nackt; Rückenflosse zuweilen mit einigen freien Strahlen u. hinter derselben falsche Flossen — (Thunfisch) . 3. Makrelen od. Thunfische.
    - Schuppenlos, chagrinartig; eine Rückenflosse; Schwz oft mit Knochenschildern — (Schnäpperfisch) . 4. Stachelschwänze od. Lederfische.
  - Haut mit großen, trockenen Schuppen
    - auch die senkrechten Flossen am Grunde mit großen Schuppen
      - Körper hoch, scheibenförmig stark zsgedrückt; 1 Rückenflosse; Kiemen ohne Wasserfäcke. Meerfische — — (Spriefisch) . . . . . 5. Schuppenflosser.
      - K. länglich, wenig zsgedrückt; lange Rückenflosse; Kiemen mit Wasserfäcken (S. 112.[40]). Süßwasserfische. — (Kletterfisch) . . . . . 6. Landkriecher
    - senkrechte Flossen ohne Schuppen
      - Körper fast drehrund, länglich; 2 Rückenflossen; Maul und Lippen klein. Meerfische. — (Meeräsche) . . . . . 7. Harder.
      - K. zsgedrückt, ellyptisch; 1 große Rückenfl.
        - Lippen groß und fleischig. Meist Meerfische. — (Rother Lippfisch) . . . 8. Lippfische.
        - L. klein, nicht fleischig — (Goldbrasse) 9. Meerbrassen.

§. 98b.

II. Kehl-Stachelflosser. 4 Familien. §§. 101—103. Meist Meerfische.

- Brustflossen nicht gestielt
  - Körper nicht bandförmig
    - Kopf mit großen, meist rauhen Wangenknochen oder mit freien Strahlen vor der Rückenflosse; meist Meerfische. — (Stichling) . . . . . 1. Panzerwangen.
    - Nicht so; Kopf abgerundet; kleinbeschuppt oder nackt; Rückenflosse mit dünnen, biegsamen Strahlen. Meerfische. — (Aalmutter) . . . . . 3. Meergrundel.
  - Körper bandfg, kleinbeschuppt; Rückenflosse über dem ganzen Körper. Meerfische — (Rother Bandfisch) . . . 4. Bandfische.
- Brustflossen gestielt; Kopfform verzerrt. Meerfische. — (Meerteufel) . . . . . 2. Froschfische.

III. Pfeifenmäuler. 2 Familien. §§. 103—105. Meerfische.

- Kiemen wie gewöhnlich, blatt- oder kammförmig; Körper mit kleinen Schuppen od. nackt, walzig od. oval. — Meerfische. — (Tabackspfeife) . . . . . 1. Röhrenmäuler.
- Kiemen in runden Büscheln od. Quasten; Körper mit Hautschildern gepanzert, eckig. — Meerfische. — (Seepferdchen) . . . . . 2. Büschel- oder Quastenkiemer.

IV. Bauch-Weichflosser. 5 Familien. §§. 105—108. Meist Süßwasserfische.

- Haut beschuppt
  - mit einer Fettflosse über dem After. — — (Rheinlachs). . . . . 1. Lachse.
  - ohne Fettflosse
    - Oberkinnlade ganz vom Zwischenkiefer gebildet
      - Maul klein; Kiefern meist zahnlos; Rückenflosse mitten auf dem Rücken — (Karausche) . . . . . 2. Karpfen ob. Weißfische.
      - Maul groß, mehr oder weniger schnabelförmig; Kiefern m. starken Zähnen; Rückenflosse meist über der Afterflosse. — (Gemeiner Hecht) . . 3. Hechte.
    - Oberkinnlade mitten vom Zwischenkiefer, an den Seiten von den eigentlichen Kieferknochen gebildet; Rückenflosse meist mitten über der Bauchflosse — (Gemeiner Häring) . . . . . 4. Häringe.
- Haut nackt ob. mit Knochenschildern; lange Bartfäden an beiden Kinnladen. — (Gemeiner Wels) . . 5. Welse.

V. Kehl-Weichflosser. 4 Familien. §§. 108—110. Meerfische.

- Ohne Saugscheibe; beschuppt
  - Körper regelmäßig; gewöhnl. Fischform. — (Kabliau) . . . . . 1. Schellfische.
  - Körper unregelmäßig, rautenförmig, flach; Kopf verdrehet; Maul schief; Augen auf einer Seite. — (Gemeine Scholle) . . . . . 2. Schollen.
- Mit Saugscheibe; nackt oder feinbeschuppt
  - Bauchflossen an der Kehle in eine Saugscheibe verwachsen. — (Seehase) . . . . . 3. Scheibenbäuche.
  - Kopf oben mit einer in Felder getheilten Saugscheibe. — (Schiffshalter) . . . . . 4. Schildfische.

VI. Kahlbäuche. Nur eine gleichnamige Familie. §. 110.

(Flußaal) . . . . . Kahlbäuche.

II. Knorpelfische.

VII. Haftkiefer. Familien. §§. 113—115. Meerfische

- Kiefern mit Schmelz (elfenbeinartigem Ueberzuge); Haut mit Stacheln. — (Stachelbauch) . . . . . 1. Nacktzähne.
- Kiefern mit deutlichen Zähnen; Haut mit harten Schuppen oder eckigen Knochenschildern. — (Vierhorn) . . . . . 2. Harthäuter.

VIII. Bedecktkiemer. Nur eine Familie in Flüſſen laichender Meerfiſche.
Mit ſpindelförmigem Körper und querem Maule unter der Schnauze.
— (Hauſen) . . . . . Störe.

IX. Quermäuler. 2 Familien. §§. 117—119. Meerfiſche.
- Bruſtfloſſen deutlich vom Kopfe getrennt; Leib ſpindelförmig. — (Gemeiner Haifiſch) . . . . 1. Haifiſche.
- Bruſtfloſſen mit dem Kopfe verwachſen; Leib ſcheibenförmig. — (Zitterroche) . . . . . 2. Rochen.

X. Rundmäuler. Nur eine gleichnamige Familie. Meer- u. Süßwaſſerfiſche.
Mit aalförmigem, nacktem Körper. — (Neunauge) . Sauger od. Rundmäuler.

I. Ostacānthi. Gräten- oder Knochenfiſche. §. 99.

Skelet hart, knochig; Schädelknochen durch Nähte verbunden; Körper meiſt mit Schuppen und im Innern meiſt mit Rippen; Kiemen meiſt kammförmig, am Hinterrande frei; eine Kiemenöffnung mit Kiemendeckel; Muskelgräten, d. h. mit den Gräten des Rückgraths nicht zuſammenhängende, meiſt gabelförmige, im Muskelfleiſche liegende und dies unterſtützende Gräten.

A. **Stachelfloſſer.** Die Rückenfloſſe ganz oder zum Theil mit einfachen, ungegliederten Stachelſtrahlen, welche zuweilen ganz freie Stacheln ohne Hautverbindung bilden. Zahlreiche Arten, $^3/_4$ aller bekannten Fiſche; meiſt in wärmeren Meeren.

I. Ordnung. *Thoracĭci.* Bruſt-Stachelfloſſer (Bruſtfloſſer).

Kopf nicht verlängert; Bauchfloſſen meiſt unter oder etwas hinter, ſelten vor den Bruſtfloſſen. 9 Familien (§. 98b).

a) Mit Zähnen und Stacheln am Rande des Kiemendeckels.

1) Percoidĕi. Barſche. Kopf gepanzert; Kopfknochen nicht grubig; Kiefern u. Gaumknochen mit Zähnen; Leib von gewöhnlicher Fiſchform; Schuppen rauh. Meer- und Süßwaſſerfiſche.

- Bauchfloſſen unter den Bruſtfloſſen
  - 7 Kiemenſtrahlen
    - 2 Rückenfloſſen offen
      - Feine, dichtſtehende Zähne
        - Kiemendeckel ſchuppenlos, mit 2—3 Stacheln am Rande; Zunge glatt. — Barſch . . . . . 1) *Perca* L.
        - K. mit Schuppen, 2 Stacheln am Rande; Zunge rauh. — Seebarſch . 2) *Labrax* C.
      - Feine Zähne und ſpitz-koniſche Fangzähne dazwiſchen. — Sander . 3) *Lucioperca* C.
    - 1 Rückenfloſſe; nur kleine Zähne. — Kaulbarſch . . . . . 4) *Acerina* C.
  - 3—4 Kiemenſtrahlen; 2 Rückenfloſſen; 2 lange Bartfäden; Schuppen groß. — See- oder Meerbarbe 5) *Mullus* L.
- Bauchfloſſen vor*) den Bruſtfloſſen (2 Rückenfl.)
  - Maul ſchief aufwärts; Augen oben genähert; Kiemendeckel mit ſtarkem Stachel. — Drachenfiſch . . . 6) *Trachinus* L.
  - Maul ſenkrecht, Kopf faſt 4ſeitig; Augen wie vorher; Schulter mit ſtarkem Stachel — Sternſeher . . 7) *Uranoscopus* L.
- Bauchfloſſen hinter den Bruſtfloſſen; vor den Bruſtfloſſen mehre lange, fadenförmige Strahlen. — Fingerfiſch . . . . . 8) *Polynemus* L.

*) Von den eigentlichen Kehlfloſſern (§. 101.) durch den gezähnelten Vorderdeckel zu unterſcheiden.

§. 99. **2) Sclaenoidĕi. Umberfische.** Kopf ganz mit Schuppen; Kopfknochen grubig; nur die Kiefern mit Zähnen. Meerfische.

- Die erstere der beiden Rückenflossen kürzer; gewöhnliche Fischform. — Umberfisch . . . . . 9) *Sciaena* C.
- Die erstere der beiden Rückenflossen sehr hoch; Körper nach hinten zugespitzt. — Ritter . . . . . 10) *Eques* Bl.

b) Ohne Zähne und Stacheln am Rande des Kiemendeckels.

α) Nur die Haut mit kleinen, glatten oder körnigen Schuppen oder schuppenlos.

3) Scomberoidĕi. Makrelen oder Thunfische. Körperform verschieden; Haut klein- und glattschuppig, selten nackt; hinter der Rücken- und Afterflosse oft falsche Flossen; die ersten Strahlen der Rückenflosse zuweilen verlängert und frei. Meerfische.

Körper gestreckt, länglich:
- 2 Rückenflossen; falsche Flossen hinter den Rücken- und Afterflossen. — Makrele . . . . . 11) *Scomber* L.
- 1 Rückenflosse:
  - Oberkiefer in eine schwertförmige Spitze verlängert. — Schwertfisch . . . . 12) *Xiphĭas* L.
  - Kopf abgestutzt:
    - vor der Rückenflosse mehre freie, unverbundene Strahlen — Pilot . . . . . 13) *Naucrătes.*
    - Rückenflosse über den ganzen Rücken laufend. — Dorade 14) *Coryphaena* L.

Körper hoch, kurz, dünn; Strahlen der 1sten Rückenfl. sehr lang, neben der 2ten u. Afterflosse gabelfg. Stacheln. — Sonnenfisch 15) *Zeus* L.

4) Teuthĭdae. Lederfische, Stachelschwänze. Körper hoch, oval, dünn, mit einer Rückenflosse; Haut schuppenlos, chagrinartig; Schwanzseiten oft mit Knochenschildern. Meerfische.

- Schwanz jederseits mit beweglichem, lanzettförmigem Stachel; Nase gewöhnlich. — Chirurg . . . . . 16) *Acanthūrus* Bl.
- Schwanz mit Höckern und unbeweglichen Platten; über der Nase ein vorstehendes Horn. — Einhornfisch . . . . . 17) *Nasĕus.*

β) Haut und auch die senkrechten Flossen an ihrem Grunde mit großen Schuppen.

5) Squamipĕnnes. Schuppenflosser. Körper hoch, scheibenförmig, stark zusammengedrückt; 1 Rückenflosse; Kiemen ohne Wasserfäcke (S. 112, 20). Meerfische.

- Maul mit Borstenzähnen, schnabelförmig verlängert; Rückenflosse ungetheilt. — Schnabelfisch . . . . . 18) *Chelmon* C.
- Maul ebenso, aber kurz; 4ter Strahl der Rückenflosse sehr lang. — Kutscher . . . . . 19) *Heniŏchus* C.

6) Chersobătae. Landkriecher. Körper länglich, wenig zusammengedrückt; Kiemen mit Wasserfäcken (S. 112, 20); 1 lange Rückenflosse. Süßwasserfische.

- Ohne fadenförmige Verlängerung der Bauchflosse. — Kletterfisch 20) *Anăbas* C.
- Erster Strahl der Bauchflosse fast bis zum After verlängert. — Gorami 21) *Osphromĕnus* C.

γ) Ebenso, aber die senkrechten Flossen ohne Schuppen.

7) Mugiloidĕi. Harder. Körper länglich, fast drehrund; 2 Rückenflossen; Maul und Lippen klein. Meerfische.

Bauchflossen etwas hinter den Brustflossen:
- 4 Stachelstrahlen in erster Rückenflosse. — Meeräsche . . . . . 22) *Mugil* L.
- 7—9 Strahlen in erster Rückenflosse. — Aehrenfisch . . . . . 23) *Atherīna* L.

8) Labroidĕi. Lippfische. Körper länglich, zusammengedrückt; 1 große Rückenflosse; Maul groß, mit dicken, fleischigen Lippen. Meist Meerfische.

Mit langen, kegelförmigen Zähnen: Kopf länger als hoch: Seitenlinie gerade. — Lippfisch 24) *Labrus* L.
Seitenlinie endet unter der Rückenflosse. — Rabenfisch . . . . . 25) *Chrómis* C.
Kopf höher als lang, vorn steil abgestutzt. — — Rasiermesser . . . . . 26) *Xyrichthys* C.
Mit kurzen, schuppenförmig hinter einander stehenden, mit den Kiefern verwachsenen Zähnen; Kiefern convexvortretend — Papageifisch 27) *Scarus* L.

9) Sparoidĕi. Meerbrassen.

Ebenso, aber Lippen nicht fleischig. Meerfische.

Mund nicht vorstreckbar; Kiefern mit 4—6 kegelförmigen Vorderzähnen und mehren Reihen abgerundeter Backenzähne — Goldbrasse 28) *Chrysóphyrs* C.
Mund vorstreckbar; Kiefern mit gleichartigen, spitzen Zähnen . . 29) *Maena* C.

1. Barsche.

Schmackhafte, häufige Fische der heißen Meere. §. 100.

* 1. ***Perca fluviatilis*** L. Flußbarsch, Baas. (Fig. 64.) Grünlich gelb; Rücken mit 6—7 schwärzlichen Querbinden; Schwanzflosse u. paarige Flossen röthlich; 1½'. Schmackhafter Raubfisch unsrer Süßwässer. Nebst dem Kaulbarsche von unsern übrigen Süßwasserfischen durch die Flossenstellung leicht unterscheidbar.

2. ***Labrax lupus*** C. Gemeiner Seebarsch. Silberfarbig; erste Rückenflosse mit 9 Strahlen; 2'; atlantisches und mittelländisches Meer. Der wohlschmeckende Lupus der Römer oder Labrax der Griechen.

3. ***Lucioperca sandra*** C. Hechtbarsch, Sander oder Sandart. Bleigrau; Rücken mit vielen schwärzlichen Querbinden; Rückenflosse schwach gebändert; 3—4'; über 20 Pfund. Flüsse und Seen Deutschlands (Donau, Plattensee in Ungarn).

* 4. ***Acerina cernua*** L. Kaulbarsch, Schroll. Olivengrün, mit schwarzbräunlichen Punkten an Körper und Flossen; 6—8"; Süßwässer Nordeuropas; häufig und schmackhaft. Abart mit goldglänzendem Kiemendeckel (Goldbarsch).

5. ***Mullus barbātus*** L. Gemeine Seebarbe, Rothbart. Rosenroth; Flossen gelb; 1½'; Mittelmeer. Berühmt wegen des Luxus, welchen römische Schwelger mit diesem so wie mit dem ähnlichen, rothflossigen, goldstreifigen *M. surmulētus* trieben, auch wegen des wundervollen Farbenspiels beim Sterben.

6. ***Trachīnus draco*** L. Petermännchen. Braunroth, mit schwärzlichen Flecken und schiefen Querstreifen; 1'; im Meere um Europa; schmackhaft.

7. ***Uranoscōpus scaber*** L. Rauher Sternseher. Grünlichbraun; erste Rückenflosse klein, mit 4 Strahlen, zweite lang; 1'. Mittelmeer. Die Bartfäden dienen ihm als Köder.

8. ***Polynēmus paradiseus*** L. Schöner Fingerfisch; Gelb; jederseits 7 freie Strahlen vor den Brustflossen; 6"; Bengalen.

2. Umberfische.

Barschähnliche, schmackhafte Meerfische.

9. ***Sciaena aquila*** L. Seeadler. Silbergrau; Flossen röthlich; 6'; Mittelmeer. Jetzt wie ehemals (Umbrina der Römer) sehr geschätzt; Kopf Leckerbissen. Die großen Ohrsteine wurden früher als Schutzmittel gegen Kolik (Kolikstein) um den Hals getragen.

10. ***Eques americānus*** Bl. Amerikanischer Ritter. Oben hellblau; Körper mit 3 schwarzen, weiß eingefaßten Binden; 5—6". Westindisches Meer.

3. Makrelen.

Große, schmackhafte Meerfische.

* 11. ***Scomber scombrus*** L. Gemeine Makrele. Die 2 Rückenflossen weit von einander entfernt; oben bläulich, mit schwärzlichen Querstreifen; unten silberig; 5 falsche Flossen oben und unten; 1½—3'; Nord- und Ostsee; häufig. Ein gefräßiger, sehr schmackhafter Raubfisch. Zieht wie folgender in großen Schaaren durchs Meer; ist im Canale von März bis April so häufig, daß die Eier gleich Seifenschaum sich auf dem Wasser verbreiten. Bilden einen guten Fang, aber wenig guten Handelsartikel, weil ihr weichliches Fleisch bald verdirbt. Lieferte nebst verwandten Arten den Römern ihr berühmtes Garum (Fischbrühe), wofür jetzt Sardellenbrühe Mode geworden ist.

§. 100. * *Sc. thynnus* L. Thunfisch. Die 2 Rückenflossen stoßen zusammen; oben bläulich, unten silberig; 8—9 falsche Flossen oben und unten; 6—18′ und 3—6 Centner; Mittelmeer, Nord- und Ostsee. Lebensart und Nutzen der Makrele; wird namentlich im Frühlinge auf seinem Zuge aus dem schwarzen ins Mittelmeer bei Constantinopel so wie bei Sardinien und Sicilien in ungeheurer Menge gefangen; schon eine Hauptspeise der alten Athener. Das Fleisch wird leicht schädlich; darf deshalb an mehren Orten nur in gesetzlich bestimmter Zeit verkauft werden.

12. *Xiphias gladius* L. Schwertfisch, Hornfisch. Ohne Bauchflosse; oben bläulich, unten silberig: 15—18′; 4—5 Centner; Mittelmeer; schmackhaft; Fang für Calabrien und Sicilien sehr wichtig.

13. *Naucrates ductor* L. Gemeiner Pilot, Lootsenfisch. Bläulichweiß, mit 3 breiten, dunkelblauen Querbinden; 4 freie Rückenstrahlen; 6—12″. Mittelmeer. Begleitet die Schiffe in Gesellschaft der Haie, für deren Führer ihn die Schiffer halten. Lebt nach Meyen's Vermuthung vom Auswurfe der Haie, doch fand Hasselquist in dessen Magen Fische.

14. *Coryphaena hippurus* L. Gemeine Dorade, Stutzkopf, Goldkarpfen. Grünblau, mit einzelnen, gelblichen Flecken; 4—5′; Mittelmeer; eßbar; sehr gefräßiger Verfolger der fliegenden Fische. Farbenspiel wie bei Mullus.

15. *Zeus faber* L. Gemeiner Sonnenfisch. Gelblich; jederseits ein runder, schwarzer Fleck; 2′; schmackhaft; Mittelmeer. Petrus soll in ihm den Zinsgroschen gefunden haben (St. Peterfisch).

4. Stachelschwänze. Vorzüglich von Tangen (II. §. 337.) lebende Meerfische.

16. *Acanthurus chirurgus* Bl. Aderlasser, Schnäpperfisch. Gelblich, mit bräunlichen Querbinden an den Seiten; 6—11″; Antillen-Meer.

17. *Naseus fronticornis* C. Nashornfisch. Oben bläulich, unten gelblichgrau; 1—2′; rothes Meer.

5. Schuppenflosser. Schön gefärbte Fische der heißern Meere.

18. *Chelmon rostratus* L. Spritzfisch. Weißlich, mit 5 braunen, weißlich gesäumten Querbinden und einem Augenflecke auf der Rückenflosse; 6″; ostindisches Meer. Lebt von Uferinsekten (S. 105.).

19. *Henïochus macrolepidotus* L. Kutscher. Bläulichweiß; 2 breite, schwärzliche Querbinden über dem Körper; Schuppen groß; über 1′; an 20 Pfund. Ostindisches Meer; sehr schmackhaft (Tafelfisch).

6. Landkriecher. Süßwasserfische Ostindiens.

20. *Anabas scandens* C. Kletterbarsch, Baumkletterer. Grünlich, unten gelblich, sehr schleimig; 6—10″; Süßwässer Ostindiens. Hat labyrinthförmige Schlundknochen mit wasserhaltenden Zellen (Wassersäcke), um Wasser zum Befeuchten der Kiemen zurückzuhalten, weshalb er 6 Tage außerhalb des Wassers leben kann (S. 105 u. 106). Er kriecht häufig im Grase umher und soll nach des Lieutenants Dallborf's Versicherung sogar auf Gesträuche klettern.

21. *Osphromenus olphax.* Braun, vertical grünlich gestreift; an 6′; China. In Teichen auf Isle de France eingeführt; soll der wohlschmeckendste aller Fische sein.

7. Harder. Schmackhafte, truppweise in Flüsse steigende Meerfische.

22. *Mugil cephalus* C. Breitköpfige Meeräsche. Bläulich, mit mehren bläulich-goldigen Längsstreifen; 2′; Mittelmeer; an der Südküste Frankreichs in solcher Menge, daß sie eingesalzen die gewöhnliche Fastenspeise liefern; auch in den Lagunen Venedigs, wo man den Inhalt des Darmkanals wie den Schnepfendreck (§. 79, 4) für Leckerbissen hält; liefert auch Caviar (S. 106 b).

23. *Atherina hepsetus* C. Gemeiner Aehrenfisch. Gelblich, schwarz punktirt; 5—6″; Mittelmeer; sehr gemein, besonders in den Canälen Venedigs.

8. Lippfische. Fleischig-lippige Meer- und Süßwasserfische.

24. ***Labrus trimaculātus*** L. Rother Lippfisch. Roth; unpaarige Flossen blau gesäumt; Hinterrücken mit 3 schwarzen Flecken; 1'; indisches Meer; wohlschmeckend.

25. ***Chromis vulgāris*** C. Trommelfisch. Braun; 4'; Mittelmeer; wird häufig gegessen. Nach Cuvier's Vermuthung verursachen Truppe dieser Fische das anhaltende, von Seefahrern zuweilen unter Schiffen bemerkte Trommeln.

26. ***Xyrichthys pentadactyla*** Bl. Sechsauge. Rücken bräunlich; Seiten weißlich. Rückenflosse orangegelb eingefaßt; hinter den Augen und am Bauche 5 blaue Augenflecken; 1'; ostindisches Meer; wohlschmeckend.

27. ***Scarus creticus.*** Kretischer Papageifisch. Roth oder blau (nach der Jahrszeit); 1'; Mittelmeer; früher wie jetzt als schmackhaft beliebt.

9. Meerbrassen. Im Gebisse sehr verschiedene Meerfische.

28. ***Chrysŏphrys aurāta*** L. Goldbrasse. Silberig, mit vielen goldigen Längsstreifen, über dem Auge ein halbmondförmiger Goldstreif; 1—1½'; Mittelmeer; häufig und schon bei den Alten als schmackhaft bekannt.

29. ***Maena vulgāris*** C. Laxirfisch, Farbenwechsler. Grau; Seiten mit schwärzlichem Spiegelflecke; Winters fast weiß; 6—8'; Mittelmeer; das zähe Fleisch soll wie das des Goldbrassen abführend wirken.

II. Ordnung. *Jugulāres.* Kehl-Stachelflosser (Kehlflosser.) §. 101.

Kopf nicht verlängert; Bauchflossen vor den Brustflossen an der Kehle; Vorderdeckel ungezähnelt. (Die Kehlflosser unter den Barschen (§. 99.) haben einen gezähnelten Vorderdeckel). 4 Familien.

a. Kopf unverhältnißmäßig groß; Körperform verzerrt.

1) Trigloïdĕi. Panzerwangen. Kopf mit großen, meist rauhen Wangenknochen; Körper mit Schuppen oder Schildern; Bauchflossen fast zwischen den Brustflossen, oft mit einigen freien Strahlen. Meist Meerfische.

- Keine freie Stacheln vor den 2 Rückenflossen
  - Kopf höher als breit
    - Kopf fast 4seitig; 3 freie Strahlen vor den großen Brustflossen — Knurrhahn . . . . . 1) *Trigla* L.
    - Kopf etwas abgestutzt; mehre verbundene Strahlen vor den körperlangen Brustflossen. — Flughahn . . . . . 2) *Dactyloptĕrus* Lacep.
  - Kopf breiter als hoch; Haut nackt; Bauchflossen schmal, mit 3—4 Strahlen. — Gröppe 3) *Cottus* L.
- Mehre freie Stacheln vor der Rückenflosse; statt der Bauchflossen 2 Stacheln. — Stichling . . . . . 4) *Gasterostĕus* L.

2) Lophioïdĕi. Froschfische, Armflosser. Kopf ohne Panzer, mit Bartfäden; Körper nackt; Brustflossen gestielt, dienen zum Fortkriechen, so wie die Bartfäden zum Anlocken kleiner Fische im Uferschlamme.

- Maul sehr groß, froschähnlich; 2 Rückenflossen. — Seeteufel. . 5) *Lophĭus* L.
- Maul klein; 1 Rückenflosse. — Seekröte . . . . . 6) *Antennarĭus.*

b. Kopf verhältnißmäßig; Körper langgestreckt.

3) Gobioïdĕi. Meergrundel. Kopf abgerundet; Maul weit; Körper mäßig lang, klein-beschuppt oder nackt, sehr schleimig; Rückenflossen mit dünnen, biegsamen Strahlen. Meerfische.

- Eine Rückenflosse, fast über dem ganzen Rücken
  - Bauchflossen mit 2 Strahlen; unpaarige Flossen zusammenlaufend. — — Aalmutter . . . . . 7) *Blennius* L.
  - ebenso, aber Bauchflossen fehlend. — Meerwolf . . . . . 8) *Anarrhĭchas* L.
- Zwei Rückenflossen; Bauchflossen in eine hohle Saugscheibe mit einander verwachsen. — Meergrundel . . . . . 9) *Gobĭus* L.

Kiefern zahnlos
- Körper meist hoch, stark seitlich zusammengedrückt; Schuppen groß (*Cyprīnus* L.)
  - Rückenflosse m. 1—2 Knochenstrahlen
    - Rückenflosse länger als die Afterflosse
      - 4 Bartfäden — Karpfen . . . 3) *Cyprīnus* C.
      - keine Bartfäden — Karausche . 4) *Carassius* C.
    - Rücken- und Afterflosse gleich lang; 4 Bartfäden. — Barbe 5) *Barbus* C.
  - Rückenflosse ohne Knochenstrahlen
    - 2 Bartfäden
      - klein beschuppt. — Schleihe . . . 6) *Tinca* C.
      - groß beschuppt. — Gründling . 7) *Gobio* C.
    - keine Bartfäden
      - Rückenflosse kürzer als die lange Afterflosse. — Brasse . . . . 8) *Abrāmis* C.
      - Rücken- u. Afterflosse kurz, ziemlich gleich lang. — Weißfisch. 9) *Leucīscus*.
- Körper aalförmig, mit kleinen Schuppen, mit vielem Schleime und mit 6—10 Bartfäden. — Grundel . . 10) *Cobītis* L.
- Oberkieferrand mit Zähnen; Körper verlängert; Augen vorgequollen, durch eine Querbinde getheilt. — Hochgucker . . . . . 11) *Anāblcps* C.

3) Esocīni. Hechte. Flossen und Kinnladenbildung wie vorher; Rückenflosse meist über der Afterflosse; Maul groß; Kiefern immer mit Zähnen; Körper ziemlich walzig, lang gestreckt. Im Meer- und Süßwasser.

- Brustflossen von gewöhnlicher Länge
  - Kiefernlänge gewöhnlich; Schnauze flach, stumpf; große Zähne im Unterkiefer. — Hecht . . . . . 12) *Esox* L.
  - Beide Kiefern zu einer spitzen Schnauze sehr verlängert. — Hornhecht . . . . . 13) *Belone* C.
- Brustflosse sehr lang; Kopf oben flach. — Flugfisch . . . . . 14) *Exocoetus* L.

4) Clupeacĕi. Häringe. Nur 1 Rückenflosse mitten auf dem Rücken; keine Fettflosse; Oberkinnlade mitten vom Zwischenkiefer, seitlich von den eigentlichen Kieferknochen gebildet. Meist Meerfische.

- Schuppen weich, von gewöhnlicher Form; Körper stark zsgedrückt
  - Maul klein; Oberkiefer breit, aus 3 Stücken u. mit schwach gebogenem Außenrande. — Häring . . 15) *Clupĕa* L.
  - Maul tief gespalten; Oberkieferknochen schmal, gerablinig. — Sardellen. . . . . 16) *Engraulis* C.
- Schuppen knochenhart, viereckig; Körper walzig; Schnauze schnabelförmig verlängert. — Knochenhecht . . . . . 17) *Lepidostĕus* Lacep.

b. Haut nackt oder mit Knochenschildern.

5) Silurīni. Welse. Lange Bartfäden an beiden Kinnladen. Flußfische.

- Leib nackt
  - Rückenflosse klein, ohne Stachelstrahl; Afterflosse sehr lang. — Wels . . . . . 18) *Silūrus* L.
  - Fettflosse statt der Rückenflosse. — Zitterwels . . . . 19) *Malapterūrus* Lacep.
- Leib ganz mit eckigen Schildern bedeckt; 1 Rückenflosse mit Stacheln; Maul unter der Schnauze. — Panzerwels . . . . . 20) *Loricaria* L.

§. 107. **1. Lachse.** Schmackhafte Süßwasser- und Meerfische letztere steigen zur Laichzeit in die Flüsse.

* **1. *Salmo salar* L.** Salm, großer oder Rheinlachs. Schwarzgrünlich, Seiten bläulich, unregelmäßig braun gefleckt, unten weißlich; 2—5′, größte Art. Leben von Würmern, Insekten, kleinen Fischen ꝛc. Ziehen im Mai aus den nordischen Meeren in geordneten Schaaren aufwärts in die Flüsse (Rhein, Elbe, Weser), wobei sie oft über 4—5′ hohe Wehre springen. Geräusch (Wassermühlen, Dampfschiffe) so wie ihre Hauptfeinde, die Seehunde, verscheucheu sie. Das röthliche Fleisch wird frisch, geräuchert und marinirt sehr geschätzt. Sälmlinge heißen die jährigen, Weißlachse die ausgewachsenen und fetten, Graulachse die magern und schlechten, Rothlachse die im Meere, Kupferlachse die zur Laichzeit gefangenen. Bei alten ♂ steht der Unterkiefer hakig vor (Hakenlachs). Die Tungusen kleiden sich in gegerbte Lachshäute.

* ***S. fario* L.** Lachsforelle, gemeine Forelle, Steinforelle. In Färbung sehr veränderlich; Seiten mit rothen, blau eingefaßten Flecken im hellern Felde; 1—1½′; Gebirgsbäche Deutschlands; Fleisch weiß, sehr geschätzt.

S. alpīnus L. Alpenforelle, Rothfisch. Im alpinischen u. nördlichen Europa; zu Zeiten die einzige Nahrung der schwedischen Lappen, so wie der grönländische Lachs (*S. arcticus*) nebst Seehundsfleisch die Hauptnahrung der Grönländer. §. 107.

* 2. *Osmērus eperlānus* L. Stint, Alander. Grau; Seiten blaugrün, silberig, unten röthlichweiß; Afterflosse lang; 5″; Landseen und Flüsse Deutschlands (Elbe, Weser); schlecht riechend, aber wohlschmeckend.

2. Weißfische. Wohlschmeckende, von Würmern, Insektenlarven, Pflanzenstoffen und von diese enthaltendem Schlamme, so wie von Koth, Aas und besonders gern von Schafmist lebende Süßwasserfische.

* 3. *Cyprīnus carpĭo* L. Gemeiner Karpfen. Olivenbräunlich, Seiten gelblich; 4 kurze Bartfäden; Schwanz stark gegabelt; 1—4′ und 3—40 Pfund. Spiegelkarpfen oder Karpfenkönig nennt man eine fast nackthäutige Abart mit 3 Reihen großer Schuppen. Aus Südeuropa seit 300 Jahren allmählig nach Nordeuropa und nach Amerika verpflanzt; gleichsam als Hausthier unter den Fischen überall in Teichen wegen des wohlschmeckenden Fleisches und der starken und leichten Vermehrung. Karpfenzunge (S. 105.) früher bei den Römern und jetzt noch in Frankreich ein Luxusartikel. Die Galle zum Färben und zur Bereitung des Saftgrüns; Schwimmblase zu schlechter Hausenblase (§. 116.).

* 4. *Cyp. carassĭus* L. Karausche. Dunkel olivengrün, mit hohem, stark gekrümmtem Rücken: Schwanzflosse abgestutzt; Seitenlinie gerade; ½—1′. Nordeuropa; wohlschmeckend.

Cyp. aurātus L. Goldfisch. In der Jugend schwärzlich, später goldfarbig oder silberig; 3″—1′; von China nach Europa gebracht; in Südeuropa in Teichen; bei uns in Gläsern der Schönheit wegen gehalten.

* 5. *Barbus vulgāris* C. Gemeine Barbe. Olivengrün, dunkel punktirt; Seiten grüngelb; Oberkiefer weit vorstehend; Schwanz gegabelt; Körper schmal; 18—24″. Flüsse Deutschlands; Fleisch grätig; der Genuß des Rogen hat oft gefährliche Zufälle erzeugt (S. 106.).

* 6. *Tinca vulgāris* C. Gemeine Schleihe. Dunkelgrün, unten ins Gelbliche; Schwanzflosse fast abgestutzt; 1—2′; einer der verbreitetsten Flußfische Deutschlands; wohlschmeckend. Goldschleihe ist goldfarbig, schwarz gefleckt.

* 7. *Gobĭo fluviatĭlis* C. Gemeiner Gründling, Greßling, Grimpe. Dunkelgrau, unten weißlich; Rücken- und Schwanzflosse schwärzlich punktirt; 6—8″; überall in Flüssen Europas; wohlschmeckend.

* 8. *Abrāmis brama* L. Blei, Brassen. Hochgewölbt; oben olivengrau; Seiten gelblich; Flossen schwarzgrau; 1½—2′; Süßwasser Europas; Fleisch grätig.

* 9. *Leuciscus erythrophthālmus* L. Plötze, Rothauge. Schwarzgrün; alle Flossen roth; Rückenflosse hinter der Bauchflosse; 1′; Deutschland; häufig.

* *L. phoxĭnus* L. Ellerütze, Bitterfisch. Leib sehr gestreckt, oben schwärzlich, gelb gefleckt, unten weiß; 4″; in klaren, besonders von Erlen eingefaßten Bächen; sehr schmackhaft.

* *L. albūrnus* L. Uklei, Lauben. Die leicht abfallenden Schuppen werden zu künstlichen Glasperlen (schottische Perlen) benutzt, indem kleine Glaskugeln damit ausgestrichen und dann mit Wachs ausgefüllt werden.

* 10. *Cobĭtis fossĭlis* L. Schlammpeitzger, Wetterfisch, Bibbe. Braunschwärzlich, mit gelblichen Längsbinden und mit orangegelbem Bauche; 10 Bartfäden; 10—12″; in schlammigen Gewässern, wo er bei Witterungsveränderung den Schlamm aufwühlt (Wetterfisch).

* *C. barbatŭla* L. Schmerle. Dunkelgrün, braun gewölkt und punktirt; 6 Bartfäden; 3—4″; deutsche Gebirgsbäche.

11. *Anăbleps tetropthālmus* C. Vierauge. Gelblich, mit 5 schwarzbraunen Längsbinden; 10″; Flüsse Surinams.

3. Hechte. Wohlschmeckende Meer- und Süßwasser-Raubfische.

* 12. *Esox lucĭus* L. Gemeiner Hecht. Gewöhnlich olivenbraun, schwärzlich oder gelblich marmorirt; unpaarige Flossen schwärzlich gefleckt; 1—6′; unser gefräßigster Süßwasserfisch, der nicht nur andere Fische und Amphibien frißt,

§. 107. sondern selbst junge Enten und Gänse angreift. Die 1—2jährigen heißen Grashechte, die gelb- und schwarzgefleckten Hechtkönige, die im Februar und März laichenden Hornungs- oder Märzhechte, die im April zur Froschlaichzeit laichenden Frosch- oder Paddenhechte. Fleisch schmackhaft; Leber als Delicatesse; die Galle liefert eine gelbbräunliche Malerfarbe.

13. ***Belone vulgaris*** C. Hornhecht. Oben grün, unten weiß; 1—3′; Nord- und Ostsee; eßbar. Auch die Knochen sind grün.

14. ***Exocoetus volitans*** L. Hochflieger. Bläulich, unten weiß; Bauchflossen vor der Mitte des Bauches, kürzer als die Schwanzflosse; 1′; meist in allen wärmern Meeren; gemeinste Art.

Ex. exilens Bl. Springfisch, fliegender Häring. Ebenso, aber Bauchflossen hinter der Mitte des Bauches und größer als die Schwanzflosse. Gemein im Mittelmeer. Sie erheben sich von Boniten, Stutzköpfen ꝛc. verfolgt etwa 30 Sekunden lang über das Meer, können höchstens 400′ weit fliegen (Wachtein der Wüste!) und werden, während sie sich schaarenweise erheben, häufig die Beute von Raubvögeln (Albatroß, Fregattenvogel ꝛc.). Fleisch schmackhaft.

4. Häringe. Meerfische mit großen, leicht abfallenden Schuppen.

* 15. ***Clupea harengus*** L. Gemeiner Häring. Dunkel bläulichgrau, nach unten silberig; Kiemendeckel aderig gestreift; Bauchschuppen sägeartig vorstehend; Gräten sehr zart; 10—12″; kommt Sommers in zahlloser Menge in regelmäßigen Zügen (wahrscheinlich nicht vom Polarkreise her, sondern aus der Tiefe des Meeres) an die nördlichen Küsten von Europa, Asien und Amerika, um zu laichen und verschwindet dann wieder. Für die nördliche Erde der wichtigste Fisch, von welchem jährlich über 1000 Mill. gefangen werden (an 60,000 Eier in einem Weibchen), wodurch Tausende von Menschen Nahrung und Erwerb bekommen. Sie leben von kleinern Fischen, Seegewürm, Crustaceen ꝛc. und dienen wieder größeren Fischen (Schellfischen, Haien) so wie Seevögeln (Möven ꝛc.) und Seesäugethieren (Nordkapern, Wallfischen ꝛc.) zur Nahrung. Sie kommen von April bis Juli in immer wachsender Zahl an, so daß sie weit ausgedehnte und dicht zusammengedrängte Bänke (Fischbänke) bilden, welche zuweilen mehre Meilen Länge und mehre hundert Fuß Tiefe haben (Hauptfang von Johannis bis Jacobi). Bis August bleiben sie meist im vollen Meere, treten darauf in seichte Gewässer zurück, laichen und ziehen dann wieder fort. Man unterscheidet 1) Jachthäringe (die zuerst gefangenen); 2) Häringskönige (mit goldschillerndem Kopfe und röthlichen Seiten); 3) Matjes, d. h. Mädchenhäringe (noch nicht ausgewachsene); 4) Schoten- oder Hohlhäringe (welche schon gelaicht), und 5) Vollhäringe (welche noch nicht gelaicht haben); 6) Bücklinge od. Speckhäringe (eingesalzene u. geräucherte); 7) Pökelhäringe (nach der von Wilh. Beuckels verbesserten Methode eingesalzene). Die holländischen Häringe sind die geschätztesten. Gute frische Häringe müssen weißes, mürbes und süßes Fleisch haben; alte Häringe haben röthliches Fleisch.

* ***C. sprattus*** L. Breitling od. Sprotte. Vorigem ähnlich, aber Kiemendeckel strahlig gestreift; nur 4—5″. Nord- und Ostsee. Wird eben so zubereitet. Sehr geschätzt die Kieler Sprotten (Flundern, Flückhäringe).

C. Sardina C. Aechte Sardelle. Azurblau, unten silberig; 4″; der schmackhafteste Häring; vorzüglich an der Küste von Bretagne; auch im Mittelmeere, wohin der Häring nicht kommt.

16. ***Engraulis encrasichölus*** L. Anchovis. Bläulich, unten weißlich; 6″; Mittelmeer, vorzüglich bei Sardinien (Sardelle); sehr wohlschmeckend und ohne Kopf (weil man glaubt, die Galle befinde sich darin) und ohne Eingeweide weithin versandt. Die Alten bereiteten ein kostbares Garum (§. 100, 11) aus demselben.

17. ***Lepidosteus osseus*** L. Knochenhecht. Grünlich; 3′; Süßwasserfisch Nordamerikas, ausgezeichnet durch harte und rautenförmige Schuppen (eine bei den vorweltlichen (§. 120 b.) Fischen vorherrschende, bei jetzt lebenden seltene Form).

5. Welse. Starke, im Schlamme auf kleine Fische lauernde Räuber.

* **18.** ***Silūrus glānis*** L. Gemeiner Wels. Dunkelschwarzgrün; 6 Bartfäden; 2—7′ und 1—3 Centner; in allen großen Strömen Deutschlands und nächst Hausen und Stören der größte Süßwasserfisch Europas. Fleisch als Speise und Blase zu Fischleim benutzt.

19. ***Malapterūrus electrĭcus*** L. Zitterwels, Raasch. Schwarz gefleckt; 1½′; im Nile; theilt elektrische Schläge mit; eßbar.

Pimelŏdes cyclŏpum C. Vulkanwels. Nur 4—6″; in den unterirdischen Seen in der Nähe des feuerspeienden Cotopachi in Quito, aus welchem er oft in Menge halbgesotten ausgeworfen wird.

20. ***Loricarĭa cataphrācta*** L. Panzerwels. Leib 8kantig; obere Schwanzflosse fadig auslaufend; 1′; Brasilien.

V. Ordnung. *Subbranchiāles.* Kehl-Weichflosser. Bauchflossen unter den Brustflossen an der Kehlgegend. Meerfische. 4 Familien. S. 108.

a) Weder Kopf noch Brust mit einer Saugscheibe.

1) Gadĭni. Schellfische.

Körper symmetrisch, langgestreckt; 1—3 Rückenflossen. Schwimmblase groß. Meerfische (Quappe ausgenommen).

Schnauze nicht vorragend; Schuppen weich: *Gadus* L.	3 Rücken- u. 2 Afterflossen	1 Bartfaden. — Kabliau . .	1) *Gadus* C.
		kein Bartfaden. — Wittling	2) *Merlăngus* C.
	2 Rücken-, 1 Afterflosse	1 Bartfaden. — Quappe . .	3) *Lota* C.
		kein Bartfaden. — Seehecht	4) *Merlucĭus* C.

2) Pleuronēctae. Schollen.

Körper unsymmetrisch, flach (Plattfische); Kopf verdrehet; Maul schief; beide Augen auf einer Seite; keine Schwimmblase. Meerfische.

Pleuronectes L.	Körper fast rautenförmig; Rücken- u. Afterflosse reichen nicht bis zur Schwanzflosse	Augen meist rechts; Zähne stumpf. — Scholle	5) *Platēssa* C.
		Augen links; Zähne spitz. — Steinbutte	6) *Rhombus* C.
	Körper zungenförmig; Rücken- und Afterflosse reichen bis zur Schwanzflosse; Augen rechts	— Zunge	7) *Solĕa* C.

b) Auf dem Kopfe oder an der Brust eine Saugscheibe.

3) Discobŏli. Scheibenbäuche.

Keine Schuppen; Bauchflossen zwischen den breiten Brustflossen in eine Saugscheibe verwachsen. Meerfische.

Körper zusammengedrückt, mit einzelnen Knochenstücken; 2 Rückenflossen. — Bauchsauger	8) *Cycloptĕrus* L.	

4) Echenēĭdae. Schildfische.

Kleine Schuppen; Kopf oben flach, mit einer durch aufrichtbare Querplatten in Felder getheilten, ovalen Saugscheibe zum Festsaugen (Anschröpfen) an Fische, Schiffe ꝛc. Meerfische.

Nur eine Gattung, mit spindelförmigem Körper — Schiffshalter 9) *Echenēis* L.

1. Schellfische. Die wichtigsten Meerfische; Fleisch leicht zertheilbar. S. 109.

* **1.** ***Gadus aeglefĭnus*** L. Gemeiner Schellfisch. Ungefleckt, Seitenlinie gerade; Schwanzfl. ausgeschnitten; 1½′ u. 2—3 Pfund. Nordsee, vorzüglich an der englischen u. schottischen Küste; Fleisch schmackhaft, stark phosphorescirend.

* ***G. morrhŭa*** L. Kabliau. Gelbgrau, braungefleckt; Kiefern gleichlang; Seitenlinie gerade; Schwanzflosse abgestutzt; 2—4′ und 12—30 Pfund; im nördlichen Weltmeere; vorzüglich um Labrador, Neufoundland (1829 wurden hier 400 Mill. Stück von 24,000 Seeleuten gefangen und doch scheint sich die Menge der Fische daselbst noch nicht vermindert zu haben), an den Nordküsten Großbritanniens sehr häufig (an 9 Millionen Eier) und wegen der mannigfaltigen Zubereitung und wegen der langen Dauer der Eßbarkeit des Fleisches von größter Wichtigkeit und der wichtigste Fisch der ganzen Gattung, dessen Fang in Europa über 50,000 Menschen beschäftigt. Heißt im Handel 1) Kabliau (im frischen Zustande); 2) Laberdan (gesalzen); 3) Stockfisch (an

Stangen getrocknet); 4) Klippfisch (gesalzen und getrocknet). Doch werden auch mehre verwandte Arten auf diese Weise zubereitet im Handel so genannt. Alle Schellfische haben ein gesundes, weißes Fleisch (Weißfische), welches sich leicht in Schichten theilt, sich spaltet oder schellt (Schellfisch). Aus der Leber wird der neuerdings häufig als Heilmittel angewandte Leberthran bereitet.

* *G. callarias* L. Dorsch. Graugelblich, braungefleckt; Oberkiefer länger; Seitenlinie krumm; Schwanzflosse abgestutzt; 1′ und 1—2 Pfund; häufig in der Ostsee; Fleisch schmackhaft.

2. ***Merlangus vulgaris*** C. Weißling. Silberig; Oberkiefer länger; 1—2′; Nord- und Ostsee.

3. ***Lota molva*** C. Der Leng. Olivengrün, unten silberig; 3—4′; nordische Meere. Wichtigster Fisch im Handel nächst Häring und Kabliau u. ebenso behandelt wie letzterer. Bergen liefert jährlich 1 Mill. Pfund.

* *L. fluviatilis* C. Quappe, Aalraupe. Gelblich, braun marmorirt; 1—3′; einer der schmackhaftesten deutschen Fische und der einzige Schellfisch des Süßwassers; in den Schweizerseen, auch in vielen Süßgewässern Deutschlands.

4. ***Merluccius vulgaris*** C. Kleiner Stockfisch, Meerhecht. Unterkiefer länger; 1—2′; Nordsee. Wird wie der Kabliau zubereitet häufig in Handel gebracht. Ein Schiff kann in einer Nacht bis 1000 Stück fangen.

2. Schollen. Wohlschmeckende, auf der Seite schwimmende Meerfische von regelmäßig unregelmäßiger Form (linke und rechte Seite verschieden), wie sie im ganzen Thierreiche nicht wiederkehrt; entweder mit glattem (Schollen) oder rauhem Körper (Butten).

* 5. ***Platessa vulgaris*** C. Gemeine Scholle. Braun, mit runden, rothen Flecken; 4—7 Höcker hinter den Augen; $1\frac{1}{2}$′ und 12—15 Pfund; häufigste Art der Nordsee; sehr schmackhaft.

* 6. ***Rhombus maximus*** L. Steinbutte. Oberseite mit einzelnen, runden, kleinen Hautknochen, welche am Kopfe Felder bilden; Afterflosse sehr lang; 2—3′; nächst der 7′ langen Heilbutte die größte Art; Nordsee und Mittelmeer; schmackhaft. Nach London allein kommen jährlich 300 Centner.



Fig. 65. Steinbutte.

7. ***Solea vulgaris*** C. Zunge. Olivenbraun, schwarz gefleckt; 12 bis 14″; europäische Meere; schmackhaft.

3. Scheibenbäuche. Saugen sich mit ihren Bauchflossen an Klippen fest.

8. ***Cyclopterus lumpus*** L. Der Lump, Seehase. Körper hoch, dick, rauh, mit 3 Reihen kegeliger Knochenplatten an den Seiten; unten abgeplattet; $1\frac{1}{2}$′; Nord- und Ostsee. Unschmackhafter Räuber.

4. Schildfische. Saugen sich mit ihrer Kopfsaugscheibe an Fischen, Schiffen ꝛc. fest.

9. ***Echeneis remora*** L. Kleiner Schildfisch oder Schiffshalter. Schwanzflosse ausgeschnitten; Saugscheibe mit 18 Platten; $\frac{1}{2}$—1′; Mittelmeer.

E. naucrates L. Großer Sch. Schwanzflosse abgerundet; Saugscheibe mit 22 Platten; 5′; in allen Meeren. Saugt sich wie voriger fest, ernährt sich aber weder durchs Festsaugen, noch kann er ein Schiff im Laufe zurückhalten (Schiffshalter).

§. 110. **VI. Ordnung.** ***Apodes.*** **Kahlbäuche.** Körper ohne Bauchflossen. Oft fehlen auch die übrigen Flossen oder sind sehr klein. Wohlschmeckende Meer- und Süßwasserfische. 1 Familie:

Anguilliformes. Aale. Körper schlangenartig, dickhäutig, schleimig, meist mit kleinen, in der Haut versteckten Schuppen.

- Mit einer Rückenflosse
  - Mit Brustflossen, unter welchen die Kiemenspalte unter kleinem, von Haut überzogenem Kiemendeckel — Aal . . . . . 1) *Muraena* L.
  - Ohne Brustflossen, am Halse jederseits eine Kiemenspalte — Muräne . . . . . 2) *Gymnothorax* Bl.
- Ohne Rückenflosse; Afterflosse sehr lang und daher After ganz vorn — Kahlrücken . . . . . 3) *Gymnotus* L.

* 1. ***Muraena anguilla*** L. Flußaal. Dunkelgrün; Unterkiefer länger; 4—6′ und 15—20 Pfund. In Seen und Flüssen. Gehen zuweilen längere Zeit aus dem Wasser (S. 106.) auf Wiesen ꝛc.; Eier mikroskopisch; laicht im März und April, nicht leicht in abgesperrten Teichen; gebärt oft lebendige Junge? Gefräßiger und wegen des starken Gebisses gefürchteter Räuber, dessen Fleisch frisch, marinirt und geräuchert schmackhaft. S. 111.

2. ***Gymnothorax Helena*** L. Gemeine Muräne. Braun und gelblich marmorirt; 4—5′; Mittelmeer; schmackhaft. Vedius Pollio fütterte sie in eingeteichtem Seewasser mit dem Fleische seiner Sclaven.

3. ***Gymnotus electricus*** L. Zitteraal. Rothbraun; Schwanz stumpf; 5—6′; in Binnengewässern Südamerikas häufig; ertheilen die stärksten elektrischen Schläge (S. 105.), die man erst an Pferden, welche man ins Wasser treibt, entladen läßt, ehe man sie fängt. Fleisch eßbar, aber schwer verdaulich.

II. Chondracánthi. Knorpelfische. S. 112.

Skelet knorpelig, weich; Körper nackt oder mit kleinen od. größern Knochenschildern ganz od. theilweise bekleidet, selten mit harten Schuppen; Maul ein runder Saugmund oder eine Querspalte unterhalb des Schnauzenendes. Die erhärtende Knochenmasse lagert sich nicht in Fasern, sondern in Körnchen ab, daher das Skelet sehr unvollkommen ist und manche Theile (z. B. Rippen) ganz oder größtentheils fehlen. Die Zahl der Knorpel- oder Warzenfische ist kleiner als die der Grätenfische. Zu ihnen gehören die größten und am vollkommensten organisirten Fische (Haie) und die unvollkommensten (Rundmäuler S. 119.). Viele verrathen ihre Verwandtschaft mit den Froschamphibien durch innern Bau, so wie durch nackte, schleimige u. warzige Haut. Einige z. B. Chimaera, Ortagorriscus etc. schwitzen einen des Nachts leuchtenden Milchschaum aus.

A. **Freikiemer.** Kiemen am Außenrande frei, beweglich, wie bei den Grätenfischen; nur eine Kiemenöffnung mit Kiemendeckel. (Uebergang zu den Grätenfischen.)

VII. Ordnung. *Plectognáthi.* **Haftkiefer.** (Freikiemer ohne Bauchflossen.) Skelet in der Jugend knorpelig und weich, später verknöchernd, von faseriger Structur und dann die Schädelknochen zum Theil mit Nähten verbunden; Kiemendeckel von der Haut überzogen; vor den Brustflossen eine enge Kiemenspalte. Langsame, durch ihre Körperbildung gegen ihre Feinde geschützte Meerfische. 2 Familien. S. 113.

1) Gymnodóntes. Nacktzähne. Kiefern mit Schmelz (Elfenbein ähnlichem Ueberzuge); Haut mit Stacheln. Meerfische.

- Kiefern ungetheilt
  - Kiefern durch eine Mittelfurche längsgetheilt, gleichsam 4 Zähne bildend. — Stachelbauch . . . . . 1) *Tetrodon* L.
  - Haut mit Stacheln; Rücken- und Afterflosse klein, vom Schwanze getrennt — Igelfisch . . . . . 2) *Diodon* L.
  - Haut ohne Stacheln, rauh; Rücken- und Afterflosse mit der breiten Schwanzflosse vereinigt — — Mondfisch . . . . . 3) *Orthagoriscus* Schn.

2) Sclerodērmi. Harthäuter. Kiefern mit großen Zähnen; Haut mit harten Schuppen oder eckigen Knochenschildern.

Körper eckig, mit verwachsenen Knochenschildern gepanzert, nur Schwanz und Flossen beweglich — Kofferfisch . . . . . 4) *Ostracion* L.
Körper seitlich zusammengedrückt, mit harten, rhomboidalen Schuppen; erste Rückenflosse mit 3 Stachelstrahlen — Hornfisch . . 5) *Balistes* L.

§. 114. **1. Nacktzähne.** Können sich durch Hülfe der, in einen großen, häutigen Sack am Schlunde (Kropf) aufgenommenen Luft ballonförmig aufblähen.

1. ***Tetrŏdon hispĭdus*** Lacep. Stachelbauch. Bläulichgrau; ziemlich rund, überall mit kleinen Stacheln; 1—2′; an der nordafrikanischen Küste.

*T. **electrĭcus*** theilt elektrische Schläge mit und lebt im indischen Ocean.

2. ***Dŏdon hystrix*** L. Gemeiner Igelfisch. Braungefleckt; Stacheln groß; an 2′ und 1′ im Durchmesser; gemeinste Art; in südlichen Meeren.

3. ***Orthagorĭscus mola*** L. Klumpfisch. Einem abgeschnittenen Kopfe ähnlich; weißlich; 4′ lang und 4′ breit und über 3 Centner schwer; europäische Meere. Seiten und Unterleib des lebenden Fisches phosphoresciren stark (Mondfisch).



Fig. 66. Klumpfisch. Flossen §. 113, 3.

2. Harthäuter. Durch kegelförmige oder von den Augen an pyramidal verlängerte Schnauze ausgezeichnet.

4. ***Ostracĭon quadricōrne*** L. Vierhorn. Gelblich, braungefleckt; vor den Augen und hinter dem After 2 Stacheln; 15″; tropische Meere.

5. ***Balistes vetŭla*** L. Das alte Weib. Kopf und Schwanz blau und gelb gestreift; 1½′; Indien; giebt einen grunzenden Ton von sich.

§. 115. **VIII. Ordnung.** ***Branchiostĕgi.*** **Bedecktkiemer.** (Freikiemer mit Bauchflossen.) Skelet weich, knorpelig; Schädelknochen völlig verwachsen, ohne eigentliche Kieferknochen und Zähne. Meerfische, welche in Flüssen laichen. 1 Familie.

Sturionīni. Störe. Spindelförmig; Maul quer unter der Schnauze.

Körper nackt; 2 Rückenflossen; Kiemendeckel unter der Haut — Seedrache . . . . . 1) *Chimaera* L.
Körper mit Längsreihen Knochenschilder; 1 Rückenflosse; Kiemendeckel deutlich; ein Sprizloch und 4 Bartfäden — Stör . . . 2) *Accipenser* L.

§. 116. 1. ***Chimaera monstrōsa*** L. Seeratze. Oben bläulich, unten weiß, schwarz punktirt; 2—3′; Mittelmeer.



Fig. 67. Gemeiner Stör.

Fünf Reihen Knochenschilder; Kopf mit Schildern gepanzert, mit kurzer, etwas aufgebogener Schnauze, unter welcher 4 kurze Bartfäden a und die quere Maulöffnung b unter den Augen, vor welchen die Nasengruben.

* 2. ***Accipēnser sturĭo*** L. Gemeiner Stör. Blaugrau; Rüssel abgerundet, über 2mal länger als die Breite der Maulöffnung; Knochenschilder strahlig-gestreift, wenig von einander entfernt, zwischen deren Reihen kleinere u. größere Knochenkerne;

6—18′ und 100—400 Pfund. Nord- und Ostsee, von wo sie in langen, schmalen Zügen in die Flüsse steigen (S. 106.). Friedsame Fische, welche wegen ihres wohlschmeckenden Fleisches und Caviars (an 50 Pfund von 1 Exemplare) für viele Völker einen wichtigen Fang bilden. Rußland fängt durchschnittlich 4 Mill. Pfund jährlich und liefert davon 800,000 Pfund Caviar. Ihr Fleisch wird frisch, marinirt und getrocknet gegessen und war bei den Gastmählern der Römer das vornehmste Gericht. Der weiße Caviar der beste. Aus der Schwimmblase dieses so wie der übrigen wird der Fischleim (Hausenblase, *ichthyocŏlla*) bereitet, das beste Bindmittel und vorzüglich zu englischem Pflaster, Mundleim, Glaskitt, Heiligenbildern, Geleen ꝛc. benutzt.

A. huso L. Hausen, Beluga. Blaugrau; Rüssel spitz, kürzer als die Breite der Maulöffnung; Schildchen mit dem Alter verschwindend, zwischen deren Reihen nur kleine Knochenspitzen; 5—18′ und bis 400 Pfd.; schwarzes u. caspisches Meer u. dessen Flüsse. Fleisch u. Hausenblasenleim schlechter als vom Störe.

B. Hafttkiemer. Kiemen am Außenrande festgewachsen, unbeweglich; jederseits 5—7, selten 1 Kiemenöffnung; kein Kiemendeckel.

IX. Ordnung. *Plagiostŏmi.* Quermäuler.

Mundöffnung quer, unter dem Schnauzenende; Körper spindel- oder scheibenförmig, mit körnigen Höckerchen und mit Brust- und Bauchflossen. Eine eigentliche Begattung; die ♀ gebären lebendige Junge, welche einen Dotterſack am Bauche haben. Die vollkommensten, den Reptilien sich nähernden Fische. 2 Familien. S. 117.

1) Squalīni. Haifische.

Leib fast spindelförmig; Brustflossen deutlich vom Kopfe getrennt; Maul mit mehren Reihen beweglicher Zähne.

Kopf nicht verlängert	Kopf zugespitzt; Schnauze verlängert; Maul meist mit großen, 3eckigen Zähnen — Hai (Fig. 68.)	1) *Squalus* L.
	Kopf kreisrund, flach; Maul am Ende der Schnauze; Brustflossen groß — Meerengel.	2) *Squatīna.*
Kopf verlängert	Kopf jederseits hammerförmig verlängert; Augen an den äußersten Enden — Hammerfisch .	3) *Zygaena* C.
	Kopf in einen langen, beiderseits mit eingekeilten Zähnen besetzten Fortsatz (Säge) verlängert — Sägefisch	4) *Pristis.*

2) Rajacĕi. Rochen.

Leib scheibenförmig, flach, weil die großen Brustflossen mit dem Kopfe verwachsen sind; Maul mit pflasterſteinförmigen Zähnen. Meerfische.

Körper rautenförmig	Schwanz lang, dünn, mit 2 Flossen, aber ohne langen Stachel — Nagelroche	5) *Raja* L.
	Schwanz ebenso, ohne Flossen, aber mit 1 oder mehren, sägig gezähnelten langen Stacheln — Pfeilschwanz	6) *Trygon.*
Körper kreisrund;	Schwanz kurz, mit kleiner, 3eckiger Schwanzflosse — Zitterroche	7) *Torpēdo.*

1. Haie. Die größten Fische, durch Raubgier und Muskelstärke der Schrecken alles Lebendigen im Meere. Nach den kolossalen versteinerten Zähnen (glossopĕtrae d. h. Schlangenzungen) müssen in der Vorwelt noch größere Arten gelebt haben. Fleisch zähe; die Haut (Fischhaut, Chagrin) dient zum Poliren so wie zu Futteralen ꝛc.; die fleischigen Schuppen sollen in Indien nach Art der indianischen Vogelnester (S. 69, [38].) zu Suppen benutzt werden.

1. *Squalus carcharĭas* L. Gemeiner Hai. Aschgrau; oben 6, unten 4 Reihen dreieckiger, seitlich gezähnelter, großer Zähne. Die Vorderreihen machen das eigentliche Gebiß aus, die hintern liegen rückwärts gekehrt, gleichsam als Reservezähne; 20—30′ und über 10.000 Pfund; in der Tiefe aller Weltmeere; lebt von Fischen, Seehunden ꝛc. und fürchtet nur den Cachelot (S. 59.). Schiffhalter (S. 109.) saugen sich häufig an ihm fest und Piloten (S. 100, [13].) S. 118.

begleiten ihn. Liefert starke Fischhaut, aus welcher die Norweger Pferdegeschirre und die Isländer Schuhe machen. Fett und Leber geben Thran.



Fig. 68. Gemeiner Hai.
Erste Rückenflosse hoch, dreieckig, zweite kleiner; 5 Kiemenöffnungen seiderseits.

2. *Squatīna angĕlus* C. Gemeiner Meerengel. Haut höckerig rauh; aschgrau, schwarz gefleckt; 4—5′; Mittelmeer. Haut zum Poliren.
3. *Zygaena malle̊us* C. Gemeiner Hammerfisch. Graubraun; Schwanzflosse 2lappig; 7—12′; atlantisches Meer; gefräßig und gefährlich.
4. *Pristis antiquōrum.* Gemeiner Sägefisch. Grau; Säge 4—6′; 12—15′; in allen Meeren. Reißt mit der Säge d. Walen (§. 57.) oft den Bauch auf.

2. Rochen. Meerfische mit schmackhaftem Fleische; legen große, 4eckige Eier mit lederartiger Schale (Seemäuse). Die Basilisken in alten Sammlungen sind verzerrte Rochen.

* 5. *Raja batis* L. Glattroche, Flete Rauh, nur auf dem Schwanze eine Reihe Stacheln; 3′ und an 200 Pfund; in der Nordsee; größte Art; häufig, schmackhaft und deshalb bedeutender Handelsartikel.
* *R. clavāta* L. Stachelroche. Rauh, unregelmäßig mit krummspitzigen Knochenhöckern besetzt; $1\frac{1}{2}$′; häufig an allen Küsten; Fleisch schlecht.
6. *Trygon pastināca* L. Pfeilschwanz, gemeiner Stechroche. Körper rund, glatt; 1—2′; fast in allen Meeren. Der Schwanzstachel kann heftig verwunden, ist aber nicht giftig.
7. *Torpēdo narke* (*Raja torpēdo* L.) Gemeiner Zitterroche. Rothgelb, mit 5 großen Augenflecken; 4′ lang und $3\frac{1}{2}$′ breit; fast in allen Meeren; wird gegessen, nachdem der für ungesund gehaltene elektrische Apparat (S. 20, 3.) herausgeschnitten ist. Theilt willkührlich elektrische Schläge aus; verliert aber diese Eigenschaft, wenn der hintere Hirnlappen mit dessen Nerven abgeschnitten wird.

§. 119. **X. Ordnung.** *Cyclostŏmi.* **Rundmäuler.** Mundöffnung rund (Saugmund), am Ende der Schnauze; Körper aalförmig, nackt, ohne Brust- und Bauchflossen; ohne Schwimmblase. Die unvollkommensten Fische, deren Mund nur zum Saugen geeignet ist. Nur 1 Familie.

Cyclostŏmi. Sauger. Maul ein runder oder halbrunder Saugmund mit fleischigen Lippen, mit welchen sie sich festsaugen, indem sie durch Zurückziehung der kolbenförmigen Zunge die Höhle des Saugmunds luftleer machen. Wohlschmeckende Meer- und Süßwasserfische.

Körper aalförmig; 7 Kiemenlöcher seiderseits am Halse; Augen deutlich — Neunauge . . . . . 1) *Petromy̆zon.*
Körper wurmförmig; ein Kiemenloch seiderseits am Bauche; keine Spur von Augen — Bauchkieme . . . . . 2) *Gasterobrānchus* Bl.

§. 120 a. * 1. *Petromy̆zon marīnus* L. Große Lamprete. Grünlich, gelb und

braun marmorirt; 2 deutlich getrennte Rückenflossen; 2—5′, größte Art, über 5 Pfd.; fast in allen Meeren Europas; steigt Frühlings in die Flüsse, um zu laichen; Fleisch schmackhaft. Die Nasenlöcher öffnen sich bei diesen wie bei den folgenden in ein einziges Loch, vor welchem eine blinde, d. h. nicht in den Mund führende Höhlung, fälschlich Spritzloch. Sie schröpfen sich an andern Fischen fest, verwunden sie mit ihren Zähnen und saugen deren Blut und übrigen Säfte. Durch reichlichen Schleim und ihren Unrath entgehen sie den Nachstellungen anderer Thiere.

* *P. fluviatilis* L. Neunauge, Flußpricke. Grünlich, an den Seiten gelblich; hintere Rückenflosse eckig und in die Schwanzflosse überlaufend; 1—1½′; Flüsse Europas; Hauptfang im December. Frisch und marinirt als wohlschmeckende Speise und deshalb ein bedeutender Handelsartikel.

* *P. Planĕri* Bl. Planer's Pricke. Blaugrünlich; 2 zusammenstoßende Rückenflossen: 7—10″; Süßgewässer Deutschlands, besonders in Gebirgsbächen.

2. *Gasterobrănchus coecus* Bl. Blinde Bauchkieme, Blindfisch. Bläulich, an den Seiten röthlich; 4 Bartfäden; 1′ lang und fingerdick, einem Wurme ähnlich und von Linné fälschlich als *Myxīne glutinōsa* den Würmern zugesellt. Lebt im Schlamme der Nordsee, saugt das Blut anderer Fische. Der einzige Fisch, welcher keine Augen hat und ein in den Mund sich öffnendes Nasloch.

---

§. 120b. Da die fossilen Fische für die Gesteinsformationen sehr wichtige Erkennungszeichen liefern, so mag hier noch eine kurze **Uebersicht der fossilen Fische** nach dem Hauptwerke über dieselben von **Agassiz** einen Platz finden. Derselbe gründet sein System besonders auf die **Verschiedenheit der Schuppen;** jedoch kann dies System nicht überall scharfe Trennungen geben, weil manchmal an einer Art oder in einer Gattung zweierlei Schuppen vorkommen. Die ersten beiden Klassen enthalten etwa ¼ und die 2 letzten etwa ¾ aller bekannten Fische. Die Ganoiden, von denen nur noch 5 Gattungen mit 27 Arten leben, waren in der Vorzeit zwanzigmal so zahlreich und enthalten fast ⅓ aller fossilen Fische, unter welchen manche so sehr von unsern jetzigen Fischen abweichende Formen sich finden, daß man früher einige sogar für Krustenthiere gehalten hat.

Schmelzschuppen, d. h. mit dickem, glänzendem, glasartigem Ueberzuge	knöcherne Schuppen **unregelmäßig** begrenzt, entweder sehr klein (chagrinartig) oder sehr groß (schildartig). Hierher die meisten Knorpelfische: Haie, Rochen ꝛc. §. 117.	**I. Placoïdĕi,** Schalen- oder Körnerschupper.
	knöcherne oder hornartige Schuppen, meist von **regelmäßig rhomboidaler** od. **vielseitiger Form,** dicht aneinander grenzend (Lepidostĕus §. 107,[17]) oder große, entfernte Knochentafeln (Accipēnser §. 116.)	**II. Ganoïdĕi,** Glanz- oder Eckschupper.
Schmelzlose, rundliche Schuppen	harte Schuppen, mit **kammförmig gezähneltem** Hinterrande. Hierher die meisten **stachelflossigen** Grätenfische §§. 99—103.	**III. Ctenoïdĕi,** Kammschupper.
	meist weicher und immer mit **ganzem, nicht gezähneltem** Hinterrande. Hierher die meisten **weichflossigen** Grätenfische §§. 105—110. . . .	**IV. Cycloïdĕi,** Kreisschupper.

Hofbuchdruckerei der Gebr. Jänecke in Hannover.

Zweite Abtheilung.

Arthrozōa. Gliederthiere (§. 23.)

§. 121.

(richtiger Kerbthiere, weil die Wirbelthiere auch Gliederthiere sind).

Der mehr längliche als breite, oft wurmförmige Körper besteht aus vielen, hinter einander liegenden, gleichen oder ungleichen Ringeln, von denen nur einige oder die alle deutliche, ebenfalls gegliederte Beine und oft noch besondere Bewegungsorgane tragen. Nur die Würmer haben **keine gegliederte** Bewegungsorgane und einen oft wenig deutlich oder gar nicht gegliederten Körper. Die **Körperbedeckung** besteht (die meisten Würmer ausgenommen) aus einer festen, ganz aus Horngewebe od. Hornsubstanz gebildeten oder kalkartigen Hülle, an welcher wie an einem Gerüste (Hautskelet) die übrigen Organe und vorzüglich die Muskeln befestigt sind. Die Gliederthiere haben gleichsam ein äußeres Skelet, wie die Rückgraththiere (mit Ausnahme der Schildkröten) ein inneres haben. Der **Körper** der meisten besteht aus drei Haupttheilen, **Kopf, Brust** und **Hinterleib** oder Bauch (Fig. 71.). Die Brust besteht wieder aus 3 Theilen; der Hinterleib meist aus 2mal 3 oder 3mal 3 Ringen. Die meisten haben drei Paar Beine und jedes Bein hat nie mehr, wohl aber weniger als 2mal 3 oder 3mal 3 Gelenke. Die Krustenthiere haben über 3 Paar Beine, einige 60, ja 100 Paare, welche immer desto unvollkommner, je zahlreicher sie sind. Je vollständiger die 3 Haupttheile des Körpers getrennt und je inniger die Ringe verbunden sind, desto höher steht das Thier und umgekehrt. Die Insekten mit freiem Kopfe stehen deshalb höher als die Spinnen, bei denen Kopf und Bruststück zum Kopfbruststücke verschmolzen sind (Fig. 117, §. 198.); auch stehen die Gliederthiere mit beständig gleicher Gliederzahl höher als die, welche beständig neue Ringe erzeugen (Bandwürmer). Der **Kopf** trägt meist 2, selten mehre Augen, welche entweder einfach oder aus vielen (bis 60.000) Facetten zusammengesetzt sind (mehr als 2 Augen finden sich überhaupt nur bei Gliederthieren). Nase und Zunge als schmeckende Organe fehlen und Gehörorgane haben nur die Krebse, obgleich die meisten Gliederthiere und vorzüglich die Insekten sehr gut hören und riechen. Die meisten haben **Fühler am Kopfe** und zangenförmige, in der Mitte getrennte Freßwerkzeuge oder Kiefern (Fig. 70.), welche sich nicht wie bei den Rückgraththieren perpendikulär, sondern horizontal gegen einander bewegen. Bei vielen Gliederthieren (Zweiflüglern, Schmetterlingen und Wanzen) sind sie zu einem Saugrüssel umgestaltet (Fig. 100; 104; 110.). Der **Brustkasten** (thorax) trägt die an Zahl, Form und Gelenkung sehr verschiedenen Beine, welche meist aus Schenkel, Schienbein u. Fuß bestehen (Fig. 71.). Insekten haben auch meist noch Flügel auf der Rückseite des Brustkastens. Der **Hinterleib** ist immer am deutlichsten geringelt, hat oft noch Beine und fußartige Anhänge und enthält die Ernährungs- und Fortpflanzungsorgane. Von den Ernährungsorganen ist der Darm sehr deutlich, meist von Körperlänge und meist mit Afteröffnung. Die Gefäße fehlen sehr oft und das weiße, nur bei einigen Würmern rothe, Blut fließt dann frei im Körper umher, doch ist immer ein das Herz vertretender Kanal da, von welchem die Blutbewegung ausgeht. Die Wasserbewohner athmen meist durch **Kiemen** (Fig. 105., §. 176.), die Luftbewohner durch **Lungensäcke**, z. B. einige Spinnen; die meisten Insekten athmen durch **Tracheen** (§. 19.) Das Nervensystem

besteht aus einem Bauchstrange, der in jedem Gliede einen Marknoten (Ganglion) bildet, von welchem die Nerven für die verschiedenen Organe (Fühler, Augen, Beine ꝛc.) auslaufen (§. 13., Fig. 4.). Der Nervenknoten über dem Schlunde vertritt die Stelle des Gehirns und heißt deshalb auch Gehirnknoten. Nur die Gliederthiere haben ein solches knotiges Nervensystem. Nur unter den Gliederthieren finden wir **Parasiten** (§. 123,7) und diese sind immer unvollkommner organisirt, haben unvollkommnere Bewegungsorgane, aber überwiegende Genitalien und vermehren sich daher oft ungeheuer stark (eine Kopflaus kann in 8 Wochen 5000 Nachkommen haben). Die meisten Gliederthiere legen Eier, aus welchen nach längerer oder kürzerer Zeit die Jungen oder Larven hervorkriechen, welche den Alten in Gestalt oft ganz unähnlich sind und erst durch mehrmaliges Abstreifen der Haut (Häuten) ihnen immer ähnlicher werden. Alle Gliederthiere haben mehr oder weniger eine solche Verwandlung oder Metamorphose (S. 132.).

Die Gliederthiere werden wie die Wirbelthiere in 4 Klassen getheilt, welche wir schon (§. 23.) kurz charakterisirt haben. Unter den Kerbthieren treten in der Vorwelt zuerst die Krustenthiere auf und in der ganzen Kohlenperiode fast nur Trilobiten (§. 210., Fig. 124.) und zwar in großer Menge und Mannigfaltigkeit.

§. 122. V. Klasse. **Insecta. Insekten, Kerfe, Sechsfüßer.**

Weißblüthige, durch Luftröhren athmende Gliederthiere, welche 3 große Körperabschnitte (Kopf, Brustkasten und Hinterleib), sechs gegliederte Beine, meist 2 oder 4 Flügel, eine Verwandlung, und am Ende des Körpers den After und meist auch die Genitalien haben.

Sie stehen unter den Gliederthieren am höchsten, haben meist Flügel für das Luftleben (Luftgliederthiere) und wiederholen durch ihre Metamorphose die Klassen der Gliederthiere, indem sie als Larven den Würmern ähneln, als Puppen die Durchgangsgruppe der Krustenthiere darstellen und dann erst als vollkommenes Insekt auftreten. Die Flügel fehlen nie einer gleichmäßig organisirten Hauptgruppe, sondern immer nur einzelnen Familien, Gattungen, oder einem Geschlechte, vorzüglich dem ♀. Auch sind alle beständigen Schmarotzer (z. B. Läuse) immer ungeflügelt. Der Körper ist von einer hornigen oder lederartigen, entweder nackten oder mit Haaren, Dornen oder schuppenartigen Gebilden bedeckten Haut umkleidet und besteht aus höchstens 13, durch mehr oder weniger tiefe Verengungen von einander geschiedenen Abschnitten, von denen der erste Abschnitt stets den Kopf (caput), die 3 folgenden das Brustst ück, den Brustkasten (thorax), die übrigen den Hinterleib (abdōmen) bilden und Ringe oder Leibesringe, Segmente, heißen (Fig. 71. u. 74.).

A. Am Kopfe, der immer frei beweglich ist, lassen sich unterscheiden:

a. Zwei **Fühler** (antennae, Fig. 71,a.) oder gegliederte, sehr bewegliche, in der Nähe der Augen eingelenkte, bei ♂ und ♀ oft schon verschiedene (Maikäfer), aber nie fehlende Tastorgane, welche für die genaue Unterscheidung der Insekten sehr wichtig sind. Sie heißen:

α) **Gleichmäßige** Fühler, bei denen alle Glieder gleichmäßig gebildet sind und diese heißen **1)** borstenförmig, wenn die Glieder allmählig in eine Spitze zulaufen, wie bei den Laubheuschrecken (Fig. 108., §. 181.); **2)** fadenförmig, wenn alle Glieder von gleichem Durchmesser sind, wie bei den Laufkäfern (Fig. 71,a.); **3)** perlschnurförmig, rosenkranzförmig, wenn die Glieder kugelrund sind, wie bei dem Müller (Fig. 79., §. 137,52); **4)** gesägt, wenn die Glieder 3eckig sind, von der Form eines Sägeblatts, wie bei den Schnellkäfern (Fig. 69,a.); **5)** gekämmt, wenn die Glieder nach einer Seite hin in lange Fortsätze auslaufen, wie bei dem gezeichneten Schmiede (Fig 72.).

β) **Ungleichmäßige** Fühler, wenn nicht alle Glieder gleichmäßig gebildet sind; diese heißen **a)** rücksichtlich ihrer **Gestalt** **1)** keulenförmig, wenn



Fig. 69. Fühler (antennae) der Insekten. §. 122.

a Gesägter Fühler von Elater (§. 129.).

b Keulenförmiger Fühler von Silpha (§. 131,35).

c Geblätterter Fühler des ♂ Maikäfers (§. 130,25), dessen Fühler-Fächer 7 Blätter hat (beim ♀ nur 6).

d Gebrochener Fühler mit gespaltenem, zahnartig erweitertem Fühlerknopfe vom Hirschkäfer, Lucanus (§. 130,28).

die Glieder nach der Spitze zu dicker werden und abgerundet sind, wie bei **Silpha** (Fig. 69, b.); **2)** spindelförmig, wenn die mittlern Glieder dicker sind, als die Grund- und Endglieder (Fig. 101., §. 170.); **3)** geknopft, wenn die Glieder plötzlich in einen verdickten, runden Knopf enden, wie bei den Todtengräbern (Fig. 73.) und den Tagschmetterlingen (Fig. 95., §. 157.). Der **Fühlerknopf** ist entweder dicht (bei Borkenkäfern Fig. 81., §. 140.), oder durchblättert, wenn die Fühlerachse durch die Mitte der blattartigen Fühlerglieder geht (Fig. 69, b.), oder gespalten (bei dem Hirschkäfer Fig. 69, d.) oder gelappt, geblättert, wenn die Glieder nach einer Seite zu in lange Fortsätze auslaufen und aus einander gefaltet werden können (beim Maikäfer Fig. 69, c.). **b)** Rücksichtlich ihrer **Richtung**: **1)** gerade, bei den meisten Insekten; **2)** gebrochen oder geknickt, in der Mitte fast rechtwinklig gebogen, wie bei den meisten Rüsselkäfern (Fig. 76. u. 80.). Bei solchen Fühlern heißt der dem Kopfe zunächst stehende Theil, wenn er wie bei den Rüsselkäfern aus einem größern Gliede besteht, der Schaft, und der über dem Knicke befindliche Theil die Geißel oder Peitsche.



Fig. 70. Mundtheile des Leder-Laufkäfers von der Unterseite (vergrößert).

a Das zur Unterlippe gehörende Kinn.
b Unterlippe (labium), den Mund von unten schließend.
c Lippentaster (palpi labiales): 3-gliedrig; Grundglied das kleinste, zweites das längste, letztes beilförmig.
d Oberkiefer, Kinnbacken (mandibulae): hornartig, einwärts gekrümmt, gezähnt
e Unterkiefer, Kinnladen (maxillae): den Oberkiefern ähnlich, aber kleiner, am Innenrande gefranzt, mit 2 Paar Kinnladentastern (palpi maxillares), deren inneres zweigliedrig, deren äußeres Paar als
f äußere Kinnladentaster unter den Kinnbacken d seitlich hervorsteht, weshalb von 4 Gliedern nur 3 sichtbar sind, deren letztes g beilförmig ist.

b. Zwei zusammengesetzte unbewegliche **Augen**, Netzaugen (Fig. 71, d.), deren Oberfläche aus vielen (bei einigen Schmetterlingen an 60.000) regelmäßigen, sechseckigen Flächen (Facetten) besteht. Außerdem haben manche noch 2—3 Nebenaugen, einfache Augen (ocelli, stemmata, Fig. 90., §. 154,30), welche kleiner und nicht facettirt sind und auf der Stirne oder dem Scheitel stehen.

c. Der **Mund** mit den Freßwerkzeugen (Fig. 70.), welche entweder beißend od. saugend sind. Die beißenden bestehen **1)** aus der **Oberlippe** od. Lefze (labrum s. labium superius), einer mit dem Kopfschilde verbundenen Hornplatte; **2)** aus der **Unterlippe** (labium s. labium inferius, Fig. 70, b.), welche die Mundöffnung von unten verschließt und woran der hornige Theil das Kinn (Fig. 70, a.) und der darauf liegende häutige die Zunge heißt, welche seitwärts die oft fehlenden Nebenzungen hat. Die Zunge liegt also nicht wie bei den Säugethieren zwischen Ober- und Unterkiefer im Gaumen, sondern zwischen Unterkiefer und Unterlippe und ist der letztern aufgewachsen; **3)** aus den **Oberkiefern**, Kinnbacken (mandibulae, Fig. 70, d.), 2 gebogenen, oft innen gezähnten und sich wagerecht gegen einander bewegenden Häkchen; **4)** aus den **Unterkiefern**, Kinnladen (maxillae, Fig. 70, e.), zwei den vorigen ähnlichen, aber kleinern Organen. **5)** Aus den **Freßspitzen**,

§. 122. Tastern (palpi), fadenförmigen, 2—6gliedrigen, den Fühlern ähnlichen Tastorganen an den Unterkiefern (Kiefertaster, Kinnladentaster, palpi maxillāres Fig. 70, f.) und an der Unterlippe (Lippentaster, palpi labiāles, Fig. 70, c.). Wenn genannte Mundtheile frei beweglich sind und also deutlich getrennt, so heißen sie **beißende**, wenn dieselben aber mehr oder weniger fest mit einander verbunden sind, **saugende** Mundtheile und zwar **1)** Rüssel (probōscis) oder Schöpfrüssel der Zweiflügler (haustellum, Fig. 100. u. 104., §. 172.), eine mehr oder weniger fleischige, meist knieförmig nach vorn gebogene, mit einer Saugfläche endende Scheide mit 4 Borsten; **2)** Schnabel der Halbflügler (rostellum, Fig. 110., §. 187.), eine 3—5gliedrige Scheide; **3)** Sauger oder Rollrüssel der Schmetterlinge, eine aus zwei Theilen zusammengesetzte feine, in der Ruhe eingerollte Röhre.

d. Das **Hinterhaupt**, der dem Brusttheile zunächst liegende und zuweilen durch einen hornigen Theil, Halstheil (collāre), damit verbundene Theil.

e. Der **Scheitel**, der obere, meist abgeplattete Kopftheil zwischen den Augen.

f. Das **Gesicht**, alle unterhalb des Scheitels liegende Theile und zwar 1) die Stirn der obere, vom abgeplatteten Scheitel begrenzte und 2) der Kopfschild (clypeus), der untere Theil von der Oberlippe bis zur Stirn.

g. Die **Wangen**, die Seiten des Kopfes bis zu den Freßwerkzeugen.

h. Die **Kehle**, die ganze Unterseite des Kopfes vom Halse oder der Brust bis zur Unterlippe.

B. Das Brustst**ück** oder der Brustkasten (thorax) besteht aus 3 mehr oder weniger deutlich verwachsenen Hornringen, dem Vorderbruströinge (prothōrax), Mittelbruströinge (mesothorax) und Hinterbruströinge (metathorax), deren jeder ein Beinpaar trägt. Die obere Seite des Brustst**ücks** heißt Rücken, die untere Brust, deren Mittellängslinie, wenn sie einen vortretenden Kiel bildet, Brustbein (sternum) genannt wird. Die meisten Insekten haben 2 oder 4 Flügel; das erste Paar, die Vorderflügel od. Oberflügel sind am Mittelbruströinge, das zweite Paar die Hinterflügel oder Unterflügel sind am Hinterbruströinge befestigt. Statt der letztern haben die Zweiflügler nur zwei Schwingkölbchen (halteres, Fig. 101., §. 170,5). Die **Flügel** sind in Form, Größe und Bildung sehr verschieden und bestehen aus hohlen, hornigen Rippen, Luftkanälen, Adern (venae, Fig. 86.; 88.; 95. ꝛc.), welche dem Flügel die Spannkraft geben, wenn sie voll Luft gepumpt sind, weshalb die eben der Puppe entschlüpfenden Schmetterlinge herabhängende, schlaffe Flügel haben, deren Adern sich aber so schnell mit Luft füllen, daß die Flügel zu wachsen scheinen, weshalb denn auch einige Insekten (Maikäfer) nicht gleich fortfliegen können, wenn sie die Flügel entfaltet haben, sondern die Adern erst mit Luft füllen müssen. Wenn die Vorderflügel ganz hornig sind, heißen sie Flügeldecken (elytra, Fig. 71, f.), wenn sie halb hornig und halb häutig sind, Halbdecken (Fig. 111., §. 189.). Die Bildung der Flügel und namentlich deren Adernverlauf ist für Klassifikation der Aderflügler (Fig. 86., §. 146.) sehr wichtig.

Die **Beine** (pedes, Fig. 71.), bei den vollkommenen Insekten nie mehr als 6 und in der Regel paarweise den 3 Bruströingen eingelenkt, bestehen **1)** aus dem Oberschenkel oder **Schenkel** (femur), welcher dem Körper mit der Hüfte oder dem Hüftkopfe (coxa), dem obersten Theile, entweder unmittelbar oder mittelbar durch 1—2 kleine Zwischenglieder, Schenkelhals oder Schenkelringe (trochanter, Fig. 85., §. 146.) genannt, eingelenkt ist; **2)** aus dem **Unterschenkel** oder **Schienbeine** (tibia), welches mit dem Ende des Schenkels articulirt und an dessen Ende **3)** der **Fuß** (tarsus) eingelenkt ist, welcher aus 1—5 hinter einander angelenkten Gliedern, Tarsengliedern, besteht, deren letztes oder Klauenglied meist 2 Klauen oder Krallen und oft 2 Saug- oder Haftlappen (arolĭae, Fig. 99., §. 168.) trägt, um sich an glatten, senkrechten Flächen zu halten. Das erste Paar Beine heißt Vorderbeine, das zweite Mittelbeine, das dritte Hinterbeine; die 2 ersteren Paare zusammen heißen vordere Beine, die 2 letztern Paare zusammen hintere Beine. Nach der Form der Beine unterscheidet man **1)** Laufbeine, ohne besondere

§. 122.



Fig. 71. Carabus coriaceus (§. 128,3), Leder-Laufkäfer (natürliche Größe). Weibchen, weil die Tarsen i der Vorderfüße nicht breiter sind, als die der Mittel- und Hinterfüße.

a Fühler: fadenförmig, elfgliedrig;
b Kinnladentaster;
c Lippentaster;
d **Kopf**, oben mit dem Kopfschilde, seitlich die Augen;
e **Halsschild**, die darunter liegende Brust bedeckend;
f **Hinterleib**, von 2 hornartigen Flügelscheiden, Flügeldecken (elytra) bedeckt.
g bis k **Laufbeine**: g Schenkel der Vorder- und Mittelbeine;
h Schienen der Vorder- und Mittelbeine;
i Fuß oder Tarsen (tarsi) der Vorder- und Mittelbeine;
k Klauenglied derselben.

Auszeichnung, wie bei Laufkäfern (Fig. 71.); **2)** Gangbeine mit breiten, haarigen Sohlen, wie bei Lamia (§. 142,84); **3)** Schreitbeine, wenn das erste Paar unvollkommen entwickelt ist, wie bei den Eckflüglern (Fig. 95., §. 157,3); **4)** Schwimmbeine, wenn sie breit gedrückt und mit Schwimmhaaren besetzt sind, wie bei den Schwimmkäfern (Fig. 75.); **5)** Springbeine, mit verdickten Hinterschenkeln und geraden Schienbeinen, wie bei den Erdflöhen (Fig. 83., §. 143.); **6)** Raub- oder Fangbeine, wenn das Schienbein in der Ruhe gegen den Schenkel, wie die Klinge auf den Griff eines Taschenmessers zurückgeschlagen ist, wie bei Wasser-Scorpionwanzen (Fig. 113., §. 190,13). Bei den Larven ist die Zahl der Beine weniger bestimmt; oft fehlen diesen die Beine ganz, z. B. den Larven der Zweiflügler, mehren Larven von Käfern (Rüsselkäfern) und Hautflüglern, manche dagegen haben sehr viele, z. B. die Larve der veränderlichen Blattwespe (Fig. 87., §. 148,2) hat 22 Beine.

Bei den Larven unterscheidet man 1) Brustbeine (Fig. 87, a.), welche hornig u. gegliedert sind und paarweise an den 3 Brustsegmenten stehen; 2) Bauchbeine, welche dick, fleischig, abgestumpft sind und an allen übrigen Segmenten vorkommen können. Zuweilen finden sich gegliederte, fußähnliche Anhänge am Afterssegmente, Nachschieber genannt (bei den Schmetterlingsraupen (Fig. 93. u. 97.). Die Zahl der Beine giebt oft gute Kennzeichen für die Larven.

C. Der Hinterleib besteht aus 3—9 mehr oder weniger dicht verbundenen Ringen, und ist entweder mit seiner ganzen Breite am Brustkasten festgewachsen, sitzend (Fig. 86.), oder hängt nur durch einen Stiel mit demselben zusammen, ist gestielt (Fig. 90.). Oft endet der Hinterleib noch mit Anhängseln, Zangen, Borsten, Fäden, Stacheln, Legeröhren u. s. w. (Fig. 88.; 105; 113 rc.).

Alle Insekten athmen durch Luftröhren, Tracheen (§. 19,2 u. Fig. 87. u. Fig. 94, k.), welche von den, im Zwischenraume zwischen je 2 Körperringen äußerlich sichtbaren und durch eine Klappe verschließbaren Luftlöchern (stigmäta) entspringen und sich vielfach im Innern des Körpers verzweigen; manche athmen auch, während sie als Larven im Wasser leben, durch Kiemen (Fig. 105., B., a.). Ein großer, röhriger Schlauch (Rückengefäß), welcher längs dem Rücken den ganzen Körper der Länge nach durchzieht, vertritt durch seine Pulsationen die Stelle des Herzens. Die **Verdauungswerkzeuge** bestehen aus der Speiseröhre und dem Magen, der gewöhnlich einen länglichen Schlauch bildet und aus dem Dünndarm mit den fadenförmigen Blinddärmen besteht. Der Hinterleib wird, vorzüglich bei den Larven, größtentheils mit einer weißen,

§. 122. flockigen Masse, Fettkörper, ausgefüllt. Die weißen, zarten **Muskeln** sind sehr zahlreich (bei der Weidenraupe nach Lyonet über 4000), liegen meist im Brustkasten, und haben bei manchen Insekten außerordentliche Kraft, so daß z. B. ein Floh seine Länge 200 Mal abspringen kann. Das **Nervensystem** hat so viel Knoten als der Leib Ringe, 2 im Kopfe, 3 im Brustkasten und 7—8 im Hinterleibe (Fig. 4. §. 13.). Von diesen Knoten entspringen die Nerven für die Fühler, Augen, Taster und Beine. Die Insekten haben also deutliche Gesichts- und Gefühlsorgane, dagegen kennt man bei ihnen weder Geschmacks- noch Geruchsorgane, obgleich wohl die meisten Insekten sehr gut riechen; Gehörorgane, welche man bisher in den Fühlern vermuthete, hat v. Siebold zuerst bei Grabflüglern (§. 181.) in einer Art Trommel aufgefunden und zwar **a.** bei der Gattung Acridium im ersten Hinterleibsringe in der früher für das Stimmorgan angesehenen Einrichtung; **b.** bei den Gattungen Locusta und Gryllus in einem ähnlichen Organe an den Schienen der Vorderbeine dicht unter dem Knie. **Eigenthümliche Absonderungsorgane: 1.** Spinngefäße der Larven, welche sich in der Unterlippe ausmünden und bei der Seidenraupe die Seide liefern; **2.** Giftdrüsen mancher ♀ unter den Aderflüglern; **3.** absondernde Gelenkhäute, durch welche die Maiwürmer (§. 138.) eine ölige, gelbe Flüssigkeit und die spanische Fliege (§. 138.) den Cantharidenkampfer absondert. Die Bienen haben zwischen den 5 mittlern Bauchringen eine taschenförmige Gelenkhaut, in welcher das Wachs in dünnen Scheiben abgesondert wird. — **Tönende Apparate: 1.** das Zirpen bei Käfern durch Reibung verschiedener Rumpftheile an einander (Lamia, Rhagium und Lema, §. 142. u. 143.); **2.** das Summen bei Fliegen durch die Luft, welche aus den vordern Luftlöchern an der Brust aus- und einströmt. Die Zweiflügler haben am ersten Brust-Stigma eine halbmondförmige, aus Hornplättchen bestehende Scheibe, welche (nach Burmeister) durch die Luftströmung erschüttert, tönt. **3.** Das Schwirren und Singen der Grabflügler (§. 181.).

Alle Insekten sind getrennten **Geschlechts**, nur einige, gesellig lebende haben auch geschlechtslose Arbeiter unter sich (Bienen); bei einigen sind ♂ und ♀ im Aeußern sehr verschieden (Schwammspinner, Frostschmetterling, Leuchtkäfer); auch sind die ♂ meist zahlreicher, behender, und bei vielen Grabflüglern mit eignem Stimmorgane (§. 181.) versehen, womit sie die ♀ anlocken, wie bei den Singvögeln. Sie begatten sich nur einmal im Leben, sterben dann gewöhnlich sehr bald, die meisten gegen den Winter, wo es ihnen an Nahrung fehlt; meist leben nur die, welche sich nicht haben begatten können, länger und halten auch wohl einen Winterschlaf; die meisten überwintern als Puppen, viele als Ei, wenige als Larven. Manche leben als vollkommene Insekten nur kurze Zeit, wie die Eintagsfliegen (Fig. 105., §. 176.), fressen wenig oder gar nicht (Schmetterlinge), haben dann aber als Larven oft schon ein oder mehre Jahre gelebt. Uebrigens will man auch bei Schmetterlingen Fälle beobachtet haben, daß frisch ausgeschlüpfte Weibchen ohne Begattung fruchtbare Eier gelegt haben. (Siehe Generationswechsel, §. 20 b. und Blattläuse §. 192.)

Alle Insekten bestehen eine **Metamorphose** oder **Verwandlung**, indem sie 4 Lebensperioden, als Ei, Larve, Puppe und vollkommenes Insekt durchlaufen. Die aus den Eiern kriechenden Larven sind den vollkommenen Insekten sehr unähnlich und gleichen mehr langgestreckten, geringelten Würmern, sind **bunt** gefärbt, wenn sie an der Luft, weiß aber und fußlos, wenn sie im Innern von Thieren oder Pflanzen leben. Die bein- und kopflosen Larven, wozu die meisten Fliegenlarven gehören, nennt man Maden; Larven mit einem Kopfe und 6 Beinen eigentliche Larven, und die mit einem Kopfe und mehr als 6, aber weniger als 16 Beinen heißen Raupen (Fig. 93.); die meist 22beinigen Larven der Blattwespen heißen Afterraupen (Fig. 87.). Larven sind noch wenig entwickelt, fressen viel, haben keine Fortpflanzungsorgane, wachsen schnell, häuten sich 3 — 7, meist 4 Male und verwandeln sich dann in eine, ihre Nervenpaare verkürzende (Fig. 4.) Puppe oder Nymphe, welche meist ruhet und nicht mehr frißt. Aus der Puppe (Coccon, Fig. 91. u. 94.) schlüpft nach längerer oder kürzerer Zeit das vollkommene Insekt (imago) aus, welches

anfangs weich ist und nur kleine Flügel hat; diese breiten sich aber in kurzer Zeit aus, die Haut erhärtet und das Insekt wächst nun nicht mehr, sondern pflanzt sich dann fort und stirbt bald darauf. Man nennt die Verwandlung eine vollkommene, wenn Larve und Puppe dem vollkommenen Insekte sehr unähnlich sind und die Puppe ohne zu fressen ruhet und also alle willkührlichen thierischen Funktionen aufhören; eine unvollkommene aber, wenn Larve und Puppe dem vollkommenen Insekte ziemlich ähnlich sind und die Puppe (hier Nymphe) frißt und nicht ruhet, sondern sich bewegt. Die Larven dieser haben nie Flügel, aber die Puppen haben Flügelstummel, wenn das vollkommene Insekt geflügelt ist. Die Insekten mit unvollkommener Verwandlung (Halbflügler, Grad- und Netzflügler) stehen immer auf einer niedern Stufe der Ausbildung. Durch die Metamorphose werden indeß nicht alle Organe umgewandelt, sondern sie entwickeln sich nur allmählig, indem man in der Puppe schon alle Theile des daraus hervorgehenden Insekts findet (Fig. 94., §. 156.). Die meisten Insekten pflanzen sich durch Eier fort, welche bei den Gall- und Sägewespen nach dem Ablegen noch wachsen; nur sehr wenige gebären lebendige Junge. Insekten vermehren sich meist wegen der großen Anzahl der Eier und des schnellen Wachsthums der Larven sehr stark; eine Weidenraupe (§. 161, 28) wird von der Zeit des Auskriechens aus dem Ei bis zur Verpuppung an 72,000 mal schwerer, und die Maden der Brechfliege (§. 172, 22) sind in 24 Stunden nach dem Auskriechen aus dem Ei schon 155 mal schwerer geworden. Einige Insekten legen nur wenige Eier, ein Floh etwa 12, manche Käfer 20 bis 30, eine Bienenkönigin aber 5000—6000, ein Termitenweibchen, dessen Hinterleib nach der Befruchtung an 2000 mal größer wird als vor der Befruchtung, über 86000. Eine Blattlaus kann in fünfter Generation eine Nachkommenschaft von 5 Millionen, und ein Paar graue Schmeißfliegen (§. 172, 20) in einem Sommer an 500 Millionen haben. Dieselbe kann in kurzer Zeit gegen 2000 Maden zur Welt bringen, welche bei reichlicher Nahrung in 24 Stunden 200fach an Gewicht zunehmen und in 5 Tagen ausgewachsen sind; daher man mit Linné sagen kann, daß wenige Individuen ein Pferd ebenso schnell auffressen würden, als ein Löwe. Eine Kiefern-Blattwespe, welche jährlich einmal 100 Eier legt, kann, wenn keins davon zu Grunde ginge, schon im 10ten Jahre eine Nachkommenschaft von 200,000 Millionen Afterraupen haben, welche in einem Jahre alle Kiefernwaldungen Deutschlands zerstören könnten. Die Eier werden einzeln oder haufenweise abgelegt, aber immer an Stellen, wo die auskriechenden Larven sogleich ihre Nahrung finden (Mistkäfer, Borkenkäfer, Schlupfwespen, Gallwespen) und dies ist auch meist ihre einzige Sorge für die Jungen; nur wenige, gesellig lebende Insekten zeigen größere Sorgfalt für ihre Nachkommenschaft und zugleich höchst merkwürdige Kunsttriebe, vorzüglich im Baue ihrer gemeinschaftlichen Wohnungen (Bienen, Wespen, Ameisen). Manche Insekten zeigen nur als Larven solche Kunsttriebe (Frühlingsfliegen, Fig. 106., §. 177.) oder am Ende ihres Larvenzustandes (Spinnerraupen); einige um sich Nahrung zu verschaffen (Ameisenlöwe), andere um für ihre Nachkommen zu sorgen (viele Aderflügler). **Verbreitung**: Die Thiere keiner Klasse sind so weit verbreitet, als die Insekten; denn fast überall, wo organische Wesen sich finden, leben auch Insekten (auf dem Meere hat man jedoch nur einen Taumelkäfer (Gyrinus marinus) und eine Wanzengattung (Halobates) rudernd gefunden. **Nahrung** und **Aufenthalt** (§. 123.). Die meisten Insekten leben von Pflanzenstoffen (Blätter, Bast, Wurzeln, Samen, Früchte, Holz, Mark, Blüthen, Honigsaft u. s. w.), manche sogar von Giftpflanzen; einige sind nur auf gewisse Pflanzen und Pflanzentheile angewiesen (auf der Eiche leben mehre hundert verschiedene Insektenarten), andere auf viele Pflanzen, andere wieder, wie die Parasiten (§§. 173. u. 186.), auf gewisse Thiere; die meisten leben auf der Erde, manche indeß leben als Larven im Wasser, als vollkommene Insekten in der Luft. Im Wasser leben viele Käfer, Wanzen, Mücken- und Libellenlarven; in der Erde viele Käfer- und Fliegenlarven; auf Thieren schmarotzen Flöhe, Läuse u. s. w.; auf Pflanzen leben viele Käfer, Käferlarven und Raupen. Von Thierstoffen leben Speckkäfer, Todtengräber, Schmeißfliegen u. s. w.; die Schlupfwespen und einige

§. 122.

Fliegen, wie die Bremsen, leben sogar als Larven in lebenden Thieren. Manche Insekten machen große Züge aus einer Gegend in die andere, z. B. die Zugheuschrecke, die 4 gefleckte Wasserjungfer, Schaumcikade, einige Blattläuse ꝛc. **Vertheidigungsmittel**: **1)** die Freßwerkzeuge (die größeren Lauf- und Wasserkäfer, Wasserscorpione, §§. 128, 133. u. 190.); **2)** ein Giftstachel (Biene, Wespe); **3)** ein übelriechender Saft (Laufkäfer, Maiwurm, Wanzen ꝛc.); **4)** die Fähigkeit, durch Anziehung der Glieder sich todt zu stellen (Byrrhus, Anobium, Cryptocephalus, §§. 131., 129. u. 143.); **5)** die Schnelligkeit (Laufkäfer, Kurzflügler, Erdflöhe, Flöhe, Springschwänze); **6)** die täuschende Farbe mit dem Körper, auf welchem sie leben (Spannraupen, Schildkäfer).

Die Zahl der bekannten Insekten schätzt man auf mehr als 80,000 Arten, von denen die meisten in Tropenländern leben, wo Wärme und üppige Vegetation ihrer Vermehrung besonders günstig ist, die wenigsten im hohen Norden. Insekten der Vorwelt sind, mit Ausnahme der in Bernstein gefundenen, sehr selten und wenig bekannt.

Uebersicht der Anzahl lebender und fossiler Insektenarten.

	Käfer.	Aderflügler.	Schmetterlinge.	Zweiflügler.	Netzflügler.	Geradflügler.	Halbflügler.	Im Ganzen.
Lebend. . .	30,000	15,000	20,000	7,500	800	1115	5000	79,415
Fossil . . .	857	65	22	365	93	60	108	1,570
Zusammen	30,857	15,065	20,022	7,865	893	1175	5108	80,985

§. 123.

A. Schaden der Insekten.

1. Den Wurzeln der Pflanzen schaden die Larven:

a) Von **Käfern**: die Laubkäfer, der Drahtwurm (§. 129,9);

b) Von **Schmetterlingen**: die Graseule und Wintersaat-Eule (§. 162,36 u. 37), die Saatmotte und der Pfeifer in der Rübsaat (§. 164,52);

c) Von **Zweiflüglern**: die Zwiebel-, Kohl- u. Lattichfliege (§. 172,21), die Rosen-Nachtfliege und Kohl-Walzenfliege (§. 172,23 u. 17), die Narcissenfliege und Wiesenschnake (§§. 172,28 u. 170,8);

d) Von **Geradflüglern**: die Maulwurfsgrylle (§. 181,4).

2. Stengel und Holzstamm der Pflanzen zerstören:

a) **Käfer**: alle echte Holzfresser (§. 140.); unter den Sägehornigen: Agrilus, Anobium und Lymexylon (§. 129.); unter den Taxikornen: Anisotoma (§. 135.); unter den Rüsselkäfern: Calandra und Pissodes (§. 139.); unter den Bockkäfern: Cerambyx, Callidium, Lamia, Saperda u. Rhagium (§. 142.);

b) **Schmetterlinge**: die Glasflügler (§. 160.), Weidenbohrer (§. 161,26);

c) **Aderflügler**: die Holzwespen (§. 149.).

3. Pflanzenblätter, junge Triebe und Augen der Pflanzen zerstören:

a) **Käfer**: fast alle Laubkäfer (§. 130,25), und von Keulenhörnigen der Rapskäfer (§. 131,33), von Blattkäfern die Erdflöhe, der Erlen-, Espen- und Pappel-Blattkäfer und das Lilienhähnchen (§. 143.); von Rüsselkäfern die Blattroller, Minirkäfer, sowie Magdalis, Ceuthorhynchus, Anthonomus, Otiorhynchus, Phyllobius, Hyllobius, Thylacites u. Brachideres (§. 139.);

b) **Schmetterlinge**:

α) Tagschmetterlinge: Hecken-, Kohl- und Rübenweißling und großer Fuchs (§. 157.);

β) Schwärmer: der Kiefernschwärmer (§. 159.);

γ) Spinner: Kiefernspinner, Kirchensp., Processionssp., Kiefernpro-

cessionsſp., Ringelſp., Schwammſp., Wallnußſp., Ringelfuß, Goldafter und Nonne (§. 161.);
δ) Eulen: Blaukopf, Föhreneule, Gamma-Eule und die Gattung Mamestra (§. 162.);
ε) Spanner: Kiefernſpanner, Birkenſp., Waldlindenſp., Winterſp. und Stachelbeerſp. (§. 163.);
ζ) Zünsler: Kohlzünsler (§. 164.);
η) Wickler: Zwetſchenwickler, Eichenw., goldgelber Wickler und die meiſten Arten von Coccyx (§. 165.);
ϑ) Motten: Schnauzenmotten (§. 166.);
c) Aderflügler: Roſen-Blattweſpe, Kiefern-B., Stachelbeer-B. und veränderliche Bl. (§. 148.);
d) Halbflügler: Pflanzenläuſe (§. 192.) und einige Schildläuſe (§. 193.).
e) Gradflügler: Zugheuſchrecke, Feldgrylle und Hausgrylle (§. 181.); auch wohl Blaſenfüße (§. 184.).

4. Pflanzenſamen und Früchte zerſtören:
a) Käfer: Samenkäfer (§. 139.), Himbeerkäfer, Anobium, Kräuterdieb (§. 129) und mehre Rüſſelkäfer, namentlich Blattroller, Nußbohrer und die Gattungen Apion, Calandra und Ceuthorhynchus (§. 139.);
b) Schmetterlinge: Apfelwickler, Tannenzapfenwickler (§. 165.), Mehlzünsler (§. 164.), Kornmotte (§. 166.) und Hadena capsincola (§. 162.).

5. Pflanzenauswüchſe (Gallen) verurſachen die Gallweſpen unter den Aderflüglern (§. 152.) und die Gallmücken unter den Zweiflüglern (§. 170,3), ſo wie einige Pflanzenläuſe unter den Halbflüglern: *Pemphigus* u. *Chermes* (§. 192.).

6. An Thierſtoffen ſchaden:
a) Käfer: Speckkäfer, Pelzkäfer, Cabinetkäfer u. Kräuterdieb (§§. 131. u. 129.);
b) Schmetterlinge: Schmalzzünsler (§. 164.), Pelz-, Kleider- und Tapetenmotte (§. 166.);
c) Zweiflügler: Brechfliege, Fleiſch- und Käſefliege (§. 172.);
d) Aderflügler: Horniſſe, Weſpen und vorzüglich in heißen Ländern die Ameiſen (§. 153.);
e) Netzflügler: Termiten und Holzläuſe (§. 178.);
f) Gradflügler: Schaben (§. 182.).

7. Den Thieren ſelbſt ſind läſtig und ſchädlich und zwar
a) dem Menſchen vorzüglich
α) Thierparaſiten: Filz-, Kopf-, Kleider- und Läuſeſuchtslaus (§. 194.), gemeiner und Sandfloh (§. 171.);
β) Schmetterlinge: Proceſſionsſpinner (§. 161.);
γ) Zweiflügler: Stechmücken und Kriebelmücken (§. 170.), Blind- und Regenbremen, Gemeinfliegen und Stechfliegen (§. 172.);
δ) Aderflügler: Weſpen und Horniſſe (§. 153.);
ε) Halbflüger: Bettwanzen (§. 189.);
b) Säugethieren: außer den meiſten eben genannten noch vorzüglich Bies- und Bremsfliegen (§. 172.), Harlinge (§. 186) und mehre Lausfliegen (§. 173.);
c) Vögeln: Federling und Haftfuß (§. 186.);
d) Fiſchen und deren Laiche: die größern Schwimm- und Waſſerkäfer (§§. 133. u. 134.);
e) Inſekten: Bienenwolf (§. 131.), Larven von Maiwürmern (§. 138.), welche an Bienen und Hummeln ſchmarotzen, ſo wie Schlupfweſpen (§. 150.), welche ihre Eier in Raupen und Puppen legen.

B. Nutzen der Inſekten. §. 124a.

1. Mittelbarer Nutzen im Haushalte der Natur:

a) Viele Inſekten und vorzüglich die Aderflügler und manche Käfer (*Mitidula* u. ſ. w.) befördern die Befruchtung der Pflanzen, namentlich

§. 124a. α) der zweihäusigen (II. §. 62.), vorzüglich der Weiden und Pappeln, bei denen auch die ♂ Blüthen die frühern sind;

β) der Orchideen (II. §. 296.), bei denen die Antheren klebrig sind und der Pollen durch Erschütterung nicht auf die Narben kommen kann;

γ) vieler Syngenesisten (II. §. 249.), bei denen das Stigma regelmäßig weit über dem Antherenkranze steht;

b) dienen sie vielen Säugethieren, namentlich Fledermäusen, zahnlückigen Säugethieren und Insektenfressern, wie Igeln, Spitzmäusen, Maulwürfen, so wie Vögeln, besonders Klettervögeln, Singvögeln, Regenpfeifern, Schnepfen und Strandläufern zur Nahrung;

c) verhindern viele Insekten, vorzüglich Schlupfwespen (echte Schlupfwespen und Schlupfwespenverwandte (§§. 150. u. 151.), so wie manche Zweiflügler, namentlich die Raupenfliegen (§. 172,19) dadurch, daß sie ihre Eier in andere Insekten, besonders in schädliche Raupen legen, die zu große Vermehrung derselben;

d) reinigen die Raub-Insekten Gärten, Felder und Wälder von schädlichen Insekten. Solche Räuber sind unter den Käfern die Laufkäfer (§. 128.), Kurzflügler (§. 132.), Weichkäfer (§. 129.) und Kugelkäfer (§. 144.); unter den Aderflüglern die Mordwespen (§. 153.); unter den Zweiflüglern die Schwebfliegen (§. 172,30); unter den Netzflüglern die Kameelhalsfliegen, Blattlausfliegen und Ameisenlöwen (§. 177.); unter den Gradflüglern die Fangheuschrecken (§. 182.).

e) Vertilgen sie viele Unkräuter theils im Keime, theils wenn sie aufgewachsen sind. Sie scheinen überhaupt in Verbindung mit den übrigen Thieren auch bestimmt zu sein, dem Uebergewichte des Pflanzenwuchses entgegen zu wirken. Den öftern Verheerungen durch einige Insektenarten (Raupenfraß, Borkenkäferverwüstungen) wird wieder durch andere (Schlupfwespen ꝛc.) eine Grenze gesetzt.

f) Befördern sie die Reinigung der Luft und dadurch die Gesundheit lebender Wesen, indem sie faulende Körper selbst verzehren od. ihre Eier hineinlegen, damit die auskriechenden Larven ihre Nahrung finden (Mistkäfer, Hautfresser, Todtengräber, Fleischfliegen, Gemeinfliegen, Dungfliegen ꝛc.). Die starke Vermehrung (S. 133.) schnelle Verdauung und große Freßgier (S. 133.) mancher Arten befördern besonders diesen Zweck.

2. Unmittelbarer Nutzen für die Menschen. Die Insekten liefern:

a) **Nahrungsstoffe** und zwar Honig (§. 154.) und Manna (§. 191.), welches im Oriente häufig als Nahrung dient. Manche Insekten, z. B. Heuschrecken (§. 181.) werden von den Beduinen in Egypten gegessen und in Persien und Marokko als Eßwaren zu Markte gebracht, so daß bei deren Ankunft die Preise der andern Fleischspeisen bedeutend fallen. Die Larven des Palmbohres werden in Brasilien gegessen, so wie früher die Larven eines andern Insekts, vielleicht eines Hirschschröters (§. 130.) oder Spießbockes (§. 142.) bei den Römern und Griechen unter dem Namen Cossus für Leckerbissen galten; auch Ameisen werden von mehren brasilianischen Völkerschaften gegessen, so wie die Hottentotten und Charuels (in Südamerika) ihr eigenes Ungeziefer verzehren.

b) **Arzneimittel**, Farbestoffe u. s. w. Die spanische Fliege (§. 138.) liefert uns das bekannte Blasenpflaster; Ameisen liefern den Apotheken die Ameisensäure; einige Zirpen (§. 191.) verursachen durch ihren Stich an mehren Pflanzen den Ausfluß der genannten Manna; die Bienen sammeln Honig und Wachs; die polnische Schildlaus und Gummilack- und Kermesschildlaus, so wie die Cochenillelaus (§. 193.) liefern Farbestoff und Schellack; verschiedene Gallwespenarten (§. 152.) bewirken Gallen auf Eichen und darin Ansammlung der Gallusäure. — Der Seidenwurm (§. 161.) liefert uns Kleidungsstoffe.

1) Linné's Eintheilung nach Form und Bau der Flügel. §.124b.

- Mit Flügeln
  - 4 Flügel
    - Vorder- und Hinterflügel von ungleicher Substanz
      - Vorderflügel ganz hornig . . **1) Käfer.**
      - Vorderflügel am Grunde hornig, an der Spitze häutig **2) Halbflügler.**
    - alle von gleicher Substanz
      - Flügel mit staubähnlichen Schuppen . . **3) Schmetterlinge.**
      - Flügel nackt
        - Längs- und Queradern fast gleich stark und gleich zahlreich, ein zierliches Adernetz mit meist 4eckigen Maschen bildend . . **4) Netzflügler.**
        - Längsadern stärker u. sich mit den wenigen Queradern baumartig verzweigend . . . **5) Aderflügler.**
  - 2 Flügel . . . . . **6) Zweiflügler.**
- Ohne Flügel . . . . . **7) Flügellose.**

2) Burmeister's Eintheilung nach der Entwickelung.

- Mit vollkommener Verwandlung (*insecta metaböla* S. 133.)
  - 4Flügel und zwar
    - ungleichartige, die vordern hornige Flügeldecken bildend (Maikäfer und Leder-Laufkäfer Fig 71.). — **Käfer** . . . . . I. *Coleoptĕra* L. §. 126.
    - gleichartige
      - nackt und mit zweigartigen Adern durchzogen (Honigbiene Fig. 90.). — **Aderflügler** . . . . . II. *Hymenoptĕra* L. §. 146.
      - ganz oder theilweise mit staubfeinen Schuppen bedeckt (großer Fuchs Fig. 95.) — **Schmetterlinge** . . . . . III. *Lepidoptĕra* L. §. 155.
  - 2 Flügel, nackt und durchsichtig; statt der 2 hintern fehlenden Flügel 2 gestielte Knöpfchen (Stubenfliege und Schlammfliege Fig. 104.) — **Zweiflügler** . . . . . IV. *Diptĕra* L. §. 168.
- Mit unvollkommener Verwandlung (*insecta ametaböla* S. 133.)
  - 4 gleichartige Flügel mit engmaschigem Adernetze (Wasserjungfer und Eintagsfliege Fig. 105.). — **Netzflügler** . V. *Neuroptĕra* L. §. 174.
  - 4 ungleichartige Flügel
    - die vordern pergamentartig, die hintern häutig, breiter und längsgefaltet (Hausgrylle Fig.108.). — **Geradflügler** . . . . . VI. *Orthoptĕra* Oliv. §. 179.
    - die vordern am Grunde hornig, am Ende häutig; die hintern mit verzweigten Adern (Schwarzfühlerige Wanze Fig. 111.). — — **Halbflügler** . . . . . VII. *Hemiptĕra* L. §.187.

Die 2 ersten und 2 vorletzten Ordnungen sind **Nager** d. h. sie haben beißende Mundtheile (Fig. 70.), die übrigen Ordnungen sind **Sauger** d. h. sie haben saugende Mundtheile (Fig. 104.).

I. Ordnung. Coleoptĕra L. (Eleutherāta F.) Käfer §. 125.

(Flügelscheider). Vorderflügel hornig, Mundtheile beißend, erster Brustkastenring (Vorderbrust) frei beweglich; Verwandlung vollkommen.

Die Flügel sind ungleichartig, die vorderen (Decken, Flügeldecken, Flügelscheiden, elytra) sind hornartig und bedecken in der Ruhe die hintern, häutigen, längern, breitern und deshalb nach vorn umgeschlagenen und zusammengefalteten und nur beim Fliegen ausgespannten Flügel; diese fehlen bei einigen und dann sind die Flügeldecken meist verwachsen und die Käfer heißen ungeflügelt (Fig. 71.). Am Kopfe stehen 2 große, facettirte Augen (selten Nebenaugen) und zwei 6—13gliedrige, sehr verschieden gebildete Fühler (S. 128.). Die Mundtheile sind meist deutlich (Fig. 70.), die Oberkiefern meist einwärts gebogen, sich berührend oder übergreifend, die Kinnladen und Lippen mit ihren Tastern sehr verschieden gebildet, die Vorderbrust (S. 130.) groß und für sich beweglich, die Mittel- und Hinterbrust unter sich und mit dem Hinterleibe innig zusammenhängend; der zweite Brustring hat oben meist eine 3eckige, zwischen beide Flügel tretende Platte, das Schildchen (scutĕllum Fig. 72; 74,b; 75. ꝛc.); die Füße sind meist 5gliedrig (Fig. 71,i), einige Glieder aber oft sehr klein und schwer zu erkennen; das letzte Glied hat 2 große Krallen (Fig. 71,k); die Beine dienen meist nur zum Laufen, selten zum Schwimmen, noch seltner zum Springen (Erdflöhe und Minirkäfer). Die Larven haben meist einen deutlichen Kopf und

keine Spinnorgane; sind meist nackt, leben versteckt und sind 6beinig (Engerlinge, Fig. 79.) oder beinlos; die in Holz und Mist lebenden haben keine, die von Raube (Laufkäferlarven §. 128.) oder Blättern lebenden (Blattkäferlarven §. 143.) jederseits 3—6 Augen; die Puppen haben dicht angezogene Gliedmaßen, liegen frei in einer Höhle und sind meist ungefärbt wie die Larven. Die Nahrung der Larven und Käfer ist sehr verschieden (§. 123.): vom Raube anderer Insekten leben die Laufkäfer, Kurzflügler, Schwimm- und Wasserkäfer (§. 127.); von faulenden Pflanzenstoffen die keulenhörnigen Käfer (§. 131.); vom Holzkörper die Holzfresser (§. 140.); von frischen Pflanzenblättern die Blattkäfer (§. 143.); viele leben auch als Larven und Käfer in Ameisenhaufen und Bienen- und Wespennestern. — Zahl der bekannten Käfer etwa 30,000 Arten, von denen etwa 8000 Arten in Europa leben (§. 122.).

§. 126. Uebersicht der 17 Familien.

I. Pentaměra. Fünfzehige. An allen Füßen fünf Tarsenglieder. (Fig. 71. u. 72.)

- Mit Laufbeinen (Fig. 71. und 72.)
  - Flügeldecken den ganzen Hinterleib bedeckend
    - Fühler an der Spitze nicht verdickt
      - Fühler faden- od. borstenfg; Endglieder gleichlang (Goldschmied u Leder-Laufkäfer, Fig. 71.) ..... 1. Fam. **Laufkäfer,** *Carabicina* §. 127,1.
      - Fühler gesägt (Fig. 69 a.) oder gekämmt (Fig. 72.) oder mit meist auffallend längern Endgliedern (gezeichneter Schmied Fig. 72.) ..... 2. Fam. **Sägehörnige,** *Serricornia.* §. 127,2.
    - Fühler an der Spitze verdickt
      - Letzte Fühlerglieder blatt- od. zahnartig erweitert (Fig. 69, c. u. d) indem sie nur an der Außenkante verbunden sind und so einen Knopf bilden, der sich fächelartig ausbreiten kann (Maikäfer) ..... 3. Fam. **Blatthörnige,** *Lamellicornia.* Fig. 127,3.
      - Letzte Fühlergl. einen rundlichen, deutlich abgesetzten od. sich nur allmählig verdickenden Knopf bildend (gemeiner Todtengräber, Fig. 73.) ..... 4. Fam. **Keulenhörnige,** *Clavicornia.* §. 127,4.
  - Flügeldecke sehr kurz, abgestutzt, kaum die Hälfte des schmalen Hinterleibes bedeckend (rothflügliger Raubkäfer, Fig. 74.) .. 5. Fam. **Kurzflügler,** *Brachelytra.* §. 127,5.
- Mit Schwimmbeinen (Fig. 75.) Wasserkäfer
  - Fühler borstenförmig (Gelbbrand, Fig. 75 a.) 6. Fam. **Schwimmkäfer,** *Hydrocantharida.* §. 127,6.
  - F. keulenförmig (Fig. 75 d.) ..... 7. Fam. **Wasserkäfer,** *Hydrophilina.* §. 127,7.

II. Heteroměra. Ungleichzehige. Die 4 ersten Füße mit 5, die 2 letzten mit 4 großen Tarsengliedern (oft noch mit einem 5ten sehr kleinen, versteckten) (Fig. 79.).

- Unterkiefer an der Innenseite
  - ohne hornigen Zahn
    - Flügeldecken hinten abgerundet; Fühler kurz, mehr od. weniger durchblättert od. schnurförmig und allmählig zur Keule sich verdickend (Trüffelkäfer) 8. Fam. **Taxikornen,** *Taxicornia.* §. 127,8.
    - Flügeldecken hinten abgestutzt od. zugespitzt; Fühler faden- oder sägeförmig (Stachelkäfer) ..... 9. Fam. **Engflügler,** *Stenelytra.* § 127,9.
  - mit hornigem Zahne
    - Kopf vom Halsschilde bedeckt, ohne Halsabschnürung, aber mit erweitertem Seitenrande (der Müller, Fig. 79.) ..... 10. Fam. **Schwarzflügler,** *Melasomata.* §. 127,10.
    - Kopf ganz frei, nach hinten halsförmig abgeschnürt (Maiwurm) ..... 11. Fam. **Halskäfer,** *Trachelophora.* §. 127,11.

Fig. 72.
Elater signātus. Gezeichneter Schmied (§. 129,9).

III. Tetramĕra. Vierzehige. An allen Füßen 4 Tarsenglieder (Fig. 80.).

- Kopf in einen längern od. kürzern Rüssel verlängert (Palmbohrer, Fig. 80.) — 12. Fam. **Rüsselkäfer**, *Rhynchophŏra*. §. 127, 12.
- Kopf ohne Rüssel
  - Fühler faden- od borstenfg
    - Fühler mit kugligem Knopfe od. schnurförmig; Leib walzig od. flach (Buchdrucker, Fig. 81.) — 13. Fam. **Holzfresser**, *Xylophăga*. §. 127, 13.
    - Fühler von Körperlänge od. noch länger; Körper gestreckt, meist groß (geschweifter Widderkäfer, Fig. 82.) — 14. Fam. **Bockkäfer**, *Longicornia*. §. 127, 14.
    - Fühler kurz, selten von Körperlänge; Körper kurz, gedrungen, stark gewölbt, meist klein (Lilienkäfer u. bogiger Flohkäfer (Fig. 83.) — 15. Fam. **Blattkäfer**, *Chrysomelina*. §. 127, 15.

IV. Triměra. Dreizehige. An allen Füßen 3 oder nur 1 deutliches Tarsenglied.

- Hinterleib von den Flügeldecken ganz bedeckt; Leib halbkuglig, selten länglich, unten flach (Sonnenkälbchen) — 16. Fam. **Kugelkäfer**, *Coccinellina*. §. 127, 16.
- Hinterleib nur zum Theil von den Flügeldecken bedeckt — 17. Fam. **Zwergkäfer**, *Pselaphina*. § 127, 17.

Uebersicht der wichtigsten Gattungen genannter 17 Familien. §. 127.

1) Carabicina. Laufkäfer. §§. 126, 1 und 128.

- Kopf immer dicker als Halsschild; Oberkiefer nach innen mehrzähnig — **Sandkäfer** — 1) *Cicindĕla* L.
- Kopf weit schmäler als Halsschild; Oberkiefer mit 1 oder keinem Zahne
  - Vorderschienen mit 1 Dorn an der Spitze; Augen vorgequollen. — **Uferkäfer** — 2) *Elăphrus* F.
  - V. mit 2 Dornen an der Spitze
    - ungeflügelt; Flügeldecken länglich (Fig. 71.) — **Laufkäfer** — 3) *Carăbus* L.
    - geflügelt; Flügeldecken viereckig — **Puppenräuber** — 4) *Calosŏma* F.
  - Vorderschienen am Innenrande mit tiefem Ausschnitte vor der Spitze
    - Flügeldecken abgestutzt; Halsschild herzförmig — 5) *Brachĭnus* F.
    - Flügeldecke abgerundet, schwarz oder metallisch
      - Oberlippe abgestutzt — 6) *Pterostĭchus* Bon.
      - Oberlippe schwach ausgerandet
        - Kinn mit stumpfem oder fast fehlendem Zahne im Ausschnitte; Halsschild hinten etwas schmäler — 7) *Harpălus* Latr.
        - Kinn mit ausgerandetem Zahne; Halsschild hinten etwas breiter — 8) *Amăra* Bon.

2) Serricornia. Sägehörnige. §§. 126, 2 und 129.

- Brustbein nach hinten mit einem Fortsatze
  - Fortsatz in einen Dorn erweitert (können sich in die Höhe schnellen) — **Schmied** (Fig. 72.) — 9) *Elăter* L.
  - Fortsatz mit stumpfer Spitze (können sich nicht in die Höhe schnellen)
    - Brustbein das Kinn mit einem Fortsatze nicht verdeckend; Flügeldecken mit gesägter Spitze. — **Prachtkäfer** — 10) *Buprĕstis* L.
    - Brustbein das Kinn verdeckend
      - Körper lang, schmal — 11) *Agrĭlus*.
      - Körper kurz, breit, flach, eckig — 12) *Trachys* L.
- Brustbein ohne Fortsatz
  - Flügeldecken hart, walzig
    - Halsschild den Kopf kapuzenförmig deckend
      - die 3 letzten Fühlerglieder länger. — **Klopfkäfer** — 13) *Anobium* F.
      - Fühler kammförmig (♂) od. fadenförmig (♀). — **Bücherbohrer** — 14) *Ptĭlinus* Geoff.
    - Halsschild herzförmig, deutlich abgeschnürt; Fühlerglieder gleichlang; Leib walzig (♂) oder eiförmig (♀). — **Kräuterdieb** — 15) *Plĭnus* L.
  - Flügeldecken weich; Kopf frei: Weichkäfer.
    - Oberkiefer am Ende zweizähnig; Fühler schwach gesägt — 16) *Dasўtes* F.
    - Oberkiefer mit 1 Zahne
      - Fühler am Grunde weit entfernt; ♂ u. ♀ geflügelt. — **Weichkäfer** — 17) *Canthăris* L.
      - Fühler am Grunde genähert; ♀ ungeflügelt, leuchtend. — **Leuchtkäfer** — 18) *Lampўris* L.
      - Körper sehr lang, walzig und sehr weich. — **Schiffswerftkäfer** — 19) *Lymexўlon* L.

§. 127. **3) Lamellicornia. Blatthörnige.** (Fig. 69. c. u. d.) §§. 126,3 u. 130.

- Leben in Mist u. Aas: Mistkäfer
  - Schildchen sichtbar; Kopf und Halsschild ohne Hörner
    - Oberkiefer hornig; Fühler 11gliedrig; Körper nicht unter 7‴ lang — **Roßkäfer** ..... 20) *Scarabaeus* F.
    - Oberkiefer häutig; Fühler 9gliedrig; Körper nicht über 6‴ lang — **Dungkäfer** ..... 21) *Aphodius* F.
  - Schildchen nicht sichtbar; Kopf und Hals mit Hörnern
    - Flügeldecken hinten nicht abgestutzt — **Mondhornkäfer** ..... 22) *Copris* F.
    - Flügeldecken hinten abgestutzt ..... 23) *Onthophagus* L.
- Leben in allen Stadien von Pflanzen: Laubkäfer
  - Leib oben gewölbt
    - Oberkiefer nicht geweihartig
      - Fühler 10gliedrig
        - Keule mit 3 Blättern; Kopfschild mit Höckern od. einem Horne — **Nashornkäfer** 24) *Oryctes* Jll.
        - Keule mit mehr als 3 Bl.; Kopfschild glatt — **Maikäfer** (Fig. 69, c.) ..... 25) *Melolontha* F.
      - Fühler 9gl., Keule mit 3 Blättern; Kopfschild glatt
        - Füße mit 2 nicht gespaltenen, gleichen Klauen 26) *Rhizotrogus* Latr.
        - Füße mit 2 gespaltenen Klauen ..... 27) *Anomala*.
    - Oberkiefer geweihartig — **Hirschkäfer** (Fig. 69, d.) .. 28) *Lucanus* L.
  - Leib oben flach; Steiß nackt — **Rosenkäfer** ..... 29) *Cetonia* F.

4) Clavicornia. Keulenhörnige. (Fig. 73.) §§. 126,4 u. 131.

- Fühler plötzlich verdickt
  - Leib walzig, Flügeldecken nicht abgestutzt
    - Leib länglich; Halsschild schmäler als die Flügeldecken, fast walzig — **Bienenwolf** 30) *Trichodes* F.
    - Leib eiförmig; Halsschild so breit als die Flügeldecken, gewölbt, nicht walzig — **Speckkäfer** ..... 31) *Dermestes* L.
  - Leib flach
    - Beine in Gruben zurückziehbar; Flügeldecken abgestutzt — **Schildkrötenkäfer** ..... 32) *Hister* L.
    - Beine nicht in Gruben zurückziehbar
      - Flügeldecken meist nicht abgestutzt, Körper höchstens $2\frac{1}{2}$‴ lang ..... 33) *Nitidula* F.
      - Flügeldecken immer abgestutzt; Körper nicht unter 5‴ lang — **Todtengräber** (Fig. 73.) ..... 34) *Necrophorus* L.
- Fühler allmählig verdickt
  - Leib flach, scharf umrandet; Beine nicht in Gruben zurückziehbar; Flügeldecken nicht abgestutzt; Halsschild hinten abgestutzt — **Aaskäfer** ..... 35) *Silpha* L.
  - Leib kuglig; Beine in Gruben zurückziehbar; Leib haarig
    - keine Grube für die Fühler — **Pillenkäfer** ..... 36) *Byrrhus* L.
    - eine Grube für die Fühler ..... 37) *Anthrenus* F.



Fig. 73.
Necrophorus vespillo (§. 131, 34).

Gemeiner Todtengräber (der Strich nebenbei bezeichnet die natürliche Größe). Fühler mit großem, durchblättertem, viergliedrigem, rothgelbem Endknopfe; Laufbeine alle 5gliedrig. Halsschild vorn abgestutzt, hinten gerundet; Flügeldecken mit 2 gelbrothen, zackigen Querbinden. Hinterschienen gekrümmt.

5) Brachelytra. Kurzflügler. (Fig. 74.) §§. 126,5 u. 132.

- Fühler am Vorderrande der Stirn innerhalb der Einlenkung der Mandibeln eingefügt
  - Zunge an der Spitze ausgerandet
    - Mittelbeine am Grunde auseinander stehend. — **Raubkäfer** (Fig 74.) ..... 38) *Staphylinus* L.
    - Mittelbeine am Grunde mit dicht neben einander liegenden Hüften ..... 39) *Oeïpus* Kirby.
  - Zunge an der Spitze abgerundet ..... 40) *Philonthus* Leach.
- Fühler auf der Stirn eingelenkt
  - Hinterhüfte klein, kegelförmig; Leib walzig ..... 41) *Stenus* F.
  - Hinterhüfte breiter als lang; Leib flach ..... 42) *Oxytelus* Gr.



Fig. 74. §. 127.
Staphylinus erythropterus (§. 132.).
Rothflügliger Raubkäfer.
a Fadenförmige Fühler.
b Dreieckiges schwarzes Schildchen.
c Von den Flügeldecken wenig bedeckter, also fast nackter Hinterleib mit dreieckigen, goldgelb-behaarten Flecken.

6) Hydrocantharĭda. Schwimmkäfer. §§. 126,6 u. 133.

Fühler borstenförmig, länger als der Kopf; Vordertarsen beim ♂ mit kreisförmiger Saugscheibe (Fig. 75 a. bis e.) — **Schwimmkäfer** ..... 43) *Dytĭcus* L.
Fühler dick, kürzer als der Kopf; Augen in ein oberes und unteres Paar getrennt — **Taumelkäfer** ..... 44) *Gyrinus* L.

7) Hydrophilīna. Wasserkäfer. §§. 126,7 u. 134.

Brustbein ganz gekielt, hinten in einen Stachel verlängert; Hintertarsen stark zusammengedrückt (Fig. 75 d.) — **Wasserkäfer** ..... 45) *Hydrophĭlus* F.
Brustbein nur in der Mitte gekielt; Hintertarsen kaum zusammengedrückt ..... 46) *Hydrobĭus* Leach.



Fig. 75.
a *Dytĭcus marginālis* (§. 133.). Weibchen des Gelbrandes (natürliche Größe).
Fühler borstenförmig. Fünftarsige Schwimmbeine. Eirunde Flügeldecken außen gelb gerandet, eben so der Halsschild im ganzen Umkreise.
b Vorderbein des ♂ vergrößert, mit kreisförmiger Saugscheibe, welche bei c noch mehr vergrößert ist.
d Kopf des pechschwarzen Wasserkäfers (Hydrophĭlus picĕus, §. 134). Fühler keulenförmig.

8) Taxicornĭa. Taxikornen. §§. 126,8 u. 135.

Fühler plötzlich in eine 5gliedrige Keule endigend; Körper halbkugelig ..... 47) *Anisotŏma* Ill.
Fühler gleichdick; Leib länglich viereckig ..... 48) *Hypophlœus* F.

9) Stenelўtra. Engflügler. §§. 126,9 u. 136.

Flügeldecken hart, merklich abgestutzt; Fühler gesägt, Hinterleib in eine lange Spitze endigend — **Stachelkäfer** ..... 49) *Mordella* F.
Flügeldecken weich, nicht abgestutzt; Fühler fadenförmig; Kopf rüsselförmig .... 50) *Oedemĕra.* Oliv.

10) Melanosomăta. Schwarzflügler. §§. 126,10 u. 137.

Flügeldecken an der Naht verwachsen — **Todtenkäfer** ..... 51) *Blaps* F.
Flügeldecken nicht verwachsen; Leib fast gleichbreit (linealisch) — **Müller** (Fig. 97.) 52) *Tenebrio* F.

11) Trachelophŏra. Halskäfer. §§. 126,11 u. 138.

Fühler fadenförmig; Flügeldecken den Hinterleib bedeckend — **Pflasterkäfer** .. 53) *Lytta* F.
Fühler perlschnurförmig; Flügeldecken verkürzt, klaffend — **Oelkäfer** ..... 54) *Melŏe* F.

§. 127. 12) Rynchophŏra. Rüſſelkäfer. §§. 126, [12] und 139.

Rüſſel breit und kurz; Fühler nicht geknickt, allmählig dicker; Steiß nackt. — Samenkäfer . . . . . 55) *Bruchus* L.

Rüſſel rund, meiſt länger als der Kopf, ſelten kürzer

- **Fühler gerade oder leicht gekrümmt (Fig. 76a.)**
  - **Kopf nach hinten verſchmälert, einen Hals bildend. — Blattroller** . . . . . 56) *Apodĕres* Oliv.
  - **Kopf nach hinten nicht verſchmälert**
    - **Steiß nackt** . . . . . 57) *Rhynchites* Hbst.
    - **Steiß bedeckt**
      - **Leib walzig** . . . . . 58) *Magdălis* Germ.
      - **Leib birnförmig** . . . 59) *Apion* Hbst.
- **Rüſſel vorgeſtreckt**
  - **Rüſſel kurz, d. h. die Fühler nahe am Ende**
    - **Fühlerfurche ſchief, bis unter die Augen gekrümmt (Fig. 76b.)**
      - **Körper faſt kuglig** . . . . . 60) *Thylacites* Germ.
      - **Körper länglich**
        - **Rüſſel nicht länger als breit**
          - **Fühler lang und dünn** . . . . . 61) *Brachydĕres* Sch.
          - **Fühler kurz und dick** . . . . . 62) *Sitŏna* Germ.
        - **Rüſſel länger als breit**
          - **R. gekrümmt; Körperfärbung nicht metalliſch**
            - **Schenkel mit einem Zahne** 63) *Hylobius* Sch.
            - **Schenkel ohne Zahn** . . . 64) *Cleŏnus* Sch.
          - **Rüſſel gerade; Körperfärbung metalliſch blau od. grün** . 65) *Polydrŭsus* Germ.
    - **Fühlerfurche geht auf die Mitte des Auges zu (Fig. 76c.)**
      - **Körper länglich, mit Flügeln** 66) *Phyllobius* Sch.
      - **Körper eirund oder faſt kugelig, ohne Flügel** . . . . . 67) *Otiorhynchus*.
  - **Rüſſel lang, d. h. die Fühler näher der Mitte oder am Grunde**
    - **eine runbliche Fühlergrube am Grunde des Rüſſels unter den Augen (Fig. 90.) — Kornwurm.** 68) *Calăndra* F.
    - **eine lange Fühlerfurche in der Mitte des Rüſſels (Fig. 76, d.)**
      - **Fühlerfurche bis unter die Augen gekrümmt** . . . . . 69) *Pissŏdes* Germ.
      - **Fühlerfurche gerade, bis vor die Augen reichend (Fig. 76d)**
        - **Rüſſel gebogen, meiſt länger als der halbe Körper; Flügeldecken abgeſtutzt — Rüſſelbohrer** . . . . . 70) *Balaninus* Germ.
        - **Rüſſel faſt gerade, kürzer als die halbe Körperlänge; Flügeldecken nicht abgeſtutzt** . . . . . 71) *Anthonŏmus* Germ.

Rüſſel in der Ruhe in einer Rinne an der Bruſt liegend; Leib kugelig, klein

- **Hinterſchenkel verdickt (ſpringen) — Springer** . . . . . 72) *Orchēstes* Jll.
- **Hinterſchenkel nicht verdickt (ſpringen nicht)** . . . . . 73) *Centorrhynchus*.



Fig. 76. Köpfe von Rüſſelkäfern.

a. Kopf von *Apodĕres coryli* (§. 139, 56): nach hinten abgeſchnürt; Fühler gerade, nicht in einen Winkel gebogen.

b. Kopf von *Thylacites coryli* (§. 139, 60): nicht abgeſchnürt; Fühler geknickt, am Ende des Rüſſels; Fühlerfurche ſchief, bis unter die Augen gekrümmt.

c. Kopf von *Phyllobius argentātus* (§. 139, 66): nicht abgeſchnürt, Fühler geknickt, am Ende des Rüſſels; Fühlerfurche klein, auf die Mitte des Auges zugehend.

d. Kopf von *Balaninus nucum* (§. 139, 70): mit langem Rüſſel, an deſſen Mitte die gerade, bis nahe vor die Augen reichende Fühlerfurche für die geknickten Fühler.

13) Xylophaga. Holzfresser. §§. 126, 13; 140. und 141. §. 127.

- Leib walzig; Fühlerkeule mit nicht abgesetzten Gliedern: echte Borkenkäfer
  - alle Fußglieder ungetheilt
    - Fußglieder kürzer als die Schienen; Halsschild breiter als der Kopf, kapuzenförmig (Fig 81.) — **Borkenkäfer** . . . . . 74) *Bostrÿchus* F.
    - Fußglieder länger als die Schienen; Halsschild schmäler als der Kopf. . 75) *Platÿpus* Hbst.
  - drittes Fußglied zweilappig (Fig. 77 b.)
    - Leib am Ende unten eingedrückt; Flügeldecken hinten fast abgestutzt (Fig. 77 b.). — **Splintkäfer** . . . 76) *Eccoptogaster* Hbst.
    - Leib nicht eingedrückt; Flügeldecken hinten gewölbt. — **Bastkäfer** . . . . 77) *Hylesinus* F.
- Leib flach; Fühlerkeule meist mit abgesetzten Gliedern: unechte Holzfresser
  - Leib elliptisch; Fühlerknopf 3gliedrig . . . . . 78) *Lathridius* Hbst.
  - Leib schmal, parallelseitig; Fühlerknopf 2gliedrig . . . . . 79) *Lyctus* F.



Fig. 77. Seitenansichten:

a. von *Bostrÿchus bicólor* (§. 140, 74) und
b. von *Eccoptogaster destructor* ♀.

Beide haben einen kapuzenförmigen Halsschild und an allen Füßen 4 Glieder, bei b. ist das dritte Fußglied zweilappig und der Leib am Ende unten eingedrückt.

14) Longicornia. Bockkäfer. §§. 126, 14 und 142.

- Augen mit tiefem Ausschnitte für die Fühler
  - Kopf geneigt, daher der Mund schräg nach born
    - Halsschild gebornt
      - scharfrandig; Fühler kürzer als der Leib — **Hornbock** . . . 80) *Prionus* Geoffr.
      - gewölbt, stumpfrandig; Fühler länger als d. Leib. **Bockkäfer** 81) *Cerambyx* L.
    - Halsschild nicht gebornt
      - flach gedrückt, kreisrund. **Listbock** 82) *Callidium* F.
      - fuglig. — **Widder** . . . . . 83) *Clytus* F.
  - Kopf senkrecht, daher der Mund abwärts
    - Halsschild walzig, gebornt . . . . 84) *Lamia* F.
    - Halsschild walzig, ungebornt . . 85) *Saperda* F.
- Augen rundlich oder länglich, mit schwacher Bucht
  - Kopf geneigt, nach hinten nicht dicker als das schmale, ungebornte Halsschild — **Schmalbock** . . . . . 86) *Leptura* F.
  - Kopf geneigt, dicker als das schmale, gebornte Halsschild. — **Zangenbock** . . . . . 87) *Rhagium* F.

15) Chrysomelina. Blattkäfer. §§. 126, 15 und 143.

- Halsschild stark verengt
  - Flügeldecken nach hinten schmäler, metallisch gefärbt — **Rohrkäfer** . . . . . 88) *Donacia* F.
  - Flügeldecken nach hinten nicht schmäler, abgerundet, nicht metallisch. — **Hähnchen** . . . . . 89) *Lema* F.
- Halsschild nicht verengt
  - Fühler zwischen den Augen eingelenkt
    - Halsschild u. Flügeldecken nicht schildförmig
      - Halsschild und Flügeldecken schildförmig erweitert. — **Schildkäfer** . . . . . 90) *Cassida* L.
      - Hinterschenkel nicht verdickt (springen nicht)
        - Hinterschenkel verdickt (springen) — **Flohkäfer** . . . . . 91) *Haltica* F.
        - Fühler fadenförmig, kürzer als der Körper; Fühlerglieder verkehrt kegelförmig. . . . 92) *Galleruca* Geoffr.
        - Fühler borstenförmig, wenigstens von Körperlänge; Fühlerglieder walzig 93) *Lupĕrus* Geoffr.
  - Fühler vor den Augen eingelenkt
    - allmählig verdickt; Körper länglich- oder rundlich-eiförmig. — **Blattkäfer** . . . . . 94) *Chrysomela* L.
    - fadenförmig; Körper walzig
      - Fühler gesägt, kaum den Halsschild überragend — **Sägeblattkäfer** 95) *Clythra* F.
      - Fühler fadenförmig, den Halsschild überragend. — **Fallkäfer** . . . . 96) *Cryptocephalus* F.

16) Coccinellina. Kugelkäfer. §§. 126,16 und 144.

Leib länglich; Halsschild hinten verengt; Fühlerknopf länglich . . . . . 97) *Coccidula.*
Leib hochgewölbt; Halsschild nicht verengt; Fühlerknopf keulenförmig — **Sonnenkälbchen** . . . . . 98) *Coccinella* L.

17) Pselaphina. Zwergkäfer. §§. 126,17 und 145.

Fühler 11gliedrig, die drei letzten Glieder eine Keule bildend — **Taskkäfer** 99) *Pselaphus* Hbst.
Fühler 6gliedrig, kolbig; Kopf ohne Augen. — **Keulenkäfer** . . . . . 100) *Claviger.*

§. 128. **1. Laufkäfer** (§. 127,1). Langbeinige, schnell laufende Käfer, überall unter Steinen, Moos ꝛc., und als (sechsbeinige) Larven im Miste von thierischen Stoffen und vom Raube lebend und durch Vertilgung vieler Insekten und deren Larven sehr nützlich. Vertheidigungsmittel (S. 134.).

* **1.** *Cicindela campestris* L. Grüner Sandkäfer. Oben grün; jede Flügeldecke mit 5 weißen Randflecken und einem braungerandeten Mittelflecke; 6‴; häufig auf sandigen Aengern; fliegt stoßweise.

* **2.** *Elaphrus riparius* F. Gemeiner Uferkäfer. Oben kupferbraun, ins Grünliche, überall feinpunktirt; jede Flügeldecke mit 4 Reihen kupferrother Gruben, in deren jeder ein Höcker in der Mitte; Schienen rostroth; 3‴; gemeinste Art an Gewässern.

* **3.** *Carabus cortaceus* F. Leder-Laufkäfer od. -Raubkäfer (Fig. 71.). Schwarz; Flügeldecken verworren gerunzelt; 16‴; größte Art; in Wäldern.

* *C. nemoralis* Jll. (*hortensis* F.) Garten-Laufkäfer. Schwarz, röthlich gerandet; Flügeldecken metallisch bräunlich, verworren gerunzelt, jede mit 3 Reihen Grübchen; 10‴; überall häufig.

* *C. cancellatus* Jll. Gitter-Laufkäfer. Hell kupferröthlich; jede Flügeldecke mit 3 erhabenen Längsrippen, welche mit 3 Reihen länglicher Körner abwechseln; Fühlergrund roth; 10‴; häufig auf Feldern.

* *C. granulatus* L. Körner-Laufkäfer. Ebenso, aber stets mit ganz schwarzen Fühlern; nur 8‴; häufig.

* *C. auratus* L. Goldschmied. Goldgrün, unten schwarz; jede Flügeldecke mit 3 erhabenen, kupferrothen Längsfalten; Beine und Fühlergrund roth; 10‴; häufigste Art bei uns, dagegen in der Mark ꝛc. sehr selten.

* **4.** *Calosoma sycophanta* L. Puppenräuber. Schwarzblau; Flügeldecken goldgrün, dicht punktirt-gestreift, jede mit 3 Reihen eingedrückter Punkte; 10—12‴; in Fichtenwäldern häufig und bei großem Raupenfraße vorzüglich nützlich.

* **5.** *Brachinus crepitans* L. Bombardirkäfer. Rostroth; Flügeldecken schwarz, schwarzblau oder grünlich, undeutlich gestreift; Fühlerglied 3 und 4 bräunlich; $3\frac{1}{2}$‴; nicht selten. Lassen gereizt, besonders beim Aufspießen, mit einem Puffe aus dem After eine ätzende Flüssigkeit fahren.

* **6.** *Pterostichus cupreus* L. Kupferfarbiger Grabkäfer. Glänzend kupferfarbig oder grün, blau oder schwärzlich; Halsschild hinten beiderseits mit 2 Längseindrücken und mit geraden Hinterecken; Flügeldecken gestreift, in den Streifen fein punktirt; Fühlerglied 1 und 2 roth; Beine schwarz oder röthlich; 4—6‴; sehr häufig.

* *P. lepidus* F. Zierlicher Gr. Ebenso, aber Fühler ganz schwarz; häufig.

* **7.** *Harpalus aeneus* F. Erzfarbiger Schnellkäfer. Metallisch glänzend, grün, blau oder schwarz; Halsschild hinten beiderseits mit einem punktirten Grübchen und mit stumpfen Hinterecken; Flügeldecken an der Spitze tief ausgerandet, gestreift und in den äußern Zwischenräumen fein punktirt; Fühler immer, meist auch die Beine roth; $4\frac{1}{2}$‴; sehr häufig.

* *H. ruficornis* F. Rothhorn. Pechschwarz; Fühler und Beine roth; Flügeldecken gestreift und dicht punktirt, fein gelblich behaart; 7‴; häufig.

†* *H.* (*Zabrus*) *gibbus* F. Gewölbter Rückenkäfer. Gewölbt, pechschwarz; Halsschild viel breiter als lang, hinten punktirt; Flügeldecken stark punktirt-gestreift; 7‴; nicht selten. Daß die Larven Getreidewurzeln zerstören, wird bezweifelt, weil keine der übrigen Laufkäfer-Larven Pflanzenstoffe frißt. Sundevall sah jedoch ausnahmsweise eine Amara Pflanzen fressen.

* **8.** *Amara communis* F. Gemeiner Kanalkäfer. Eirund, oben hell-

erzfarbig; die 3 ersten Fühlerglieder und die Schienen roth; Halsschild hinten beiderseits fein punktirt und mit 2 schwachen Eindrücken; $2^1/_2$—3‴; häufig.

2. Sägehörnige Käfer (§. 127, 2). Die Larven haben meist Beine und leben mit Ausnahme von Canthăris in faulenden Pflanzenstoffen oder im Innern der Gewächse; letztere sind deshalb schädlich. Die Käfer leben meist auf Pflanzen. §. 129.

A. Schnell- od. Springkäfer oder Schmiedeknechte. Können sich durch eine besondere Bildung des Brustbeins in die Höhe schnellen, wenn sie auf den Rücken gelegt werden.

* **9.** ***Elăter murīnus*** F. Mausefarbiger Schmied. Bräunlichschwarz, mit gewölkter, weißer oder hellbräunlicher, feiner Behaarung; Fühler und Tarsen rostbraun; 6‴; häufig.

* ***E. haemorrhoidālis*** F. Rothafter. Schwarzbraun, weichhaarig; Rand und Spitze des Hinterleibes unten rothbraun; 5‴; häufig.

* ***E. holosericĕus*** F. Seidenhaariger Schmied. Schwärzlich, oben mit dichter, fast bindenförmiger, greiser Behaarung; Beine rothbraun; 4‴; häufig.

* ***E. aenĕus*** L. Erzfarbiger Schmied. Dunkel erzfarbig, blau oder violett, glänzend, nicht behaart; Flügeldecken hinter der Mitte breiter; Beine roth; 7‴; häufig.

†* ***E. segĕtis*** Gyl. (***lineātus*** L., ***striātus*** F.) Saat-Schnellkäfer. Braun, greis behaart; Fühler und Beine braungelb; Flügeldecken gestreift-punktirt und meist mit braungelben Längslinien; 4—5‴. Häufig auf Wiesen und Feldern, wo die Larve (Drahtwurm) die Getreidewurzeln abnagt und besonders dem Hafer schon oft schädlich geworden ist.

Fig. 78. *Elăter segĕtis* (§. 129.). Saat-Schnellkäfer.

†* ***E. variabĭlis*** und ***spectātor*** sind hier auf Feldern ebenso häufig und können bei zu starker Vermehrung ebenfalls viel schaden.

†* ***E. signātus*** (Fig. 72.). Gezeichneter Schmied. Kopf und Halsschild dunkel metallischgrün; Flügeldecken braungelb, an der Spitze schwarz wie Beine und Fühler; 6‴; nicht selten.

B. Prachtkäfer. Können sich nicht in die Höhe schnellen; haben meist metallische Farben.

10. ***Buprēstis gigantēa*** F. Riesen-Prachtkäfer. Glänzend goldgrün; über 2‴; größte Art. Surinam.

* **11.** ***Agrĭlus biguttātus*** F. Zweifleckiger Prachtkäfer. Blaugrün; jede Flügeldecke mit einem weißen Punkte; 6‴; Larve in Eichenborken. Die übrigen 33 europäischen, meist mehr oder weniger grünen oder blauen Arten dieser Gattung sind schwer zu unterscheiden, aber besonders wichtig, weil die Larven von 3—4 Arten für die Buche sehr schädlich sind (besonders *A.* ***tenŭis***, ***fagi*** und ***nocīva***), indem sie in jungen Buchenstämmen leben und deren Absterben oder doch die häufigen Knollenauswüchse an denselben verursachen.

* **12.** ***Trachys minūta*** F. Kleiner Gleißkäfer. Dunkel erzfarbig, glänzend, behaart; Flügeldecken mit weißhaarigen Wellenbinden; $1^2/_3$‴; an Weiden häufig.

C. Bohrkäfer. Die kurzbeinigen Larven bohren in Holz.

†* **13.** ***Anobĭum pertĭnax*** L. Gemeiner Klopfkäfer, Todtenuhr, Trotzkopf. Flügeldecken punktirt-gestreift, dunkel schwarzbraun; Halsschild in der Mitte mit 3, hinten mit 2 Gruben, an den Hinterecken mit einem gelblichen Haarflecke; $2^1/_2$‴. Häufig in alten Weiden, auch in hölzernen Hausgeräthen, welche von den Larven dieser so wie mehrer anderer nahe verwandten Arten oft ganz in Wurmmehl verwandelt werden. Auch Bücher werden von ihnen nicht selten ganz durchbohrt. Das ♂ bringt zur Begattungszeit durch starkes Klopfen mit dem Kopfe die bekannten, Taschenuhrschlägen ähnlichen Töne in unsern Wohnungen hervor, welche das ♀ beantwortet. Früher hielt man diese Töne aus Unkunde für Vorboten eines Todesfalles im Hause. Dieser wie die

übrigen Arten ziehen bei der leisesten Berührung die Beine dicht an den Leib und stellen sich so hartnäckig todt, daß sie sich nicht rühren, selbst wenn sie auf eine Nadel gespießt am Lichte gebraten werden (Trotzkopf).

‡* *A. paniceum* L. Brodkäfer. Nur $1\frac{1}{2}$‴, aber für Pflanzen- und Insektensammlungen, so wie für Brod und Schiffszwieback oft sehr schädlich.

‡* **14.** *Ptilinus pectinicornis* F. Bücherbohrer. Schwarzbraun; Fühler und Beine gelbroth; Halsschild fast kugelrund; Flügeldecken unregelmäßig punktirt; $1\frac{1}{2}$—$2\frac{1}{2}$‴; bohrt häufig in Buchen und Eichen; zerstört aber noch häufiger hölzerne Hausgeräthe, auch Bücher.

‡* **15.** *Ptinus fur* L. Kräuterdieb. Rostbraun, kurz behaart; Halsschild mit 4 büschlig behaarten Höckern; Flügeldecken einfarbig oder mit 2 weißlichen Haarbinden; 1—2‴; häufig. Larven für Pflanzen- und Insektensammlungen sehr zerstörend; zuweilen auch in Mehlvorräthen.

D. Weichkäfer. Körper mit weichen, lederartigen Flügeldecken.

†* **16.** *Dasytes niger* F. Himbeerkäfer. Länglich, schwarz, rauhhaarig, zart punktirt; Halsschild beiderseits eingedrückt; 2‴. Die Larven häufig in Himbeerfrüchten (Himbeerwürmer).

* **17.** *Cantharis fusca* F. Brauner Weichkäfer. Schwarz; Halsschild braunroth, mit schwarzem Vorderrande; Hinterleib unten roth gerandet; Beine schwarz oder dunkelbraun; 6—7‴; häufig auf Gebüschen.

* *C. rustica.* Feld-Weichkäfer. Ebenso, aber Mitte des Halsschildes und Schenkelspitzen schwarz; 6—7‴.

* *C. melanura* L. Schwarzafter. Gelbroth; Flügeldeckenspitzen schwarz; 5‴; auf Kornfeldern; häufig.

* **18.** *Lampyris splendidula* F. Gemeiner Leuchtkäfer. Länglich; braun; Halsschild beiderseits mit 2 durchsichtigen Mondflecken; 4‴; häufig. Die ungeflügelten ♀ um Johannis (Johanniswürmchen) häufig zwischen Gräsern und unter Hecken, die ♂ fliegend in der Luft. Sie leuchten mit den letzten Hinterleibsringen; auch die Larven leuchten (Feuerwurm). Die in Norddeutschland seltnere *L. noctiluca* L. leuchtet ebenfalls.

‡* **19.** *Lymexylon navale* L. Schiffswerftkäfer, Matrose. Flügeld. abgekürzt; Körper weichhaarig; Halsschild länger als breit; ♀ gelblich; ♂ schwärzlich; 5‴; in gefälltem Eichenholze, namentlich auf Schiffswerften, oft sehr schädlich.

§. 130 **3. Blatthörnige Käfer** (§. 127, 3). Die langbeinigen Larven leben von vegetabilischen Stoffen in faulendem Holze oder im Thiermiste; die Käfer leben daselbst oder auf Pflanzen, fressen Blätter oder saugen Pflanzenabgänge.

A. Mistkäfer. Leben im Thiermiste.

* **20.** *Scarabaeus stercorarius* L. Gemeiner Roßkäfer. Schwarz, grünlich oder bläulich; Flügeld. punktirt-gefurcht, mit glatten Zwischenräumen; 1‴; häufig im Pferdemiste und oft von Käfermilben (§. 200.) fast bedeckt.

* *Sc. sylvaticus* F. Wald-R. Ebenso, aber Zwischenräume runzlig; 10‴.

* *Sc. vernalis* L. Frühlings-Roßkäfer. Ebenso gefärbt, aber Flügeldecken kaum bemerkbar punktirt-gestreift; 7‴; sehr häufig.

* **21.** *Aphodius fossor* L. Gemeiner Dungkäfer. Schwarz, glänzend; Kopfschild 3höckerig; Flgld. schwach gekerbt-gefurcht; 6‴; häufig im Thiermiste.

* *A. fimetarius* L. Mist-Dungkäfer. Ebenso, aber Flügeldecken und Hinterleib roth; $3\frac{1}{2}$‴; häufig im Pferdemiste und Kuhmiste.

* *A. prodromus.* Früher Dungkäfer. Schwarz, etwas flach; Seiten des hinten gerandeten Halsschildes rothgelb; Flügeldecken gekerbt-gestreift, graugelb, jede mitten mit großem, vorn verschmälertem Nebelflecke; $3\frac{1}{2}$‴; schon an den ersten Frühlingstagen sehr häufig; in Färbung sehr veränderlich.

* **22.** *Copris lunaris* L. Mondhornkäfer. Schwarz; ♂ mit spitzem, ♀ mit ausgerandetem Horne auf dem Kopfschilde; 9‴; nicht selten im Thiermiste auf Viehweiden.

* **23.** *Onthophagus fracticornis* F. Bruchhörniger Pillenkäfer. Bronzebraun; Flügeldecken braungelb, schwarz besprengt; Kopf des ♂ mit einem

an der Spitze stark überhängenden Horne, an dessen Stelle beim ♀ nur 2 erhöhete Querlinien; 4‴; häufig.

Zu den Mistkäfern gehört auch noch *Ateuchus sacer*, der sich häufig auf Denkmälern der Aegypter ausgehauen und auf Gemmen (Scarabäen-Gemmen) ausgeschnitten findet.

B. Laubkäfer. Die Larven fressen unter der Erde mehre Jahre (mehrjährige Generation) an Pflanzenwurzeln und sind deshalb der Forst- und Landwirthschaft schädlich.

†* **24.** *Oryctes nasicornis* L. Nashornkäfer. Kastanienbraun; Kopfschild mit gekrümmtem Horne (♂) oder mit stumpfem Höcker; 1½‴; nebst den Larven häufig in Eichenlohe und in Lohbeeten (Lohkäfer) schädlich.

‡* **25.** *Melolontha vulgaris* L. Gemeiner Maikäfer. Braun; Halsschild langhaarig; Flügeldecken rothbraun, mit 4—5 Längsrippen; Beine röthlich; Fühlerkeule (Fig. 69c.) 6blättrig, oval (♀) oder 7blättrig, verlängert (♂); 12—13‴. Halsschild schwarz (Mohren, Könige) oder rothbraun (Türken, Kapuziner). Eins der schädlichsten Insekten, dessen als Engerling oder Kartoffelwurm allbekannte Larve an Wurzeln der Holzpflanzen und Ackerpflanzen besonders Schaden verursacht. Auch die Käfer entblättern nicht selten im Mai besonders Obstbäume und Eichen. Sie erscheinen nur alle 4 Jahre in Menge, weil die Larve, bis sie zum Käfer sich entwickelt, 4 Jahre gebraucht. Maulwürfe, Spitzmäuse, Krähen und Dohlen vertilgen viele Larven. Wiesen können durch Bewässerung, Felder durch Stalldünger, welcher in Composthaufen (Düngerhaufen) gefahren wird und die Käfer zum Eierablegen anzieht und so das Sammeln der Larven erleichtert, von dieser Plage befreit werden.

* *M. fullo* L. Der Walker, Müller. Kastanienbraun, mit weißen Flecken besprengt; 16‴; nicht häufig.

‡* **26.** *Rhizotrogus solstitialis* L. Junikäfer, Brachkäfer. Schmutziggelb, langbehaart; Flügeldecken mit 4 weißlichen Längsleistchen; 7—8‴. Erscheint erst im Juni; ist sehr häufig und schädlich.

†* **27.** *Anomala horticola* L. Garten-Laubkäfer. Etwas flach, behaart, bläulich grün; Flügeldecken rothbraun, fein punktirt-gestreift; 4‴; häufig. Larven an Wurzeln von Gartengewächsen, die Käfer an Garten- u. Waldbäumen schädlich.

* **28.** *Lucanus cervus* L. Hirschkäfer, Feuerschröter. Kastanienbraun; Oberkiefer des ♂ einem Hirschgeweihe ähnlich, mit 3 Zähnen, beim ♀ viel kürzer, kaum von Kopfslänge; 13—24‴ ohne die Kiefern, größter Käfer Deutschlands. Die Larven leben bis zur Verpuppung mehre Jahre in faulenden Holzstämmen, vorzüglich in Eichen, deren auslaufenden Saft die Käfer mit ihrer pinselförmigen Zunge lecken. Die Larve dieses oder des Spießbockes (§. 142.) halten Einige für den, bei den Römern als Leckerbissen beliebten *Cossus* (§. 124, 2).

* **29.** *Cetonia aurata* F. Rosenkäfer. Goldgrün, sehr glänzend; Kopfschild ausgerandet; Flügeldecken mit weißen Querstrichen; 8—9‴; häufig, besonders auf Rosenbüschen; soll durch Ausfressen der Blüthen schaden. Die Larven in modernden Pflanzen, Eichenlohe ꝛc., auch in Ameisenhaufen.

4. Keulenhörnige Käfer (§. 127, 4). Larven mit Beinen und 8 Augen; leben wie die Käfer von thierischen und vegetabilischen Stoffen. §. 131.

†* **30.** *Trichodes apiarius* L. Bienenwolf. Glänzendblau, langhaarig; Flügeldecken roth, 2 breite Querbinden derselben und die Spitze blau; 6—7‴; auf Blüthen nicht selten; Larven in Bienenstöcken schädlich.

‡* **31.** *Dermestes lardarius* L. Speckkäfer. Länglich, schwarz; Flügeldecken auf der Vorderhälfte mit aschgrau behaarter Querbinde, in welcher jederseits 3 schwarze Punkte stehen; 4‴; sehr häufig. Die haarigen Larven sind für trockne Fleischwaaren, Speck, Pelzwerk, ungegerbte Häute und Naturaliensammlungen sehr verderblich. Sorgfältiges Ausklopfen und Ofenhitze das beste Mittel dagegen.

‡* *D. pellio* L. Pelzkäfer. Eirund, schwarz, behaart; Fühlergrund röthlich; jede Flügeldecke mit einem weißen Mittelpunkte; 2½‴; mit vorigem

zusammen, aber auch häufig auf Blumen; besonders verderblich für Pelzwerke. Vertilgung wie vorher.

* **32.** ***Hister unicŏlor*** F. Einfarbiger Schildkröten- oder Stutzkäfer. Fast rund, schwarz, glänzend; Halsschild jederseits mit $1\frac{1}{2}$ Streifen; jede Flügeldecke mit 7 Streifen, die 3 innern abgekürzt; 4‴; häufig im Thiermiste wie folgender

* *H. quadri-notātus* Pz. Vierfleckiger St. Eirund, schwarz, glänzend; jede Flügeldecke mit einem dunkelrothen Flecke auf der Schulter und der Mitte; $3\frac{1}{2}$‴.

‡* **33.** ***Nitidŭla aenĕa*** F. Rappskäfer. Länglich-eirund, gedrängt punktirt, glänzend grün od. bläulich, unten schwärzlich; Beine röthlich od. schwarzbraun; $1\frac{1}{2}$‴. Einer der häufigsten Käfer auf Blüthen u. nebst dem Pfeifer (§. 164.) das schädlichste Insekt auf Feldern mit Rapps, dessen aufblühende Knospen er ausfrißt. Wird von Landleuten häufig mit den Erdflöhen (§. 143, [91]) verwechselt; springt aber nicht.

* **34.** ***Necrophŏrus vespillo*** L. Gemeiner Todtengräber (Fig. 73.). Schwarz; Fühlerkeule und 2 Querbinden auf den Flügeldecken gelbroth; Hinterschienen gekrümmt; 6—8‴; sehr häufig in und an todten Thieren, welche sie schon aus weiter Ferne wittern, die Erde darunter wegscharren und so gleichsam unter die Erde begraben, um ihre Eier hineinzulegen, damit die auskriechenden Larven sogleich Nahrung finden (Instinkt. S. 22.). Nützen durch Aufzehrung des Aases, riechen aber unangenehm und sind oft fast ganz mit Käfermilben (§. 200.) bedeckt.

* **35.** ***Silpha rugōsa*** L. Runzliger Aaskäfer. Schwarz; Halsschild höckerig; Flügeldecken mit 3 erhabenen Längslinien, deren Zwischenräume quer gerunzelt; $4\frac{1}{2}$‴; häufig.

* *S. obscūra* L. Dunkler Aaskäfer. Schwarz; Halsschild fein punktirt; Flügeldecken mit 3 erhabenen Längslinien, deren Zwischenräume tief punktirt sind; 6‴; häufig.

* *S. thoracica* L. Schwarz; Halsschild roth; 7‴; in Wäldern.

* **36.** ***Byrrhus pillŭla*** L. Gemeiner Fugen- od. Pillenkäfer. Länglich-eiförmig, schwarz, oben braunflizig; Halsschild graugelb gesprenkelt; jede Flügeldecke mit 4 schwarzen, mehre Male durch Gelb unterbrochenen, zottigen Längsstreifen (abgerieben, ganz schwarz); 4‴; häufig unter Steinen und trockenem Laube (S. 134, [4]).

‡* **37.** ***Anthrēnus museōrum*** Gyl. Cabinetkäfer. Schwarzbraun, rostbraun besprengt; Seiten des Halsschildes und 3 Querbinden der Flügeldecken mit greisgrauen und gelblichen Schuppen; Schienen röthlich; 1‴; häufig auf Blumen; Larven in Naturaliensammlungen oft sehr schädlich, besonders an Insekten.

‡* *A. scrofulariae* L. Braunwurz-Knollenkäfer. Schwarz; Flügeldecken mit 3 weißen Binden, rother Naht und Spitze; $1\frac{1}{2}$‴; häufig auf Blüthen; Larve für Pelzwerk und Insektensammlungen oft ebenso schädlich wie vorhergehender.

§. 132. **5. Kurzflügler** (§. 127, [5]). Die langbeinigen Larven haben 8 Augen, leben in faulenden Thier- u. Pflanzenstoffen; die Käfer daselbst oder unter Moosen, Baumrinden, Steinen, in Schwämmen, Ameisenhaufen, an nassen Ufern und auf Blumen. Zahlreiche, überall häufige, schnelle Raubkäfer, sämmtlich durch Vertilgung schädlicher Insekten und deren Larven nützlich.

* **38.** ***Staphylīnus nebulōsus*** F. Wolkiger Raubkäfer. Schwarz, mit braunem, etwas grau gemischtem Filze bedeckt; Taster und Beine gelbroth, letztere an der Wurzel schwarz; 6—8‴; häufig.

* *St. murīnus* L. Mausegrauer Raubkäfer. Ebenso, aber Taster und Beine schwarz; 5‴.

* *St. erythroptĕrus* L. Rothflügliger Raubkäfer (Fig. 74.). Schwarz; Flügeldecken und Beine roth; Fühler an der Spitze und am Grunde rothgelb; Schildchen goldgelb und Hinterleib oben goldgelb gefleckt; 8—9‴; häufig.

* *St. caesarĕus* (*erythroptĕrus* F.). Vorigem sehr ähnlich, etwas größer; Schildchen schwarz; Flügeldecken und Hinterrand des Halsschildes goldgelb; Hinterleib wie bei vorigem oben goldgelb gefleckt.

* **39.** *Ocýpus símilis* F. Schnellfüßiger Raubkäfer. Ungeflügelt, mattschwarz; Flügeldecken etwas kürzer als der Halsschild; 8—9‴; häufig.

* **40.** *Philónthus polítus* L. Blanker Mistfreund. Schwarz, oben ins Grünliche spielend; Kopf schmäler als Halsschild, beide spiegelblank; erstes Fühlerglied unterwärts roth; 5‴; häufig.

* **41.** *Stenus biguttátus* L. Hinterleib gerandet, schwarz, dicht punktirt, fein weißlich behaart; jede Flügeldecke mit rundem, rothem Mittelflecke; $2\frac{1}{2}$‴; häufig.

* **42.** *Oxytélus rugósus* F. Schwarz, matt; Halsschild mit 3 Längsfurchen; Beine rothbraun; Stirn runzlig punktirt, vorn eingedrückt und glatt; $2\frac{1}{4}$‴; häufig.

6. Schwimmkäfer (§. 127,6). Leben nebst ihren Larven in stehenden Gewässern vom Raube anderer Wasserthiere, schwimmen sehr geschickt und fliegen Nachts umher. Die größern Arten sind in Fischteichen schädlich, weil sie Laich und kleine Fische verzehren und den größern Fischen Löcher in den Leib fressen. §. 133.

†* **43.** *Dytíscus marginális* L. Der Gelbrand (Fig. 75a.). Eirund, oben schwarzgrün, unten gelb; Halsschild rundum, Flügeldecken nur nach außen gelb gerandet; Brustbein gabelförmig, mit breit zugespitzten Lappen; ♀ meist mit gefurchten, ♂ mit glatten Flügeldecken und Saugscheiben (Fig. 75b.); 14‴; häufigste Art.

†* *D. latissímus* L. Der Breitrand. Vorigem sehr ähnlich, aber Flügeldecken in einen breiten, scharfen Rand erweitert; 18‴; selten.

* **44.** *Gyrínus natátor* F. Taumelkäfer. Eirund, oben schwarz, unten dunkel erzfarbig; Flügeldecken mit gleich starken Punktreihen; Beine braunroth; 3‴. Schwimmen in Kreisen häufig auf der Oberfläche der Gewässer.

7. Wasserkäfer (§. 127,7). Lebensart und Schaden wie vorher. §. 134.

†* **45.** *Hydrophílus píceus* L. Pechschwarzer Wasserkäfer (Fig. 75d.). Länglich-eirund, hinten zugespitzt, schwach gewölbt, pechschwarz, glänzend; Fühler rostroth; Flügeldecken an der Spitze mit einem Zähnchen; 19—22‴; überall in Teichen.

* **46.** *Hydróbius fuscípes* L. Eirund, gewölbt, schwärzlich, dicht punktirt; Flügeldecken gekerbt-gestreift; Beine pechbraun; 3‴; häufig.

8. Taxikornen (§. 127,8). Leben in Schwämmen od. unter Baumrinden. §. 135.

†* **47.** *Anisotóma cinnamoméa* Pz. Trüffelkäfer. Länglich-eirund, gewölbt, rostbraun; Flügeldecken punktirt-gestreift; 3‴; Larven häufig und schädlich in Trüffeln, in welchen ich auch die Käfer nur fand.

* **48.** *Hypophlóeus castanéus* F. Kastanienbrauner Pochkäfer. Kastanienbraun, glänzend, gedrängt punktirt; Halsschild fast doppelt so lang als breit; Flügeldecken punktirt-gestreift; 3‴; unter Rinden abgestorbener Bäume.

9. Engflügler (§. 127,9). Leben auf Blüthen und Blättern oder unter Baumrinden; Larven in Schwämmen und in faulendem Holze. §. 136.

* **49.** *Mordélla fasciáta* Gyl. Gemeiner Stachelkäfer. Schwarz, gedrängt punktirt, seidenartig behaart; Flügeldecken vorn mit weißgrauem, gemeinschaftlichem Bogenflecke und hinter der Mitte auf jeder Flügeldecke ein mondförmiger, weißer Fleck; 3‴; häufig auf Wiesen.

* **50.** *Oedemera lurída* Gyl. Blaßgelber Dickschenkel. Dunkel blaugrün, dicht punktirt; Flügeldecken nach hinten verschmälert; 5‴; häufig.

10. Schwarzflügler (§. 127,10). Meist ungeflügelte, nächtliche, dunkel gefärbte Käfer, deren glatte, pergamenthäutige, drehrunde Larven in moderndem Holze leben (Fig. 79.). §. 137.

* **51.** *Blaps mortisága* F. Todtenkäfer. Schwarz, fein und zerstreut punktirt; Flügeldecken lang zugespitzt, gewölbt; 10‴; häufig unter faulenden Dielen in Häusern; sondert einen scharfen, eigenthümlich riechenden Saft ab und galt früher dem gemeinen Manne als Vorbote des Todes (S. 145,13.).

†* **52.** ***Tenebrio molitor*** L. Der Müller (Fig. 79.). Pechschwarz, etwas glänzend, unten rothbraun; Flügeldecken schwach punktirt-gestreift; 7‴. Die gelblichen Larven (Mehlwürmer) häufig auf Kornböden, in Mehlkisten ꝛc. und bei starker Vermehrung sehr schädlich, übrigens ein vortreffliches Nachtigallenfutter, weil sie sich wegen ihrer pergamentartigen Körperhaut lange halten.

§. 138. **11. Halskäfer** (§. 127,11). Die Larven unter Baumrinden oder schmarotzend auf Thieren; die Käfer fressen Pflanzenblätter oder saugen Blüthenhonig.



Fig. 79. *Tenebrio molitor* (§. 137.). Der Müller.

Die Fühler sind perlschnurförmig und elfgliedrig. Die 4 ersten Füße sind fünf-, die 2 letzten viergliedrig. Neben dem Käfer die walzige Larve mit 12 pergamenthäutigen Ringeln und 6 Beinen. Der Schwanz mit 2 kurzen Spitzen.

†* **53.** ***Lytta vesicatoria*** F. Spanische Fliege, Pflasterkäfer. Glänzend grün; Kopf und Halsschild längs-gefurcht und Flügeldecken mit erhabenen Linien; 10‴. Im Juni auf Liguster, Hollunder, vorzüglich auf Eschen, welche sie oft ganz entblättern. Werden in Spanien, seltner in Deutschland für Apotheken zu dem bekannten Zugpflaster (Canthariden-Pflaster, §. 124,2) gesammelt, wobei aber Vorsicht nöthig ist, weil die lebenden Thiere auf den nackten Theilen des Körpers schnell Blasen verursachen. Innerlich für alle Thiere, auch für den Igel (§. 37.) tödtlich. Die blasenziehende Wirkung hat ihren Grund in einem eigenthümlichen Stoffe, den die Chemiker Cantharіden-Kampfer oder Cantharidin nennen.

†* **54.** ***Meloë proscarabaeus*** L. Maiwurm, Oelkäfer. Blauschwarz; Halsschild etwas verlängert-viereckig, stark punktirt; Flügeldecken lederartig gerunzelt; Fühler des ♂ in der Mitte gekrümmt; 5—20‴. Schon im April überall auf Wegen häufig. Er schwitzt wie die seltnere ***Meloë majalis*** L. aus den Beingelenken eine ölähnliche, blasenziehende Substanz und bildete früher den Hauptbestandtheil des unwirksamen, preußischen Geheimmittels gegen die Wasserscheu oder Wuthkrankheit. Die flohähnlichen Larven hängen sich gleich nach dem Auskriechen aus dem Ei als Schmarotzer an Bienen und fliegenartige Insekten.

§. 139. **12. Rüsselkäfer** (§. 127,12). Die Larven haben einen undeutlichen Kopf, weder Beine noch Augen und leben in Früchten oder im Holzkörper der Pflanzen.

†* **55.** ***Bruchus granarius*** L. Gemeiner Samenkäfer, Hülsen-S. Schwarz; Halsschild und Flügeldecken mit zerstreuten, weißlichen Haarflecken; die 4 Grundglieder der Fühler und die Vorderbeine (Schenkelbasis ausgenommen) gelbroth; $1^2/_3$‴. Sehr häufig in Hülsenfrüchten, besonders Erbsen und Wicken; oft schädlich.

†* ***B. rufimanus*** (***pisi*** Panzer) Erbsenkäfer. Länglich-eirund, schwarz; ein Fleck auf dem Halsschilde vor dem Schildchen weiß; Flügeldecken weiß punktirt; Fühlergrund und Vorderbeine gelbroth; $1^2/_3$‴; eben so häufig u. schädlich.

†* **56.** ***Apoderes coryli*** L. Hasel-Blattroller (Fig. 76, a.). Schwarz; Halsschild ganz oder nur am Hinterrande wie die gekerbt-gestreiften Flügeldecken roth; 3—4‴; überall häufig, vorzüglich an Erlen und Haseln, deren Blätter er tutenförmig rollt, um seine Eier hineinzulegen.

†* **57.** ***Rhynchites betuleti*** F. Birken-Blattroller, stahlblauer Reben- od. Birkenstecher. Metallischblau oder goldgrün; ♀ beiderseits am Halsschilde mit einem Dorn; 3‴. Zerstört wie vorige Gattung die Blätter durch Einrollen und ist am Weinstocke und wie folgende Art an Birken häufig und schädlich.

†* ***Rh. betulae*** L. Ganz schwarz, und schlanker als voriger; 2‴.

†* ***Rh. alliariae*** F. Stahlblau, glänzend, lang behaart; Halsschild stark punktirt; Flügeldecken mit tiefen Punktstreifen; 2‴; schädlich an Apfel- und Birnbäumen, deren junge Triebe und Prophreiser er abnagt.

†* **58.** ***Magdălis pruni*** L. Pflaumen-Rüsselkäfer. Schwarz; Fühlerschaft rostroth; Rüssel kurz, gerade; Halsschild beiderseits mit einem Höcker; Flügeldecken fast cylindrisch, gekerbt-gestreift, Zwischenräume fein gerunzelt; $1\frac{1}{2}-2\frac{1}{2}'''$. Die Larve zernagt Frühjahrs die jungen Triebe der Pflaumen- und Kirschbäume, auf welchen der Käfer im Juni sehr häufig. §. 139.

†* **59.** ***Apion pomonae*** F. Wickenstecher, Hülsenstecher. Schwarz, kurz behaart; Flügeldecken schwarzblau, punktirt-gefurcht; Rüssel an der Wurzel plötzlich dicker, mit pfriemlicher Spitze; 2'''; sehr häufig auf Bäumen und Gesträuchen und schädlich durch Zerstörung der zarten Blüthen der Obstbäume.

* *A. frumentarium* L. Rother Kornwurm. Mennigroth, nur die Augen schwarz; $2\frac{1}{2}'''$. Ist dem Getreide nicht schädlich, findet sich nur auf Gräsern im Freien und ist wohl mit dem schädlichen, schwarzen Kornwurme (siehe folgende Seite) verwechselt, dessen frisch ausgekrochene Exemplare zuweilen röthlich sind.

†* **60.** ***Thylacites corylli*** Gyl. (Fig. 76, b.). Grundfarbe schwärzlichbraun, durch bräunliche oder weißliche, leicht abreibbare Haarschüppchen verdeckt; Fühler und Beine rothbraun; Stirn und Rüssel breit, runzlig gefurcht; Flügeldecken deutlich punktirt-gestreift; $1\frac{1}{2}-2'''$. Häufig und schädlich an Haseln, Birken, Buchen, Kiefern und Fichten, an welchen er Blätter, Rinde, Knospen und junge Triebe abnagt.

†* **61.** ***Brachyděres incānus*** L. Grauer Kurzhals. Schwarz, mit grauen, kupferröthlich glänzenden Haarschuppen; Fühler rostroth; Halsschild sehr kurz, breiter als lang, oben flach, Flügeldecken fast 4mal länger; $3\frac{1}{2}'''$; häufig und schädlich an Fichten, vorzüglich an Kiefern.

†* **62.** ***Sitŏna lineāta*** L. Schwarz, oben mit braunen, unten mit weißlichen Haarschuppen (abgerieben, ganz schwarz); Halsschild mit weißen Linien, 3mal kürzer als die Flügeldecken, welche hinten breiter, fein punktirt; Fühler, Schienen und Tarsen röthlichbraun; 2'''; überall sehr häufig, vorzüglich auf Kleefeldern. Fressen auch die jungen Blätter und Stiele der Erbsen und Bohnen ab.

* **63.** ***Hylobĭus pini*** (***Curculio pini*** L.). Großer, brauner Kiefern-Rüsselkäfer. Dunkelbraun, gelblich behaart; Halsschild vorn verengt; Flügeldecken mit 2 gebogenen Fleckenbinden, punktirt-gestreift; Punkte groß, 4eckig, Zwischenräume grob gerunzelt; 4—6''', also größter Forstkäfer, überall häufig und sehr schädlich auf Nadelholze (selten auf Laubholze), lockt durch Zerfressen der Knospen und Stämme die gefährlichsten Feinde (Borken- u. Bastkäfer) herbei.

* **64.** ***Cleŏnus sulcirŏstris*** L. Hohlrüsselkäfer. Schwarz, dicht aschgrau behaart; Flügeldecken mit feinen Punktstreifen und 3 kahlen, schrägen Querbinden; Rüssel mit 3 gleichen Furchen; 6'''; an sandigen Stellen.

†* **65.** ***Polydrŭsus micans*** F. Glänzender Laubholz-Rüsselkäfer. Eirund, schwarz, mit kupferroth schillernden Haarschuppen; die dünnen Fühler und Beine roth; Flügeldecken fast 5mal länger als der Halsschild, punktirt-gestreift, hinten stark abschüssig; $3\frac{1}{2}'''$; auf Obstbäumen u. Haseln häufig u. schädlich.

†* ***P. sericĕus*** Gyl. Seidenartig glänzender Laubholz-Rüsselkäfer. Länglich, schwarz, mit grünen, matten Haarschuppen; die dünnen Fühler und Beine blaßgelb; Schenkel schwach gezähnt; $2\frac{1}{2}'''$; häufig. Von ***Phyllobĭus argentātus*** durch dünnere Fühler und Haarlosigkeit unterschieden.

66. ***Phyllobĭus*** Sch. Blattnager. Leben auf Laubhölzern und schaden durch Abnagen der Blätter, Knospen und jungen Triebe.

†* ***Ph. pyri*** L. Birn-Blattnager. Länglich, schwarz, mit schmalen, grünen oder fast goldigen Haarschuppen; Beine und Fühler rostroth oder schwarz (***Ph. alnĕti*** F.); Schenkel mit kurzem Zahne; Halsschild vorn stark zusammengeschnürt und quergewölbt; 4—5'''; auf Obstbäumen häufig und schädlich.

†* ***Ph. argentātus*** L. Silberglänzender Bl. (Fig. 76, c.). Länglich, schwarz, mit rundlichen, metallischgrün glänzenden Haarschuppen dicht bedeckt, zwischen welchen einzelne, aufrechtstehende Härchen stehen; die ziemlich dicken und langen Fühler, die Schienen und Tarsen gelblich; Schenkel mit starkem Zahne; $2-2\frac{1}{2}'''$; auf Obst- und Waldbäumen häufig und schädlich.

†* ***Ph. oblōngus*** L. Länglicher Blattnager. Länglich, schmal, schwarz, mit langen, grauen Härchen bedeckt; Fühler und Beine roth; Schenkel gezähnt;

§. 139. Flügeldecken blaß rostroth, schwarz gerandet oder ganz blaßroth oder ganz schwarz; 2‴; daselbst häufig und schädlich.

†* ***Ph. vespertīnus*** F. (***malī*** Oliv.). Apfel-Bl. Länglich, schwarz, mit schmalen, greisgrauen oder kupferrothen Schüppchen; die dicken Fühler und die Beine rothbraun; Schildchen schneeweiß; 2—3‴; daselbst häufig und schädlich.

†* **87.** ***Otiorhynchus āter*** Gyl. Schwarzer Ohrrüsselkäfer. Länglich-eirund, schwarz; Beine roth, Knie u. Tarsen schwarz; Halsschild dicht gekörnelt; Flügeldecken punktirt-gestreift, Zwischenräume grob gerunzelt; 4‴; an Nadelhölzern, deren junge Triebe sie zerfressen.

†* ***Ot. picīpes*** F. Pechschwarzfüßiger Ohrr. Pechschwarz, dicht mit bräunlichen und weißlichen Haarschüppchen bedeckt; Halsschild gekörnelt; Flügeldecken gefurcht und mit Augenpunkten; Beine rothbraun; $3\frac{1}{2}$‴; in Laub- und Nadelwäldern häufig und schädlich; auch an Weinstöcken.

* ***Ot. ovātus*** L. Eirunder Ohrr. Schwarz, glänzend; Fühler und Beine roth; Halsschild runzlig; Flügeldecken grob punktirt-gestreift mit runzligen Zwischenräumen; 2‴; sehr häufig unter Steinen.

‡* **88.** ***Calāndra granaria*** L. Schwarzer oder brauner Kornwurm. Rothbraun; Halsschild tief punktirt, so lang als die tief gestreift-punktirten Flügeldecken. In der Form dem Palmbohrer (Fig. 80.) ähnlich, aber nur 2‴ lang. Nebst dem weißen Kornwurm (§. 166.) das schädlichste Insekt auf Kornböden. Das ♀ legt die Eier an Getreidekörner, dessen Mehl die Larve ausfrißt und sich in der Hülle verpuppt. Häufiges Umstechen des Korns und Aufwerfen von Flachsknoten auf die Böden gelten als Vertreibungsmittel (§. 166.). Auch Besprengen der Böden und Gebälke mit scharfer Seifensiederlauge und dann Abfegen derselben, vertilgt die Kornwürmer.

†* ***C. orȳzae*** F. Reis-Kornwurm, Glander. Schwarzbraun; Flügeldecken mit 4 rothen Flecken; 2‴; häufig und schädlich in Reiskisten bei Kaufleuten.

† ***C. palmārum*** F. Palmbohrer. (Fig. 80.) Die $1\frac{1}{2}$″ lange, weißliche Larve lebt in den Stämmen der Palmen Südamerikas, besonders der Arekapalme (II. §. 306,7), deren Mark sie frißt. Die Eingeborenen Südamerikas essen dieselbe als Leckerbissen.

Fig. 80.
Palmbohrer (§. 139,69). Ueber 2″ lang, mattschwarz; Flügeldecken mit vertieften Streifen.

‡* **89.** ***Pissŏdes notātus*** Gyl. Weißpunkt-Rüsselkäfer. Länglich-eirund, mit grauweißen Haarschuppen, welche auf dem Halsschilde 8 grauweiße Punkte und auf den punktirt-gestreiften Flügeldecken 2 solcher Binden bilden; 3‴. Sehr verderblich für Kiefern. Stockroden und Entfernen kränklicher, schon von weitem durch röthliche Nadeln sich verrathender Bäume ist das beste Vertilgungsmittel.

†* ***P. hercyniae*** Hbst. Harz-Rüsselkäfer. Sehr gestreckt, mit weißlichen Punkten und 2 weißlichen, sehr schmalen, unvollständigen Binden und einigen Punkten hinter den letztern auf den Flügeldecken, welche abwechselnd schmale und breite Zwischenräume haben; $2\frac{3}{4}$‴. Der einzige ***Pissŏdes*** an der Fichte und häufig am Harzgebirge.

†* **90.** ***Balanīnus nūcum*** L. Hasel-Nußbohrer (Fig. 76, d.). Eirund; Grundfarbe schwarz; oben mit grauen oder braunen Haarschuppen; Fühler mit kugligen Peitschengliedern; $2\frac{1}{2}$—3‴; Rüssel bis $\frac{5}{6}$ der Körperlänge, beim ♂ kürzer. Dieser so wie die sehr ähnlichen ***B. glandium*** und ***venōsus*** leben häufig auf Eichen und Haseln. Die bekannten Würmer in Haselnüssen sind die Maden dieses Käfers, der seine Eier in die Nüsse legt, so lange sie noch weich sind.

†* **91.** ***Anthonŏmus pomōrum*** L. Apfel-Rüsselkäfer, Obstblüthenager. Schwarzbraun, aschgrau behaart; Flügeldecken rostroth, nach hinten mit schräger, weißer, schwarz eingefaßter Querbinde; Schildchen weiß; 2‴.

Häufig und schädlich auf Apfel- und Birnbäumen. Die überwinternden Käfer legen Frühjahrs ihre Eier nur in die noch zarten Blüthenknospen, welche die Larven dann ausfressen. Durch Ablesen der durch die Larven zusammengesponnenen Blüthen und durch kräftiges Treiben der Knospen werden die Bäume geschützt.

‡* **72.** ***Orchēstes fagi*** Gyl. Buchen-Minirkäfer oder Buchenspringer. Schwärzlich, länglich-eirund, bräunlichgrau behaart; Fühler und Tarsen röthlichbraun; Schenkel gedornt; $1\frac{1}{4}$‴. Häufig und schädlich an jungen Rothbuchen. Die überwinternden Käfer zernagen Frühjahrs die jungen Triebe; die Larven sind wie viele Schaben-Raupen (§. 166.) Minirer oder Blattköhler.

* ***O. populi*** F. Pappelspringer. Ebenso, aber Fühler und Beine rothgelb; Hinterschenkel mit schwarzer Binde und ungedornt; $\frac{1}{2}$‴. Häufig auf Pappeln u. Weiden, so wie ***O. lonicĕrae*** (eirund, gelbraun; Schenkel und Flügeldecken mit schwärzlicher Binde; $\frac{1}{2}$‴) auf ***Lonicĕra xylostĕum*** (II. §. 216.).

‡* **73.** ***Ceutorrhynchus assimilis*** Germ. Aehnlicher Rüsselverberger (können den Rüssel bis auf die Brust zurücklegen). Bleifarbig-schwarz, dünn behaart; Halsschild mit einer Rinne und beiderseits mit 2 Höckern; Flügeldecken tief gefurcht, abgestutzt, hinten mit Borstenhaaren; $1\frac{1}{2}$‴. Häufig auf Schotengewächsen, vorzüglich auf Rappsfeldern und deshalb von Einigen fälschlich für den berüchtigten Pfeifer (§. 164.) gehalten.

C. echii F. Schwarz, mit weißen, netzförmigen Linien; $2\frac{1}{2}$‴. Auf Blättern des Natternkopfes; nicht häufig.

13. Echte Holzfresser oder Borkenkäfer (§. 127, 13). §. 140.

Die schädlichsten aller Forstinsekten, die wohl am liebsten krankes, stehendes oder schon liegendes Holz, aber auch oft ganz gesunde Bäume angehen. Anfangs Frühlings kriechen die Käfer aus ihren Winterquartieren hervor, begatten sich und bohren dann zum Eierablegen Löcher in Bäume, am liebsten in einzeln stehende Stämme an sonnigen Plätzen. Einige treiben das Bohrloch nur bis in oder unter die Rinde (Borkenkäfer), andere bis ins Holz selbst (Holzkäfer). Einige der erstern gehen nur bis in die eigentliche Rinde (Rindenkäfer), andere bis auf den Bast (Bastkäfer). Die Rinden- und Bastkäfer nagen dann charakteristische, aber nach Richtung, Lage und Länge bei den verschiedenen Arten sehr verschiedene Gänge (Muttergänge), worin sie die Eier ablegen, aus welchen die Larven kriechen, welche sich abwärts neue Gänge fressen (Larvengänge), an deren Ende sie sich eine Höhlung (Wiege) bereiten, um sich darin zu verpuppen. Bei den Rindenkäfern sind die Gänge am unregelmäßigsten, bei den meisten Bastkäfern dagegen sehr regelmäßig und wagerecht (Wagegänge bei ***Hylesinus fraxini***) oder lothrecht (Lothgänge bei ***Bostrÿchus typographus***) oder sternförmig auseinander laufend (Sterngänge bei ***B. chalcographus***). Die genaue Kenntniß der Arten und deren Lebensweise ist um so wichtiger, weil nur hierauf eine zweckmäßige Vertilgungsmaßregel gegründet und größerer Schaden an Obst- u. Waldbäumen verhindert werden kann.

‡* **74.** ***Bostrÿchus typographus*** L. Fichten-Borkenkäfer, Linné's Buchdrucker. (Fig. 81.) Flügeldecken hinten abschüssig, jederseits mit 4 Zähnchen, deren dritter der größte; $2\frac{1}{2}$‴; sehr schädlich in der Fichte und der einzige Borkenkäfer mit Lothgängen in derselben. Verursachte 1783 die Wurmtrockniß in den Wäldern am Harzgebirge.



Fig. 81.
Linné's Buchdrucker (*Bostrÿchus typographus* L. §. 140.).

‡ *B. stenographus* (*typographus* F.) Großer Kiefern-B. Flügeldecken hinten abschüssig, jederseits mit 6 Zähnen, deren vierter der größte; 3‴; größte Art, sehr schädlich in der Kiefer und der einzige darin mit Lothgängen. — Die übrigen 33 europäischen Arten leben ebenfalls meist in Nadelhölzern. ***B. villōsus*** und ***monographus*** leben in Eichen, ***B. domestĭcus*** in Buchen, in welchem auch ***B. bicŏlor***, der kleine Buchen-Borkenkäfer (Fig. 77, a.), lebt, welcher höchstens 1‴

lang wird. Er ist mehr oder weniger braun und zuweilen nach hinten dunkler, also zweifarbig (*bicŏlor*).

Das vorzüglichste Mittel gegen diese verheerenden Käfer besteht a) in der Vorbauung, d. h. in der Entfernung aller brutbegünstigenden Gegenstände aus dem Walde, also der Stuken, Lagerhölzer ꝛc. und b) in dem Entrinden der gefällten Bäume. Unter den Vertilgungsmitteln ist die Anwendung der Fangbäume, d. h. mit vollen Aesten gefällter Bäume zur Anlockung der Käfer das wichtigste.

‡* **75.** ***Platỹpus cylindrĭcus*** F. Eichen-Kernkäfer. Dunkelbraun, völlig walzig; Flügeldecken tief gefurcht und überall punktirt, an der Spitze gezähnt; $2\frac{1}{2}'''$; in Eichenstuken und noch berindeten, stehenden Bäumen.

‡* **76.** ***Eccoptogăster prunĭ*** Rtz. Zwetschen-Splintkäfer. Bräunlich, glänzend; Flügeldecken punktirt-gestreift, hinten viel schmäler und mit kleiner Spitze, Zwischenräume breit, mit zarter Punktreihe; $1\frac{1}{2}'''$; sehr häufig und schädlich in Zwetschen- und Pflaumenbäumen.

‡* ***E. rugulōsus.*** Sehr ähnlich, überall mit Börstchen; Flügeldecken punktirt-gestreift, runzlig, Zwischenräume sehr schmal, mit grober Punktreihe; $1\frac{1}{4}'''$; häufig und schädlich an Pflaumen- und Apfelbäumen.

‡* ***E. destructor.*** Zerstörender Splintkäfer. (Fig. 77, a. Weibchen. — Die Männchen unten am Hinterleibe mit Höckern). Glänzend schwarz, Halsschild kaum länger als breit; Flügeldecken mit bis zur Spitze vertiefter Naht; Zwischenräume auf den Flügeldecken nur mit einer Punktreihe. Fast $2\frac{1}{2}'''$ lang; größte Art und häufig am Harzgebirge in Buchen, wie *E. carpĭni* in Hainbuchen.

‡* **77.** ***Hylesĭnus pinipērda*** L. Kiefern-Bastkäfer. Pechschwarz oder braungelb, kurz behaart; Fühler und Tarsen gelbbraun; Flügeldecken punktirt-gestreift, Zwischenräume schwach quergerunzelt, jeder mit einer Reihe behaarter Höckerchen, die zweite Reihe am Ende des horizontalen Theiles der Flügeldecken aufhörend; Halsschild tief und weitläufig punktirt; $2'''$; nur in Kiefern und sehr schädlich; stets Lothgänge. Die angegangenen Bäume ähneln künstlich beschnittenen Bäumen, daher der Name Waldgärtner.

‡* *H. minor* Hrtg. Kleiner Bastkäfer. Vorigem sehr ähnlich, aber die Höckerchen bis zum Ende der abschüssigen Stelle fortlaufend; $1\frac{1}{2}'''$; in Kiefern, meist mit vorigem zusammen; stets doppelarmige Wagegänge.

‡* *H. micans* (*lignipērda* Gyl.). Holzzerstörender Bastkäfer. Fast zottig behaart; Fühler gelbroth; Flügeldecken punktirt-gestreift, Zwischenräume runzlig, mit vielen Höckerchen; Halsschild grob-punktirt, mit glatter Längsleiste auf der Mitte; $3\frac{1}{2}'''$; größte Art der echten Holzfresser, häufig und schädlich in Fichten und besonders merkwürdig durch den Rinden-Familiengang, indem viele Larven dicht gedrängt in einem gemeinschaftlichen Gange fressen.

‡* *H. fraxĭni* F. Bunter Eschen-Bastkäfer. Schwarz, durch bräunlichgelbe Schuppen auf den Flügeldecken bunt; $1\frac{1}{2}'''$; häufig und schädlich in Eschen; doppelarmige Wagegänge. — *H. palliātus* auf Lärchen sehr schädlich.

§. 141. **Unechte Holzfresser.** Bohren keine regelmäßige Gänge und sind in Forsten nie merklich schädlich, weil sie nur in abgestorbenem Holze leben oder nur als Schmarotzer in fremden Gängen.

†* **78.** ***Latrĭdius porcātus*** Hbst. Pechschwarz; Fühler und Beine gelbroth; Halsschild fast herzförmig, Vorderecken rundlich erweitert, hinten mit einem Quereindrucke; Flügeldecken tief punktirt-gestreift; $\frac{3}{4}'''$; häufigste der 40 europäischen Arten; in Häusern und in altem Holzwerke; die Larve schädlich an den Wurzeln des Gartenrettigs.

†* **79.** ***Lyctus canaliculātus*** F. Braunroth, weichhaarig; Halsschild fast quadratisch, seitlich gezähnt, oben mit länglicher Grube; Flügeldecken walzig gewölbt, mit haarigen Längslinien; $2'''$; häufig, in abgestorbenem Holze.

§. 142. **14. Bockkäfer** (§. 127, 14). Die weißen od. gelblichen Larven sind kurzbeinig od. beinlos, flachköpfig, haben aber starke Kauwerkzeuge. Sie entwickeln sich meist in Holzpflanzen, machen aber keine Muttergänge, sondern nur Larvengänge. Die Käfer leben auf Holzpflanzen oder Kräutern.

†* **80.** ***Prionus coriarius*** L. Sägebock oder Gerber. Pechschwarz; Halsschild viel schmäler als die runzlig-punktirten Flügeldecken und beiderseits mit 3 spitzen Dornen; Fühler gesägt; 15‴; in Laubwäldern nicht selten.

†* **81.** ***Cerambyx heros*** F. Spießbock, Eichenbock. Schwarzbraun, gewölbt, nach hinten verschmälert; Flügeldecken nach hinten heller, mit feiner Endspitze; Halsschild warzig-gerunzelt, beiderseits mit kurzem Dorne; $1^3/_4$‴; Fühler des ♂ von doppelter Körperlänge. Das ♀ legt die Eier nur an lebende Eichen, die von den Larven nach allen Richtungen durchfressen werden.

†* *C. cerdo* L. Runzelbock. Ebenso, aber schwarz; Flügeldecken gleichfarbig, ohne Spitze am Ende; 8—9‴; in Eichen und Buchen nicht selten.

* *C. moschatus* L. Moschusbock. Metallischgrün, oft ins Kupferrothe; 7—13‴; an anbrüchigen Weiden nicht selten; riecht nach Moschus (S. 53.).

* **82.** ***Callidium violaceum*** F. Violetter Listkäfer. Flachgedrückt, oben glänzend violett, oft ins Grünliche, runzlig-punktirt; 7‴; nicht selten.

†* *C. luridum* F. Blaßgelblicher Listkäfer. Etwas flach, sehr fein punktirt; Halsschild glänzend schwarz, sparsam punktirt, schwach gefurcht; Flügeldecken mit oft kaum merklichen Längsrippen, schwarzbraun (*auticum* F.) oder kastanienbraun (*castaneum* L.); 5—7‴; in Fichten schädlich.

* **83.** ***Clytus arietis*** L. Gemeiner Widderkäfer. Dunkelschwarz; Vorder- und Hinterrand des Halsschildes gelb; Schildchen und 4 Querbinden der Flügeldecken gelb, die erste unterbrochen, die zweite bogig, die dritte gerade, die vierte am Ende; Fühler und Beine roth; 4‴; häufig.

* *Cl. arcuatus* F. Geschweifter Widderkäfer (Fig. 82.). Schwarz, glanzlos; Oberseite mit gelben Flecken und mondförmig gebogenen, gelben Binden; Fühler und Beine rothbraun; 5—6‴; nicht selten an Weidenstämmen.

Fig. 82.
Clytus arcuatus. Geschweifter Widderkäfer.

†* **84.** ***Lamia aedilis*** L. Zimmerbock. Flachgedrückt, bräunlich, dicht aschgrau behaart; Halsschild mit 4 gelblichen Haarflecken; Flügeldecken mit 1—2 braunen Binden; 5—7‴; ♂ mit 3″ langen Fühlern, ♀ mit langem Afterstiele; häufig in Fichten und Kiefern; zuweilen schädlich für Bauhölzer.

* *L. textor* L. Weberbock. Gewölbt, schwarzbraun, matt; Halsschild runzlig. Flügeldecken gekörnelt, mit bräunlichen Haarflecken; Fühler dick, kaum von Körperlänge; 14‴; nicht selten an Espen.

‡* **85.** ***Saperda carcharias*** L. Walzenbock. Bläulich- oder gelblichgrau, mit schwarzen, wulstig gerandeten Grübchen; Fühler schwarz geringelt; 10—12‴; häufig in lebenden Pappeln, welche von den Larven überall durchlöchert werden.

‡* *S. populnea* L. Espenbock. Bräunlichschwarz, tief runzlig-punktirt; Fühler schwarz geringelt; ein Längsstreif jederseits des Halsschildes und 4 in einer Längsreihe stehende Flecken jeder Flügeldecke gelblich behaart; 5—6‴; in Stämmen und Zweigen der Espe häufig und schädlich.

†* **86.** ***Leptura livida*** F. Gelbrother Schmalbock. Schwarz, grauhaarig, tief punktirt; Flügeldecken gelbroth; Vorderschienen rostbraun; 3‴; häufig auf Blumen.

†* **87.** ***Rhagium mordax*** F. Gemeiner Zangenbock. Schwarz, dicht gelb behaart; Flügeldecken mit 2 breiten, gelblichen Querbinden über der Mitte; 12‴; häufig auf Laubhölzern, besonders Eichen.

†* *R. inquisitor* F. Laurender Z. Ebenso, aber die 2 Binden einander genähert und jederseits mit einem schwarzen Flecke. Laubhölzer, vorzüglich Buchen.

15. Blattkäfer (S. 127, 15). Die langbeinigen Larven leben wie die Käfer von der Blattsubstanz, finden sich mehr auf Kräutern als Bäumen und enthalten, vorzüglich dem Landbaue sehr schädliche Arten. — Von Holzpflanzen werden sie am leichtesten in Regenschirme geklopft, vorzüglich im Mai und Juni, ehe die ♀ ihre Eier abgelegt haben; von niedern Pflanzen vertilgt man S. 143.

§. 143. ste, namentlich die Erdflöhe, durch Besprengen der Saatbeete mit Wermuthaufguß (auf einen Eimer kochenden Wassers einige Hände voll) oder mit Tabacksbrühe (2 Pfund auf einen Eimer). Man säe auch mit andern Samen zugleich Kressensamen, der früher keimt (II. §. 49.) und von den Erdflöhen abgefressen wird, während dann die übrigen zarten Pflanzen schon so weit heranwachsen, daß sie den Erdflöhen zu hart sind.

* **88.** ***Donacia sagittariae*** F. Pfeilkraut-Rohrkäfer. Etwas flach, grün, unten goldgelb behaart; Flügeldecken mit deutlichen Eindrücken; Halsschild runzlig-punktirt, mit vertiefter Längsfurche; Hinterschenkel verdickt, mit einem Zahne; 5‴; häufig auf dem Pfeilkraute (II. §. 314.).

* ***D. simplex*** F. Gemeiner Rohrkäfer. Etwas flach, oben kupferroth, kupfergrün gerandet; 4‴; häufigste Art, an Wasserpflanzen.

* ***D. menyanthidis*** F. Oben kupfergrün, unten silberweiß glänzend; Fühler und Beine rothbraun; 5‴; häufig auf Wasserpflanzen (II. §. 222, 3).

†* **89.** ***Lema merdigera*** L. Lilienkäfer, Lilienhähnchen. Schwarz; Halsschild und Flügeldecken scharlachroth; 3‴; häufig auf Lilienarten, deren Blätter die mit Koth sich überdeckende Larve zerfrißt. Zirpen durch Reiben des Halsschildes an den Flügeldecken (Zirpkäfer, Musikant).

* ***L. duodecim-punctata*** L. Flügeldecken roth, jede mit 6 schwarzen Punkten; 3‴; häufig auf Sparget.

* ***L. asparagi*** L. Spargelhähnchen. Schwarzblau; Halsschild roth; Flügeldecken gelblich, 6 Punkte und ein Kreuz derselben schwarz; 3‴; auf Sparget, häufig.

* **90.** ***Cassida viridis*** L. Grüner Schildkäfer. Lebhaft grün, unten schwarz; Hinterleibssaum und Beine blaßgelb; 4‴; häufig auf Wasserminzarten (II. §. 230, 1).

* ***C. murraea*** L. Geflekter Schildkäfer. Braunroth oder grün (***maculata*** L.), unten schwarz; Flügeldecken schwarz gefleckt; 4‴; häufig auf Alantarten.

‡* **91.** ***Haltica oleracea*** L. Gemeiner Erdfloh. Stahlblau oder grün; Halsschild mit deutlicher Querfurche; Flügeldecken unregelmäßig fein punktirt; $1\frac{1}{2}$—2‴; häufig und vorzüglich schädlich (§. 143, 15) auf Schotengewächsen und Gemüsepflanzen. Fast eben so häufig sind folgende:

†* ***H. exoleta*** F. Distel-Flohkäfer. Halsschild mit deutlicher Querfurche; ungefleckt, rostbraun; Flügeldecken mit Punktreihen; 2‴; sehr häufig, besonders auf Disteln.

‡* ***H. helixines*** F. Metallischgrün oder blau; Halsschild kupferroth, mit deutlicher Querfurche; Punktreihen der Flügeldecken mit glatten oder mit runzligen und punktirten (***H. nitidula*** L.) Zwischenräumen; $1\frac{1}{2}$‴.

* ***H. mercurialis*** F. Bingelkraut-Flohkäfer. Sehr gewölbt, schwarzblau; 1‴. Auf Wald-Bingelkraute häufig.

†* ***H. nemorum*** F. Hain-Flohkäfer. Schwarz, fein punktirt; Fühlergrund, Schienen, Tarsen und ein gerader Längsstreif auf jeder Flügeldecke schwefelgelb; $1\frac{1}{2}$‴.

* ***H. flexuosa***. Bogiger Flohkäfer (Fig. 83.). Dem Hain-Flohkäfer sehr ähnlich, aber der Längsstreif mehr röthlich und in der Mitte mit mehr oder weniger gebogenen Seiten; 1 — $1\frac{1}{2}$‴; häufig.

Fig. 83.
Haltica flexuosa. Bogiger Spring- oder Flohkäfer.

* **92.** ***Galleruca nigricornis*** F. Schwarzhöriger Furchtkäfer. Gelblich; Flügeldecken grün; Fühler schwarz; $2\frac{1}{2}$‴; häufig.

‡* ***G. capreae*** F. Weiden-F. Oben gelbbraun; Kopf, einige Punkte des Halsschildes, Unterseite und Schenkel schwarz; $2\frac{1}{2}$‴; auf Laubhölzern; auf Birken schädlich.

‡* ***G. alni*** F. Erlen-F. Dunkelstahlblau; $2\frac{1}{2}$—3‴; Larven und Käfer auf Erlen, deren Blätter die Larven skeletiren, wie ***G. viburni*** die Blätter des Schneeballs.

†* **93.** *Lupĕrus rufipes* F. Glänzend schwarz, fein punktirt; Fühlerwurzel und Beine gelbroth; 2‴; häufig und schädlich auf Laubhölzern.

94. *Chrysomĕla* L. Blattkäfer. Enthält über 180 europäische, auf Kraut- und Baumblättern oder Gräsern lebende Arten (Blattkäfer).

a. Flügeldecken zerstreut-punktirt; Halsschildseiten nicht wulstig.

* *Ch. cortaria* F. Leder-Blattkäfer. Ungeflügelt; hochgewölbt, verworren-punktirt, schwarz oder schwarzblau, unten violett; 3—5‴; häufig.

* *Ch. haemaptĕra* L. Rothflügiger B. Geflügelt, wie alle folgenden; schwarzblau; Fühlergrund roth; Flügeldecken tief und unregelmäßig punktirt; 3‴; häufig und bei Verwundungen einen rothen Saft von sich gebend, wie.

* *Ch. sanguinolenta* L. Rothrandiger Blattkäfer. Schwarz oder schwarzblau; Flügeldecken wie vorher, aber mit rothem Außenrande; 4—5‴; häufig.

* *Ch. gottingensis* L. Göttingen'scher Blattkäfer. Violett, fein punktirt; Fühlergrund und Tarsen rothbraun; $3\frac{1}{2}$‴; häufig.

* *Ch. violacĕa* F. Violetter Blattkäfer. Veilchenblau; 3—4‴; häufig auf Wasserpflanzen.

* *Ch. graminis* L. Gras-Blattkäfer. Glänzend goldgrün; Flügeldecken mit vielen, fast reihigen Punkten; 4—5‴; häufig auf Wasserminzen.

* *Ch. cerealis* F. Aehrenblattkäfer. Kupferroth; Flügeldecken mit 5 blauen Längsstreifen; 4‴; häufig.

* *Ch. fastuōsa* L. Blaustreifiger Bl. Glänzend goldgrün; Rath der Flügeldecken und ein Mittelstreif blau; 3‴; auf Brennnesseln besonders häufig.

* *Ch. polygŏni* L. Knöterich-Blattkäfer. Glänzend blau oder grün; Halsschild, After und Beine roth; 2‴; häufig auf Vogel-Knöterich.

†* *Ch. armoraciae* L. Meerrettig-Blattkäfer. Blau oder blaugrün, unten schwarz; Flügeldecken am Grunde gefaltet; 2‴; häufig und schädlich auf Weiden.

b. Flügeldecken punktirt-gestreift; Halsschildseiten nicht wulstig.

†* *Ch. decem-punctāta* F. Zehnpunktiger Blattkäfer. Schwarz; Mund, Beine, Halsschild und Flügeldecken roth, letztere schwarz gefleckt; After rothgelb; 3‴; auf Obstbäumen und Pappeln schädlich.

†* *Ch. viminālis* Pz. Bandweiden-Blattkäfer. Ebenso, aber Mund und Beine schwarz; 3‴; häufig auf Weiden.

†* *Ch. vitellinae* L. Dotterweiden-Blattkäfer. Kupfergrün oder blau; Flügeldecken am Grunde gefaltet; After roth gerandet; 2‴; häufig und schädlich auf Weiden und Pappeln.

†* *Ch. cochleariae* F. Löffelkraut-Blattkäfer. Glänzendblau; After gelbroth oder gleichfarbig (*egĕna*); $1\frac{1}{2}$‴; häufig und schädlich auf Kohl rc.

c. Flügeldecken zerstreut-punktirt; Halsschild mit wulstig verdickten Seitenrändern.

‡* *Ch. populi* L. Pappel-Blattkäfer. Schwarzblau oder dunkelgoldgrün; Flügeldecken roth, mit schwarzer Spitze; 5‴; häufig und schädlich auf Espen und Pappeln.

‡* *Ch. tremŭlae* F. Espen-Blattkäfer. Ebenso, aber Flügeldecken ganz roth, 4‴; daselbst.

†* **95.** *Clythra quadri-punctāta* L. Säge-Blattkäfer. Schwarz, grauhaarig; Flügeldecken punktirt, gelbroth, mit 4 schwarzen Flecken; 3—5‴; auf Weiden, Erlen, Birken.

* **96.** *Cryptocephălus sericĕus* F. Seideglänzender Fallkäfer. Grün, blaugrün oder kupferroth; Flügeldecken runzlig punktirt, mit erhabenem Schildchen; 3‴; häufig (S. 134, 4).

16. Kugelkäfer (§. 127, 16). Leben auf Pflanzen und haben behaarte Larven; die Käfer sind durch Vertilgung der Blattläuse nützlich (Blattlauskäfer). §. 144

* **97.** *Coccidŭla pectorālis* F. Brust-Kugelkäfer. Roth; Brust schwarz; $1\frac{1}{3}$‴; häufig auf Wasserpflanzen.

* **98.** *Coccinella septem-punctata* L. Siebenpunkt-Marienkäfer oder Sonnenkäfer. Schwarz; Flügeldecken roth, mit 7 schwarzen Punkten; 3‴; häufig.

* *C. quinque-punctata* L. Fünfpunktiges Sonnenkälbchen. Ebenso, aber nur 5 schwarze Punkte; $2\frac{1}{2}$‴; häufig.

* *C. bipunctata* L. Zweipunktiges S. Schwarz; Flügeldecken sehr verschieden gefärbt, häufig roth, meist mit zwei schwarzen Punkten; 2‴; häufig und fast in 20 Abarten, so wie sich

* *C. variabilis*, das veränderliche Sonnenkälbchen mit erhabener Querfalte hinten auf der Mitte der Flügeldecken, in fast 40 Abarten häufig findet.

* *C. 22-punctata* L. Zweiundzwanzigpunktiges S. Schwefelgelb; Halsschild mit 5 und Flügeldecken mit 22 schwarzen Flecken; $1\frac{1}{2}$‴; häufig.

§. 145. **17. Zwergkäfer** (§. 127, 17). Kleine Käfer in Ameisenhaufen und unter Pflanzenresten und Moosen.

* **99.** *Pselaphus fossulatus* Rchb. Gemeiner Fühl- oder Tastkäfer. Kastanienbraun; Halsschild kuglig, mit 3 gleichen Grübchen; 1‴; häufig.

* **100.** *Claviger foveolatus.* Keulenkäfer. Ziegelroth; Fühler mit verdickten, walzigen Endgliedern; $\frac{3}{4}$‴; zwischen Ameisen, welche Käfer und Larven sorgfältig verpflegen und füttern (S. 166.).

§. 146. **II. Ordnung. Hymenoptĕra** L. (Piezăta F.) **Hautflügler, Aderflügler, Immen** (§. 124b.). Vier scheinbar nackte, mit wenigen, ästförmig verzweigten Adern durchzogene, nur sehr selten fehlende Flügel (Fig. 86.); Vorderflügel länger und breiter; Brustkasten (thorax) mit harter Horndecke; ♀ mit einer Legeröhre (terĕbra) oder einem Stechstachel (aculĕus); Verwandlung vollkommen.

Kopf meist quer-länglich und meist mit 3 Nebenaugen, also 5 Augen (Fig. 84; 88 u. 90.); Fühler faden- od. borstenförmig od. gebrochen (Fig. 86 bis 90.), selten keulenförmig. Mundtheile (Fig. 84.) meist saugend; Oberlippe und Oberkiefer groß, deutlich; Unterkiefern zart, bilden eine, Unterlippe und Zunge einhüllende Scheide. Zunge einfach, fadenförmig oder blattartig getheilt, zum Einsaugen der Blumensäfte; nur einige mit kürzerer Zunge, wie



Fig. 84.
Vordere Ansicht des Kopfes der Honigbiene.

a Zwei Netzaugen;
b Drei Nebenaugen;
c Geknickte Fühler;
d Kopfschild (clypĕus);
e Quere Oberlippe;
f Unten löffelförmig ausgehöhlte Oberkiefer;
g Unterkiefer;
h Viergliedrige Lippentaster;
i Behaarte Zunge, durchbohrter Rüssel oder Saugrüssel.

die Wespen (§. 153.), fressen auch harte Pflanzenstoffe und vorzüglich fleischige Früchte. Hinterleib 3—9 ringelig, sitzend (Fig. 86.) oder gestielt (Fig. 90.). Die ♀ haben entweder eine mehr oder weniger lange, oft den Körper an Länge weit übertreffende Legeröhre (Fig. 88.) oder einen Stachel, welcher im Leibe verborgen ist, aber vorgestreckt werden kann und als mächtige Waffe dient. Mit der Legeröhre (Bohrer) durchstechen oder durchsägen sie die Oberhaut von Thieren oder Pflanzen, um ihre Eier hineinzulegen. Die Aderflügler mit langer Legeröhre stechen nie Menschen, sondern bedienen sich des langen Schwanzes nur zur Ablegung der Eier in fremde Körper, immer unmittelbar an den Ort, wo die Brut künftig ihre Nahrung finden soll; dagegen stechen die Aderflügler mit verborgenem Stachel (Bienen und Wespen) sehr empfindlich, indem durch den Stachel aus einem, mit demselben in Verbindung stehenden Bläschen ein ätzender Saft in die Wunde gebracht wird. Der Thorax besteht aus 3 deutlichen, eng verbundenen Ringen, der Vorder-, §. 146.



Fig. 85. Hinterbein der Kiefern-Blattwespe (§. 148.).
a Hüfte (coxa);
b zweigliedriger Schenkelring (trochanter);
c Schenkel (femur);
d Schienbein (tibia);
e Enddornen;
f Fuß- oder Tarsenglieder (tarsi).



Fig 86.
Grüne Blattwespe (§. 148, 5).
a Flügelmahl in der Randader (radius);
b zwei Radialzellen;
c vier Cubitalzellen;
d drei Discoidalzellen.

Mittel- und Hinterbrust (pro-, meso- und metathorax). Beine (Fig. 85.) stets mit 5 Tarsengliedern; zwischen den Hüften und dem Schenkel ist ein 1- oder 2gliedriger Schenkelring (trochanter Fig. 85, b.). Mit Ausnahme weniger kleinen Arten (besonders Ameisen) sind alle geflügelt. Jurine hat in dem Flügelgeäder treffliche Unterscheidungscharaktere aufgefunden, welche von Hartig und Gravenhorst zur Bildung von Familien und Gattungen mit Glück benutzt sind und deren Berücksichtigung für die Kenntniß der Aderflügler jetzt unentbehrlich ist. Die Flügelzellen (Fig. 86.) werden durch Längs- und Queradern gebildet und ihre Zahl ist hier höchstens 16, bei den Netzflüglern dagegen fast immer viel größer. Von der Wurzel des Vorderflügels aus laufen in die Flügelscheibe mehre Adern, deren oberste den Rand des Flügels bildet, bedeutend dicker ist und Randader (radius oder costa) heißt; sie ist in der Mitte dick angeschwollen und bildet hier einen, meist abgerundet dreieckigen Fleck, das hornige Randmahl oder Flügelmahl (carpus oder stigma), welches bei den Gallwespen (Fig. 89.) fehlt. Die parallel unter der Randader liegende Ader, die Unterrandader oder der Subcostalnerv (subradius), hat fast denselben Verlauf, wendet sich zum Flügelmahle und von da in einem Bogen nach dem Vorderrande oder der Flügelspitze (wie bei Ichneumon Fig. 88.), oder tritt gleich in den Flügel hinein (wie bei Tenthrēdo Fig. 86.). Sie ist oft dicker als die äußere Randader und bei den meisten Blattwespen sind zwischen beiden noch feine Queradern. Die neben und unter dem Flügelmahle liegenden 1—3 Zellen heißen Radialzellen. Die dritte, von der Flügelwurzel aus die Flügel durchlaufende Ader, heißt von ihrer gewöhnlich geknickten

Form Ellenbogen- oder Cubitalader (Cubitus); über dieser und unter den Radialzellen liegen die 2—4 Cubitalzellen, deren mittelste und kleinste Mittelzelle oder Spiegelzelle (areola. Fig. 88.) heißt; die unter diesen liegenden heißen Discoidalzellen. Die Verbindungsadern zwischen beiden letztern heißen rücklaufende Adern, und die sich nach der Flügelwurzel öffnenden Zellen, Schulterzellen, deren unterste, zwischen 2 Längsnerven liegende und sehr lang gezogene, lanzettförmige Zelle genannt wird.

Sehr lebhafte, bewegliche, summend fliegende Luft- und Landthiere. Viele leben gesellig und äußern merkwürdige Kunsttriebe. (Ameisen, Wespen und Bienen). Die Larven der Blattwespen (Fig. 87.) leben frei auf Pflanzen von Blättern, die der Holzwespen leben im Innern des Holzes, die der Schlupfwespen im Innern anderer Insekten, namentlich der Raupen, die der Gallwespen in Pflanzengallen, die der Raubwespen von thierischen und vegetabilischen Stoffen und die der Blumenwespen leben in künstlichen Wohnungen vom Nektar (Honigsafte) der Blüthen. Die Aderflügler haben meist eine einjährige Generation, manche Blattwespen eine doppelte; manche Ichneumonen gebrauchen zu ihrer Entwickelung nur 2—3 Wochen; die Holzwespen dagegen 2 Jahre.

Nützlich sind alle **Ichneumonen** durch Vertilgung vieler schädlichen Insekten, wie es denn überhaupt unter ihnen die größte Zahl der Insektenfeinde giebt. Die Honigbienen **nützen** durch Honig und Wachs, und die Eichengallwespe durch die Knoppern. **Forstlich-schädlich** sind fast alle Blatt-, Holzwespen und Gallwespen. Die größern Raubwespen stechen empfindlich, rauben Honig und tödten Honigbienen; die Wegwespen schleppen nützliche Spinnen weg; die Wespen beschädigen die Rinde junger Bäume, verfolgen aber auch schädliche Insekten. Die in Lebensart meist sehr verschiedenen Larven sind gewöhnlich kopf- und beinlos, weiß und weich, seltner gefärbt (Blattwespen); diese haben 6, 8 oder 18—22 Beine. Kein Hautflügler legt seine Eier, wie einige Zweiflügler (§. 172.), in größere Thiere, und keine verfolgen den Menschen so, daß er ihrer schwer los werden könnte.

Die Zahl der bekannten Hautflügler schätzt man auf etwa 15.000 Arten

§. 147. Uebersicht der 7 Familien und deren vorzüglichsten Gattungen.

I. Ditrŏcha. Zwischen Hüfte und Schenkel zwei Glieder (Schenkelringe Fig. 85b.); ♀ mit einer Legeröhre.

A. Hinterleib verwachsen (nicht gestielt d. h. sitzend): Breitleibige.

1. Blattwespen. Vorderschienen 2dornig; Legestachel des ♀ nicht über die Hinterleibsspitze hinausragend. §. 148.

- Mit 3 Fühlergliedern; Endglied lang, verdickt . . . . . 1) *Hylotŏma* Latr.
- Mit mehr als 3 Fühlergliedern
  - Mit 5—7 keulenförmigen Fühlergliedern . . . . . 2) *Cimbex* Oliv.
  - Mit mehr als 7 Fühlergliedern
    - Flügel mit 1 Radialzelle; Fühler 17—23gliedrig, gekämmt (♂) oder gesägt (♀) . . . . . 3) *Lophyrus* Latr.
    - Flügel mit 2 Radialzellen (Fig. 86, b.)
      - Fühler 9—15gliedrig
        - mit 3 Cubitalzellen . . . . 4) *Emphytus* Klg.
        - mit 4 Cubitalzellen (Fig. 86c.) —**Blattwespe** . . . . . 5) *Tenthrēdo* L.
      - Fühler 19—36gliedrig . . . . . 6) *Lyda* F.

2. Holzwespen. Vorderschienen eindornig; Legestachel des ♀ über die Hinterleibsspitze hinausragend. §. 149.

- Hinterleib walzig; Fühler fadenförmig, 16—24gliedrig — **Holzwespe** . 7) *Sirex* L.
- Hinterleib seitlich zusammengedrückt; Fühler kolbig, 22gliedrig . . . . . 8) *Cephus* F

B. Hinterleib meist gestielt: Schmalleibige. §. 147.

3. Echte Schlupfwespen. Vorderflügel mit einer Spiegelzelle, also mit 3 Discoidalzellen (Fig. 88.). §. 150.

- Hinterleib deutlich gestielt
  - Leib gerade, walzig — **Schlupfwespe** ..... 9) *Ichneumon* L.
  - Leib sichelförmig gekrümmt, seitlich zusammengedrückt — **Sichelwespe** ..... 10) *Ophion* F.
- Hinterleib sitzend
  - Hinterleib kurz, erstes Segment überall gleichbreit, flach; Legestachel sehr kurz ..... 11) *Banus* Gr.
  - Hinterleib lang; Legestachel meist von Körperlänge (Fig. 88.) ..... 12) *Pimpla* F.

4. Schlupfwespenverwandte. Vorderflügel ohne Spiegelzelle, also mit 2 Discoidalzellen. §. 151.

- Fühler faden- oder borstenförmig, mit mehr als 16 Gliedern
  - Hinterleib sitzend ..... 13) *Bracon* F.
  - Hinterleib gestielt ..... 14) *Aphidius* N.
- Fühler dick, geknickt, mit 7—14 Gliedern
  - Legestachel unterhalb des Bauches in einer Rinne vorstehend ..... 15) *Torymus*.
  - Legestachel nicht vorstehend ..... 16) *Pteromalus* Latr.

5. Gallwespen. Vorderflügel nur mit einer Discoidalzelle. §. 152.

- Fühler nach der Spitze zu etwas dicker, mit walzigen Gliedern — **Eichen-Gallwespe** (Fig. 89.) ..... 17) *Cynips* L.
- Fühler borstenförmig — **Rosen-Gallwespe** ..... 18) *Rhodites* Htg.

II. Monotrŏcha. Zwischen Hüfte und Schenkel nur 1 Glied; ♀ mit einem Wehrstachel oder Stechstachel.

6. Raubwespen. Erstes Tarsenglied der Hinterbeine walzig und weder verbreitert noch dicht behaart. §. 153.

- Vorderflügel ungefaltet
  - Ungeflügelte ♀ od. ungeflügelte Geschlechtslose: **Ameisen**
    - Hinterleibsstiel eingliedrig; statt des Wehrstachels nur ein Aetzsaft — **Ameise** ... 19) *Formica* L.
    - Hinterleibsstiel 2knotig; ein Wehrstachel .. 20) *Myrmica* Latr.
  - ♂ und ♀ geflügelt: **Wespen**
    - Fühler kurz, nach der Spitze verdickt und gebrochen; Hinterleib nach beiden Enden zugespitzt — **Siebwespe** ..... 21) *Crabro* F.
    - Fühler kurz, nicht verdickt, aber gebrochen; rollen sich kuglig zusammen und haben Metallfarben — **Goldwespe** ..... 22) *Chrysis* L.
    - Fühler länger, fadenförmig, nach der Spitze zu dünner
      - Vorderbrust schmal, wulstförmig abgeschnürt; Hinterleib lang gestielt — **Mordwespe** .. 23) *Sphex* F.
      - Vorderbrust breit, innig mit der Mittelbrust verwachsen; Hinterleib kurz gestielt — **Wegwespe** ..... 24) *Pompilus* F.
- Vorderflügel einmal der Länge nach gefaltet; Fühler meist deutlich gebrochen, 13gliedrig und kolbig (♂) oder 12gliedrig und kaum merklich verdickt (♀); Hinterleib am Grunde abgestutzt — **Wespe** ..... 25) *Vespa* L.

7. Blumenwespen. Erstes Tarsenglied der Hinterbeine mehr oder weniger zusammengedrückt, breit, stets und oft sehr dicht behaart und Blumenstaub tragend. §. 154.

- Mittellappen der Zunge kürzer als deren Scheide
  - Mittellappen der Zunge wenig länger als der Kopf; Körper fast kahl — **Glattbiene** ..... 26) *Dichröa* Jll.
  - Mittellappen der Zunge von doppelter Kopflänge; Körper dicht behaart — **Schmalbiene** ..... 27) *Hylaeus* F.
- Mittellappen fadenförmig, so lang oder länger als deren Scheide
  - Hinterschienen rund (ungesellige)
    - Kinnbacken mit einem Zahne .. 28) *Anthophöra* Latr.
    - Kinnbacken mit 3—4 Zähnen .. 29) *Megachile* Latr.
  - Hinterschienen zusammengedrückt (gesellige)
    - Ohne Endstacheln an den Hinterschienen; Leib kurzhaarig — **Biene** ..... 30) *Apis* L.
    - Mit Endstacheln an den Hinterschienen; Leib dicht behaart — **Hummel** ..... 31) *Bombus* Latr.

§. 148. 1. Pflanzenwespen.

A. Blattwespen (Tenthredonidae). §. 147. Die Larven (Afterraupen) haben einen deutlichen Kopf und meist 22 Beine (Fig. 87.); sie leben meist frei auf Blättern und sind deshalb raupenähnlich gefärbt, meist grün (nur einige Arten leben in Blattgallen der Weiden und Pappeln); sie spinnen sich zur Verpuppung eine papierähnliche Hülle. Nur die auf Nadelhölzern lebenden werden oft sehr schädlich.

a b c

Fig. 87.

Afterraupe von der veränderlichen Blattwespe.

a Sechs Brustbeine, jedes mit horniger Klaue.
b Vierzehn Bauchbeine.
c Zwei Afterbeine oder Nachschieber.

Die über den Beinen längs des Körpers stehenden schwarzen Punkte bezeichnen die Luftlöcher (stigmata §. 19, 2).

†* **1.** ***Hylotoma rosarum*** Klg. Rosen-Blattwespe. Hochgelb; Kopf, Fühler, Rücken, Brust, Thorax, Vorderrand der Vorderflügel, Tibienspitzen und Tarsenglieder schwarz; 3—5‴; die Larven von August bis October auf Rosen. Werden auf ausgebreitete Tücher abgeschüttelt.

†* **2.** ***Cimbex variabilis*** Klg. Veränderliche oder große Birken-Blattwespe. Schwarz; Fühler und Tarsen rothbraun; Hinterrand der Flügel schwarzbraun (*femorata* L., Dickschenkel, wegen der verdickten Hinterschenkel des ♂) oder gelbbraun bis roth (*lutea* L.); 3/4—1″. Auf Erlen, Birken und Weiden nicht selten.

‡* **3.** ***Lophyrus pini*** L. Kiefern- od. Fichten-Bl. ♀ blaßgelb; Kopf, Mitte des Hinterleibes und 3 Flecke des Thorax schwärzlich; Fühler gesägt; 4—5‴; ♂ schwarz; Beine gelblich, mit schwarzen Schenkeln; Fühler gekämmt; 3‴. Afterraupen gesellig und sehr schädlich auf jungen Kiefern; werden häufig von Schlupfwespen (§. 150.) angestochen.

‡* **4.** ***Emphytus grossulariae*** F. Stachelbeer-Bl. Schwarz; Beine gelblich; Flügelmahl bräunlich; $3\frac{1}{2}$‴; Larven häufig und schädlich auf Stachelbeeren. Werden im Herbste durch Abschütteln und im Frühjahre durch Aufsuchen der Puppen aus der umgegrabenen Erde vertilgt.

* **5.** ***Tenthredo scalaris*** Klg. Grüne Blattwespe. Körper verlängert, grün; Scheitel, Flecke des Thorax, eine unterbrochene Rückenstrieme des Hinterleibes und Striche auf den Beinen schwarz; 4—5‴; auf Weiden und Erlen.

* *T.* ***notha*** Klg. Unechte gebänderte Blattwespe. Körper verlängert, schwarz; alle Segmenträder (2 und 7 unterbrochen) und Beine gelb, nur Oberseite der Schenkel und Tibienspitzen schwarz; 4‴; sehr häufig.

†* *T.* ***morio*** F. Schwarze Blattwespe. Körper klein, schwarz, Beine rothgelb, letzte Tarsenglieder bräunlich; Flügel schwärzlich; $1\frac{1}{3}$‴; Larven auf Johannisbeeren und schädlich auf Pflaumenbäumen.

†* **6.** ***Lyda pratensis*** F. Kopf und Thorax schwarz, mit gelben Zeichnungen; Hinterleib schwarz, mit rothem Rande; 6‴; schädlich auf Kiefern.

* *L.* ***sylvatica*** L. Schwarz; Mund und Fühler gelbroth; Fühlergrund schwarz; Kopf und Thorax blaßgelb gefleckt; Beine gelb, am Grunde schwarz; 4‴; häufig.

§. 149. B. Holzwespen (Siricides). §. 147.

Larven 6beinig, im Innern der Bäume, deshalb farblos; Entwickelung (§. 146.).

†* **7.** ***Sirex gigas*** L. Riesenwespe oder gelbe Fichtenholzwespe. Schwarz; Kopf hinter den Augen mit großem, gelbem Flecke; Hinterleib roth, mit schwarzer Spitze (♂) oder schwarz, in der Mitte roth (♀); 15‴; oft im Holze der Fichten oder Tannen, in welche das ♀ mit seiner langen Legeröhre am Ende des Hinterleibes für jedes Ei ein Loch bohrt.

†* **8.** ***Cephus pygmaeus*** L. Glänzend schwarz; Brust und Hinterleibsbinden gelb; 3‴; häufig. Larve in Waizenhalmen in Menge und schädlich.

2. Schlupfwespen. §. 147. §. 150.

A. Echte Schlupfwespen, Raupentödter (Ichneumonidae verae).

Sehr nützliche Thiere, deren ♀ durch ihre Legeröhre die Eier in Raupen, Fliegenmaden, Spinnen, Blattläufe, ja selbst wieder in Schlupfwespen (sind dann Schmarotzer-Schmarotzer) ꝛc. legen, in welchen die auskriechenden bein- und kopflosen Larven alsdann einzeln oder gesellig als Schmarotzer leben, indem sie die innern Theile des angebohrten Thieres (Wirthes) aufsaugen, welches dann meist noch fortlebt und sich sogar verpuppt, so daß Puppen in Puppe liegen. (S. 171,2,d,β). Die Maden einiger kriechen, wenn sie ausgewachsen sind, aus ihrem Wirthe heraus u. verpuppen sich in kleinen Gespinnsten. Die ausfliegenden Schlupfwespen setzen das Geschäft ihrer Mutter fort und vertilgen so viele schädliche Insekten, besonders Raupen. Die Schlupfwespen genießen höchstens etwas Thau oder Blumensaft. Wie die Schmarotzer bei Menschen und Thieren durch deren Krankheit begünstigt werden, eben so vermehren sich auch die Schlupfwespen bei allgemeinem Insektenfraße, wenn dieser seinem Ende nahe ist, ganz außerordentlich, so daß also, wie Ratzeburg nachgewiesen hat, die starke Vermehrung der Ichneumonen Folge und nicht Ursache der Krankheit der Raupen ist. Einige Schlupfwespen mit verborgenem Stachel, welcher auch zugleich als Legeröhre dient, stechen zwar auch, aber nie so empfindlich wie Bienen u. Wespen.

* **9.** ***Ichneumon castigātor*** F. Strafende Schlupfwespe. Hinterleib und Schildchen schwarz; Schenkel und Schienen roth; 4—7‴; häufig.

* ***I. extensorius*** Gr. Lange Sch. Schildchen blaßgelb; Hinterleib schwarz, Segment 2 und 3 roth, die letztern mit weißem Flecke; Fühler weiß geringelt; Beine roth, Schenkel oft schwarz; $3\frac{1}{2}$—6‴; sehr häufig.

* ***I. luctatorius*** L. Ringende Sch. Schildchen gelb; Segment 2 und 3. Schienen und Punkte am Grunde der Flügel gelb; Hinterschienen mit schwarzer Spitze; ♂ mit gelbem Gesichte, ♀ mit weißem Fühlerringe; 5—9‴; sehr häufig.

* **10.** ***Ophion lutĕus*** L. Gelbe Sichelwespe. Ueberall ziegelfarbig; der innere Nerv der Radialzelle gerade; Augen braun; 4—6‴; sehr häufig. Larven in Eulen- und Spinnerraupen und sich außerhalb der Raupe verwandelnd.

* ***O. merdarius*** Gr. Koth-S. Ebenso, aber innerer Nerv der Radialzelle etwas gekrümmt; 6—9‴; sehr häufig. Larve in ***Trachēa pinipērda*** (§. 162.).

* ***O. harpūrus.*** Nur 2—3‴; die Larven in Rosenäpfeln (S. 165,18) sehr häufig.

* **11.** ***Bassus laetatorius*** F. Schwarz; Hinterleibsmitte roth, Segment 2—4 mit einem Quereindrucke; Beine roth, Hinterschenkel mit schwarzem, rothem und weißem Ringe; Schildchen und Flecken des Halsschildes weißlich; 2—3‴; gemeinste Art.

* **12.** ***Pimpla manifestātor*** L. (Fig. 88.) Hinterleibssegmente höckerig, die erstern viel länger als breit; überall schwarz; Beine rothbraun; 12—15‴; Legeröhre $1\frac{1}{3}$mal so lang als der Körper; größte Art. Larven in Bockkäferlarven (§. 142.).

* ***P. setōsa*** Gr. Hinterleibssegmente



Fig. 88. *Pimpla manifestātor* (§. 150,12). Die kleine, eckige Zelle der Flügelscheibe heißt Springzelle und unterscheidet die echten Schlupfwespen von den Schlupfwespenverwandten.

glatt; schwarz, nur Beine rothgelb mit schwarzen Hüften; Legeröhre von Körperlänge; 7 — 9‴; Larve im Weidenbohrer (§. 161.).

* *P. flavicans* F. Hinterleibssegmente quer eingedrückt, die mittlern breiter als lang; überall gelbbraun, nur hier und da schwärzlich gestrichelt oder gefleckt; 3—6‴, Legeröhre halb so lang; gemeinste Art, deren Larven in Raupen von Heckenweißlingen und Eulenraupen (Dickkopf ꝛc.).

* *P. instigator* F. Hinterleibssegmente wie bei voriger Art; Körper schwarz; Schenkel und Schienen rothgelb; 4—8‴, Legeröhre halb so lang; sehr häufig; Larve in Raupen vom Kohlweißlinge, Goldafter, Ringelfuße ꝛc.

§. 151. **B. Schlupfwespenverwandte** (Ichneumonidae ascitae) §. 147. Meist nur sehr kleine Wespen.

* **13.** *Bracon variator* N. Schwarz; Hinterleib glänzend schwarz oder mehr oder weniger roth; Färbung der Beine veränderlich; Flügel dunkel, mit undeutlicher, hellerer Binde; $1^3/_4$‴, Legestachel halb so lang; häufigste Art.

* **14.** *Aphidius varius* N. Blattlausbohrer. Schwarz; Vordertheil des Thorax, die vordern Hinterleibssegmente und die Vorderbeine gelb; 1‴. In Blattläusen, vorzüglich der Rosen. Die weißfarbigen Blattläuse sind deshalb nicht zu tödten.

* **15.** *Torymus bedeguāris* L. Gallenbohrer. Thorax grün; Hinterleib goldig; Fühler schwarz, in der Mitte dunkler, Fühlerschaft und Beine gelb; $2^1/_2$‴, Legeröhre 2‴; in Menge im Rosenbedeguar in den Larven der Rosengallwespe schmarotzend.

* **16.** *Pteromălus pupārum* F. Puppenbohrer. Goldgrün; Fühler und Beine blaßgelb, Hüfte grün; Hinterleib des ♂ flach, länglich, beim ♀ mehr rundlich und olivengrün; $1^1/_4$‴. Leben zu Hunderten in Puppen des Kohlweißlings und des großen und kleinen Fuchses, so wie der nur $^1/_2$‴ große *Teleas phalaenārum* seine Eier häufig in die Eier der Ringelraupe (Fig. 96. B.) legt.

§. 152. **3. Gallwespen** (Gallicŏlae) §. 147.

Die Larven dieser, nie über $2^1/_2$‴ großen Aderflügler leben von Pflanzen, meist auf Holzgewächsen. Das ♀ legt die schlauchförmigen Eier in das Parenchym (Zellgewebe II. §. 5.) der Pflanzen, wodurch ein Andrang der Säfte entsteht, welcher verschieden gestaltete Auswüchse, die sogenannten Gallen erzeugt. Das Ei besteht aus 2, durch einen dünnen Faden verbundenen Schläuchen, einem Quersacke ähnlich. Da der Faden länger ist als die Legeröhre, so befindet sich das mit Eisubstanz gefüllte Schlauchende noch im Leibe des ♀, während das andere leere Schlauchende schon in die Pflanze gelegt ist und so kann die Eisubstanz durch den Faden aus dem Leibe in das gelegte leere Schlauchende nachfließen, wodurch es möglich wird, daß das Ei durch den viermal dünnern Legestachel geht. Mit den Eiern zugleich wird nach Hartig ein besonderer Saft in die Pflanze gebracht, welcher den Saftandrang und dadurch die verschiedenen Gallen (an unsern Eichen über 30 verschiedene) erzeugt. Die Verschiedenheit der Gallen hängt nicht von der Pflanze allein, sondern vorzüglich vom Insekte ab, indem 2 verschiedene Gallwespen an demselben Blatte auch immer 2 verschiedene Gallen erzeugen; deshalb glaubt Ratzeburg, daß jedes dieser Thierchen seine besondere Art zu verwunden hat, so daß das eine nur einzelne, das andere gruppirte Spiralgefäße (II. §. 6.) zu treffen weiß, und wieder ein anderes bald Lebensgefäße (II. §. 5.) der Pflanze aufsucht, bald nicht, und dadurch die verschiedenen Gallen hervorbringt. Man unterscheidet indeß **echte Gallwespen**, welche selbst Gallen erzeugen, und **Inquilinen** oder Einmiether, welche in den Gallen mit jenen zugleich leben, ohne selbst Gallen zu erzeugen. Merkwürdiger Weise hat man unter den vielen, bekannten Arten Gallwespen (Cynips), selbst den häufigsten, bis jetzt noch keine ♂, sondern nur ♀ gefunden, die sich also vielleicht durch Selbstbefruchtung fortpflanzen oder von ♂ anderer Art befruchtet werden oder deren Eierstöcke sich ohne Mitwirkung eines ♂ ausbilden können (siehe Blattläuse §. 192.). Gallen an Pflanzen werden übrigens auch noch durch **Blattwespen** (an Weiden und Pappeln),

durch Gallmücken (an Buchen, Linden, Weiden u. s. w.), so wie durch Blattläuse hervorgebracht.

* **17.** ***Cynips quercus folii*** L. Eichenblatt-Gallwespe (Fig. 89.). Schwarzbraun; Rücken rothgestreift; $1\frac{1}{3}$‴. Bewirkt die gewöhnlichsten Gallen, welche man häufig auf der Unterseite der Eichenblätter findet. Sie sind von Größe der Kirschen, grün od. rothbackig, weich, saftig und enthalten in ihrer Mitte in einer Höhlung die Larve.

Fig. 89. Eichenblatt-Gallwespe (*Cynips quercus folii* §. 152.).

* *C.* ***longiventris*** Htg. Langbauchige Gallwespe. Bewirkt erbsengroße, roth und gelb gebänderte Gallen an den Eichenblättern.

* *C.* ***Malpighi*** F. Malpighi's Gallwespe. Bewirkt die linsenförmigen, die Eichenblätter oft ganz bedeckenden, fein behaarten Gallen, so wie *C.* ***Reaumurii*** Htg. die ebenso geformten, Hemdsknöpfen ähnlichen Gallen.

C. ***tinctoria*** L. Färber-G. Liefert die levantischen Galläpfel (Knoppern oder Gallen-Aleppo) des Handels, welche in Kleinasien von der Knoppern- und Gallen-Eiche (II. §. 273.) gesammelt werden. Die schwärzlichen und grünlichen Gallen sind die besten, die weißen und löcherigen die schlechtesten. Sie unterscheiden sich von den, ihnen oft sehr ähnlichen, nur wenig Gerbestoff (II. §. 60, B. 1.) enthaltenden Gallen unserer Eichen durch größere Härte und höckerige Oberfläche. Sie enthalten sehr viel Gerbestoff, welcher mit Eisenoxydul (III. §. 153.) verbunden zum Schwarzfärben, zu schwarzer Dinte ꝛc. allgemein gebraucht wird.

C. ***psenes*** L. Feigen-G. Lebt in Südeuropa und ist dadurch wichtig, daß sie Früchte des früher tragenden, wilden Feigenbaums (Geißfeige, ***caprificus***) ansticht, von welchem man die Feigen oder Feigenbaumzweige dann auf den später tragenden Feigenbaum hängt, damit das Insekt in die Früchte dieser übergehen kann (Gallwespenbefruchtung, ***caprificatio***), so daß durch den größern Zufluß der Säfte die Feigen größer, süßer und früher reif werden. Sie vermehrt durch Zerstörung der Samen den Ertrag der Feigen aufs Zehnfache.

* **18.** ***Rhodites rosae*** L. Rosen-G. Schwarz; Beine roth, Hüfte und Schenkelring schwarz. In die Larven legt ***Torymus bedeguāris*** (§. 151, 15) seine Eier. An der Hundsrose entstehen dadurch die bekannten, wie mit Moos bewachsenen, haarigen **Bedeguare** (Rosenäpfel, Schlafäpfel), in welchen wir die Larven als kleine Würmer in ihren Zellen liegen sehen, wenn wir den Bedeguar durchschneiden. Die Rosenäpfel waren früher offizinell und wurden von einfältigen Menschen auch wohl Kindern zur Beförderung des Schlafes unter das Kopfkissen gelegt.

4. Raubwespen (Rapientia) §. 147. §. 153.

Die Larven leben von thierischen Stoffen, meist von Insekten und Spinnen, doch nähren die echten Wespen ihre Brut auch mit Pflanzenstoffen, mit Früchten und mit Honig, den sie den Blumenwespen (§. 154.) rauben, weshalb auch die ♀ einen Giftstachel haben. Erst bei dieser Abtheilung der Aderflügler tritt ein Kunsttrieb (§. 21 b.) auf.

A. Ameisen. Die Ameisen bilden, wie die Bienen und Wespen, die bevölkertsten Staaten unter den Insekten. Die Ameisen leben geſellig in hohlen Bäumen, unter Steinen oder in besondern, aus Holzstückchen ꝛc. aufgeführten Bauen (Ameisenhaufen), worin sich zur Begattungszeit **a.** geflügelte ♂; **b.** geflügelte ♀ und **c.** verkümmerte, immer ungeflügelte ♂ oder geschlechtslose Arbeiter finden. Diese machen wie bei Bienen immer die größte Zahl aus. Im August schwärmen ♂ und ♀ in der Luft, begatten sich, fallen paarweise herab, worauf die ♀ sich absichtlich die Flügel abstreifen und neue Colonien gründen, während die nun überflüssigen ♂ sterben oder bei ihrem Umherirren eine Beute der Vögel werden. Die Arbeiter verrichten alle Arbeiten in dem Baue, bessern die Wohnungen aus, füttern die Larven (welche also 2 Mütter haben), tragen die Puppen (fälschlich Ameiseneier) an

§. 153. die Sonne und wieder zurück. Von dem Baue aus laufen bestimmte Straßen oder eigends gebahnte Wege aus, auf welchen sie hin und her laufen. Obgleich die Ameisen mit den übrigen Insekten im Kampfe leben, so dulden sie doch nicht allein manche Insekten in ihrem Haufen, sondern sehen sie sogar gern darin. Hierher gehören als Inquilinen namentlich viele Kurzflügler (§. 132.), Larven vom Rosenkäfer (§. 130, [29]), und besonders die blinden Keulenkäfer (§. 145, [100]), die man nur unter ihnen findet und deren ganzes Bestehen ganz allein von Ameisen abhängig ist. Die **Nahrung** der Ameisen besteht in süßen Pflanzen- und Thiersäften (Honig, Zucker, Syrup); vorzüglich saugen sie gern den Honigsaft aus den Honigröhren der Blattläuse (§. 192.), mit welchen sie deshalb sehr befreundet sind und die man daher auch häufig unter ihnen findet. Auch tragen sie wohl Blattläuse in ihre Wohnungen und verpflegen und benutzen sie darin wie die Landwirthe ihre Milchkühe. Ameisen fressen auch Schildläuse, Raupen, Regenwürmer und das Fleisch von kleinen todten Säugethieren und Vögeln; Früchte indeß wohl erst dann, wenn sie entblößte Stellen haben. Für den großen Ortssinn spricht die Erfahrung, daß sich da, wo eine Ameise Vorrath von Süßigkeiten gefunden hat, bald ihre ganze Kameradschaft einfindet. Wegen ihrer Nahrung und wegen ihres beständigen Krieges gegen schädliches Ungeziefer sind sie wenigstens in Deutschland mehr nützlich als schädlich, indem ihr Schaden, den sie besonders Topfpflanzen durch Unterwühlen der Erde zufügen, sehr gering ist; in heißen Ländern dagegen schaden einige Arten sehr an Eßwaaren. Werden Ameisen in Häusern lästig, so verschmiere man ihre Eingänge; in Gärten gieße man kochendes Wasser, Tabakslauge oder am besten eine heiße, starke Salzauflösung über ihre Nester, lege Theerringe um die Bäume und binde über die Theerringe einen Streifen gekratzter Wolle, in welcher sie sich mit ihren Tarsen verwickeln. Nach Humboldt leben die Eingebornen am Rio Negro einen großen Theil des Jahrs von Ameisen, welche sie zu einem Teige geknetet in Beuteln aufbewahren; auch viele Wirbelthiere leben von Ameisen (§. 45, [3]). Die ♀ u. Arbeiter haben einen Stachel od. nur eine Drüse od. Blase, aus welcher sie Ameisensäure absondern. Diese spritzen sie uns an die Hände und theilen so denselben einen eigenthümlichen Geruch mit, wenn man sie in Ameisenhaufen gesteckt hat. Ameisen werden deshalb in der Apotheke zu Ameisen-Spiritus so wie zu Bädern gebraucht. Die Ameisenpuppen werden zum Schaden der Wälder als das beste Futter für Nachtigallen häufig gesammelt.

* **19.** *Formica rufa* L. Gemeine, braunrothe oder Waldameise. Schuppe des Hinterleibstiels fast herzförmig, oben ausgerandet; Bruststück der Arbeiter fast ganz braunroth; ♂ fast ganz schwarz; 4—5‴; häufig in Wäldern, in großen Haufen. Die von April bis Juli in ihren Nestern sich findenden Puppen sind größer als die später darin vorkommenden. Aus den größern kommen ♂ und ♀, aus den kleinern Arbeiter. Nützlich durch Vertilgung anderer Insekten, zu Ameisenspiritus, zu Bädern; Puppen ein bekanntes Nachtigallenfutter. Die oft in ihrem Haufen sich findenden Harzstückchen geben als wilder Weihrauch (II. §. 279, [6]) ein schlechtes Räucherwerk.

* *F. nigra* L. Schwarze Ameise. Schüppchen sehr schwach ausgerandet; bräunlichschwarz, glänzend; Mundtheile, Fühler und der größte Theil der Beine schmutzigbraun; Flügel an der Basis getrübt; 2—3‴; häufig.

* *F. flava* F. Gelbe A. Gelb; Augen schwarz; $1\frac{1}{3}$—2‴; unsere kleinste Art.

* *F. herculanea* L. Roßameise. Größte deutsche Art, 5—8‴; besonders in Nadelwäldern, in den Gängen kranker Bäume. Färbung fast ganz schwarz; nur Beine und ein Theil der Brust bräunlich.

‡ *F. saccharivora.* Zuckerameise. Nur 2‴ groß. Nisten gewöhnlich unter Zuckerrohr und haben in Westindien schon ganze Zuckerplantagen vernichtet.

* **20.** *Myrmica rubra* L. Rothe Ameise. Unterhalb des ersten Höckers am Hinterleibsstiele ein kurzer, nur beim ♂ undeutlicher Dorn; Hinterbrust mit 2 geraden Dornen; Hinterleib nadelrissig; überall schmutzig gelbbraun; $2\frac{1}{2}$—3‴; unter Steinen in Wäldern häufig.

‡ *M. omnivora* L. ist in Aegypten zu Hause, siedelte sich nach Amerika

über, wo sie, wie neuerdings auch in London, überall durch ihre Zerstörungen §. 153. schadet.

B. Raubwespen (§. 147.) leben immer einzeln, meist auf Wegen, selten auf Bäumen; die ♀ rauben für ihre Larven Insekten (Raupen, Blattläuse, Käfer), welche sie erst durch einen Stich lähmen und dann in ihre Nester schleppen.

* **21.** *Crabro cribrarius* L. Siebwespe. Schwarz; Hinterleib mit 5—6 gelben Binden, die mittlern unterbrochen; Hinterrand der Vorderbrust, Schildchen, Schienen und Beine gelb; ♂ mit weiß punktirter Scheibe an den Vorderschienen; 5‴; häufig; ernähren ihre Larven vorzüglich mit Zweiflüglern.

* **22.** *Chrysis ignita* L. Goldwespe. Glänzend grünblau; Hinterleib goldig, mit vierzähnigem After, unter die Brust zurück rollbar, wie bei allen Arten; 4—5‴; sehr häufig und durch Vertilgung anderer Insekten nützlich. Das ♀ legt nach Art des Kuckucks (§. 67,3) seine Eier in Nester von Wespen oder Wegwespen. Die auskommenden Larven sollen dann häufig die Nahrung der Larven ihrer Wirthe so freßgierig aufzehren, daß deren Larven Mangel leiden müssen.

* **23.** *Sphex* (*Ammophila*) *sabulosa* L. Sandwespe od. Grabwespe. Schwarz, schlank; Hinterleib über 2mal so lang als der Thorax; Stiel 2gliedrig, länger als der Thorax; Segment 2 und 3 rostroth; 8—10‴; nicht selten. Leben einzeln, vorzüglich in sandigen Gegenden, wo sie auf Fußwegen Löcher in die Erde graben, ihre Eier hineinlegen und daneben getödtete Insekten, Spinnen, Raupen u. s. w.

* **24.** *Pompilus viaticus* F. Gemeine Wegwespe. Schwarz; die 3 ersten Hinterleibssegmente roth, mit schmalem, schwarzem Hinterrande; Flügel mit schwärzlichem Außenrande; 5—7‴; nebst folgender sehr häufig.

* *P. fuscus* F. Braunrothe Wegwespe. Ebenso, aber die 3 Segmente ganz roth und Flügel klar; 5‴.

Hierher gehört auch noch die Töpferwespe (*Trypoxylon figulus*), welche ihr Nest in Wänden oder Thürpfosten anlegt und inwendig mit Thon ausschmiert.

C. Echte Wespen. Leben meist gesellig und bestehen dann aus ♂, ♀ und Arbeitern. Weibchen und Arbeiter zernagen Holz, welches sie mit ihrem klebrigen Speichel zu einer löschpapierartigen Masse verarbeiten und zum Baue des nach Verschiedenheit der Wespenart auch an Größe und Gestalt verschiedenen Nestes verwenden, dessen Eingangsloch aber immer nach unten gekehrt ist, damit kein Regen eindringen kann. Nach Schinz hängt die Größe der Wespennester von der Witterung ab. Je länger der Sommer dauert, desto größer werden die Wespennester. Das ♀ allein überwintert an geschützten Stellen, bauet im Frühjahre einige Zellen, legt in jede 1 Ei; aus den Eiern entwickeln sich Arbeiter, welche den Bau fortsetzen, die Larven mit Nahrung versorgen u. s. w., während das ♀ daheim die Vermehrung des Staats besorgt; erst im Herbste entwickeln sich aus den Eiern auch ♂ zur Befruchtung der ♀, weshalb also im Frühjahre nur ♀, später auch Arbeiter und gegen den Herbst erst ♂ zu finden sind. Sie leben von Insekten, Fleisch, Früchten, saugen auch gern süße Säfte. Die ♀ gebrauchen ihren Giftstachel nur in der warmen Jahreszeit und gegen Menschen nie ungereizt. Im Freien hängende Nester zerstört man Nachts durch Schwefeldämpfe; in Wohnungen befindliche wickelt man Nachts schnell in ein Tuch und zerschlägt sie in demselben (Mittel gegen Wespenstiche siehe bei den Bienen).

† * **25.** *Vespa crabro* L. Hornisse. Schwarz; Fühler, Schildchen und Kopf ganz-, Thorax nur am Vorderrande und in der Mitte, und Hinterleib am Grunde braunroth; die letzten Hinterleibssegmente gelb, am Vorderrande schwarz und mit 2—3 nach hinten auslaufenden Punkten; 14—16‴. Schadet jungen Baumpflanzungen, besonders Eschen, durch Abnagen der Rinde.

† * *V. vulgaris* L. Gemeine Wespe. Schwarz; Kopf, Thorax und Schildchen gelb gefleckt; Hinterleib gelb, Vorderrand der Segmente schwarz, nach hinten schwarz auslaufend; die gelben Binden jederseits mit schwarzen Punkten;

8—11‴; häufigste Art; ihr graues, in Größe und Form einem weißen Kohlkopfe ähnliches Nest in und an Bäumen, Dachsparren, auch in der Erde. Geht häufig an süße Früchte, an Fleisch; tödtet auch manche Honigbiene.

Verwandt ist die südamerikanische Papp- oder Papierwespe, welche ihr fast cylindrisches, fester, glatter Pappe ähnliches Nest an Zweige der Bäume befestigt.

§. 154. 5. Blumenwespen oder Bienen (Anthŏphĭlae) §. 147.

Leben einzeln oder gesellig in künstlichen Wohnungen vom Honigsafte der Blüthen, mit welchem sie auch die Larven füttern. Höchster Kunsttrieb; Giftstachel; geschlechtslose Arbeiter. Nützlich durch Befruchtung zweihäusiger Pflanzen (II. §. 278. und 296, 1), die Honigbiene durch Wachs und Honig.

a) **Ungesellige.** Leben einzeln in künstlichen Wohnungen auf Fußwegen (Grabbienen, Schmalbienen), oder in Lehmwänden (Mauerbienen), oder Baumstrünken (Rosenschneider).

* **26.** ***Dichróa gíbba*** F. Gemeine Glattbiene. Schwarz, fast kahl; Hinterleib roth, nur die 2 letzten Segmente schwarz; Tarsen röthlich; 4‴; nicht selten.

* **27.** ***Hylaeus albípes*** F. Weißbeinige Schmalbiene. Schwarz, weißlich behaart; mittlere Hinterleibssegmente roth, mit schwarzen Binden; Lippe gelb; Beine gelb mit schwarzen Ringeln; ♀ rothbraun behaart; Hinterleib schwarz, mit rothgelbem Hinterrande der Segmente; 4‴; häufig.

* ***H. flavípes*** Jll. Gelbbeinige Schmalbiene. Glänzend schwarzerzfarbig; Beine gelb; 3‴; häufig.

* **28.** ***Anthophóra parietína*** F. Mauerbiene oder Mauerwespe. Schwarz, gelblichgrau behaart; Lippe weißgelb (♀); oder schwarz behaart, die letzten Hinterleibssegmente gelbroth behaart (♂); 6‴. Bauen vor dem Eingange des Nestes in Lehmwänden eine gekrümmte, aus Erdkörnern bestehende Röhre.

* **29.** ***Megachíle centuncularis*** F. Rosen- oder Blattschneider. Schwarz; ♀ aschgrau behaart, mit fast herzförmigem Hinterleibe und weißgerandeten Segmenten; ♂ mit fast kugelförmigem Hinterleibe; Bauch und Beine gelbroth behaart; 6‴. Schneidet sehr künstlich Blätter ab, besonders von Rosen und schiebt sie in Erd- oder Baumlöcher, legt in jede dieser fingerhutähnlichen Zellen ein Ei und verschließt die Zelle mit einem zirkelrund abgebissenen Stücke eines Blattes.

b) **Gesellige.** Leben gesellig in künstlichen Nestern über der Erde (Honigbiene) oder unter der Erde (Hummeln).

* **30.** ***Apis mellífica*** L. Honigbiene (Fig. 90.). Schwarz, bläulichgrau behaart. Die Gesellschaft (Stock, Bienenschwarm) besteht 1) aus 600 bis 800 ♂, Drohnen, Hummeln, die etwas größer und gedrungener sind als 2) die Arbeitsbienen od. Geschlechtslosen, die man für verkümmerte ♀ ansieht, weil man zuweilen in ihnen verkümmerte Eierstöcke mit Eiern gefunden hat; bei diesen stoßen die Augen oben nicht aneinander; ihre Zahl beträgt oft 10,000 bis 30,000; 3) meist aus einem einzigen ♀, welches Königin, Mutterbiene, Weiser heißt, die größte und langleibigste aller und das einzigste ♀ in jedem Stocke ist. Die Arbeitsbienen, welche allein alle Arbeit im Korbe verrichten, haben an den Hinterschienen eine Vertiefung nach Außen, Körbchen, Hosen, zum Einsammeln des Blumenstaubes. Nur ♀ und Arbeiter haben einen Stachel, der gewöhnlich beim Stechen in der Wunde zurückbleibt oder doch durch das Losreißen den Bauch der Biene so beschädigt,



Fig. 90. Honigbiene (natürliche Größe).
a Weibchen;
b Kopf des Männchen.

daß sie sterben muß. Durch den Stich strömt ein ätzender Saft in die Wunde, wodurch Geschwulst entsteht, welche man durch Ausziehen des Stachels und durch Auflegen feuchter Erde, geschabter Kartoffeln oder anderer kühlenden Mittel, so wie durch Umschläge von Bleiessig (III. §. 96,4) oder Einreiben von Baumöl heben kann. Sie bauen ihre Zellen immer verdeckt in Baumlöcher, Körbe u. s. w. aus Wachs, welches zwischen den Hinterleibssegmenten in Blättchen hervorkommt, aber nach den neuesten Untersuchungen nicht aus Blüthenstaube im Körper bereitet wird, sondern aus Honig sich umbildet, weshalb auch eingesperrte und mit Honig gefütterte Bienen Wachs machen können. Eine Menge solcher Zellen bildet eine Scheibe, Wabe, welche senkrecht im Stocke steht und mit Stopfwachs, Vorwachs, der klebrigen Masse von den Knospen mancher Bäume, wie z. B. der Pappeln, festgeklebt ist. Einige der Wachszellen werden mit Honig gefüllt, welchen sie aus Blumen saugen und durch Erbrechen wieder von sich geben; in andere legt die Königin ein oder mehre Eier, aus welchen ♂, ♀ und Arbeiter sich entwickeln, und stirbt dann, weshalb der Stock bis zur Entwickelung der weiblichen Maden ohne Weiser ist. Sind mehre Königinnen vorhanden u. zu viele Bewohner im Stocke, so zieht ein Theil der Arbeiter, von einer Königin geführt, aus, um eine andere Wohnung anzulegen (sie schwärmen), und dies geschieht 3—4mal in einem Sommer. Die **Drohnen** erscheinen erst im Frühjahre im Stocke, haben keinen Stachel, fliegen selten aus und nur bei warmem Wetter, tragen nicht ein, arbeiten nicht und werden gegen den Herbst sämmtlich nebst der Königin getödtet oder aus dem Stocke geworfen (Drohnenschlacht). Erfahrene Bienenwärter behaupten, daß Drohnen auch zuweilen Eier legen, daß eine Königin ohne Drohnen fruchtbare Eier legen kann und daß die Bienen sich in der Noth aus einer Arbeitsbiene eine Königin erziehen können. Feinde der Bienen sind unter den Säugethieren die Bären, unter den Vögeln der Wespenbussard, Bienenfresser, Honigkuckuck, unter den Insekten die Raubwespen und die Wachsschabe, welche die Wachsscheiben zerstört; auch schmarotzen die Larven vom Maiwurm an Bienen. — Bienen, Seidenraupen und Cochenille-Insekten sind die einzigen aller Insekten, welche von Menschen als Hausthiere gezogen werden. Bienen zeichnen sich durch Arbeitsamkeit, Reinlichkeit, Ordnungsliebe, hohen Kunsttrieb im Baue der Zellen so wie durch ihr streng-monarchisches System unter allen Insekten aus. Auch die Bienen sammeln, wie die Hummeln, zuweilen Honig aus Giftpflanzen (II. §. 244,6). — Neuerdings hat man in den vereinigten Staaten aus zerriebenen Bienen einen Thee bereitet und mit Glück gegen Strangurie (Harnzwang) angewandt.

* **31.** ***Bombus terrĕstris*** F. Erdhummel. Schwarz; After weiß; Vordertheil des Thorax und eine breite Binde auf dem zweiten Hinterleibsringe gelb; 6—10‴; nebst folgender häufig auf Syngenesisten (II. §. 62.) und blühendem Klee. Bauen ihr Nest unter die Erde und bedecken es mit Moos. Die ♀ stechen empfindlich, aber nicht leicht. Auch bei dieser Gattung überwintern, wie bei den Wespen, nur die ♀, deren jedes im Frühjahre aus einer wachsartigen Masse sich meist unter der Erde ein Nest für die Maden anlegt, welche anfangs, wie bei den Wespen, nur Arbeiter liefern, welche der Mutter beim Bauen helfen. Später erscheinen ♂ und ♀. Gegen den Winter sterben ♂ und Arbeiter. Sie haben genießbaren Honig, der aber auch aus den Sturmhutarten (II. §. 198,5) gesammelt wird und deshalb in der Schweiz schon einmal dem Genießenden tödtlich wurde.

* *B. lapidarĭus* L. Steinhummel. Schwarz, nur der After roth (♀); beim ♂ ist außerdem Gesicht und Thorax vorn und hinten gelb; 6—9‴.

III. Ordnung. Lepidoptĕra. (Glossāta F.) Schmetterlinge. §. 155.

Vier mit kleinen Schuppen bedeckte Flügel, ein Rollrüssel, verwachsene Brustkastenringe und vollkommne Verwandlung (§. 122.). Die **Flügel** sind mit kleinen, meist schön gefärbten Schuppen dicht bedeckt, nur bei wenigen in der Mitte durchsichtig (Glasflügler) und nur

§. 155. bei sehr wenigen ♀ sehr kurz oder ganz fehlend (Frostschmetterling). Die beiden ersten Flügel heißen Vorder- oder Oberflügel, die 2 letztern Hinter- oder Unterflügel. Die beiden längsten, fast paralleten Ränder heißen Vorder- und Innenrand und der dritte kürzeste der Hinterrand (Fig. 95.). Am Rande der Unterflügel hakt bei einigen ein zahnförmiger Büschel steifer Borstenhaare (Halter, Haltapparat) wie ein Zapfen hinter den Innenrand der Oberflügel. Die **Mundtheile** sind saugend, unvollkommen ausgebildet, Oberlippe und Oberkiefer nur noch als Rudiment vorhanden und die 2 Unterkiefern in einen langen, hohlen Faden verlängert und in der Ruhe spiralförmig aufgerollt (Rüssel, Rollzunge). Die Unterlippe ist groß, dreieckig, mit 2 großen, meist dreigliedrigen Lippentastern, zwischen welchen der Rüssel liegt, an dessen Grunde die kleinen, 1—3gliedrigen Kiefertaster sitzen. Alle haben 2 große, facettirte **Augen,** nur sehr wenige zugleich Nebenaugen. Die **Fühler** (§. 122, a.) sind vielgliedrig (oft bis 60 gliedrig), nie geknickt (Fig. 76d.), von verschiedener Länge und entweder fadenförmig oder borstenförmig (Fig. 98.) oder nach und nach verdickt (keulenförmig Fig. 92.) oder plötzlich verdickt (geknopft Fig. 95.) und entweder einfach oder gekämmt. Die **Brustringe** sind eng verbunden und nur bei einigen oben durch längere Haare (Kragen Fig. 96.) ausgezeichnet. Das **Hauptgeschäft** des Schmetterlings ist die Fortpflanzung, von deren frühern oder spätern Vollziehung auch die kürzere oder längere Lebensdauer desselben abhängt. Die meisten haben eine einjährige Generation, nur wenige (Weidenbohrer, Glasflügler) eine mehrjährige, keiner aber wohl, wie manche Käfer, eine doppelte Generation; denn manche, oft schon im Frühlinge und nachher im Herbste fliegende Arten, wie der große und kleine Fuchs, sind meist nicht befruchtete und deshalb überwinterte ♀. Beide Geschlechter sind sich in Färbung meist sehr ähnlich, aber die ♀ sind meist größer, haben einen dickern Hinterleib, der oft am Ende stärker behaart ist, die ♂ haben oft doppelt gekämmte Fühler (Spinner) oder einen Afterbüschel (Schmalzzünsler). **Fortpflanzung:** Die Metamorphose ist bei den Schmetterlingen vollkommen und sehr ausgezeichnet. Die ♀ einiger Arten legen ihre Eier in Häufchen mit einem Kitt zusammengeleimt (Ringelspinner), oder bedecken sie mit Haaren (Afterwolle), welche sie mit den Hinterfüßen vom After kratzen (Schwammspinner und Goldafter); alle legen ihre Eier aber immer an Orte, wo die auskriechenden Larven (Raupen) sogleich ihre Nahrung finden. **Nahrung:** Die Schmetterlinge leben, einige Motten und Zünsler ausgenommen, nur von Vegetabilien; als Raupen meist von Blättern, selten von Früchten (Apfelwickler), Holz (Weidenbohrer) oder Mehl (Mehlzünsler), als Schmetterlinge aber nur vom Honigsafte der Pflanzen, welchen sie mit ihrer Rollzunge einsaugen. Manche Phaläneu, welchen die Rollzunge fehlt, bedürfen als Schmetterling wahrscheinlich gar keiner Nahrung. Nach Verschiedenheit der Raupennahrung unterscheidet man unter den Raupen: **a)** Monophagen d. h. nur auf eine bestimmte Pflanze angewiesene Raupen, welche lieber sterben, als andere Nahrung zu sich nehmen. Hierher gehören vorzüglich die Nadelholzfresser, namentlich der Kiefernspinner und die Föhreneule. **b)** Polyphagen, d. h. Raupen, welche mehre Pflanzenarten fressen. Hierher gehören alle Laubholzfresser, namentlich der Heckenweißling, der Goldafter u. s. w. Die Nadelholzfresser scheiden sich meist streng von den Laubholzfressern, nur die Nonne frißt ebenso häufig auf jenen, wie auf diesen Holzarten. Die Nadelholzfresser ziehen auch wie die Borkenkäfer kranke Holzpflanzen gesunden vor und niedrige Bäume und Stangenhölzer den hohen und mittelwüchsigen. Die Raupen leben nach dem Auskriechen entweder immer oder nur auf einige Zeit gesellig oder zerstreuen sich gleich anfangs; sie haben einen deutlichen Kopf, deutliche Kauwerkzeuge und an der Unterlippe ein Spinnorgan, womit sich viele zur Verpuppung eine Hülle (Kokon) verfertigen. Der Körper der Raupen (Fig. 93. u. 97.) hat, wie bei den Käferlarven, 12 Ringe und 9 Paar Luftlöcher oder Tracheen, ist meist walzig, nackt (viele Zygänen) oder behaart (Glucken), oder mit verschiedenen Warzen, Höckern und Fortsätzen versehen (Tagschmetterlinge und Schwärmer) und liefert dadurch wichtige, unentbehrliche Gattungscharaktere. Mit Ausnahme einiger beinlosen Blattminirer haben sie nie unter 6 und nie über 16 Beine. Die 6 vorderen Beine heißen (wie bei der Afterraupe Fig. 87.) Brust-

beine, sind gegliedert, haben Krallen und entsprechen den Beinen des voll- §. 155.
kommenen Insekts, die übrigen 8 Beine heißen Bauchbeine und die 2 am letzten Leibesringe Nachschieber. Die Raupen verwandeln sich nach mehrmaligen Häutungen in Puppen, welche, wenn sie, wie bei einigen Tagschmetterlingen, hell gefärbt, bunt und mit Goldflecken bezeichnet sind, Goldpuppen (Chrysaliden) heißen. Die Puppe ruhet, ist eckig (bei den Tagschmetterlingen Fig. 91.), rund, nackt (bei Schwärmern und Eulen Fig. 94.) od. behaart (Ringelfuß), liegt frei in der Erde (Schwärmer) od. in einem Gewebe (Spinner) oder hängt in der Luft (Spindelbaum-Schnauzenmotte). Aus der Puppe kriecht der Schmetterling nach einigen Wochen, oft erst nach einem oder mehren Jahren aus, treibt in die Flügeladern Luft (§. 122. B.), wodurch die Flügel sich sehr schnell spannen, und fliegt davon.



Fig. 91. Puppe des Heckenweißlings (§. 157,9).
Eckig und mit einem, von der Raupe gesponnenen Faden befestigt an einem abgebrochenen Zweige.

Alle Schmetterlinge sind, jedoch nur im Raupenstande, mehr oder weniger schädlich (§. 123.) und nur der Seidenwurm bringt bedeutenden Nutzen, obgleich er den Maulbeerbäumen in seinem Vaterlande ebenfalls schädlich ist. Die **Schädlichkeit** der Schmetterlinge wie überhaupt der Insekten (§. 123.) hängt vorzüglich ab: **a**) von ihrer starken Vermehrung; **b**) von ihrer Nahrung, indem die, welche Nadelholz und nützliche Pflanzen fressen, immer schädlicher sind als die, welche Laubholz und überhaupt Pflanzen fressen, die weniger benutzt werden (Brennnesseln); auch sind die Knospen- und Fruchtfresser immer schädlicher als die Blattfresser; **c**) von der Jahrszeit des Fraßes, da die beim Ausschlagen der Pflanzen im Frühjahre erscheinenden und das junge Laub fressenden immer empfindlicher schaden, als die im Herbste lebenden. Die **Vertilgung** der Schmetterlinge ist im Allgemeinen am schwierigsten im Eistande, leichter im Puppen- und am leichtesten im Raupenstande und geschieht: **1**) durch Sammeln mit freier Hand, vorzüglich von niedern Pflanzen; **2**) durch Anprällen oder Abklopfen von Bäumen und Gesträuchen, indem man mit einem keulenförmigen Knittel oder einer Axt an Bäume, Aeste und junge Zweige schlägt, so daß die Raupen herabfallen und getödtet werden können; **3**) durch Fanggräben, indem man Bäume, welche von Raupenfraß leiden, mit Gräben umzieht, in welche die wandernden Raupen fallen und sich fangen; **4**) durch Eintreiben der Schweine, die in den Forsten den Boden aufbrechen, um Puppen, ihre Lieblingsspeise, zu finden; **5**) durch Abraupen, indem man die Gespinnste (Nester), in welchen manche Raupen in ihrer Jugend gesellig leben, abschneidet; **6**) durch Spiegeltödten, indem man die gesellig an Baumstämmen zusammensitzenden jungen Raupen (Spiegel) vernichtet, ehe sie sich zerstreut haben; **7**) durch Anlegen von Theerringen um die Baumstämme, wodurch das Hinaufkriechen auf den Baum vom Boden aus verhindert wird; **8**) durch Anwendung chemischer Mittel, indem man eine Auflösung ätzender Substanzen, Tabackslauge u. dgl. auf die Pflanzen spritzt. Der zu starken Vermehrung der Schmetterlinge werden indeß oft von der Natur selbst schon Grenzen gesetzt und zwar **1**) durch ungünstige Witterung (Regen, Kälte); **2**) durch Insektenfeinde und zwar a) durch Säugethiere, namentlich Fledermäuse, Schweine, Igel, Iltisse, Marder ꝛc.; b) durch Vögel, namentlich Häher, Krähen, Eulen, Kuckucke, Würger und viele der kleinern Singvögel; c) durch Amphibien, welche fast sämmtlich von Insekten leben und d) durch Insekten selbst und zwar α. durch Raubinsekten: Laufkäfer, Kurzflügler, Wespen, Ameisen, Wasserjungfern u. s. w., welche Raupen und Puppen entweder nur benagen und aussaugen oder ganz auffressen; β. durch Parasiten (Schlupfwespen und Raupenfliegen §. 150. u. 172.), welche ihre Eier in Schmetterlingseier, in Raupen oder in Puppen legen, die sich dann durch Veränderung der Farbe und geringere Beweglichkeit unterscheiden.

Man kennt etwa 20,000 Arten, unter welchen über 2,500 von Treischke und Ochsenheimer beschriebene Europäer.

§. 156. **Uebersicht der 11 Familien.**

I. Diūrna. Tagfalter. Fliegen am Tage. Flügel groß, beiderseits lebhaft gefärbt, in der Ruhe senkrecht; Fühler dünn, in einen Knopf oder eine Keule endend; Raupen 16beinig.

1) Papilionīna. Echte Tagfalter. §. 157. Flügel in der Ruhe aufrecht; Hinterschienen nur an der Spitze mit 2 Stacheln. Raupen meist dornig; Puppen eckig, am Ende des Körpers oder auch über der Mitte mit einem Faden befestigt (Fig. 91.)

- Nur vier vollkommene Beine (die 2 vordern nämlich verkümmert)
  - Fühlerkeule geknopft
    - Fühlerkeule eiförmig; Flügel abgerundet, rothgelb, oben mit schwärzlichen, unten mit gelbweißen Flecken. Schein-dornraupen (mit fleischigen Erhöhungen) — **Scheckenfalter** . . . . . 1) *Melitaea* F.
    - Flügel etwas gezähnt, oben mit schwärzlichen, unten mit Perlmutterflecken. Halsdornraupen (auf den ersten Ringen Dornen) — **Perlmutterfalter** . 2) *Argynnis* F.
    - Flügel eckig, oben gefleckt, unten braunschwarz oder bunt. Scharfdornraupen (erster Ring dornlos) — **Eckflügler** (Fig. 95.) . . . . . 3) *Vanessa* F.
  - Fühler allmählig in eine Keule verdickt, selten geknopft
    - Flügel gezähnt, oben schwärzlich, unten zimmtbraun. Halsdornraupen (mit 2-spitzigem Kopfe) — **Wandirter Falter** 4) *Limenitis* F.
    - Flügel ausgeschweift, blauschillernd, die hintern mit einem Auge. Hörnerraupen (Kopf mit 2 langen Hörnern) — **Schillerfalter** . . . . . 5) *Apatūra* F.
    - Flügel rundlich, mit einigen Augenflecken. Zweispitzraupen (mit 2 Spitzen am Ende) — **Randäugiger Falter** . . 6) *Hipparchia* F.
- Sechs vollkommene Beine
  - Flügel klein, oben meist bläulich, unten mit vielen Augen. Schildraupen (den Asseln §. 207. ähnlich) — **Argusfalter** . . . . . 7) *Lycaena* F.
  - Flügel groß
    - Hinterflügel lang geschwänzt. Sprenkelraupen (gesprenkelt) — **Falter** . . . . . 8) *Papilio* L.
    - Hinterflügel nicht geschwänzt
      - Flügel oben weiß, mit schwärzlichen Flecken. Rückenstreifraupen — **Weißling** . . . . . 9) *Pontia* F.
      - Flügel gelb. Seitenstreifraupen — **Gelbling** . . . . . 10) *Colias* F.
      - Flügel wenig beschuppt, fast durchsichtig . . . . . 11) *Doritis* F.

2) Hesperīdae. Unechte Tagfalter. §. 158. Flügel in der Ruhe halb aufgerichtet; Hinterschienen mit 2 Stacheln an der Spitze und 2 an der Seite. Afterwickelraupen (fast nackt; leben und verpuppen sich in leichten Geweben zwischen zusammengewickelten Blättern).

Kopf groß, Fühler mit sehr verdickter Keule — **Dickkopf** . . . . . 12) *Hesperia* Latr.

II. Crepuscularĭa. Abendfalter. Fliegen in der Dämmerung. Flügel schmal, düster gefärbt, in der Ruhe horizontal auseinander stehend; Hinterflügel sehr schmal, mit Haltern (§. 155.); Raupen 16beinig.

3) Sphingoděa. Schwärmer. §. 159. Fühler dreikantig, von gleicher Dicke oder nach der Spitze dicker. Nackte Schwarzhornraupen (auf vorletztem Ringel ein spitzes Horn (Fig. 93.); Puppen ohne Hülle, in der Erde, mit starkem Rüsselwulste (Fig. 94, c.).

- Ohne Afterbüschel
  - Fühler ohne Endfortsatz
    - Flügel ganzrandig, die vordern lanzettlich (Fig. 92. bis 94.) . . . . . 13) *Sphinx* F.
    - Flügel ausgebuchtet oder gezähnt . . . . . 14) *Smerinthus* Latr.
  - Fühler mit langem Endfortsatze . . . . . 15) *Acherontia* Ochs.
- Mit Afterbüschel. Flügel verhältnißmäßig klein gegen den breiten Hinterleib (fliegen bei Tage) . . . . . 16) *Macroglōssa* Ochs

§. 156.



Fig. 92.
Ligusterschwärmer (*Sphinx ligustri*, §. 159,13).
Linker Vorderflügel horizontal ausgespannt zum Fliegen, der entgegengesetzte dachförmig zurückgeschlagen wie im Zustande der Ruhe des Schwärmers.



Fig. 93.
Schwarzhorn-Raupe des Ligusterschwärmers (§§. 156,3 u. 159,13) in der Stellung der ägyptischen Sphinxe.



Fig. 94.
Puppe des Ligusterschwärmers.
a Kopfhülle. b Augenhülle. c Zungenhülle oder Rüsselwulst. d Fußhülle. e Hülle der Oberflügel. f Hülle der Unterflügel. g Hülle des Vor-, Mittel- und Hinterbruststücks. h Fühlerhülle. k Luftlöcher, l Hülle der Bauchringe.

4) Zygaenidae. Widderchen. §. 160. Fühler keulenförmig oder gekämmt; Flügel oft nur an den Adern beschuppt. Raupen behaart oder nackt u. dann im Innern der Pflanzen lebend; Puppen in leichter Hülle, ohne Rüsselwulst.

- Fühler gekämmt. Schildraupen (eine Reihe Schildchen auf dem Rücken) 17) *Atychia* Och.
- Fühler keulenförmig
  - Flügel ganz beschuppt, die vordern rothgefleckt, die hintern roth. Walzenraupen (mit walzigem Körper) — **Widderchen** . . . . . 18) *Zygaena* F.
  - Flügel in der Mitte durchsichtig. Raupen im Innern der Pflanzen — **Glasflügler** . . . 19) *Sesia* F.

§. 156. **III. Noctūrna. Nachtfalter.** (Phalaena L.) Fliegen nach der Dämmerung und sitzen bei Tage versteckt; Leib kurz, dick; Flügel meist düster, in der Ruhe dachförmig ausgebreitet oder um den Leib gerollt. Raupen und Puppen sehr verschieden, erstere 10 — 16beinig.

5) Bombycoděa. Spinner. S. 161. Fühler beim ♂ stark gekämmt, beim ♀ meist borstenförmig, seltener gekämmt; Leib des ♀ dick. Raupen 16beinig, nackt oder behaart; verpuppen sich in einem Gespinnste.

a. Hinterflügel ohne Halter (§. 135):

- Flügel lanzettlich; Fühler faden- od. schnurförmig. Wurzelraupen (im Innern der Pflanzen oder an Wurzeln) . . . . . 20) *Hepiŏlus* Jll.
- Flügel breit, gerundet
  - Flügel in der Ruhe ausgebreitet, mit einem Augenflecke
    - Augenfleck rund; Sternraupen (mit Höckern, worauf Borsten) . . . . . 21) *Saturnia.*
    - Augenfleck eckig; Raupen den Schwärmerraupen (Fig. 93.) ähnlich. . . . . 22) *Agŏa* Ochs.
  - Flügel in der Ruhe dachförmig anliegend, ohne Augenflecken
    - Hinterflügel in der Ruhe unter den vordern nicht hervorstehend; Raupen nackt, hinten mit einem Horne — Spinner . . . . . 23) *Bombyx* F.
    - Hinterflügel unter den vordern hervorragend. Dicht behaarte Halsbandraupen, Zapfenraupen(1—2farbige Querstreifen, letzter Ringel mit zapfenartiger Warze) Fig. 96. — Glucke . . . . . 24) *Gastropăcha* Ochs.

b. Hinterflügel mit Halter:

- Männchen u. Weibchen geflügelt
  - Vorderflügel lang, schmal
    - Fühler gekämmt; Aftergabelraupe (After mit 2 langen Spitzen, daher nur 14beinig) . . . . . 25) *Harpyĭa* Ochs.
    - Fühler borstenförmig; Spindelraupe (spindelförmig, bunt) . . . . . 26) *Lithosĭa* F.
  - Vorderflügel breit
    - Rücken mit erhabenem Schopfe; Höckerraupen (Höcker auf den mittlern Ringen) . . . . . 27) *Notodonta* Ochs.
    - Rücken ohne Schopf
      - Fühler fast borstenförmig; Holzraupen (leben im Holzkörper) . . . . . 28) *Cossus* F.
      - Fühler des ♂ gekämmt
        - Hinterflügel einfarbig
          - Hinterleib des ♀ mit dicker Afterwolle; Warzenbüschelraupen (mit behaarten Warzen). . 29) *Lipăris* Ochs.
          - Hinterleib gebärtet, in der Ruhe emporgerichtet, beim ♂ getheilt; Haarbüschelraupen(1und letzter Ring mit Haarbüschel) . . . . . 30) *Pygaera* Ochs.
          - Hinterleib nicht gebärtet; Bürstenraupen (mit einzelnen, bürstenförmigen Haarbüscheln) . . . . . 31) *Orgyĭa* Ochs.
        - Hinterflügel bunt (schwarz und roth); Bärenraupen (mit stark behaarten Warzen) . . . 32) *Euprepĭa* Ochs.
- Weibchen ungeflügelt; Sackträgerraupen (leben und verpuppen sich in einer Röhre aus Pflanzenstoffen) . . . . . 33) *Psyche.*

6) Noctucaceă. Eulen (Noctŭae). S. 162. Fühler nicht gekämmt, meist borstenförmig und bei ♂ und ♀ ganz gleich; Leib kurz, dick, kegelförmig; Vorderflügel schmal, dachig anliegend. Raupen 12 bis 16beinig, nackt oder schwach behaart, meist ohne Höcker, immer mit Nachschieber (Fig. 87c.). — Leben nie gesellig, selten auf Holzgewächsen, nie im Holzkörper; Puppen selten in einem Gewebe, meist nackt, in der Erde.

Anmerk. Die folgenden Gattungsmerkmale machen auf Schärfe keinen Anspruch und sollen nur die Uebersicht erleichtern, da es uns bei Schmetterlingen und ganz besonders bei Eulen noch überhaupt an guten Gattungscharakteren fehlt.

- Hinterflügel grau, weißlich oder bräunlich
  - Vorderflügel hellgrau
    - mit pfeilförmigem oder rundem Flecke und einem Nierenfleck; Raupen lang behaart 34) *Acronycta* Ochs. S. 156.
    - mit einem Doppelflecke auf der Mitte; Raupen verschieden . . . . . 35) *Episĕma* Ochs.
    - mit 2 schwarz umzogenen Mittelflecken . . 36) *Agrŏtis* Ochs.
    - rindenfarbig; Raupen mit hellen Längsstrichen . . . . . 37) *Xylina* Hüb.
  - Vorderflgl mit einem W-Zeichen am Außenrande
    - dunkel gefärbt, mit Pfeilstrichen; Raupen sehr verschieden . . . . . 38) *Hadĕna* Schk.
    - marmorartig; Raupen lebhaft gefärbt und gestreift . . . . . 39) *Mamēstra* Ochs.
  - Vorderflügel bunt, hellgefärbt, mit weißen Flecken und deutlichen Adern; Raupen mit breiten Streifen. . . . . 40) *Trachĕa* Ochs.
  - Vorderflügel mit Gold- od. Silberflecken; Raupen nur mit 6 Bauchbeinen. . . . . 41) *Plusia* Hüb.
- Hinterflügel hochgelb oder roth oder schwarz
  - hochgelb mit schwarzer Randbinde; Raupen gelbgrün 42) *Triphaena* Ochs.
  - roth mit schwarzer oder schwarz mit blauer Mittelbinde; Raupen baumrindenfarbig . . . . . 43) *Catocăla* Schk.

7) Phalaenoděa (Geométrae). **Spanner.** Fühler borstenförmig oder beim ♂ gekämmt, nie beim ♀; Leib dünn, schlank; Flügel breit, in der Ruhe meist ausgebreitet. Spannraupen 10beinig, selten 12- oder 14beinig, spannen, d. h. gehen schreitend mit gewölbtem Rücken (Fig. 97.). — Viele leben auf Holzpflanzen; Puppen ohne Gespinnst.

- Hinterflügel abgerundet
  - Leib dick, dem der Spinner ähnlich; Flügel groß, weißgrau, dunkel bestäubt; Rindenraupen (Baumrinden ähnlich) . . 44) *Amphidăsis* Ochs.
  - Leib dünn schlank
    - Flügel mit dunkeln Punkten und Strichen staubig besprengt; Streifen-Raupen (mit hellen Seiten- und Rückenstreifen) . . . . . 45) *Fidonia* Ochs.
    - Flügel mit Querlinien oder Querbinden.
      - Querlinien zahlreich, parallel, wellenförmig; Scheineulenraupen (dick, kurzleibig, meist grün) . . . . . 46) *Acidalia* Ochs.
      - Querbinden dunkelfarbig, auf den Vorderflügeln gegen den Außenrand eckig vorragend; Schuppenraupen (alle Ringe mit Winkelflecken und Halbkreisen) . . . 47) *Cidaria* Ochs.
      - Querbinden aus dunklen Flecken auf weißlichem oder gelblichem Grunde; Zeichenraupen (mit Flecken und Linien über Rücken und Seiten) (Fig. 97.) . . . . . 48) *Zerēne* Fr.
- Hinterflügel nicht abgerundet
  - Mit deutlich vorstehenden Ecken; Astraupen (gleichen Baumästchen) . . . . . 49) *Ennŏmos.*
  - Kurz geschwänzt; Raupen mit Höckern und seitlich gerunzelt 50) *Acaena* Ochs.

IV. Microlepidoptĕra. Klein-Schmetterlinge.

Fliegen theils des Nachts, theils bei Tage; Raupen meist 16beinig, nackt oder dünn behaart; leben bis zu ihrer Verpuppung im Innern ihrer Nahrung versteckt; verpuppen sich in einer Puppenhülle. — Die kleinsten und zahlreichsten Schmetterlinge.

A. Vorderflügel nicht auffallend schmal.

8) Pyralĭdae. Zünsler, Lichtmotten. Vorderflügel nicht geschultert, d. h. nicht mit ausgeschweiftem Vorderrande, in der Ruhe ein Dreieck bildend und nach hinten dachig über den schlanken Leib geschlagen; Beine lang, mit 2 Paar langen Dornen; Raupen 14- oder 16beinig, nackt, frei lebend und über der Erde in einem Gewebe sich verpuppend.

- Vorderflügel metallisch glänzend; Fühler gekämmt. . . . . 51) *Pyrălis* Schk.
- Vorderflügel seidenartig glänzend
  - mit hellen Flecken und Randstreifen. . . . . 52) *Scopŭla* Schk.
  - mit 2, aus größerem Flecke des Vorderrandes entspringenden, ein anders gefärbtes Mittelfeld einschließenden Querlinien . . . . . 53) *Asopia* Tr.
  - 3eckig, mit scharfer, äußerer Spitze . . . . . 54) *Botys* Latr.

9) Tortricīna. Wickler. Vorderflügel stark geschultert, ohne langen Fransensaum, in der Ruhe dachförmig; Beine mit 2 Paar Dornen. Raupen stets 16beinig, nackt, spinnen Blätter zusammen (wickeln); lassen sich an Fäden zur Erde herab. — Manche leben im Innern der Pflanzen, aber keine, wie einige Motten und Zünsler, von thierischen Stoffen. Manche sind vorzüglich Nadelhölzern schon sehr schädlich geworden und können nur durch Abschneiden der Zweige und Entfernen der Gespinnste vertilgt werden.

- Vorderflügel mit metallischen Querstreifen, sonst düster gefärbt; Raupen in Früchten oder im Holze der Obstbäume . . . . . 55) *Carpocāpsa* Tr.
- Vorderflügel ohne metallische Querstreifen
  - wenig ausgeschweift, schwärzlich oder braun, mit weißen Flecken und Binden . . . . . 56) *Penthina* Tr.
  - stark ausgeschweift (mit starkem Schulterbogen)
    - bunt, hellgefärbt, grün od. gelb mit 2—3 breiten, hellen Querbinden; Raupen nie entschieden grün; nur an Nadelhölzern . . . . . 57) *Tortrix* L.
    - 58) *Coccyx* Tr.

B. Vorderflügel auffallend schmal.

10) Tineodēa. Motten. Vorderflügel nicht geschultert, mit langen Fransensäumen; Hinterflügel breiter, in der Ruhe gefaltet, um den schlanken Leib gerollt. Raupen meist 16beinig, kahl oder schwach behaart. Leben und verwandeln sich in einer Hülle oder leben im Innern verschiedener Substanzen. Zu ihnen gehören die eigentlichen **Minirraupen** (Nadelhöhler und wahre Blattminirer, welche zwischen Ober- und Unterhaut der Blätter leben) und die berüchtigten **Thierfresser**, welche Haare und Federn zerstören und aus Naturaliensammlungen ꝛc. am sichersten durch trockne Wärme oder Arsenikdämpfe vertilgt werden.

- Fühler kaum von Körperlänge
  - Kieferntaster klein
    - Lippentaster länger als der stark behaarte Kopf und aufgerichtet — **Schabe** (Fig. 98.) . . . . 59) *Tinēa* F.
    - Lippentaster so lang als der Kopf und stark zurückgebogen . 60) *Hyponomeuta* Latr.
  - Kieferntaster groß, unter den Schuppen des Kopfschildes versteckt; Lippentaster kürzer als der Kopf . . . 61) *Galleria* F.
- Fühler fünf bis zehnmal so lang als der Körper . . . . . 62) *Adēla* Latr.

11) Pterophorīdae (Alucita L.). **Geistchen, Federmotten.** Flügel federartig gespaltet; Beine lang, mit 4 Dornen; Raupen 16beinig, nackt.

Taster von Kopflänge — **Federmotte** . . . . . 63) *Pterophōrus* Latr.

§. 157. **1. Echte Tagfalter** (§. 156.). Mit den bunteſten und lebhafteſten Farben.

* **1.** *Melitaea artēmis* F. Ehrenpreisfalter (II. §. 231.8). Rothgelb, schwarz geadert; Hinterflügel mit 6—7 schwarzen (auf der Unterseite gelb geringelten) Punkten in rothgelber Binde, hinter welcher blaßgelbe Randflecken stehen; 7‴ lang u. 18‴ breit. **Raupen** schwärzlich, mit weißpunktirten Längsstreifen; Dornen schwarz; von 4—6 auf Teufelsabbiß und Wegerich nicht selten.

* **2.** *Argynnis paphia* L. Silberstrich, Kaisermantel. Rothgelb, schwarz gefleckt; Hinterflügel unten auf grünem Grunde mit silbernen Querstreifen, deren mittlerer sich ganz durchzieht; 11‴ l. u. 34‴ br. **Raupe** braun, oben gelblich, mit schwärzlichen Längslinien; Dornen gelblich; von 5—7 auf Hundsveilchen, Himbeeren und Brennnesseln häufig.

* *A. aglaia* L. Großer Perlmutterfalter. Rothgelb, schwarz gefleckt; Hinterflügel unten grün und blaßgelb, mit mehren, grün begränzten Silberfleckreihen; 11‴ lang und 26‴ breit. **Raupe** schwärzlich, mit gelben Rückenstreifen und rothen Seitenflecken; von 4—6 auf Hundsveilchen häufig.

* *A. Latonia* L. Kleiner P. Rothgelb, schwarz gefleckt; Hinterflügel unten ochergelb, mit vielen großen und kleinen Silberflecken und einer Reihe rostbrauner Augen mit Silberpupillen; Vorderflügel unten in der Außenspitze mit einigen Silberflecken; 8‴ lang und 20‴ breit. **Raupe** gelbgrau, mit weißen Rückenstreifen; Dornen und Beine ochergelb; von 6—9 häufig auf Ackerveilchen, Esparsette und Ochsenzunge.

* **3.** *Vanessa cardui* L. Distelfalter. Gelbroth, schwarz und weiß gefleckt; Hinterflügel unten mit 4 Augen; 11‴ lang und 24‴ breit. **Raupe**

schwärzlichgrau, mit gelben Strichen und Punkten; von 6—9 häufig auf Di- S. 157.
steln, Brennnesseln und Schafgarben.

* *V. atalanta* L. Admiral. Schwarz; Vorderflügel an der Spitze weißgefleckt, mit rother Querbinde; Hinterflügel mit schwarz punktirter, rother Randbinde; 11‴ lang und 30‴ breit. **Raupe** gelbgrün bis schwärzlich, mit gelben Seitenstreifen und gelben Dornen; von 6—8 häufig auf Brennnesseln.

* *V. Jo* L. Tagpfauenauge. Braunroth; jeder Flügel mit großem Auge; 11‴ lang und 30‴ breit. **Raupe** schwarz, weißpunktirt; Dornen schwarz; von 6—9 häufig auf der großen Brennnessel.

* *V. antiopa* L. Trauermantel. Sammetbraun, mit schwefelgelbem, zuweilen weißem Saume und mit blauen Flecken vor dem Außenrande; 11‴ lang und 34‴ breit. **Raupe** schwarz, mit rothen Rückenflecken; Dornen schwarz; von 5—9 häufig auf Weiden, Birken, Espen und Allee-Pappeln.

†* *V. polychloros* L. Großer Fuchs (Fig. 95.). Rothgelb; Vorderflügel am Vorderrande mit 3 großen, in der Mitte mit 4 kleinen, schwarzen Flecken; 11‴ lang und 30‴ breit. **Raupe** bräunlich, mit gelben Rücken- und Seitenstreifen; Dornen ästig; von 5—7 häufig auf Weiden, Rüstern, Kirsch- u. Birnbäumen. Leben bis zur Verpuppung gesellig und können leicht abgenommen werden.

Fig. 95.
Großer Fuchs (*Vanessa polychloros*, §. 157.).
a b Vorderflügel;
a Hinterrand der Vorderflügel;
b Vorderrand, dem Innenrande entgegengesetzt;
c d Hinter- oder Unterflügel.

* *V. urticae* L. Kleiner Fuchs. Ebenso, aber nur 3 schwarze Flecken auf der Mitte der Vorderflügel; 8‴ lang und 24‴ breit. **Raupe** schwärzlich, mehr oder weniger gelb gestreift; von 7-9 häufig auf Brennnesseln.

* *V. C. album* L. Weißes C. Rothgelb; Hinterflügel unten mit weißem C; 8‴ lang und 24‴ breit. **Raupe** oben bis zur Hälfte gelblich, dann weiß; Selten schwärzlich, roth gestreift; 5 und 8 häufig auf Rüstern, Hopfen Brennnesseln, Johannis- und Stachelbeeren, Haseln und Heckenkirschen.

* 4. *Limenitis populi* L. Pappelfalter, großer Eisfalter. Oben schwarzbraun, mit weißen und rothen Flecken und Bändern; unten rothgelb, weiß gefleckt; 1″ lang und 3″ breit. **Raupe** mit abwechselnd rothbraunen und grünlichen Körperringeln, 5ter und 7ter mit großem Spiegelflecke; von 4—6 häufig auf der Espe und Schwarzpappel.

* 5. *Apatura iris* L. Schillerfalter. Schwarzbraun, blau schillernd (♂) oder ohne Schiller (♀), mit weißer, auf den Vorderflügeln unterbrochener Querbinde; Hinterflügel mit rothgeringeltem Auge; 14‴ lang und 38‴ breit. **Raupe** grün, mit rothen Streifen und 2 rothen Schwanzspitzen; von 5—7 häufig; nur auf der Palmweide.

* 6. *Hipparchia galathea* L. Brettspiel. Schwarzbraun, mit weißlichen oder gelblichen Flecken; Vorderflügel unten mit 1, Hinterflügel unten mit 5 blau gekernten Augen; 8‴ lang und 24‴ breit. **Raupe** lebhaft grün, später gelblich, mit gelbweißen Längsstreifen; 5—7 häufig auf Wiesen-Lieschgrase.

* *H. Megaera* L. Brauner Augenfalter. Schwarzbraun, mit mehren rothbraunen Binden, in welchen auf den Vorderflügeln oben und unten ein weiß gekerntes Auge, meist mit kleinen Nebenaugen; Hinterflügel oben mit 4—6, unten mit 6 gelbgeringelten Augen, deren letztes am Innenwinkel doppelt; 8‴ lang und 22‴ breit. **Raupe** graugrün, mit 3 dunklern Längsstreifen; von 5—7 auf weichen Gräsern.

* 7. *Lycaena argiolus* L. Faulbaumfalter. Unten ohne rothgelbe

§. 157. Binde; oben hellblau; Vorderflügel mit schmalem (♂) oder breitem (♀) schwarzbraunem Rande; unten bläulich weiß, mit einer Bogenreihe schwarzgekernter Augen; 6‴ lang und 14‴ breit. **Raupe** von 4 — 5 auf dem Faulbaume.

* *L. Adōnis* F. Adonis. Unten am Außenrande mit rothgelber Binde; oben glänzend himmelblau (♂) oder dunkelbraun mit rothgelben Randflecken (♀); unten aschgrau, mit vielen, schwarzgekernten Augen; 6‴ lang und 16‴ breit. **Raupe** grünlich, mit dunklem Rückenstreife und 3eckigen, rothgelben Seitenflecken; von 5 — 8 auf Klee und Ginster.

* *L. phlaeas* L. Goldvogel. Vorderflügel glänzend goldfarbig, schwarz gefleckt und breit schwarz gerandet; Hinterflügel schwarzbraun, mit goldfarbiger Randbinde, unten grau mit kleinen Augen und rothem Streife; 6‴ lang und 14‴ breit. **Raupe** hellgrün, mit gelbem Rückenstreife; im Frühling und Sommer auf gemeinem Sauerampfer.

* *L. betŭlae* L. Weißbirkenfalter. Flügel kurz geschwänzt, schwarzbraun, mit kleinem, weißlichem Mittelfelde (♂) oder rothgelbem Nierenflecke (♀); unten braungelb mit weiß und schwarz gerandeter Querbinde; 7‴ lang und 16‴ breit. **Raupe** grün, mit gelben Rücken- und Seitenstreifen; von 4—7 häufig auf Weißbirken, Schlehen und Pflaumenbäumen.

* *L. pruni* L. Punktband. Flügel kurz geschwänzt, dunkelbraun, mit einigen rothgelben Flecken am Außenrande der Hinterflügel (♂) oder auch der Vorderflügel (♀); unten bräunlich, mit weißlicher Querlinie und orangegelber Randbinde; 6‴ lang und 16‴ breit. **Raupe** grünlich, mit weißen Linien und fleischigen, an der Spitze braun punktirten Erhöhungen; von 5 — 8 auf Pflaumenbäumen und Schwarzdorn, so wie die Raupe von L. quercus auf Eichen.

* 8. *Papilio Machāon* L. Schwalbenschwanz. Schwefelgelb, schwarz gesäumt; Vorderrand der Vorderflügel mit schwarzen Flecken; 12‴ lang und 38‴ breit. **Raupe** grünlich, mit schwarzen Querbinden, worin rothe Punkte; im Sommer und Herbste auf Fenchel, Dill, Möhren und Kümmel nicht selten.

* *P. Podalirius* L. Segelfalter. Ebenso, aber die schwarzen Flecke verbreiten sich als schwarze Binden über das Mittelfeld der Flügel. **Raupe** gelbgrün, roth punktirt und gelb gestreift, mit 2 einziehbaren Hörnern am Kopfe; im Sommer und Herbste auf Schlehen-, Eichen-, Pflaumen-, Birn- und Apfelbäumen nicht selten.

‡* 9. *Pontia crataegi* L. Hecken- od. Baumweißling. Weiß, schwarz geadert; 10‴ lang und 28‴ breit. **Raupe** aschgrau, behaart, mit rothen und schwarzen, weißpunktirten Längsstreifen; im Frühlinge und Sommer häufig auf Weißdorn, Schlehen, Pflaumen-, Birn- und Apfelbäumen und in manchen Jahren in Obstgärten sehr schädlich. Der Falter legt im Juli 30 — 100 Eier an die Unterseite der Blätter, die Raupen kriechen bald aus, leben gesellig in einem Gespinnste (kleine Raupennester, zum Unterschiede der großen Raupennester vom Goldafter §. 161,29), überwintern, beginnen im Frühlinge ihre Zerstörung und zerstreuen sich dann. Der auskriechende Falter läßt aus dem After einige blutrothe Tropfen fallen, welche man häufig auf Blättern sieht, wodurch der Glaube an Blutregen veranlaßt wurde. Die Eierhaufen müssen zerdrückt und die Raupennester abgeschnitten werden.

‡* *P. brassicae* L. Kohlweißling. Weiß; Vorderflügel oben mit breiter, schwarzer Spitze und 2 großen schwarzen, dem ♀ fehlenden Mittelflecken; 10‴ lang und 30‴ breit. **Raupe** (Kohlraupe) blaugrün, mit gelbem Rücken- und Seitenstreife; im Sommer und Herbste überall und schädlich auf Küchenkräutern, Kohlarten, Rettig, Meerrettig ꝛc. Müssen durch Ablesen vertilgt werden; sind häufig von Schlupfwespen (§. 150.) angestochen.

‡* *P. Rapae* L. Rübenweißling. Weiß; Vorderflügel oben mit schmaler, schwarzer Spitze und 2 kleinern, schwarzen Mittelflecken; 8‴ lang und 22‴ breit. **Raupe** mattgrün, mit gelbem Rückenstreife und gelben Seitenpunkten; im Sommer und Herbste häufig und schädlich auf Rübenkohle, Reseda, Kapuzinerkresse und Küchenkräutern.

†* *P. napi* L. Grünäder. Weiß; Vorderflügel mit schmaler, schwarzer Spitze und 1 (♂) und 2 — 3 (♀) schwarzen Mittelflecken; Unterseite gelblich,

grün bestäubt; 8‴ lang und 22‴ breit. **Raupe** grünlich, mit röthlichen Luftlöchern; von 6 — 9 überall häufig auf Kohlarten, Rüben und Reseda.

* *P. napi* L. Senfweißling. Weiß; Flügel verhältnißmäßig schmäler als bei vorhergehendem; Vorderflügel mit schwärzlicher Spitze; 7‴ lang und 18‴ breit. **Raupe** grün, mit hochgelbem Seitenstreife über den Beinen; im Sommer auf gemeinem Schotenklee und der Wiesenplatterbse.

* *P. cardamines* L. Aurorafalter. Weiß; Vorderflügel mit schwarzer Spitze und schwarzem Mittelflecke, zwischen welchen das ♂ orangefarbig, das ♀ weiß ist; Hinterflügel unten gelbgrün gewölkt; 8‴ lang und 20‴ breit; **Raupe** grün, an den Seiten weißlich; von 5 — 7 häufig auf Wiesen-Schaumkraute (*Cardamine pratensis*) und Rübenräpps.

* **10.** *Colias rhamni* L. Zitronvogel. Flügel zugespitzt-eckig, gelb (♂) oder weiß (♀), auf jedem ein orangefarbiger Mittelfleck; 10‴ lang und 22‴ breit. **Raupe** grün, schwarz punktirt; von 4 — 8 häufig auf Kreuzdorn, Faulbaum und niedern Eichengebüschen.

11. *Doritis Apollo* L. Apollo-Falter. Flügel abgerundet, weißlich; die hintern oben mit 2, unten mit 3 rothen Augen; 10‴ lang und 34‴ breit. Süddeutschland, auf hohen Gebirgen.

2. Unechte Tagfalter (S. 156.) Durch dicken Kopf ausgezeichnete Falter. S. 158.

* **12.** *Hesperia malvarum.* Malvenfalter. Dunkelbraun, schwärzlich schattirt; Vorderflügel mit einigen durchsichtigen Punkten; Hinterflügel unten weißpunktirt; 7‴ lang und 16‴ breit; **Raupe** aschgrau bis röthlichgrau, Kopf schwarz, mit gelben Flecken; von 5 — 7 häufig auf Pappelrosen, besonders Eibisch.

3. Schwärmer (S. 156.). Dickleibige Schmetterlinge; Schwanzhornraupen (Fig. 93.). S. 159.

* **13.** *Sphinx elpenor* L. Großer Weinschwärmer. Vorderflügel olivengrün, mit rosenrother Binde; Hinterflügel rosenroth, am Grunde und Vorderrande schwarz, mit weißem Saume; 1″ lang und 2¼″ breit. **Raupe** grün, braun oder schwarz, mit schwarzen Strichen, vorn mit weißgefernten Augenflecken; von 5 — 9 häufig auf gelbem Labkraute, zottigem Weidenröschen, gemeinem Weiderich und Weinstocke.

* *Sph. euphorbiae* L. Wolfsmilchsch. Vorderflügel olivengrün, mit weißgelber, breiter Binde, in welcher ein großer, olivengrüner Mittelfleck; Hinterflügel schwarz, eine Mittelbinde und der Außenrand rosenroth und Innenrand mit weißem Flecke; 1⅓″ lang und 3″ breit. **Raupe** erwachsen grünlich schwarz, mit vielen weißgelben Punkten; ein Rückenstreif roth; jedes Gelenk mit 2 gelblichen Flecken; von 7 — 9 nicht selten auf Wolfsmilchkräutern.

* *Sph. ligustri* L. Ligusterschwärmer (Fig. 92. bis 94.). Vorderflügel röthlichgrau, mit schwarzbraunem Innenrande und weißgrauer Spitze; Hinterflügel und Hinterleib rosenroth mit schwarzen Binden; 1¾″ lang und 4″ breit. **Raupe** hellgrün, jederseits mit 7 violettbraunen, unten weißen Schrägstreifen; Luftlöcher rothgelb; von 7 — 9 auf Liguster und Syringen häufig.

†* *Sph. pinastri* L. Kiefern- oder Fichtenschwärmer. Vorderflügel aschgrau, mit 3 kurzen, schwarzen Mittelstrichen; Hinterflügel braungrau; Hinterleib mit schwarzen und weißen, unterbrochenen Binden; 1⅓″ lang und 2¾″ breit. **Raupe** grün und gelb gestreift; Rückenlinien roth; Luftlöcher hochroth; von 7 — 9 häufig auf Föhren, Tannen und Weymouthskiefern, meist in Gesellschaft mit dem Kiefernspinner (S. 161.) und schädlich.

* **14.** *Smerinthus tiliae* L. Lindenschwärmer. Vorderflügel ochergelb oder grau und braun gewölkt, mit 3 dunkelgrünen oder rothbraunen Mittelflecken; Hinterflügel gelbbraun, mit schwärzlicher Binde; 1¼″ lang und 2½″ breit. **Raupe** grün, chagrinartig rauh, mit halb rothen und halb gelben Schrägstreifen; von 7 — 9 häufig auf Linden, Ulmen, Erlen und Birken.

†* *S. ocellatus* L. Abendpfauenauge. Hinterflügel mit großem, blauem Auge auf der Mitte; 1½″ lang und 3⅓″ breit. **Rp.** blaugrün, chagrinartig rauh, mit weißen oder weißlichgelben Schrägstreifen; Luftlöcher roth; von 7 — 9 häufig auf Weiden-, Pappeln-, Schlehen- und Apfelbäumen, letztere oft entblätternd.

* *S. populi* L. Pappelschwärmer. Aschgrau, mit bräunlichen Binden und großem, rostfarbigem Fleck an der Wurzel der Hinterflügel; $1\frac{1}{4}$″ lang und $3\frac{1}{3}$″ breit. **Raupe** der vorhergehenden sehr ähnlich, aber gelbgrün; von 7—9 häufig auf Weiden, Pappeln und Espen.

* **15.** *Acherontia atropos* L. Todtenkopf. Vorderflügel schwarzbraun, gelblich gewölkt; Hinterflügel ochergelb, mit 2 schwarzen Binden; Rücken mit todtenkopfähnlicher Zeichnung; $2\frac{1}{3}$″ lang und $4\frac{1}{2}$″ breit. **Raupe** sehr veränderlich gefärbt, meist gelb, schwärzlich punktirt, mit bläulichen, violetten, und weißbegränzten Schrägstreifen; Horn gekrümmt; von 7—9 auf Kartoffeln, seltner auf Möhren ꝛc. Der Schwärmer läßt einen eigenthümlichen Ton hören, welcher durch eine Spalte am ersten Hinterleibs-Ringel hervorgebracht wird, vorzüglich wenn man den Schwärmer anfaßt.

* **16.** *Macroglossa stellatarum* L. Taubenschwanz. Vorderflügel graubraun, mit 2 schmalen, schwarzen Binden; Hinterflügel rostgelb, braun gerandet; Hinterleib mit schwarzem, weißgeflecktem Saume; 1″ lang und 2″ breit. **Raupe** grün oder rothbraun, weißlich punktirt, mit gelblichweißer Seitenlinie; von 7—9 nicht selten auf Labkraut.

§. 160. **4. Widderchen** (§. 156.). Wenig zahlreiche, dickleibige, schmalflüglige Arten.

* **17.** *Atychia pruni* F. Schlehenschwärmer. Vorderflügel schwarzbraun, grünlich schillernd, unten schwarzgrau; Hinterflügel und Hinterleib schwärzlich; 4‴ lang und 10‴ breit. **Raupe** braun, mit schwärzlichen, auf Wärzchen stehenden Haaren; von 4—6 nicht selten auf Schlehen, Eichen und Haidekraute.

* **18.** *Zygaena filipendulae* L. Johannisvogel oder Johannisschwärmer. Vorderflügel dunkelblau oder grünlich, mit 6, zuweilen zu 2 zusammengeflossenen rothen Flecken; Hinterflügel roth; 7‴ lang und 16‴ breit. **Raupe** hellgelb, mit 4 Reihen schwärzlicher Flecken; von 5—7 häufig auf Wegerich, Klee, Löwenzahn, Ehrenpreis und gemeinem Habichtskraute.

†* **19.** *Sesia apiformis* L. Bienen-Glasflügler oder -Schwärmer. Flügel durchsichtig; Vorderrand und Adern rostbraun; Hinterleib unverhältnißmäßig lang, gelb, mit schwarzen Binden; Kopf gelb; 12‴ lang und 18‴ breit. **Raupe** weißgelb, mit dunklerer Rückenlinie; Kopf schwarzbraun; von 4—5 in Pappeln und Espen, welche sie durchlöchern.

§. 161. **5. Spinner** (§. 156.). Die Raupen haben an der Unterlippe ein kegelförmiges Wärzchen mit feiner Oeffnung, aus welcher die Spinnmaterie, die in 2 langen Schläuchen zur Seite des Speisekanals liegt, heraustritt.

* **20.** *Hepiolus humuli* L. Hopfenspinner. Flügel silberweiß, unten schwarzbraun (♂), oder oben blaßgelb, mit schiefen, ziegelrothen Flecken und Streifen (♀); 9‴ lang und 24‴ breit. **Raupe** gelblich, mit dunklerm Kopfe und Nackenschilde; von 4—5 an den Wurzeln des Hopfens.

* **21.** *Saturnia carpini* Hüb. Hainbuchenspinner, kleiner Nachtpfau. Weiß und braun gewölkt; Mitte jedes Flügels mit gelb geringeltem Auge; Hinterflügel des ♂ fast ganz rothgelb; 9‴ lang und 28‴ breit. **Raupe** grün, mit schwarzen Gürteln, worin röthliche, sternförmige Knöpfe stehen; von 5—8 nicht selten auf Schlehen, Hainbuchen, Eichen, Birken, Erlen, Wollweiden, Hundsrosen, Erd- und Heidelbeeren.

* **22.** *Aglia tau* L. Hammerschmied. Rothgelb; jeder Flügel mit blauschwarzem Auge, dessen Pupille Tförmig; 9—12‴ l. u. 30—35‴ br. **Raupe** grün, chagrinartig rauh, mit weißlichen Schrägstreifen und Längslinien über den rothen Luftlöchern; Rücken mit einer Höckerreihe; von 7—9 nicht selten auf Rothbuchen, Eichen, Hainbuchen, Birken, Linsen, Haseln, Birn- und Aepfelbäumen.

* **23.** *Bombyx mori* L. Seidenspinner, Seidenraupe. Weißlich, mit 2—3 dunklern Querstreifen, zwischen welchen ein bräunlicher Halbmond auf den Vorderflügeln; $\frac{3}{4}$″ lang und $1\frac{3}{4}$″ breit. — Auf dem weißen Maulbeerbaume. — Der Seidenwurm (Seidenraupe) spinnt ein länglichrundes, meist gelbes,

selten weißes Cocon, welches uns die Seide liefert und aus 3 Lagen besteht: die äußere liefert die Floretseide, die zweite die feine Seide und die dritte die Seidenwatte. Kann in Europa nur in Häusern gezogen werden, ist aber doch schon in manchen Ländern ein einträglicher Erwerbszweig geworden. Die Raupen leiden oft an einer verheerenden Krankheit, der **Muscardine**, die in der Entwickelung eines den ganzen Körper überziehenden Schimmels besteht (II. §. 338.). Zwei Mönche brachten 555 aus China, dem ursprünglichen Vaterlande der Seidenraupe, Eier nach Constantinopel, von wo sich die Seidenzucht 1130 nach Italien und 1470 nach Frankreich verbreitete. Zur Zeit der Römer wurde die Seide mit Gold aufgewogen und der Kaiser Heliogabalus war der erste, der ein Kleid von reiner Seide trug; Marcus Aurelius verkaufte, um seinen erschöpften Schatz zu füllen, unter andern seine seidenen Kleider, und Jacob I. borgte sich, als er noch König von Schottland war, ein Paar seidene Strümpfe, um sich vor dem englischen Gesandten damit zu zeigen. §. 161.

‡* **24.** ***Gastropăcha pini*** L. Kiefern- oder Fichtenspinner. Braun; Vdfl. weiß bestäubt, mit rostbrauner, schwarzbraun gerandeter, zackiger Querbinde und weißem Flecke auf der Mitte; $1\frac{1}{4}$‴ l. u. über 3‴ br. Begatten sich Ende Juli; die Raupen überwintern und verpuppen sich dann Anfangs Juli. **Raupe** aschgrau, braungefleckt, vorn mit 2 blauen Querstreifen; von 5—7 oft häufig auf Nadelhölzern, vorzüglich Föhren. Die Puppen werden von vielen Schlupfwespen- u. Fliegenlarven bewohnt, die Raupen häufig von Laufkäfern u. Vögeln (Holzhäher, Kuckuck) gefressen. Die beste Vertilgung besteht in dem Anprällen (§. 155, 2) und Sammeln der Raupen im Frühjahre, ehe sie bäumen, d. h. auf die Bäume kriechen, so wie der Puppen und Schmetterlinge im Sommer.

‡* ***G. lanēstris*** L. Kirschenspinner. Flügel rothbraun, mit geschlängelter, weißer Querlinie; Vdfl. auf der Mitte und an der Wurzel mit weißem Flecke; ♀ mit grauwolligem After; 8—10‴ l. u. 20—22‴ br. **Raupe** schwarzblau, mit 2 Reihen behaarter, rother Rückenwärzchen; von 5—7 häufig auf Schlehen, Zwetschen, Kirschen, Weißbirken, Linden, Weiden, Hagedorn ꝛc. Die Raupen ziehen in unregelmäßigen Gesellschaften aus und haben fast eben so gestaltete Haare, wie die Processionsraupe, die Haare schaden aber wenig, weil sie sehr fest sitzen.

‡* ***G. processionĕa*** L. Processionsspinner. Vorderflügel aschgrau, mit 2 schwarzgrauen Bogenlinien, zwischen welchen oft ein schwärzlicher Punkt, ♀ mit braungelbem After, blasser und undeutlicher gezeichnet; 8‴ l. u. $1\frac{1}{2}$‴ breit. **Raupe** weißgrau behaart, Rücken blauschwarz, Seiten weißlich; jedes Gelenk mit 2 röthlichen Warzen; von 5—7 auf Eichen. Hier selten, häufig in Westphalen, und den Eichenwäldern sehr schädlich. Die Raupen ziehen in regelmäßig geordneten Gesellschaften (Processionsraupen) auf das junge Laub aus und kehren ebenso in ihre Gespinnstnester an die rauhen Theile der Aeste zurück Zur Zeit der Verpuppung überspinnt sich die ganze Gesellschaft mit einem sackförmigen Gewebe mit einer Oeffnung, aus welcher die Schmetterlinge im August hervorkriechen. Die feinen Haare der Raupen haben Widerhäkchen und können, wie es scheint, willkührlich abgeschüttelt werden, bleiben an Gegenständen leicht hängen und verursachen Menschen und Thieren, vorzüglich an feuchten Stellen der Haut, wo sie leicht eindringen, heftiges Jucken und die heftigsten Entzündungen, gegen welche man Oel einreiben und sich auch dadurch vorher schützen kann. Die Haare der meisten rauhen Raupen, vorzüglich von ***Liparis dispar***, haben indeß ebenfalls die Eigenschaft, auf zarter Haut des Menschen, besonders im Gesichte, Entzündung zu erregen, wenn sie zufällig daselbst mit der Hand eingerieben werden. Die Processionsraupen werden am Besten vertilgt durch Abnehmen der Gespinnstbeutel mit den Puppen. In den Raupen leben, wie in allen langhaarigen Raupen, selten Ichneumonen, sondern vorzüglich Raupenfliegen (§. 172, 18).

‡ ***G. pinivŏra*** Tr. Kiefer-Processionsspinner. In Färbung und Lebensart vorigem sehr verwandt. Die Raupen leben auf Föhren, sind sehr gefräßig und schädlich, wandern so, daß immer nur eine hinter der andern geht; ihre Haare erregen gleichfalls Entzündung. Häufig in Westphalen.

§. 161.

‡* ***G. neustria*** L. Ringelspinner (Fig. 96.). Ochergelb bis rothbraun; Vdfl. mit einer dunklern, hellgerandeten Querbinde; Fransen gelblich und braun gefleckt; 7—9‴ lang u. 14—18‴ breit. **Raupe** blau, roth und gelb gestreift; von 5—7 fast auf allen Obstbäumen und Laubhölzern und auf erstern sehr schädlich. Das ♀ klebt die Eier ringförmig um die jährigen Triebe der Bäume (Ringelraupe); die Raupen kriechen schon Ende Aprils aus und leben bis zur ersten Häutung gesellig in einem Gespinnste, vorzüglich in den Astwinkeln, wo sie frühzeitig abgenommen werden müssen; die Eierringel nimmt man schon beim Beschneiden der Bäume fort. In die Eier legt häufig eine, nur ½‴ große Schlupfwespe (***Telĕas phalaenārum***) ihre Eier, so daß hier Eier in Eiern liegen.

B A

Fig. 96.

A. Weibchen des Ringelspinners (*Gastropăcha neustria*).

B. Eierringel, ringförmig um ein abgeschnittenes Stück eines Baumzweiges geklebt.

* **25.** ***Harpȳia vinŭla*** L. Hermelinspinner, Gabelschwanz. Vdfl. grauweiß, schwarzadrig, mit verloschenen Zickzacklinien und schwarzen Punkten; Hinterleib schwarz geringelt; 10‴ l. u. 24‴ br. **Raupe** erst schwarz, später bläulich, mit gelben und dann mit grünen, weiß begränzten Seiten; Schwanz mit 2 langen Spitzen; von 6—8 häufig auf Weiden, seltner auf Linden und Pappeln.

* ***H. fagi*** L. Buchenspinner. Vdfl. aschgrau, mit bräunlicher Binde; vor dem Außenrande eine Reihe schwarzer, weiß gerandeter Punkte; 10‴ lang und 14‴ breit. **Raupe** braun, durch die langen Brustbeine und die 3 letzten, sehr breiten, oben flachen, gezähnelten Körperringe von allen Raupen leicht zu unterscheiden; von 7—9 auf Eichen, Buchen, Weißbirken, Linden, aber selten.

* **26.** ***Lithosia quadra*** L. Das Viereck. Vorderflügel aschgrau, mit gelber Wurzel und blauem Vorderrande (♂) oder goldgelb und jeder mit 2 stahlblauen Rautenflecken (♀); 7‴ lang und 16‴ breit. **Raupe** grau, mit gelben Längslinien, in welchen rothe, behaarte Knöpfchen stehen; von 6—7 auf Flechten an Obst- und Waldbäumen, so wie die Raupe von ***L. jacobaeae*** auf Jacobskraute (II. §. 250,[24]).

* **27.** ***Notodonta camelina*** L. Erlenspinner. Vorderflügel gezähnt, rostbraun, gewölkt, mit 2 undeutlichen, schwärzlichen, gezähnten Querlinien; Hinterflügel blaßgelb, mit schwarzblauem Wische am Innenwinkel; 8‴ lang und 16‴ breit. **Raupe** grünlich oder röthlichgrau; Rücken weißlich; eine gelbe Seitenlinie und 2 rothe Spitzen auf dem vorletzten Gelenke; im Sommer und Herbste häufig auf Eichen, Birken, Weiden, Pappeln, Erlen, Hainbuchen und Linden.

‡* **28.** ***Cossus ligniperda*** L. Weidenbohrer. Bräunlichgrau, schwarzbraun und weißlich gewölkt, mit vielen schwarzen Querstrichen gegittert; 1½″ lang und 3½″ breit. **Weidenraupe** (S. 132 u. 133.) fleischfarbig und wegen der Größe, Häufigkeit und Gefräßigkeit sehr schädlich für Laubhölzer, besonders Weiden, Pappeln, seltner für Obstbäume; sie durchbohrt die Stämme nach allen Richtungen; entwickelt sich erst in 2—3 Jahren. Durch Bestreichen der Baumstämme mit Lehm, Kuhmist u. s. w. wird das ♀ am Eierlegen gehindert.

‡* ***C. aesculi*** L. Roßkastanienfp. od. Blausieb. Weiß, mit vielen schwarzblauen Punkten und Flecken; 10‴ l. u. 20‴ br. **Rp.** gelb, mit schwarzen Höckerpunkten; von 5—7 nicht selten in jungen Stämmen von Linden, Buchen, Birken, Erlen, Roßkastanien, Wallnuß- u. Obstbäumen. Jede Raupe zerstört einen Stamm.

‡* **29.** ***Lipăris monăcha*** L. Fichtenspinner, Nonne. Vdfl. weiß, mit vielen schwarzen Zickzacklinien; Htfl. weißgrau; Hinterleib mit rosenrothen Einschnitten; 1″ l. u. 2½″ br. **Raupe** weißgrau, schwarz gemischt, mit behaarten rothen und blauen Warzen; von 6—8 gesellig auf Föhren, Tannen, seltner auf Laubhölzern, Eichen, Buchen u. s. w.; die überwinterten Eier kommen Ende Aprils aus; die Raupen fressen dann die Blätter in der Mitte aus, lassen aber das Meiste des abgebissenen Blattes herabfallen; verpuppen sich Ende Juni zwischen

feinen Gespinnstfäden unten an den Stämmen. Sehr schädlich wegen ihrer Gefräßigkeit, starken Vermehrung und Lebenszähigkeit, indem sie Kälte, Regen und Wind leicht ertragen. Sammeln der Eier vom September bis April, Spiegeltödten (Zerreiben der anfangs gedrängt zusammensitzenden Raupenfamilien mit Moos) vom April bis Juni, Anprällen der Stangen, Sammeln der Raupen, Puppen und Eier vom Juni bis September, sind die besten Vertilgungsmittel.

‡* ***L. salicis*** L. Ringelfuß oder Weidenspinner. Glänzendweiß; Beine schwarz geringelt; 8—10‴ lang und 18—24‴ breit. **Raupe** an den Seiten braungrau; über den Rücken eine Reihe gelber oder weißer Flecken, seitlich von behaarten, rothen Warzen begränzt; von 4—7 auf Weiden und Pappeln häufig und gesellig. Man vertilgt die einem Schwamme ähnlichen Eiernester an den Stämmen und sammelt die Raupen durch Anprällen (S. 171.).

‡* ***L. dispar*** L. Schwammspinner od. Großkopf. Flügel mit schwarzbraunen, welligen Querlinien, beim ♂ braun, mit dunklerm Schatten, beim ♀ grauweiß, mit schwarz punktirtem Außenrande; ♂ 8‴ lang und 18‴ breit, ♀ 12‴ lang u. 30‴ breit. **Rp.** braun oder aschgrau, gelb gestreift, vorn mit blauen, hinten mit rothen, behaarten Warzen; von 5—8 gesellig, häufig und schädlich auf allen Obstbäumen und Laubhölzern; frißt im Nothfalle selbst Giftpflanzen. Das ♀ überzieht die in Haufen gelegten Eier mit seiner gelbbraunen Afterwolle und heißt deshalb große Schwammraupe, zum Unterschiede der kleinern, folgenden. Am besten zerstört man die Eierhaufen und Spiegel vom September bis Juni.

‡* ***L. chrysorrhoea*** L. Goldafter. Einfarbig weiß; Vdfl. unten am Vorderrande etwas geschwärzt; Hinterleib röthlichbraun, mit rostgelber Afterwolle (♂) oder schwarzbraun mit rothbrauner Afterwolle (♀); 6—8‴ l. u. 16—20‴ br. **Raupe** schwarzgrau, mit 2 rothen Rückenstreifen, neben welchen weiße, abgebrochene Linien; im Frühjahre und Sommer häufig und gesellig auf Laubhölzern, Eichen, Weiden, Hainbuchen, vorzüglich aber auf Obstbäumen, worauf sie auch sehr schädlich ist, weil sie Knospen, Blüthen und Blätter gleich gern frißt. Die Raupen überwintern in versponnenen Blättern (große Raupennester), die im April abgeschnitten werden müssen, ehe die Raupen sich zerstreuen.

‡* ***L. auriflua*** F. Schwan. Ebenso, aber etwas größer, mit goldgelber Afterwolle und der Innenrand der Vorderflügel mit langen Haarfransen. **Raupe** voriger ähnlich gezeichnet, aber noch ein rother Streif über den Beinen. Lebt auf denselben Holzgewächsen, aber nie so häufig, ist aber doch noch merklich schädlich. Zerstreuen sich schon im Herbste und können deshalb nur durch Zerstörung der Eierschwämme am leichtesten vertilgt werden.

‡* **30.** ***Pygaera bucephala*** L. Wappenträger. Vdfl. silbergrau, mit großem, hellgelbem, gewölktem Flecke in der Flügelspitze; Htfl. gelblichweiß; 12‴ l. u. 30‴ br. **Rp.** schwarzbraun, mit gelben Längs- und Querbinden; von 7—9 gesellig auf allen Laubhölzern, vorzüglich Buchen, Eichen u. Gartenrosen.

‡* **31.** ***Orgyia pudibunda*** L. Buchen- oder Wallnußspinner. Weißgrau, schwärzlich bestäubt; Vorderflügel mit 2—3 welligen, bräunlichen Querstreifen; Hinterflügel weißlich; 8—11‴ lang und 20—30‴ breit. **Raupe** grüngelb, mit schwarzen Einschnitten und 4 gelben Haarbüscheln auf dem Rücken; von 7—10 häufig auf allen Laubhölzern, vorzüglich Buchen, Eichen und Gartenrosen; auf Buchen verheerend. Ueberwintern verpuppt unter Moos und können dann am besten gesammelt werden.

‡* **32.** ***Euprepia casa*** L. Gemeiner Bärenspinner. Vdfl. braun, mit weißen, zusammenhängenden Streifen und Flecken; Htfl. roth, mit schwarzbraunen Flecken; 14‴ lang u. 34‴ breit. **Bärenraupe** schwärzlich, mit weißlichen Warzen, auf welchen vorn rostgelbe, hinten schwärzliche Haare stehen; von 5—7 auf allen niedern Pflanzen, selbst Giftpflanzen; an Küchengewächsen schädlich.

* **33.** ***Psyche pulla*** Esp. Kleiner Sackträger. Schwarz, Flügel gefranzt; 3‴ lang und 6‴ breit. **Raupe** auf Wiesen in walziger, aus Grashalmen zusammengewebter Röhre umherkriechend und sich auch darin verpuppend.

6. Eulen (§. 156.). Der kleine Kopf ist fast ganz unter dem Halsschilde versteckt und mit einem Haarkragen umgeben, wie der Kopf der Eulen unter den Vögeln mit einem Federkragen. §. 162.

§. 162.

†* **34.** *Acronycta psi* L. Pfeileule. Vorderflügel bläulichgrau, an der Wurzel mit schwarzem, 3zackigem Längsstriche und nach der Spitze zu mit 2 schwarzen ψ bezeichnet; Hinterflügel weißlich; 8‴ lang und 18‴ breit. **Raupe** mit breitem, gelbem Rückenstreife und einem kegelförmigen Fleischzapfen auf dem vierten Ringe; häufig auf Obstbäumen, Buchen, Linden, Pappeln, aber erst von 8—10 und deshalb selten schädlich.

‡* **35.** *Episema caeruleocephala* L. Blaukopf. Vorderflügel schwärzlichgrau, mit 2 zusammenhängenden, weißlichen Nierenflecken; Hinterflügel aschgrau; 8‴ lang und 18‴ breit. **Raupe** gelbgrün, mit schwarzen Knöpfchen, deren jedes ein Haar trägt; Rücken mit 3 blaßgelben Längsstreifen; von 5—7 auf allen Obstbäumen häufig und schädlich.

‡* **36.** *Agrotis segetum* Hüb. Winterfaateule. Vdfl. grau oder gelbgrau, schwarz bestäubt, mit 2 zackigen Querlinien und 2 schwarz umzogenen Mittelflecken; Htfl. weiß (♂) oder grau bestäubt (♀); 8‴ l. u. 16‴ br. **Raupe** nackt, schmutzigbraun, mit hellerem, schwarz eingefaßtem Rückenstreife und 4 schwarzen Punkten auf jedem Ringe. Frühjahrs an Wurzeln, vorzüglich des Wintergetreides, schon oft verwüstend, auch an Kartoffelknollen und Gartenpflanzen überhaupt. Lebt bei Tage unter der Erde verborgen (Erdraupe der Gärtner), kriecht Nachts hervor u. verwüstet. Sie überwintert u. ist im Frühjahre erwachsen.

‡* **37.** *Xylina graminis* L. Graseule. Vdfl. graubraun, vor dem Außenrande eine schwarze Punktreihe, auf der Mitte ein weißlicher, 3gabliger Fleck; Htfl. gelblichbraun, schwärzlich gerandet; 6‴ l. u. 14‴ br. **Rp.** schwarzbräunlich, mit 5 hellern Rückenstreifen; von 5—6 häufig auf Futtergräsern, denen sie Wurzel und Keime abfrißt und dadurch schon oft große Verwüstungen anrichtete (1816 und 1817 auf dem Harze). Vertilgung durch Auftreiben der Schweine.

†* **38.** *Hadena capsincola* Hüb. Lychnisfamen-Eule. Die Raupe lebt von 5—7 auf Nelken und Lychnisarten und durchlöchert deren Samenkapseln.

* **39.** *Mamestra pisi* L. Erbsen-Eule. Vorderflügel rothbraun, rostbraun gewölkt, die 2 Nierenflecke und eine Zickzacklinie gegen den Außenrand gelbweiß; 8‴ lang u. 18‴ breit. **Raupe** rothbraun, mit 4 gelben Streifen; von 5—7 auf Bietsbohnen, Wicken, Erbsen, Ampfer, Kleearten und mehren Gräsern.

†* *M. oleracea* L. Gemüse-Eule. Vdfl. dunkelrostbraun, mit pomeranzenfarbigem Nierenflecke auf der Mitte und mit weißer, Wförmiger Zackenlinie am Außenrande; Htfl. gelblich od. weißlich. **Rp.** grünlich, nach der letzten Häutung rothbraun, mit 3 weißlichen, schwarz eingefaßten Linien und mehren solchen Punkten; von 7—8 häufig auf Gemüsearten, Kohl, Lattich, Mangold und Knöterich.

†* *M. chenopodii* F. Gänsefuß-Eule. Vdfl. aschgrau oder braungrau, mit schwärzlichem Nierenflecke und Wförmiger, weißlicher Zackenlinie; Htfl. weißgrau, mit breiter, dunkelbrauner Binde und einem Mittelflecke; 6‴ l. u. 12‴ br. **Raupe** grün bis dunkelbraun; Rücken mit 2 weißen oder schwarzen Längsstreifen u. einem rosenrothen Streife über den Beinen; von 7—9 sehr häufig auf Gemüsepflanzen, Sellerie, Lattich, Kohl, Spargel, Gartenmelde und Gänsefußarten.

‡* *M. brassicae* L. Kohl-Eule. Vdfl. schwarzbraun, rothbraun gewölkt, mit weißgelben W-Linien; die 2 Mittelflecke weiß umgränzt; Htfl. hellgrau; 8‴ l. u. 18‴ br. **Rp.** grün oder braungrau; Rücken mit dunklerm Längsstreife, neben welchem rothe Punkte; ein gelber Streif läuft über die Beine; von 8—9 häufig auf Gemüsearten, Salat, Kohl, die Endknospen (das Herz) ausfressend.

‡* **40.** *Trachea piniperda* Esp. Fichten- od. Föhreneule, Waldverderber. Vorderflügel braunroth, mit 2 weißlichen, gezähnten Querlinien und weißen Adern; die 2 Flecke weiß, mit grünlichem Kerne und nach unten fast verbunden; Htfl. dunkelbraun; 6‴ lang und 14‴ breit. **Raupe** grün, mit 5 weißen Längsstreifen und einem rothen über den Beinen. Ueberall in Kiefernwäldern, vorzüglich auf Stangenhölzern, und oft in zahlloser Menge. Die Eule fliegt im April, die jungen Raupen spinnen, steigen im Juli von den Bäumen herab zur Verpuppung und Ueberwinterung unter Moos und in der Erde. Werden von allen Vögeln, welche Insekten fressen, und von vielen Ichneumonen verfolgt und durch Eintreiben der Schweine im Herbste am leichtesten vertilgt.

‡* *T. atriplicis* L. Melden eule. Vorderflügel graubraun, mit lillafarbigem

Anfluge, hellgrünen Flecken und länglichem, gelbweißem, 2spaltigem Mittelflecke; 8‴ lang und 20‴ breit. **Raupe** grün, später bräunlich, mit 5 Längsstreifen, in welchen weiße Punkte; von 7—9 auf Knöterich, Gänsefuß, Meldenarten; auf Ampfer in Gärten oft schädlich.

‡* **41.** ***Plusia gamma*** L. Gamma-Eule. Vdfl. aschgrau bis roſtbraun, in der Mitte mit einem silber- oder goldfarbigen γ Zeichen; 9‴ lang und 18‴ breit. **Raupe** grün, mit 6 weißlichgelben Linien auf dem Rücken; von 4—9 faſt auf allen Kräutern, auch auf Gräsern; in Gärten für Gemüsepflanzen und auf Feldern für Hülsenfrüchte, Wiesenkräuter, Lein (deſſen Stengel ihre Lieblingsnahrung), so wie für Hafer oft sehr verderblich.

†* **42.** ***Triphaena pronuba*** L. Sauerampfer-E. Vdfl. gelbbraun bis schwarzbraun, mit 2 dunklern Mittelflecken; Htfl. hochgelb, mit schwarzer Randbinde von halber Hinterleibsbreite; 1″ l. u. 2″ br. **Rp.** dunkelblau, mit 3 hellern Rückenlinien und 2 roth eingefaßten Linien über den Beinen; von 4—6 Nachts auf Ampfer, Primeln, Aurikeln, Levkojen, Kohl, Veilchen ꝛc.; schadet oft den Aurikeln.

* **43.** ***Catocala fraxini*** L. Blaues Ordensband. Vorderflügel hellgrau, mit bräunlichen Zackenlinien und weißem Mittelflecke; Hinterflügel schwarz, mit breiter, hellblauer Mittelbinde; $1\frac{1}{4}$″ lang und 4″ breit. **Raupe** meist aschgrau, schwarz punktirt; frißt von Mai bis Juli Nachts häufig auf Eschen, besonders Pappeln, aber auch auf Birken, Rüstern, Ahorn und Eichen.

7. Spanner (§.156.). Durch die spannende Bewegung ihrer 10 beinigen Raupen, bedingt durch Mangel der Beine an den mittlern Bauchringen, vor allen Schmetterlingen ausgezeichnet (Fig. 97.). §. 163.

‡* **44.** ***Amphidasis betularia*** L. Ast- oder Birkenspanner. Grauweiß, schwarz bestäubt, mit schwärzlichen, winkligen Querlinien und schwarz und weiß gefleckten Fransen; 9‴ lang und 26‴ breit. **Raupe** aschgrau oder gelbgrün, oft mit weißlichen oder rothen Flecken und rother Rückenlinie; von 7—10 auf Birken, Weiden, Pappeln und Eichen.

‡* **45.** ***Fidonia piniaria*** L. Kiefern- oder Fichtenspanner. Flügel braun, in der Mitte bis zur Wurzel gelbweißlich (♂) oder hellbraun (♀), mit dunklern Querbinden durchzogen; 6‴ lang und 15‴ breit. **Raupe** grün, mit 5 gelben und weißlichen Längsstreifen; von 7—10 auf Kiefern, seltner auf Fichten schädlich, namentlich auf Stangenhölzern. Verpuppen sich unter Moose und werden durch Puppensammeln und Eintreiben der Schweine vertilgt.

‡* ***F. defoliaria*** L. Waldlinden-Spanner. Röthlich braungelb; Mittelfeld der Vdfl. heller und durch ein dunkel rothbraunes Zackenband getheilt; Htfl. bräunlichgelb, wie bei dem ♀, welches ungeflügelt und schwarzbraun gesprenkelt ist; 6‴ lang und 18‴ breit. **Raupe** braunroth; Seiten schwefelgelb, mit rothbraunen Strichen auf jedem Gelenke; von 5—7 auf Obstbäumen und Birken schädlich und in Lebensweise dem Winterspanner sehr ähnlich.

†* ***F. wawaria*** L. Johannisbeerspanner. Aschgrau, mit 4 schwarzen, abgekürzten, ungleichen Binden auf den Vorderflügeln; 6‴ lang und 14‴ breit. **Raupe** blaugrau, beiderseits mit breiter, gelber Längslinie; von 5—7 auf Johannis- und Stachelbeerbüschen häufig.

‡* **46.** ***Acidalia brumata*** L. Winter-Spanner, Obst-Spannraupe, Frostschmetterling. Schmutzig braungrau, auf den Hinterflügeln heller; Vorderflügel mit mehren gekerbten, dunkeln Bindenstreifen, deren einer nur im letzten Drittel immer deutlich ist; ♀ mit kurzen Flügelstummeln, weiß bestäubt, mit schwarzbraunen Querbinden; ♂ 4‴ lang und 13‴ breit, ♀ etwas kleiner. **Raupe** erst grau, dann grün und gelb gestreift, in den gelben Streifen rothe Punkte; von 3—5 am liebsten auf Obstbäumen aller Art, aber auch auf Eichen, Buchen, Linden, Hainbuchen, Rüstern und Wallnüssen. Der Schmetterling fliegt wie der Waldlinden-Spanner erst im November od. December, begattet sich an Bäumen sitzend, das ♀ kriecht dann hoch auf die Bäume und klebt die kleinen Eier an Knospen oder Blattstielnarben; die Räupchen (Spaniol) kriechen beim Ausbrechen der Knospen aus, bohren sich in die Knospen hinein, und fressen dieselben aus; später fressen sie die Blätter. Verpuppen sich Mitte Juni in der Erde, indem

ste sich an Fäden von den Bäumen herablassen. Dieser Spanner gehört zu den schädlichsten Insekten für Obstbäume und ist auch jungen Buchen- und Eichenpflanzen sehr verderblich. In Gärten gräbt man um die Bäume vom Juni bis September die Erde 1 Fuß tief um, und tritt sie dann so fest, daß der Schmetterling der Puppe nicht entschlüpfen kann; auch legt man im October u. November Theerringe um die Bäume, über welche das ♀ nicht hinaufkriechen kann.

* **47.** ***Cidaria prunata*** L. Zwetschen-Sp. Vdfl. röthlichbraun, mit 2 hellern, weißlich gerandeten Binden, deren äußere nach außen von einer Reihe weißgerandeter Flecken und Halbmonde begrenzt ist; in der Flügelspitze ein zackiger, weißer Strich; Htfl. bräunlichweiß, mit 3 weißen, zackigen Streifen; 6‴ l. u. 18‴ br. **Raupe** grün, braun oder grau, über dem Rücken eine Reihe röthlicher Flecken; von 5—7 auf Obstbäumen, vorzüglich Zwetschen, auch auf Stachelbeeren, Rüstern, Pappeln ꝛc. Verpuppt sich zwischen zusammengesponnenen Blättern.

†* **48.** ***Zerene grossulariata*** L. Stachelbeer-Spanner, Harlekin (Fig. 97.). Weiß, mit schwarzen, rundlichen Flecken, durch welche sich auf den Vorderflügeln 2 gelbe Binden ziehen; 7‴ lang u. 22‴ breit. **Raupe** weißlich; Rücken mit einer Reihe schwarzer, fast 4eckiger Flecken; überwintert, ist im Juli ausgewachsen; häufig auf Johannis- u. Stachelbeeren, auch auf Schlehen.



Fig. 97.
Stachelbeer-Spanner (*Zerene grossulariata* §. 163, 48) und dessen Spannraupe.

* **49.** ***Ennomos prunaria*** L. Pflaumen-Spanner. Orangefarbig (♂) oder gelb (♀), mit braunen Querstrichen, jeder Flügel mit dunkelbraunem Halbmonde; 8‴ lang und 16‴ breit. **Raupe** blaßbraun, Rücken dunkler, mit einigen Spitzen und Warzen; von 4—6 häufig auf Pflaumen, Schlehen, Hainbuchen, Rüstern, Haselsträuchen, Syringen, Wegerich ꝛc.

‡* ***E. lituraria*** L. Blaugrauer Kiefern-Spanner. Bläulichgrau, mit 3 schwarzbraunen Querbinden, deren mittlere sich nicht über die Hinterflügel fortsetzt und deren äußere breit und inwendig gelbroth ist; 7‴ lang und 13‴ breit. **Raupe** grün, mit weißem und gelbem Seitenstreife und grünem Kopfe; häufig und schädlich an Kiefern.

* **50.** ***Acaena sambucaria*** L. Hollunder-Spanner, Spitzschwanz. Schwefelgelb; Vdfl. mit 2, Htfl. mit 1 bräunlichen Querlinie; 2 schwärzliche Punkte in den Spitzen der Htfl.; 9‴ lang und 24‴ breit. **Raupe** bräunlich, röthlich oder grau, mit vielen dunklern Wellenlinien; von 4—6 häufig auf gemeinem Hollunder, auf Weiden, Linden, Birnbäumen u. fast allen Pflaumenarten.

§. 164. **8. Zünsler** oder **Lichtmotten** (§. 156.). Kleine, gern dem Kerzenlichte zufliegende Schmetterlinge mit langen Hinterbeinen.

†* **51.** ***Pyralis pinguinalis*** L. Schmalz-Zünsler oder Fettschabe. Vdfl. bräunlich aschgrau, glänzend, mit 2 unterbrochenen, schwärzlichen Zackenlinien und einem ebenso gefärbten Flecke; 7‴ lang und 14‴ breit. **Raupe** glänzend braun, glatt, 16beinig; lebt in Speck, Butter ꝛc., benagt auch Leder an Büchern; kriecht Frühjahrs häufig in Speisekammern an Wänden umher.

†* **52.** ***Scopula frumentalis*** L. Saat-Motte. Vorderflügel weißlich, mit gelbbraunen, ausgeschweiften Binden; Hinterflügel weiß, mit bräunlichem Außenrande. **Raupe** Frühjahrs auf Saatfeldern die Wurzelkeime abfressend und dadurch in mehren Gegenden schon verwüstend aufgetreten.

‡* ***S. margaritalis*** Hüb. Pfeifer in der Rübsaat (S. 153, 73). Vorderflügel blaß schwefelgelb mit rostfarbiger Spitze; Hinterflügel weißlich, mit einer äußern.

undeutlichen, roſtrothen Binde; 6‴ lang und 14‴ breit. Auf Schotengewächſen, vorzüglich auf Rübſaatſchoten, deren Samen ſie ausfreſſen und dadurch an manchen Orten ſehr ſchaden.

†* **33.** *Asopia farinālis* L. Mehl-Zünsler. Vorderflügel dunkelbraun, mit einem helleren, beiderſeits durch eine weiße Linie begrenzten, breiten Mittelfelde; Hinterflügel aſchgrau; 4‴ lang und 10‴ breit. **Raupe** von 5—8 häufig im Mehle und durch ihre Menge zuweilen ſchädlich.

†* **34.** *Botys urticālis* Hüb. Brennneſſel-Zünsler. Glänzend weiß, mit ſchwarzbraunen Fleckenbinden; Bruſt, After und Hinterleibseinſchnitte gelb; 6‴ lang und 13‴ breit. **Raupe** blaßgrün, von 7—8 häufig auf Brennneſſeln, Zaunwinden und Stachelbeeren.

†* *B. forficālis* L. Kohl-Zünsler. Vorderflügel blaßgelb, mit ſchiefen, roſtbraunen Streifen und einem Mittelflecke darin; Hinterflügel weißlich, mit braungelber, undeutlicher Bogenbinde gegen den Außenrand; 12‴ breit. **Raupe** von 7—10 häufig auf Kohl, Meerrettig und andern Gartengewächſen.

9. Wickler (§. 156.). Ihre Raupen leben wie die mancher Motten und die Larven der Blattroller (§. 139, 56 u. 57.) in zſgewickelten Blättern ꝛc. §. 165.

‡* **35.** *Carpocāpsa pomonāna* L. Apfel-Wickler. Vdfl. bläulichgrau, mit vielen feinen Querſtrichen, die in der Mitte eine Querbinde bilden, am Außenrande ein großer, ſammetſchwarzer, inwendig roſtroth geringelter Fleck; Htfl. röthlichbraun; 4‴ l. und 9‴ br. **Raupe** nur auf Obſtbäumen, vorzüglich Apfel- und Birnbäumen, in deren wurmſtichigen Früchten ſo wie in Zwetſchen ſie bis zum Herbſte lebt und dann durch die große, mit graubraunem Pulver bezeichnete Oeffnung herauskriecht, zwiſchen Rindenriſſen oder auf Obſtkammern ſich einſpinnend überwintert, aber erſt im Mai ſich verpuppt. Der Falter fliegt im Juni und die kleinen Raupen bohren ſich in die halbwüchſigen Früchte durch ein kleines, ſpäter noch an den Früchten ſichtbares Loch. Sehr ſchädlich und deshalb iſt das wurmſtichige Fallobſt ſchnell zu ſammeln und zu verbrauchen.

‡* **36.** *Penthina prunīana* Hüb. Zwetſchen-Wickler. Wurzelhälfte der Vdfl. ſchwarz und weiß marmorirt, in der Mitte von 2 weißlichen Streifen durchzogen und mit bläulichem Flecke, die Außenhälfte weiß, nur nach der Flügelſpitze zu vor den Franſen wie an der Wurzel marmorirt; Hinterflügel braungrau. **Raupe** grün, mit ſchwärzlichen Querſtreifen; von 4—6 auf Pflaumen, vorzüglich Kirſchen, Zwetſchen, und beſonders durch Ausfreſſen der zarten Knospen junger Bäume oft ſchädlich.

‡* **37.** *Tortrix viridāna* L. Eichen-Wickler. Vorderflügel apfelgrün, vorn gelblich gerandet; Hinterflügel hellgrau, grauweiß gefranſet; 6‴ lang und 9‴ breit. **Raupe** grün, ſchwarz gefleckt, mit ſchwarzem Kopfe und Halsbande; frißt nur an Eichen gern, zeigt ſich ſchon im Mai an den Knospen der Eichen, entblättert ſie oft ganz und verpuppt ſich zwiſchen verſponnenen Blättern.

‡* *T. Bergmanniāna* L. Goldgelber Wickler. Vorderflügel auf goldgelbem Grunde mit dunkeln Stäubchen und Querlinien, am Vorderrande und vor den Franſen orangefarbig, Flügelfläche mit 4 ſilbernen, orangefarbig geſäumten Querbinden, die 3te gabelförmig, am Vorderrande; Hinterflügel röthlichgrau; 4‴ l. u. 10‴ br. **Raupe** grau, weiß punktirt; ſchon im April mit den Blättern auf Gartenroſen erſcheinend und ſich von den Blüthenknospen nährend.

†* *T. Forskaeleāna* L. Gartenroſen-Wickler. Vdfl. auf goldgelbem Grunde ſehr fein pomeranzenfarbig gegittert, mit reingelbem Vorderrande, unter welchem eine pomeranzenfarbige Linie, und mit roſtfarbiger Mittellinie, die ſich halbmondartig zum Innenrande biegt; Htfl. matt goldgelb. **Rp.** auf Gartenroſen nicht ſelten.

‡* **38.** *Coccyx Buoliāna* F. Kieferntrieb-W., *C. turionāna* L. Kiefern-Knospen-W., *C. strobilāna* L. Tannenzapfen-W. und *C. Hercyniāna* Fichten-Neſtwickler, ſo wie *C. duplāna* Hüb. ſind an Fichten und Kiefern ſchon bedeutend ſchädlich geworden, beſonders an jungen Stämmen.

10. Motten (§. 156.). Zahlreiche, kleine Schmetterlinge, aus den kleinſten aller Raupen ſich entwickelnd und in ſelbſt geſponnenen Hüllen von Pflanzen- und Thierſtoffen lebend. §. 166.

‡* **59.** ***Tinĕa granĕlla*** L. Kornmotte, weißer Kornwurm (Fig. 98.). Kopf gelblich; Vorderflügel grau, braun und ſchwärzlich marmorirt und hinten aufgerichtet; Hinterflügel bräunlich; 3‴ lang und 7‴ breit. Das ♀ legt die Eier an Getreidekörner, die Raupe ſpinnt dann mehre Getreidekörner zuſammen, frißt dieſelben aus, überwintert in einem Geſpinnſte aus abgenagten Holzſpänchen am Gebälke auf Kornböden, verpuppt ſich im März oder April und fliegt nach 4 Wochen aus. Werden am beſten durch Backofenwärme getödtet. Auch iſt es zweckmäßig, eine dünne Lage Korn neben die großen Kornhaufen zu ſtreuen und letztere mit Tüchern zuzudecken, damit die Schmetterlinge ihre Eier hier nicht an letztere, ſondern an erſtere legen und dann mit dem Korn zugleich entfernt werden können. Schwarzer oder brauner Kornwurm (§. 139,[68]).

Fig. 98.
Kornmotte, *Tinĕa granĕlla* (§. 166.).

‡* *T. pellionĕlla* L. Pelzmotte, Haarſchabe. Kopf und Halskragen weiß, Vorderflügel ſilbergrau, in der Mitte mit 1—2 dunkelbraunen Punkten; Hinterflügel gelbweiß; 3‴ lang und 6‴ breit. Das ♀ legt meiſt im Mai ſeine Eier in Pelzwerk, Wolle, Roßhaare u. ſ. w. Die nach 14 Tagen auskriechenden Räupchen beißen die Haare am Grunde ab, wodurch die glatten Wege zwiſchen dem Pelze entſtehen. Die verdächtigen Gegenſtände werden im Frühjahre und dann wieder im Auguſt oder Anfangs September ausgeklopft, weil die Motten um dieſe Zeit ihre Futterale noch nicht befeſtigt haben. Am ſicherſten werden dieſe, wie folgende Motten durch trockne Wärme (Sonnen- od. Ofenwärme) getödtet.

‡* *T. sarcitĕlla* L. Kleidermotte. Flügel ſilbergrau, an der Wurzel zu beiden Seiten des Rückens ein weißer Punkt; 3‴ lang und 7‴ breit. Die Raupen leben in Haarfutteralen, wollenen Stoffen, Kleidern, Ueberzügen, Tapeten, Seſſeln, Betten, Pelzwerken ꝛc. Die Eier werden meiſt im Mai und Juni gelegt; nach 3 Monaten iſt die Raupe ausgewachſen, überwintert, verpuppt ſich im März oder April und fliegt nach 4 Wochen aus.

†* *T. tapetzĕlla* L. Tapeten- oder Kutſchenmotte. Kopf ſchneeweiß; Vorderflügel an der Wurzel ſchwarz, an der Spitze weiß, braun gewellt. Raupen in Pelzwerk, Tapeten, Federn, Naturalienſammlungen und vorzüglich häufig im Tuche, womit alte Kutſchen ausgeſchlagen ſind; verpuppen ſich in einer Hülle aus genannten Stoffen.

* *T. roborĕlla* Tr. Die Minirraupe. Frühjahrs häufig in Eichenblättern.

‡* **60.** ***Hyponomeuta evonymĕlla*** L. Spindelbaum-Schnauzenmotte. Vorderflügel ſchneeweiß, jeder mit etwa 50 ſchwarzen Punkten; Hinterflügel dunkelgrau; 4‴ lang und 11‴ breit. Raupe gelb, ſchwarz gefleckt; von 5—7 auf dem Spindelbaume, auf Traubenkirſchen, Birn- und Apfelbäumen; auf letztern ſchädlich; verpuppen ſich geſellig in dichtem Geſpinnſte.

‡* **61.** ***Galleria cerĕlla*** Hüb. Honig- od. Wachsſchabe. Vorderflügel aſchgrau, am Innenrande mit purpurbraunem Längsſtreife; Körper oben gelbbraun, auf dem Rücken ein ſchwarzbrauner Haarſchopf mit weißer Spitze; Vorderflügel des ♂ blaſſer und hinten eingedrückt, beim ♀ dunkler und hinten ſtumpf; 8‴ lang und 14‴ breit, ♂ etwas kleiner. Raupe lebt faſt das ganze Jahr hindurch in den Stöcken der Honigbiene von Wachs und verdirbt den ganzen Stock, wenn die angefreſſenen Wachswaben nicht ſogleich entfernt werden.

* **62.** ***Adĕla de Geerĕlla*** L. Vorderflügel faſt goldgelb, mit breiter, blau begränzter, hellgelber Mittelbinde; 3‴ lang und 9‴ breit; häufig auf Wieſen. Raupe eine Sackträgerin wie Psyche pulla (§. 161,[33]).

§. 167. **11. Federmotten** (§. 156.). Langbeinige, kleine Schmetterlinge mit geſpaltenen Flügeln.

* **63.** *Pterophorus pentadactylus* L. Fünffeder. Schneeweiß; Vorderflügel in 2, Hinterflügel in 3 Theile getheilt; 6‴ lang; gemeinste Art.

IV. Ordnung. Diptera. (Antliata F.) **Zweiflügler, Fliegen** (§. 124 b.). Zwei häutig-aderige Flügel, hinter welchen 2 gestielte Knöpfchen (Schwinger oder Schwingkölbchen, halteres, Fig. 101.) stehen; vollkommene Verwandlung. §. 168.

Nur sehr wenige Fliegen sind ganz flügellos (§§. 171 u. 173). Die mit 1—2 Schüppchen bedeckten oder nackten Schwingkölbchen, wegen ihrer sehr schnellen Schwingungen so genannt, werden als Repräsentanten der fehlenden Hinterflügel, von Einigen auch als Anhänge des Athmungssystems angesehen. Am Körper der Zweiflügler unterscheiden wir **1.** den **Kopf**, woran **a**) die Fühler, welche entweder sehr lang und vielgliedrig (Fig. 100.) oder kurz und meist 3gliedrig sind und dann am letzten Gliede (Endgliede) fast immer einen Griffel oder eine Borste entweder an der Spitze (Endborste) oder auf dem Rücken (Rückenborste) haben (Fig. 104.); **b**) das Untergesicht, die Gegend zwischen Fühlern und Munde, ist nackt oder hat einen Halbkreis von Borsten über dem Munde (Knebelbart); **c**) der Mund, welcher von der verschiedensten Bildung ist und meist aus einem großen Theils fleischigen, einziehbaren und nur zum Einsaugen von Pflanzen- und Thiersäften eingerichteten Rüssel, Saug- oder Schöpfrüssel (haustellum, Fig. 100 u. 104.) besteht. An diesem unterscheiden wir die Stechborsten und deren Futteral, welches die Unterlippe bildet. Die Fliegen haben 2, die Schweber 4, die Mücken u. s. w noch mehre Stechborsten. Diese stellen Zunge, Oberlippe, Ober- und Unterkiefer vor. Mit den feinen Spitzen der Stechborsten wird die Wunde gemacht und schnell erweitert. An der Wurzel des Rüssels sind die 1—5gliedrigen Taster eingelenkt. **d**) Die sehr großen und facettirten Augen, und meist auch noch 3 Neben- oder Punktaugen auf dem Scheitel (Fig. 104.) **2.** Den **Mittelleib**, welcher aus den 3 engverbundenen Brustringen besteht und oben Rückenschild (thorax), unten Brust (pectus) heißt. Der mittlere Theil, an welchem die Flügel sitzen, heißt Mittelrücken (mesothorax), der dahinter liegende Theil mit den Schwingern Hinterrücken (metathorax). **3.** Den **Hinterleib**, welcher oben Rücken, unten Bauch heißt. Die Füße haben immer 5 Glieder, deren letztes, das Klauenglied, 2 Klauen und zwischen diesen gewöhnlich noch 2—3 Fußballen (Fig. 99.) hat. Die Zweiflügler legen Eier, nur wenige sind lebendig gebärend, wie dies z. B. von der Fleischfliege, welche schon aus den Eiern ausgekrochene Maden an Fleischwaaren legt, allgemein bekannt ist; nur die Lausfliegen legen gleich Puppen. Die Eier sind noch sehr wenig bekannt. Die meist kopf- und beinlosen Larven (Maden), hier wie bei den Aderflüglern die eigentlichen Fresser, leben entweder in stehendem Wasser und sind dann durch zahlreiche Kiemen ausgezeichnet, oder in Pflanzentheilen, selbst im Holzkörper, so wie im Mist Aas und Auswurf der Thiere (im Kuhmist oft zu Tausenden), selten schmarotzend in andern Insekten und in deren Larven, aber dann immer nur innerhalb der lebenden Insekten sich verpuppend, nie außerhalb (wie einige Schlupfwespen). Die Larven häuten sich bei der Verpuppung meist nicht, sondern die Larvenhaut schrumpft zusammen, erhärtet und nimmt die Gestalt eines Eies an (Tonnenpuppe), von welchem das Insekt den vordersten Theil wie einen Deckel absprengt und hervorkriecht. Das Summen mancher Arten wird entweder durch die aus den Luftlöchern des Körpers strömende Luft (nach Burmeister) oder durch die schwingenden und knitternden Bewegungen der Häute des Rumpfes (nach Erichson) hervorgebracht.

Fig. 99. Klauenglied mit den Fußballen von der Stubenfliege (§. 170, 22).

Die Zweiflügler haben am Ende des Körpers keinen Stachel; viele stechen aber mit dem Rüssel und sind zumal in heißen Ländern durch ihre Menge, starke Vermehrung (Seite 133) und Zudringlichkeit, so wie durch ihre Blutgier



Fig. 100.

Mundtheile von der Stechmücke (*Culex*, §. 170.).

A. Männchen: a Fühler 14gliedrig (die 2 letzten Glieder länger), langhaarig, federbuschförmig, auf warzenförmiger Erhöhung vor den mondförmigen Netzaugen stehend (beim ♀ alle Glieder gleich lang, und nur kurz behaart, nicht federbuschförmig).
b Taster länger als der Rüssel.
c Lippe.

B Weibchen: b Taster weit kürzer als der Rüssel.
c Lippen fleischig, vorn mit zweitheiligem Knopfe.
d Lefze hornartig, mit einer Rinne zur Aufnahme der Zunge.
e Zwei lange Stechborsten an der Wurzel der Lefze.

die lästigsten aller Insekten (Stechmücken, Kriebelmücken, Blindbremen, Flöhe); viele verderben unsere Fleischwaaren durch die daran gelegten Eier oder unsere Gemüsepflanzen (§. 123, c.) oder schaden durch Gallen, welche sie an Pflanzen verursachen (Gallmücken §. 170, 3). Daß indeß der bekannte Milzbrand des Rindviehs durch Fliegen fortgepflanzt werde, ist behauptet, aber nicht erwiesen. Mehre Diptern dagegen nützen durch Beförderung der Auflösung faulender Stoffe (Gemeinfliegen [musca], Dung- und Fleischfliegen), so wie durch Vertilgung schädlicher Insekten. Die Schnepfenfliegen und Raubfliegen z. B. leben vom Insektenraube; die Larven der Schwebfliegen sind die größten Feinde der Blattläuse; viele Raupenfliegen legen ihre Eier in Schmetterlingsraupen u. s. w. Man kennt über 7000 Arten, von denen Meigen nahe an 5000 europäische Arten beschrieb (§. 122.).

§. 169. Uebersicht der 4 Familien und deren vorzüglichsten Gattungen.

I. Proboscidea. Rüsselfliegen. Ein Schöpfrüssel mit fleischiger Lippe und mit Tastern; Brust häutig; Beine in gewöhnlicher Stellung, am Grunde dicht bei einander.

1) Mücken. Geflügelt; Fühler meist viel länger als der Kopf, 6—24gliedrig; Schwinger unbedeckt.

- Kopf nicht schnauzenförmig verlängert
  - Fühler des ♂ federbuschförmig, des ♀ kurzborstig
    - Rüssel länger als die 14gliedrigen Fühler; diese beim ♂ stark buschig. — **Stechmücke** (Fig. 100.) ..... 1) *Culex* L.
    - Rüssel kürzer als die 13gliedrigen Fühler; die Grundglieder beim ♂ abwärts mit langen Haaren (Barte). — **Bartmücke** .. 2) *Ceratopogon* M.
  - Fühler bei ♂ und ♀ fast gleich, höchstens quirlförmig behaart
    - Fühler vielmal länger als der Kopf
      - Flügel mit zwei bis drei Längsnerven, gleichmäßig behaart. — **Gallmücke** ..... 3) *Cecidomyia* M.
      - Flügel mit vielen Längsnerven; die Behaarung Flecken bildend. — **Schmetterlingsmücke** ..... 4) *Psychoda* Latr.
    - F. etwa nur von doppelter Kopflänge u. walzig
      - keine Punktaugen; Fühler 11gliedrig. — **Kriebelmücke** . 5) *Simulia* M.
      - drei Punktaugen; Fühler 9gliedrig. — **Haarmücke** ..... 6) *Bibio* Geoffr.
- Kopf schnauzenförmig verlängert
  - Taster 4gliedrig, alle Glieder gleichlang. — **Wiesenmücke** ..... 7) *Limnobia* M.
  - Taster 4gliedrig, letztes Glied viel länger. — **Bachmücke** ..... 8) *Tipula* L.

2) Flöhe. Ungeflügelt; Fühler sehr kurz, versteckt; Saugrüssel am Grunde mit 2 Schuppen; Körper zusammengedrückt; starke Springbeine. — **Floh** (Fig. 102.) .. 9) *Pulex* L.

3) Fliegen. Geflügelt; Fühler kurz, meist nur 3gliederig, deren Endglied mit einem Griffel oder einer Borste am Ende oder am Grunde (Rückenborste Fig. 103.). S. 169.

a. **Endglied der Fühler nicht geringelt.**

- Endglied ohne Rückenborste, aber am Ende mit oder ohne Borste oder Griffel
  - Körper gestreckt (wie bei Mücken)
    - Fühler ziemlich lang; Glieder sehr ungleich
      - Untergesicht borstig
        - Endglied pfriemlich, mit borstenförmigem Endgriffel — **Raubfliege** 10) *Asilus* L.
        - Endglied mit 2gliederigem Endgriffel. — — **Habichtsfliege** 11) *Dioctria* F.
      - Untergesicht nicht borstig; Endgriffel 2gliederig
        - Rüssel an der Wurzel geknickt, nach vorn gerichtet. — **Dickkopffliege** 12) *Conops* L.
        - Rüssel nicht geknickt, nach unten gerichtet — — **Schnepfenfliege** 13) *Empis* L.
    - Fühler kurz, alle Glieder fast gleichlang; Endglied kegelförmig, mit langer Endborste. — **Tanzfliege** 14) *Leptis* F.
  - Körper gedrungen (wie bei Stubenfliegen), dicht behaart; Flügel dunkel, scheckig
    - Rüssel lang vorgestreckt; Hinterleib eirund. — **Schwebfliege** 15) *Bombylius* L.
    - Rüssel eingezogen oder nur kurz vorstehend; Hinterleib länglich. — **Trauerfliege** 16) *Anthrax* F.
- Endglied mit einer Rückenborste
  - Rücken oben mit deutlicher Quernaht vor den Flügeln; Oberlippe an der Spitze nicht ausgerandet
    - Flügel mit einer Querader in der Spitze
      - Mund mit Knebelbart
        - Hinterleib walzig. — **Walzenfliege** 17) *Ocyptera* M.
        - Hinterleib nicht walzig
          - R. gefiedert
            - Rückenborste nackt. — **Naupenfliege** 18) *Tachina* M.
            - Rüssel schlank, dünn, wagerecht vorstehend, länger als der Kopf. — — **Stechfliege** 19) *Stomoxys*.
          - R. dick, fleischig, in d. weite Mundhöhle ganz zurückziehbar
            - Rückenborste an der Spitze nackt. — — **Fleischfl.** 20) *Sarcophaga* M.
            - Rückenb. bis zur Spitze gefiedert. **Gemeinfliege** (Fig. 103.) 21) *Musca* L.
      - Mund ohne Knebelbart; Hinterleib fast kugelig. — **Kugelfliege** 22) *Gymnosoma* M.
    - Flügel ohne Querader in der Spitze
      - Mund nackt. — **Nacktfliege** 23) *Peila* M.
      - Mund mit Knebelbart
        - Hinterleib 4 ringelig. — **Blumenfliege** 24) *Anthomyia* M.
        - Hinterleib 5 ringelig
          - Endglied der Fühler elliptisch, mit nackter Rückenborste. — — **Käsefliege** 25) *Piophila*.
          - Endglied verlängert, prismatisch, stumpf, mit nackter oder gefiederter Rückenborste — **Dungfliege** 26) *Scatophaga* Latr.
  - Rücken ohne Quernaht; Oberlippe an der Spitze immer ausgerandet
    - Rückenborste nackt; Hinterschenkel verdickt
      - Endglieder der Fühler kreisrund; Hinterleib linsenförmig. — **Tägefliege** 27) *Xylota* M.
      - Endglieder länglich; Hinterleib länglich. — **Schenkelfliege** 28) *Merodon* M.
    - Rückenborste haarig; Hinterschenkel nicht verdickt
      - Untergesicht etwas verlängert; Beine stark; Hinterleib kugelig (♂) oder eirund-länglich (♀). — — **Schlammfliege** (Fig. 104.) 29) *Eristalis* F
      - Untergesicht unter den Fühlern etwas eingedrückt, über dem Munde mit einem Höcker; Beine dünn; Hinterleib verschieden, meist flach. — — **Schwebfliege** 30) *Syrphus* F.
- Rüssel dick, fleischig
  - Rüssel im kleinen Munde versteckt
    - Flügel mit einer Querader in der Spitze; Schwinger mit Doppelschüppchen. — **Bremse** 31) *Oestrus* L.
    - Flügel ohne Querader; Schwinger unbedeckt. — **Bremsfliege** 32) *Gastrus* M.

b. **Endglied der Fühler geringelt.**

- Schildchen am Hinterrande mit 2 Stacheln; Endglied 5ringelig. — **Waffenfliege** ..... 33) *Stratiömys* Geoff.
- Schildchen ohne Stacheln
  - drei Punktaugen; die 2 ersten Fühlerglieder gleich lang. — **Blindbreme** ..... 34) *Chrysops* M.
  - keine Punktaugen, zweites Fühlerglied das kleinste
    - Endglied flach, an der Wurzel ausgeschnitten, 5ringelig. — — **Viehbreme** ..... 35) *Tabānus* L.
    - Endglied pfriemlich, 3ringelig. — **Regenbreme** ..... 36) *Haematopŏta* M.

II. Eprobòsciděa. Rüssellose, Parisiten.

Rüssel kein Schöpfrüssel, sondern nur aus einer zweiklappigen Scheide bestehend, zwischen welcher die hornartige Zunge liegt; Lippen und Taster fehlen; Brust lederartig; Hüftglieder der Mittelbeine weit von einander entfernt.

4) Lausfliegen. Fühler sehr klein, meist nur höckerförmig; Körper breit und flach.

- Flügel breit, länger als der Hinterleib; keine Punktaugen. — **Pferdelausfliege** ..... 37) *Hippobŏsca* L.
- Keine Flügel und keine Punktaugen. — **Schaflaus** ..... 38) *Melophăgus* Latr.

§. 170. **1. Mücken** (Nematocĕra). §. 169. Die Larven der Stechmücken leben im Wasser, die der Gallmücken in Pflanzengallen, der Wiesen- und Bachmücken in der Erde, der Kriebelmücken im Miste.

†* **1.** ***Culex pipiens*** L. Gemeine Stechmücke (Fig. 100.). Halsschild gelbbraun, mit 2 dunklern Längslinien; Hinterleib grau, weißgeringelt; Beine blaß; 3‴; häufig und lästig durch ihr Stechen und Singen, besonders wenn sie zur Zeit der Begattung in der Luft tanzend große Säulenwolken bilden. Saugen Blut und Pflanzensäfte; nur die ♀ stechen, lassen einen flüssigen Saft durch den Rüssel in die Wunde fließen (wie wir auch bei Stubenfliegen, wenn sie Zucker lecken wollen, diesen erst durch einen Saft aus dem Rüssel erweichen sehen), u. verursachen bei uns nur dann Entzündung der Haut, wenn beim plötzlichen Fortjagen der Mücke die abbrechenden Spitzen der Stechborsten in der Haut stecken bleiben. Das ♀ legt 4—6mal im Jahre etwa 300 Eier in stehende Gewässer, in welchen die Larven, eine Lieblingsspeise der Schwalben und vieler Wasserthiere, bis zur völligen Ausbildung leben. In der Nähe der Gewässer vorzüglich häufig. — Einige Stechmückenarten sind in heißen Ländern, weil bei starker Hitze leichter Entzündung entsteht, eine sehr gefährliche Plage und unter dem Namen Mosquītos allgemein bekannt. Man versteht indeß darunter nicht nur eigentliche Stechmücken, wie die blauflüglige Stechmücke, die Amazonen-Stechmücke u. s. w., sondern auch einige Kriebelmücken u. s. w. In Südeuropa hält man die Stechmücken durch Netze, in heißen Ländern auch durch Feuer, Räuchern, so wie dadurch ab, daß man sich auf Stühlen mit Wiegenbeinen beständig bewegt.

* **2.** ***Ceratopōgon commūnis*** F. Gemeine Bartmücke. Tief schwarz; Schwinger weiß; Flügel glasartig; Beine pechfarbig; 1 — $1\frac{1}{4}$‴; häufig und lästig. — Hierher gehört auch die Floh-Bartmücke, Gnitzen oder Grieben genannt (*C.* ***pulicāris*** L.), nur 1‴ groß, in Lappland die Menschen oft legionenweise anfallend, in Mund und Nase kriechend, ohne daß man sie durch Blasen oder Abwehren mit Händen zurückhalten kann.

‡* **3.** ***Cecidomyĭa pini.*** Kiefern- oder Harz-Gallmücke. Schwarzbraun, mit silberweißen Beinen; 1‴. Die Larve lebt in dem Vereinigungspunkte der Kiefernadeln und bewirkt deren Absterben. *C. loti* bewirkt am Schotenklee Gallen und *C.* ***juniperīna*** an jungen Wachholdersprossen. Diese Wachholdergallen nennen die Landleute Kiekbeeren und gebrauchten sie früher gegen Husten.

* *C.* ***fagi*** Htg. Buchen-Gallmücke. Erzeugt die kegelförmigen Gallen auf Buchenblättern.

* *C.* ***pyri.*** Birnenmücke. Drehet an Birnbäumen die Blätter zusammen,

wie die Wickler unter den Schmetterlingen. Die Larve von *C. salicina* lebt in den länglichen Anschwellungen der Weidentriebe.

* **4.** ***Psychoda phalaenoides*** L. Gemeine Schmetterlingsmücke. Bräunlichgrau; Flügel niederhängend, mit einigen verloschenen Flecken und dunklen Randpunkten; $1\frac{1}{2}$‴; häufig an Abtrittswänden.

†* **5.** ***Simulia reptans*** L. Gemeine Kriebelmücke. Rückenschild schwarzblau, weiß gerandet; Hinterleib schwarzbraun; Schienen weiß; Vorderbeine tief schwarz, Flügel schön irisirend; Schwinger gelb; 1‴. Frühlings in Wäldern häufig und dadurch besonders lästig, daß sie an den empfindlichsten Theilen (Nasenlöchern u. s. w.) sticht.

‡ ***S. maculata*** M. Columbatzscher Mücke. (Fig. 101.). Berüchtigt durch die außerordentliche Menge, in welcher sie, vorzüglich in Serbien beim Dorfe Columbatz am rechten Donauufer, im Mai und August in Wäldern über Menschen und Thiere herfallen, so daß dadurch Entzündungsfieber, Krämpfe, ja der Tod selbst herbeigeführt wird.

Fig. 101.
Columbatzscher Mücke (*Simulia maculata* T. 170, 5).

†* **6.** ***Bibio Marci*** L. Marcus-Haarmücke. Glänzend schwarz, stark behaart; Flügel mit dunklem Vorderrande und weiß (♂) oder braun (♀); 5 — 6‴; häufig.

B. Johannis L. Johannis-H. Schwarzbraun, schwarz behaart; Flügel bräunlich, mit schwärzlichem Randmahle; Beine rostgelb mit braunen Schenkeln (♂), oder ganz rostgelb (♀); nur 2‴; häufig. Die Fliegen beider Arten erscheinen zur Zeit der Obstblüthen. Die Larven leben im Miste und zerstören in Mistbeeten viele Pflanzenwurzeln.

‡* ***B. hortulanus*** L. Garten-H. Schwarz, weiß behaart (♂) oder Rücken und Hinterleib gelbroth (♀); 3‴; häufig. Larve an Knollengewächsen in Gärten höchst schädlich.

* **7.** ***Limnobia nubeculosa*** M. Wolkige Wiesenmücke oder Schnake. Rückenschild gelblich, mit 3 schwarzen Striemen; Hinterleib braun, mit gelben Einschnitten; Flügel braun gewölkt; Schenkel gelb, mit 3 braunen Ringen; 4‴; häufig auf Wiesen.

* ***L. punctata*** M. Punktirte W. Grau; Flügel mit braunen Ringen, Flecken und Punkten; Fühler und Beine braun; 6 — 7‴; daselbst häufig.

†* **8.** ***Tipula pratensis*** L. Wiesen-, Bach- od. Pferdemücke. Rückenschild schwarz, hellgelb gefleckt; Hinterleib schwärzlich, mit gelben Seitenflecken; 7 — 9‴; häufig.

‡* ***T. oleracea*** L. Gemüse- oder Wiesenschnake. Rückenschild grau, mit braunen Striemen; Hinterleib hellbräunlich; Flügel bräunlich, mit graubraunem Vorderrande; 6 — 10‴; sehr häufig. Die Larve frißt nur faulende Pflanzen, lockert aber die Erde um die Wurzeln so auf, daß große Plätze auf Wiesen gelb werden.

In diese Abtheilung gehören auch die Thierchen, deren zusammengewickelten Larven als Heerwurm berüchtigt sind. Nach Berthold's Untersuchungen sind es die Larven der schwarzen Trauermücke (Sciara Thomae), nach Ludw. Bechstein's neuesten Werkchen die Larven einer verwandten Mückenart.

‡* **2. Flöhe.** (Pulicina) §. 169. Die Maden leben in faulenden Sägespänen, im Miste, Holzmulm u. s. w., kriechen nach 11 Tagen aus den Puppen und schmarotzen darauf an Säugethieren und Vögeln. Sie können ihre Länge einige 100mal abspringen. §. 171.

9. ***Pulex irritans*** L. Gemeiner Floh. Pechbraun; Kopf glänzend, glatt; Beine blasser; 1‴. Entwischt durch Behendigkeit und Schnelligkeit oft allen Nachstellungen seiner Wirthe, der Menschen. Kann leicht durch den Geruch des Floh- od. persischen Insektenpulvers getödtet werden, welches aus zerriebenen Samen von einer, der Mutterkamille ähnlichen Pflanze (Pyre-



Fig. 102.

A. Floh des Igel (*Pulex erinacei*). Zwölfmal vergrößert. Hellbraun und ausgezeichnet durch den dünnen, schlanken Brustkasten.

B. Kopf des gemeinen Flohes.

a Einfaches Auge, hinter welchem der kleine Fühler unter einem, von den Backen ausgehenden Fortsatze verborgen liegt, der abgebrochen werden muß, wenn man den Fühler sehen will.

b Zwei 4gliedrige, früher für Fühler gehaltene Taster.

c Zwei lanzettförmige Scheidenblätter, welche sich zu einer 4gliedrigen Röhre zusammenlegen und

d den hohlen, glatten Saugstachel einschließen.

e Zwei kürzere Scheidenblättern.

thrum carneum) besteht und vom kaukasischen Isthmus jetzt bei uns in Handel gekommen ist.

† *P. penétrans* L. Sandfloh, Chique. Saugrüssel von Körperlänge; sehr klein. Kann glücklicher Weise ungeachtet der verdickten Hinterschenkel nicht springen. Im Sande der amerikanischen Baumwollepflanzungen. Bohrt sich vorzüglich in die Fußhaut der barfuß gehenden Sklaven, wo dann der Hinterleib des ♀ zu einem erbsengroßen Eiersacke anschwillt und dadurch höhsartige Geschwüre verursacht, wenn er nicht frühzeitig mit einer Nadelspitze herausgezogen wird.

§. 172. **3. Fliegen** (Brachicĕra). §. 169. Larven sehr verschieden in Bildung und Lebensart, entweder mit 4 Luftlöchern zum Athmen und die Puppenhaut abstreifend, oder kopf- und beinlos, mit 2 Luftlöchern oder mit schwanzförmiger Athemröhre und sich in der alten Larvenhaut verpuppend.

* **10.** *Asĭlus germanĭcus* L. Deutsche Raubfliege. Rückenschild aschgrau, mit schwarzer Strieme; Hinterleib schwarz; erste Fußglieder und Mitte der Schienen roth; Knebelbart oben schwarz, unten rothgelb; Flügel mit rostgelber Randader, braungrau (♀), an der Wurzel weiß (♂); 7 — 8‴; sehr häufig. Leben wie die folgenden Habichts- und Schnepfenfliegen vom Raube anderer Insekten, namentlich auch von Borkenkäfern, besonders aber von Mücken; sind deshalb nützlich.

* **11.** *Dioctria rufĭpes*. Rothbeinige Habichtsfliege. Schwarz; Beine rothgelb, die hintern braun; Untergesicht messinggelb; Flügel glasartig; 6 — 7‴; sehr häufig.

* *D. oelandĭca* L. Fast ebenso, aber Flügel rußigbraun; 7‴; häufig.

* **12.** *Conops flavĭpes* L. Gelbbeinige Dickkopffliege. Schwarz; Hinterleib mit 2 (♂) oder 3 (♀) gelben Binden; Beine gelb; Schenkelspitzen schwarz; 5‴; nicht selten. Die Larven leben als Schmarotzer vorzüglich in bienenartigen Aderflüglern.

* **13.** *Empis tessellāta* F. Gewürfelte Schnepfenfliege. Rückenschild grau, mit 3 schwarzen Striemen; Hinterleib grau, Rückenlinie und Einschnitte schwarz; Hinterbeine verlängert; Flügel braun, mit rostgelber Wurzel; 5 — 6‴; häufig.

* **14.** *Leptis scolopacĕa* L. Schnepfen-Tanzfliege. Rückenschild schiefergrau, mit 3 bräunlichen Striemen; Beine und Hinterleib rostgelb, letzterer mit einer Reihe schwarzer Rückenflecken; Flügel braunwolkig; 6 — 7‴; häufig.

* *L. tringaria* L. Wie Vorhergehende, aber Hinterleibsspitze schwarz; Flügel ungefleckt. Die Larven dieser Gattung leben vielleicht häufig in andern Insekten. §. 172.

* **15.** *Bombylius medius* L. Mittlerer Wollschweber od. Schwebfliege. Rothgelbhaarig; Hinterleib nach hinten schwarz; Flügel mit braunen Punkten; 5‴; nicht selten; saugt, wie die übrigen Arten, Blumensäfte.

* **16.** *Anthrax semiatra.* Halbschwarzer Trauerschweber oder Trauerfliege. Tiefschwarz; Brust und Hinterleib an den Seiten rothgelbhaarig; Flügel an der Wurzelhälfte schwarz; 2 — 5‴; nicht selten.

†* **17.** *Ocyptera brassicaria* F. Kohl-Walzenfliege. Hinterleib rothgelb, Wurzel und Spitze schwarz; Rückenschild aschgrau, mit 4 schwarzen Striemen; Flügel mit rostgelber Wurzel; 5 — 6‴; häufig; Larve in den Wurzeln des Gartenkohls und anderer Pflanzen.

18. *Tachina.* Raupenfliege. Eine der größten und wichtigsten Gattungen (über 350 Europäer), deren Larven als Schmarotzer in andern Insektenlarven, vorzüglich der Schmetterlinge und Aderflügler leben und so wie die Schlupfwespen viele schädliche Insekten vertilgen. Sie stechen aber nur kranke Insekten an und die meisten gehen eben so gern auf faulende Pflanzen.

* *T. grossa* L. Große Raupenfliege. Glänzend schwarz; Kopf und Flügelwurzel rothgelb; Schüppchen braun; 8‴; häufig.

* *T. fera* L. Gemeine R. Hinterleib durchscheinend rostgelb, mit schwarzer Rückenstrieme; Fühler und Beine rostgelb, Schenkel des ♂ mit schwarzer Wurzel; 6‴; gemeinste Art.

†* **19.** *Stomoxys calcitrans* L. Gemeine Stechfliege, Wadenstecher. Grau; Hinterleib schwarz gefleckt; Taster gelb; 3‴; durch ihre schmerzhaften Stiche als Plage für Menschen und Vieh überall bekannt. Sie kommt nur, wenn es regnen will in die Häuser; setzt sich gern an die Beine, weshalb das Weidevieh dann auch so unruhig wird und stampft.

‡* **20.** *Sarcophaga carnaria* L. Graue Fleischfliege od. Schmeißfliege. Grauweißlich; Hinterleib schwarz gewürfelt; Kopf gelblich; ♂ mit schwarzem After; 7‴; gemeinste Art. Starke Vermehrung (S. 133.).

†* *S. haemorrhoidalis.* Wie Vorhergehende, aber Würfelflecken schwarzbraun; After blutroth; 5 — 6‴; sehr häufig.

Auch die früher so berüchtigten Leichenwürmer kommen von einer Fleischfliege (*S. mortuorum* L.), welche ihre Eier gern an menschliche Leichen legt, wenn sie in offenen Gewölben beigesetzt werden.

†* **21.** *Musca domestica* L. Stubenfliege. Aschgrau; Untergesicht gelb; Rückenschild mit 4 schwarzen Striemen; Hinterleib schwarz gewürfelt; Bauch blaßgelb; 3‴; überall in Häusern die häufigste Art und weit verbreitet, auch am Kap, in Surinam ꝛc. Saugt kein Blut (§. 18. B.) und ist nur durch ihre Zudringlichkeit und das Beschmutzen aller Gegenstände sehr lästig. Durch die Fußkrallen (Fig. 99.) u. eine Feuchtigkeit, welche sie aus den Fußballen schwitzen, halten sie sich an glatten Körpern fest. Larven im Miste und oft auch in Speisekasten, weshalb Kranke wohl schon geglaubt haben, sie speien Würmer aus. Vertilgung durch Fliegenstein (III. §. 99.) mit etwas Zucker in warmem Wasser aufgelöset.



A B

Fig. 103.

A Schmeißfliege (*Musca vomitoria* §. 172, 21.)

B Kopf der Schmeißfliege. Endglied des Fühlers mit einer Rückenborste.

†* *M. rudis* F. Rückenschild mit bräunlichem Filze; Hinterleib aschgrau, schwarz gewürfelt; Spitzenquerader im Flügel gebogen; 2—4‴; daselbst oft eben so häufig.

†* *M. vomitoria* L. Brechfliege, Brummer, Schmeißfliege (Fig. 103.). Kopf schwarz; Rückenschild mit 4 Längslinien; Hinterleib glänzend blau, weiß schillernd, mit schwärzlichen Fleckenbinden; Taster rostgelb; Flügelschüppchen schwarzbraun, weiß gerandet; 5—6‴. Summt stark und soll das Genossene leicht wieder aus-

§. 172. brechen können. Die gemeinste Schmeißfliege und kaum abzuhalten vom Legen der Eier (Schmeißen) an frische Fleischwaaren. Befördert die Auflösung faulender Thierkörper durch ihre starke Vermehrung (S. 133.). In Frankreich erzieht man absichtlich die Maden und verkauft sie zum Fischfange und als Fasanenfutter.

* *M. Caesar* L. Goldfliege. Glänzend goldgrün; Taster rostgelb; Backen weiß; Flügel am Vorderrande röthlichbraun; 4‴; sehr häufig.

* **22.** *Gymnosōma rotundāta* L. Runde Kugelfliege. Hinterleib rostgelb, mit schwarzen Rückenflecken; Rückenschild rothgelb, hinten mit schwarzer Binde (♂) oder schwarz mit weißlichen Seiten (♀); 4‴; häufigste Art.

†* **23.** *Psila rosae* F. Rosen-Nacktfliege. Schwarz; Kopf und Beine gelb; 2‴; Larve in Gängen der Wurzeln von Möhren, deren Kraut dann gelb wird. Wegen der gelben Farbe der Larven nennt man solche Möhren eisenmadige.

* **24.** *Anthomyĭa lardarĭa* F. Fleisch-Blumenfliege. Glänzend bläulich; Rückenschild mit 4 schwarzen Striemen; Hinterleib eirund, mit schwarzer Rückenlinie, schwarz gewürfelt schillernd; Beine schwarz; 5‴; häufig.

* *A. meteorĭca* L. Gewitterfliege. Rückenschild schwarz; Hinterleib eirund, schwarzbraun, aschgrau schillernd, mit schwarzer Rückenlinie; Vorderschenkel an der Spitze mit 2 Dornen (♂); oder dunkelgrau; Rückenschild mit schwarzen Striemen; Beine ohne Dornen (♀); 3‴; vorzüglich häufig u. lästig in Wäldern.

* *A. pallĭda* F. Ueberall rostgelb; Füße braun; 3‴; häufig.

†* *A. cepārum.* Zwiebelfliege. Hat schon ganze Zwiebeiernbten verdorben, indem sie die Eier in die aus der Erde hervorstehende Theile legt, von wo aus die Maden (Zwiebelmaden) sich dann tiefer in die Zwiebeln einbohren und deren Trockenwerden verursachen.

†* *A. brassĭcae.* Kohlfliege. Larven häufig in Wurzeln u. Stengeln von Kohlarten. Die welk werdenden Pflanzen müssen aufgezogen u. die Maden getödtet werden.

†* *A. lactucārum.* Lattichfliege. Die Larven zerstören den Samen in den Blüthen der Salatarten, vorzüglich des Kopfsalats, so wie die Larven von *A. radĭcum* (Radieschenfliege) die Wurzeln der Radieschen vernichten.

†* **25.** *Piophĭla casĕi* L. Gemeine Käsefliege. Glänzend schwarz; Untergesicht, Fühler und Beine rothgelb; Vorderbeine und ein Ring um die Hinterschenkel schwarz; $1\frac{1}{2}$‴. Die Larven springen, leben in Käse (Käsemaden oder Käsewürmer) und Fettwaaren; die Fliegen sind nur durch Netze abzuhalten.

* **26.** *Scatophăga stercorarĭa* L. Mist-Dungfliege. Fühler schwarz, mit gefiederter Borste; Hinterleib mit rothgelben (♂) oder weißgelben (♀) Haaren; Beine rostgelb; Flügel mit schwarzem Mittelpunkte; 4‴; vorzüglich häufig auf Menschenkoth, worin auch die Larven leben.

* *S. merdarĭa* F. Koth-Dungfliege. Fühler und Flügel wie bei voriger Art; Körper aschgrau; Schienen röthlich; 3‴; häufig.

* *S. furcāta.* Schildchenspitze mit 2 langen Borsten; $3\frac{1}{2}$‴; sehr häufig.

* **27.** *Xylōta pipĭens* L. Gemeine Sägefliege. Hinterleib schwarz, mit gelben (♂) oder weißen (♀) Seitenflecken; Hinterschenkel schwarz, mit rothgelber Binde; 4‴; gemein.

† **28.** *Merŏdon narcīssi* F. Narcissen-Schenkelfliege. Metallisch grün, mit rostgelbem Pelze; Beine schwarz; 6‴; Süddeutschland, wo die Larve das Herz der Narcissenzwiebeln ausfrißt, wodurch diese faulen.

* **29.** *Eristălis tenax* L. Zähe Schlammfliege (Fig. 104.). Fühlerborste kahl; Rückenschild gelblich grauhaarig; Hinterleib schwarz, mit gelblichen Einschnitten; auf dem zweiten Ringe eine breite, auf dem dritten eine schmälere, gelbe Binde, erstere in der Mitte unterbrochen und beim ♀ undeutlich; Beine braun, Knie mehr oder weniger weißlich; 7‴; häufigste Art; wilde Biene von Unkundigen genannt. Larven wie bei folgenden Arten in Koth, Pfützen ꝛc.; Puppen (Tönnchen) mit schwanzförmig verlängertem Athemrohre am Ende des Körpers (Rattenschwanzmaden). Zähe (*tenax*) nennt man die Fliege, weil die Larven nach Geoffroy's Angabe auch in der Papiermasse der Papiermühlen einst

Fig. 104. §. 172.



Zähe Schlammfliege (*Eristalis tenax* ♀. §. 172,29) nebst vergrößerten Kopftheilen.

A. Dreigliedriger Fühler mit nackter Rückenborste am Grunde, das letzte Glied viel größer.
B. Untergesicht verlängert, unten mit einem Höcker.
C. Mund mit fleischiger, lang vorgestreckter Lippe, welche am Ende einen zweitheiligen, haarigen Knopf hat.
b Lefze hornartig, an der Spitze ausgerandet.
c Zunge hornartig, spitz, von Länge der Lefze.
d Taster, feinhaarig.
e Kinnbacken
D. Fliege in natürlicher Größe., Weibchen: an den nicht zusammenstoßenden, sondern durch die breite Stirnnaht getrennten Augen vom Männchen unterschieden.

unversehrt geblieben sein sollen, obgleich die Stampfen beständig wirkten und die Masse mit den Larven herumtrieben.

* *E. intricarius* L. Fühlerborste gefiedert, wie bei allen folgenden; schwarz, mit rothgelben, am After weißlichen Haaren; Schildchen gelb; 6‴; häufig.

* *E. arbustorum* L. Garten-Schlammfliege. Rückenschild rothgelbhaarig; Hinterleib schwarz, mit weißlichen oder gelblichen Einschnitten, an der Wurzel mit rothgelben Seitenflecken; 5‴; häufig.

* *E. florëus* L. Blumen-Schlammfliege. Rückenschild rostgelb, mit schwarzen Binden; Hinterleib schwarz, mit 3 rothgelben in der Mitte unterbrochenen Binden; 6‴; häufig.

* **30.** *Syrphus pyrasti* L. Birnbaum-Schweb- od. Blattlausfliege. Hinterleib schwarzblau, mit 3 Paar weißlichen Mondflecken; 6‴; häufig. Die zwischen Blattläusen und von Blattläusen lebenden Larven dieser artenreichen Gattung sind sehr nützlich. Eine Larve kann in einer halben Stunde an 30 Blattläuse aussaugen.

* *S. ribesii* L. Johannisbeer-Schwebfliege. Schildchen gelb; Hinterleib schwarz, mit 4 gelben, hinten ausgerandeten Binden, nur die erste unterbrochen; Beine rothgelb; 5‴; häufig; Larven auf Johannisbeersträuchen.

* *S. balteātus.* Gürtel-Schwebfliege. Ebenso, aber jede der 3 letzten Binden durch einen schwarzen Querstrich getheilt; 5‴; häufig.

* *S. taeniātus* M. Band-Sch. Rückenschild schwarzgrün, gelb gerandet; Schildchen gelb; Hinterleib sehr schmal, schwarz, mit gelben, nicht unterbrochenen Binden, nur die vierte durch einen schwarzen Längsstrich getheilt; 4‴; häufig.

†* **31.** *Oestrus ovis* L. Schafbremse, -Dasselfliege od. -Biesfliege. Fast nackt; Hinterleib weiß, mit tiefschwarzen, unregelmäßigen Schillerflecken. Die Eier werden den Schafen an die Nase gelegt (Nasenbremse), und die ausschlüpfenden Larven kriechen von hier in die Stirnhöhle und sollen die sogenannte Drehkrankheit verursachen, die aber weit häufiger von einem Eingeweidewurm, der [redacted]rnquese (§. 218.), bewirkt wird.

†* *O. bovis* L. [redacted]nderbremse. Schwarz; Rückenschild mit 3 Furchen, vorn rothgelb-, hinten schwarzhaarig; Hinterleib an der Wurzel grau-, am After gelbhaarig; 6‴; das ♀ legt durch einen Stich, meist in die Rückenhaut des Rindviehes, so wie der Hirsche und Rehe ein Ei ab, wodurch eine große Eiterbeule (Dasselbeule) entsteht, worin die Larve (Engerling) gegen Ende Mai ausgewachsen ist, dann herausfällt und sich in der Erde in eine Nymphe verwandelt, woraus nach einigen Wochen sich die Bremse entwickelt. Schon das Bieſen dieser Fliegen setzt das Vieh in Schrecken und treibt es in die Flucht.

O. tarandi L. Rennthierbremse, lebt in der Haut des Rennthiers.

†* **32.** *Gastrus equi* F. Pferdebremsfliege. Rostgelb; Flügel weißlich,

eine Querbinde und 2 Flecken an der Spitze braun; 5‴. Das ♀ legt die Eier den Pferden und dem Rindviehe an die Vorderschenkel, wo die ausgekrochenen Larven abgeleckt und heruntergeschluckt werden, und dann im Magen bis Ende August ihre völlige Größe erreichen, durch den Mastdarm herauskriechen oder mit dem Unrathe herausgeworfen werden und sich in der Erde zu einer Nymphe verwandeln, aus welcher sich die Fliege entwickelt.

†* *G. haemorrhoidālis* F. After- oder Mastdarmbremse. Legt die Eier dem Pferde gleich an die Lippen, von wo die Larven gleich in den Mastdarm gelangen.

* **33.** *Stratiōmys chamaelĕon* L. Gemeine Waffenfliege. Schwarz; Schildchen und eine unterbrochene Binde des Hinterleibes gelb; unten gelb mit schwarzen Querstreifen; 7‴; häufig.

* *St. hydrolĕon* L. Wasser-Waffenfliege. Hinterleib grün, mit schwarzer, an den Seiten winkliger, breiter Rückenstrieme; 4—5‴; häufig.

†* **34.** *Chrysops caecutiens* L. Gemeine Blindbreme. Hinterleib, Beine und Fühler schwarz; Hinterleib am Grunde mit rothgelbem Seitenflecke (♂) oder mit gelbem Grunde, worin 2 schiefe, schwarze Linien; 4‴; häufig und sehr lästig; lassen sich, wenn sie angefangen haben zu saugen, fangen ohne fortzufliegen (blinde Fliege).

†* **35.** *Tabānus bovīnus* L. Rindsbreme. Schwarzbraun; Hinterleibsringe mit gelber Spitze; Rücken mit weißen, dreieckigen Flecken; Schienen gelb; 1‴; von Juli an sehr häufig und Menschen und Vieh durch ihr empfindliches Stechen sehr lästig.

†* **36.** *Haematopŏta pluviālis* L. Regenbreme. Schwärzlich; Rücken mit weißlicher Linie; Hinterleib mit weißlichen Einschnitten und 2 Reihen grauer Flecken; Flügel grau, mit weißen Punkten; 4‴; sehr häufig und vorzüglich bei schwüler Gewitterluft sehr zudringlich.

§. 173. **4. Lausfliegen** (Pupipăra). §. 169. Die Larven verwandeln sich schon im Mutterleibe und werden als Puppen geboren. Die Fliegen laufen sehr schnell und leben als Schmarotzer auf Thieren.

†* **37.** *Hippobōsca equīna* L. Pferde-Lausfliege. Rückenschild glänzend braun, gelb gefleckt; Beine rostgelb, braun geringelt; 3—4‴; häufig an Pferden, vorzüglich in den Weichen und in der Nähe des Afters; glitscht wegen ihrer Härte leicht zwischen den Fingern weg, wenn man sie zerdrücken will; legt nur eine Puppe.

†* **38.** *Melophăgus ovīnus* L. Schaflaus oder Teke. Rostgelb, mit einfarbig braunem Hinterleibe; 2‴; häufig auf Schafen zwischen der Wolle. Wird durch Terpentinöl, Tabackslauge und bei zu starker Vermehrung durch Abscheeren der Wolle selbst vertrieben.

§. 174. **V. Ordnung. Neuroptĕra** L. **Netz- od. Gitterflügler** (§. 124b.). Vier gleichartige, häutige, netz- oder gitterförmige, meist gleichgroße Flügel (nur bei einigen mit wenigen Adern oder ganz fehlend); Fühler meist borstenförmig, selten kolbig; Mundtheile beißend; Unterkiefer häufig von einer Art Kappe, Helm (galĕa), bedeckt; Metamorphose bald vollkommen, bald unvollkommen.

Die meisten Gattungen dieser Durchgangsgruppe in der Entwickelungsreihe der Kerfe leben vom Insektenraube, fliegen gut; springen und graben indeß nie wie die Grabflügler. Die vollkommenen Insekten leben nur auf dem Lande, ihre 6beinigen Larven im Wasser oder auf dem Lande. Wasserjungfern, Eintagsfliegen und Nager haben eine unvollkommene, die Frühlingsfliegen, Ameisenlöwen und übrigen Plattflügler eine fast vollkommene Ver-

wandlung (S. 133.). — Eintagsfliegen nützen als Dünger und beim Fischfange als Köder; die Larven der Florfliegen vertilgen viele Blattläuse und die Wasserjungfern rauben überhaupt Insekten, sind daher ebenfalls nützlich; alle Nager dagegen schädlich. — Man kennt etwa 800 Arten (§. 122.).

Uebersicht der 3 Familien und deren vorzüglichsten Gattungen. §. 175.

1. Pfriemenhörner (§. 176.). Flügel mit vielen Netzadern; Fühler kürzer oder kaum länger als der Kopf.

- Flügel gleichgroß; Hinterleib ohne Schwanzborsten. — **Wasserjungfer**.. 1) *Libellula* L.
- Hinterflügel kleiner oder fehlend; Hinterleib mit 2—3 langen Schwanzborsten. — **Eintagsfliege** (Fig. 105.) .. 2) *Ephemera* L.

2. Langhörner (§. 177.). Flügel mit vielen Netzadern; Fühler immer länger als der Kopf, borstenförmig oder kolbig.

- Fühler borstenförmig
  - Hinterflügel breiter, längs gefaltet (Faltflügler)
    - mit drei Nebenaugen; Hinterleib mit 2 langen Borsten. — **Afterfrühlingsfliege** 3) *Perla* Geoff.
    - mit zwei Nebenaugen; Hinterleib ohne Borsten. — **Frühlingsfliege** 4) *Phryganea* L.
  - Hinterflügel gleichbreit, flach (Plattflügler)
    - Flügel klein und schmal
      - Hals auffallend lang. — **Kameelhalsfliege** 5) *Raphidia* L.
      - Hals gewöhnlich
        - Kopf rüsselförmig. — **Scorpionsfliege** 6) *Panorpa* L.
        - Kopf nicht rüsselförmig. — **Schlammfliege** 7) *Sialis* Latr.
    - Flügel groß und breit; Augen metallisch glänzend
      - ohne Punktaugen. — **Florfliege** 8) *Hemerobius* L.
      - mit drei Punktaugen — — **Blattlausfliege** 9) *Osmylus* Latr.
- Fühler nach der Spitze zu kolbig, kürzer als der Leib. — **Ameisenlöwe** 10) *Myrmecoleon* L.

3. Nager (§. 178.). Flügel mit wenigen oder gar keinen Queradern oder ganz fehlend.

- Mit Flügeln
  - Fühler perlschnurförmig; Tarsen 4gliederig. — **Termite** ..11) *Termes* L.
  - Fühler borstenförmig; Tarsen 2gliederig. — **Holzlaus** .....12) *Psocus* Latr.
- Ohne Flügel; Fühler borstenförmig; Tarsen 3gliederig. — **Bücherlaus** .13) *Troctes* Burm.

I. Pfriemenhörner (Subulicornia). §. 175. Die Wasserjungfern §. 176. haben stark entwickelte Mundtheile und leben als schnelle, kühne und sehr nützliche Insektenräuber an Gewässern, worin sich auch ihre Larven entwickeln. Die Eintagsfliegen haben verkrümmte Mundtheile und leben als Larven 2—3 Jahre im Wasser, [illegible] aus der Nymphenhaut gekrochene Insekt häutet sich nochmal, beg[illegible] in der Luft und stirbt ohne Nahrung genommen zu haben, oft schon nach wenigen Stunden. Die oft an Uferpflanzen überall haftenden gebliebenen Häute gaben ihnen den Namen **Uferhaft**. Sie erscheinen besonders Abends im August (daher **Aust**), oft in solcher Menge, daß sie die Ufer hoch bedecken und zum Düngen benutzt werden können (Uferaas).

* **1. *Libellula depressa*** L. Plattbauch. Flügel in der Ruhe horizontal, klar, am Grunde rothbraun; Hinterleib flach, blau (♂) oder bräunlich (♀); $1\frac{1}{2}$"; häufig.

* *L. 4-maculata* L. Vierfleckige Wasserjungfer. Flügel wie bei voriger Art, aber in der Mitte mit schwarzbraunem Flecke; $1\frac{1}{2}$"; häufig; machen oft weite Wanderungen (S. 22.) wie die Zugheuschrecken.

* *L. virgo* L. Flügel in der Ruhe aufgerichtet, ganz blau oder nur in der Mitte blau (♂) oder braun getrübt (♀); Körper metallisch grün; $1\frac{1}{2}$‴; häufig.

* *L. puëlla* L. Gemeine Wassernymphe. Flügel in der Ruhe aufgerichtet, klar; Körper blau, grau, grün oder röthlich; $1\frac{1}{2}$‴; häufig.

* *L. vulgāta* L. Gemeine Wasserjungfer. Flügel klar; Körper rothgelb (♀) oder roth, nach hinten mit verdicktem Hinterleibe (♂); $1\frac{1}{2}$‴; häufig.

2. *Ephemĕra vulgāta* L. Gemeine Eintagsfliege (Fig. 105.). Mit 3 Schwanzborsten; braun; 8—9‴; häufig.

* *E. diptĕra* L. Zweiflüglige Eintagsfliege. Mit 2 Schwanzborsten und nur mit 2 Flügeln; rothgelb; 3—4‴; häufig.



Fig 105.
A. Gemeine Eintagsfliege *(Ephemĕra vulgāta)*.
B. Larve derselben. Mit 3 auseinander fahrenden Schwanzborsten.
a. Seitliche Kiemenblättchen (§. 122 C.) und Flossen zugleich.
b. Flügelkeime.

Fig. 106.

Hülsenwurm oder eine, von der Larve der Frühlingsfliege (§. 177, 4) zusammengesponnene Hülle, aus welcher die Larve mit dem Vordertheile des Körpers herauskommt und so in Gewässern umherkriecht, aber beim Herausnehmen aus dem Wasser sich sogleich ganz in ihre Hülle zurückzieht und die Oeffnung vorn mit dem Kopfschilde verschließt.

§. 177. **II. Langhörner** (Longicornia). §. 175. Die Frühlingsfliegen leben als Larven im Wasser (Wassermotten) in sehr zierlich aus Sandkörnern, Schilfstückchen, Conchylien u. s. w. selbst zusammengesponnenen Röhren (Hülsenwürmer Fig. 106.) und kriechen mit denselben schon im Wasser [illegible] des Frühlings (Frühlingsfliegen) auf dem Grunde flacher Bäche umher. Die Florfliegen heften ihre langgestielten Eier an Pflanzenblätter; ihre Larven leben von Blattläusen. Die Larven der Ameisenlöwen leben in sandigen Gegenden in selbst gemachten Sandtrichtern, in deren Grunde sie mit ihren weit aufgesperrten Kiefern auf Insekten lauern, welche entweder vom Rande durch die mit herabrollenden Sandkörner hineinfallen oder durch Sand, den die Larve den etwa entfliehenden nachwirft, wieder zurückgleiten.

3. *Perla vĭridis* F. Grüne Afterfrühlingsfliege. Grün, getödtet später rothgelb; Scheitel schwarzbraun gefleckt; 2‴; häufig.

* *P. bicaudāta* L. Zweischwänzige Afterfrühlingsfliege. Schwarz-

braun; Scheitel und Vorderrücken mit orangefarbigen Längsstreifen; 2 gelbliche, braungeringelte Afterfäden; 6‴; häufig.

* **4.** ***Phryganĕa rhombĭca*** L. Gemeine Frühlingsfliege. Vorderflügel gelbbraun, mit 2 weißlichen Rautenflecken; Hinterflügel durchsichtig; 7—9‴; häufig.

* ***Ph. grandis*** L. Große F. Vorderflügel graubraun, aschgrau gesprenkelt, gestreift und gefleckt; Hinterflügel gelblichgrau; 1″ lang.

* **5.** ***Raphidĭa ophiŏpsis*** L. Gemeine Kameelhalsfliege. Flügelspitze mit 5 Gabeladern; 4‴; selten.

* **6.** ***Panŏrpa communis*** L. Gemeine Scorpionfliege. Gelbgrün; Flügel mit 3 schwarzbraunen Binden; Rüssel und die scorpionsähnliche Haltzange am Ende des Schwanzes beim ♂ roth; 5—6‴; häufig auf Gebüschen.

* **7.** ***Sialis lutarĭus*** L. Gemeine Schlammfliege. Grauschwarz; Flügel bräunlich, dunkel geadert; Scheitel mit 2 gelben Streifen; 5—7‴; im Frühlinge häufig in der Nähe von Gewässern an Holzwerken.

* **8.** ***Hemerobĭus perla*** L. Gemeine Florfliege. Gelbgrün; Rücken und Hinterleib oben blaßgelb; Kopf mit rothbraunem Streife; Flügel schwärzlich behaart; 6—7‴; häufig.

* ***H. reticulātus*** (***chrysops***) L. Goldauge. Grasgrün, schwarz gefleckt; Scheitel mit schwarzem Flecke; Fühler gelblich, zweites Glied schwärzlich; 5‴; häufigste Art.

* **9.** ***Osmylus maculātus*** L. Gefleckte Blattlausfliege. Schwarzbraun; Kopf roth; Beine gelblich; Vorderflügel schwarzbraun gefleckt; 9‴; häufig.

10. ***Myrmecoleon formicarĭus*** L. Ameisenlöwe. Bräunlich; Halsschild scheckig; Beine rothgelb geringelt; Hinterleibssegmente blaß gerandet; Flügel braun gefleckt; $1\frac{1}{3}$″. In sandigen Gegenden, besonders Süddeutschlands.

III. Nager (Corrodentia). §. 175. Mit stark entwickelten Mundtheilen zum Beißen. Nähren sich von trocknen, vegetabilischen und animalischen Stoffen, welche sie in Gesellschaft ihrer Larven und Puppen zernagen und dadurch schädlich werden. §. 178.

11. ***Termes*** L. Die Termiten leben dem Lichte entzogen, gesellig wie die Ameisen, in heißen Ländern und richten als Larven (Arbeiter, die von ihrer weißgelblichen Farbe weiße Ameisen heißen) oft an vegetabilischen und animalischen Stoffen große Zerstörungen an. Sie haben nach Humboldt in Mexiko fast alle geschichtlichen Documente verzehrt und in Indien früher die von Europa her dort eingeführten musikalischen Instrumente zerstört. Sie können sich in einer Nacht durch den Boden eines großen Koffers fressen und dessen ganzen Inhalt an Kleidungsstücken u. s. w. verzehren. Sie bauen von Lehm und Sand (die amerikanische Termite baut aus Holz in alte Baumstämme) gemeinschaftliche, zuckerhutförmige, 12′ hohe Wohnungen. Die Bewohner solcher Nester sind: 1) geflügelte Individuen, welche Burmeister sämmtlich für ♂ hält. Nach G[illegible] sind dies jungfräuliche ♀ und die ♂ überhaupt noch nicht bekannt[illegible]rscheinlich wenig von diesen unterschieden und mit unter denselben; 2) [illegible], ungeflügelte ♀; 3) mit Flügelansätzen versehene Puppen; 4) kleinere noch nicht mit Flügelansätzen versehene Larven und 5) geschlechtslose, ungeflügelte, den Larven ähnliche Individuen doppelter Art, von denen die Einen kleiner sind, die Andern aber größer und mit größerm Kopfe; letztere heißen Soldaten, arbeiten nicht, sondern vertheidigen nur die Wohnungen. Von diesen aus bringen die Bewohner durch unterirdische Gänge in die Wohnungen der Menschen und höhlen Holzgeräthe und hölzerne Häuser inwendig so aus, daß nur ein leicht zerbrechliches Gerüste stehen bleibt, an welchem man äußerlich nichts bemerkt, welches aber leicht zusammenstürzt, wenn es angerüttelt wird. Die sogenannten Arbeiter hält Guerin für weibliche Larven und die sogenannten Soldaten für männliche Larven. Arbeiter und Soldaten kommen

fast nie an die freie Luft und sind blind. Für den Menschen sind die Termiten höchst lästig, da sie ganze Häuser zerstören können, wie sie z. B. den Pallast des General-Gouverneurs von Calcutta 1814 wirklich zerstört haben, dienen aber den von Insekten lebenden Säugethieren (§. 45.), vielen Vögeln u. s. w. zur angenehmen Nahrung und werden in Afrika geröstet auch von Negern und Hottentotten gegessen und für wohlschmeckender gehalten, als die Larven und Puppen des Palmbohrers (§. 139, 68), die doch eine der größten Delicatessen auf den Tafeln der Westindier sind. Das befruchtete ♀ (Königin) schwillt zur Zeit des Eierlegens (wie der Sandfloh [§. 171.] und die Schildläuse [§. 193.]) so an, daß der Hinterleib übermäßig dick und über 10mal länger wird (S. 133.).

‡ *T. fatāle* F. Weiße Ameise, Termite. Braun; Flügel mit ziegelrothem Außenrande; Arbeiter 3‴, Puppen 5‴, ausgebildetes Insekt 7—8‴; in Indien und dem Innern Afrikas, wo ihre leeren Gebäude oft als Backöfen benutzt werden.

‡ *T. destrŭctor* F. Zerstörende Termite. Leben in Südamerika; dringen oft zerstörend in die Häuser, werden aber von Indianern gern gegessen. Das in eine feine Filzmasse durch sie verwandelte Holz dient den Indianern als Zunder (Ameisenzunder).

* **12.** *Psocus domestĭcus* Burm. Gemeine Holzlaus. Schwarz; Kopf roth; Fühler und Beine blaß; Flügel unbehaart, durchsichtig; 3/4‴; an alten Fenstern in Häusern.

†* **13.** *Troctes pulsatorĭus* L. Klopfende Bücherlaus. Blaßgelblich; Mund röthlich; Augen rothbraun; 3/4‴; Larve häufig zwischen alten Papieren und in Insektensammlungen, welche sie zernagt. (Die dem Schlage einer Taschenuhr ähnlichen Töne in Wänden und altem Holzwerke werden indeß durch den Klopfkäfer [§. 129, 13] herborgebracht).

§. 179. **VI. Ordnung. Orthoptĕra. Grabflügler, Helmkerfe** (§. 124b.). Vier ungleichartige, netzadrige Flügel; Vorderflügel (Decken oder Flügeldecken) pergamentartig, schmal, gerade; Hinterflügel (Flügel) breiter, häutig, längsgefaltet (nur bei Ohrwürmern umgeschlagen); nur einige (Lappenschwänze und Pelzfresser) ungeflügelt; Verwandlung unvollkommen.

Kopf mit starken, beißenden (nur bei Blasenfüßen mit saugenden) Freßwerkzeugen; Oberkiefer stark gezähnt; Unterkiefer hornig, mit mehrgliederigen Tastern und häutigem Helme (galĕa); Augen meist groß; oft Nebenaugen; Fühler meist lang; Hinterleib sitzend, beim ♀ mit zweiklappiger Legescheide, bei Lappenschwänzen und Ohrwürmern noch mit besondern Anhängen; Gang-, Raub- oder Springbeine (S. 131.). Landinsekten mit unvollkommner Verwandlung; Larven ohne Flügel; Puppen mit kurzen Flügelstummeln; geflügelte Insekten erst im Herbste erwachsen. **Nahrung:** Die meisten fressen Pflanzen; die Heuschrecken fressen sich auch wohl einander; Pilze und sind überhaupt die gefräßigsten aller Insekten (schon im hohen Alterthume eine Plage in Aegypten). Fangheuschrecken leben vom Insektenraube, Pelzfresser schmarotzen an Thieren. Viele finden sich oft zahlreich zusammen (Heuschrecken), aber nie in geschlossenen Gesellschaften wie Bienen und Termiten. In keiner Insektenordnung treffen wir so viel Geräusch (Gesang); dies wird durch Streichen und Reiben der Beine und Flügeldecken oder durch besondere Stimmorgane (Singapparat §. 181.) hervorgebracht. Sämmtlich durch ihr Geräusch, ihre Häufigkeit und Freßgier unangenehme Thiere; nur einige Heuschrecken heißer Länder werden gegessen.

Uebersicht der 6 Familien und deren vorzüglichsten Gattungen. §. 180.

Fig. 107. Blasenfuß (*Thrips*).

- **Mit Flügeln.**
  - Hinterflügel nur von der Wurzel an längsgefaltet
    - Hinterschenkel verdickte Springbeine: **I. Springer**
      - Fühler nicht über halbe Körperlänge: **Feldheuschrecken**
        - Kopf in einer vorn u. hinten erweiterten Kappe der Vorderbrust. **Grashüpfer** ..... 1) *Tetrix* Latr.
        - Kopf frei, ohne Kappe. — **Schnarrheuschrecke** ..... 2) *Acridium* Latr.
      - Fühler nicht über Körperlänge; erstes Hintertarsenglied verlängert: **Grabheuschrecken**
        - Vorderbeine gewöhnlich, ♀ mit Legeröhre. — **Grylle** (Fig. 108.) ..... 3) *Gryllus* Latr.
        - Vorderb. breite Grabfüße; keine Legeröhre. — **Maulwurfsgrylle** .... 4) *Gryllotalpa* Latr.
      - Fühler von Körperlänge und darüber; alle Hintertarsenglieder gleichlang: **Laubheuschrecken**
        - Stirn zwischen den Fühlern in einen Knopf oder in ein gerandetes Dreieck vortretend. **Laubheuschrecke** ..... 5) *Locusta* Geoff.
        - Stirn breit und gerundet. — **Beißheuschrecke** ..... 6) *Decticus*.
    - keine Springbeine: **II. Fänger**
      - Vorderbeine Fangbeine. — **Fangheuschrecke** ..... 7) *Mantis* L.
      - Vorderbeine gewöhnlich; Leib flach; Thorax den Kopf überdachend. **Schabe** (Fig 109.) 8) *Blatta* L.
  - Hinterflügel gefaltet
    - Hinterflügel auch zugleich quergefaltet; Hinterleib am Ende mit einer Zange: **III. Ohrwürmer** ..... 9) *Forficula* L.
    - Hinterflügel nicht gefaltet, schmal, gefranzt; Hinterleib ohne Anhang; Füße mit einer Blase endend: **IV. Blasenfüße** (Fig. 107.) ..... 10) *Thrips* L.
- **Ohne Flügel.**
  - Hinterleib mit Anhängseln **V. Lappenschwänze**
    - Hinterleib am Ende mit einer gegen die Brust zurückgeschlagenen Springgabel. — **Springschwanz** ... 11) *Podura* L.
    - Hinterleib am Ende mit 3 größern, gleichlangen und mit mehren kleinern Borsten. — **Zuckergast** ..... 12) *Lepisma* L.
  - ohne Anhängsel; den Läusen ähnlich und an Thieren schmarotzend: **VI. Pelzfresser, Thierläuse**
    - Fühler fadenförmig
      - 5gliederig; Fußklauen doppelt. — **Federling** ..... 13) *Philopterus* N.
      - 3gliederig; Fußklauen einfach. — **Haarling** ..... 14) *Trichodectes* N.
    - Fühler mit einem Knöpfchen an der Spitze; Fußklauen doppelt. — **Haftfuß** ..... 15) *Liothrum* N.

A. Geflügelte Grabflügler (Orthoptera). §. 180. §. 181.

Meist große, in Menge erscheinende und mit Ausnahme der Fangheuschrecken, von frischen Pflanzenstoffen auf Feldern, Wiesen ꝛc. lebende, sehr gefräßige und mehr oder weniger schädliche Thiere. Manche haben einen Singapparat, welcher in einer runden, zellenleeren Trommelhaut (Spiegel) am Grunde der Oberflügel und in einem am ersten Hinterleibssegmente befindlichen Kanale besteht, in welchem 2 [illegible]n ausgespannt sind. Durch das Reiben der Flügel und das Ausströ[illegible]uft durch diesen Kanal entstehen die lauten Locktöne, das sogenannte Si[illegible]. Nach Ratzeburg indeß soll der Gesang lediglich in der Bewegung der Flügel (bei Gryllus und Locusta) oder der Hinterschenkel gegen die Flügel (bei Acridium) seine Ursache haben. — Siehe auch Gehörorgane S. 132.

I. Springer. Heuschrecken (Saltatoria). §. 180. Mit Springbeinen.

* 1. ***Tetrix bipunctata*** L. Gemeiner Grashüpfer. Meist bräunlich; Thorax so lang oder nur wenig länger als der Hinterleib; 4‴; häufig.

* *T. subulata* L. Pfriemlicher Grashüpfer. Wie bei voriger Art, aber Thorax sich weit über den Hinterleib fortsetzend; 6‴.

†* 2. ***Acridium grossum*** L. Gemeine Schnarrheuschrecke. Thorax mit

3 Kielen, die Seitenkiele fast gerade; Schienen hochgelb, mit schwarzen Dornen; Vorderflügel am Vorderrande gelb; 10—12‴; häufigste Art bei uns.

‡* *A. stridulum* L. Rothflüglige Schnarrheuschrecke. Thorax mit einem Kiele; Hinterflügel zinnoberroth; 8—12‴; schwirrt laut im Fluge und ist durch ganz Europa verbreitet.

‡* *A. caerulescens* L. Bläuliche Sch. Ebenso, aber Hinterflügel blau; seltner.

‡* *A. migratorium* L. Wander- oder Zugheuschrecke. Grünlich; Decken braun gefleckt; 1½″; überall in Deutschland, aber nur zuweilen häufig und dann durch ihre verheerenden Züge sehr schädlich; noch schädlicher indeß sind verwandte Arten in Asien und Nordafrika, welche in solcher Menge auf ihren Zügen erscheinen, daß sie die Sonne verfinstern, Häuser und Straßen durch ihre Menge bedecken und Bäume und Felder in wenigen Stunden ganz kahl fressen. Die größern Arten werden jetzt noch gegessen, wie sie schon die Kinder Israels und Johannes in der Wüste aßen.

‡* 3. *Gryllus campestris* L. Feldgrylle. Schwärzlich; Hinterschenkel innen roth; 1″; ♀ mit einem Singapparate (S. 132. u. 203.). In Erdlöchern auf trocknen Feldern, dem Garten- und Feldbaue sehr schädlich.

† *G. domesticus* L. Hausgrylle, Heimchen (Fig. 108.). Gelblichgrau; Kopf und Thorax schwarzbraun gefleckt; 8‴; ♀ mit Singapparate. Ein nächtliches, durch Gezirpe und Aufzehren von Eßwaaren in Küchen höchst lästiges Thier.



Fig. 108.
Hausgrylle oder Heimchen (§. 181, 3).

‡* 4. *Gryllotalpa vulgaris* Latr. Maulwurfsgrylle, Werre. Braun; Grabbeine mit 5 Zähnen; 1½″; häufig und schädlich in feuchten Feldern und Gärten, wo sie Pflanzenwurzeln fressen, aber auch Insekten und Larven verzehren; schaden auch jungen Holzpflanzen. Können auf ihren nächtlichen Wanderungen in Töpfen, welche man in die Nähe ihrer Röhren eingräbt, gefangen werden.

* 5. *Locusta viridissima* L. Grüne Laub- oder Säbelheuschrecke, großes Heupferdchen. Grün, ungefleckt; Flügeldecken noch einmal so lang als der Hinterleib; 1½—2″; größte Art; häufig, aber einzeln; sehr gefräßig; besteigt auch die Bäume.

† 6. *Decticus verrucivorus* L. Warzenbeißer. Thorax mit fein erhabener Mittellängslinie; Vorderflügel grünlich, braun gefleckt, länger als der Hinterleib, beim ♀ etwa die Mitte des Legestachels erreichend; 14‴; häufig auf den Wiesen am Harze. Die schwedischen Bauern sollen sich die Warzen auf den Händen von ihnen abbeißen lassen; daher der Name.

§. 182. **II. Läufer** (Cursoria). §. 180. Können nicht springen, aber schnell laufen.

7. *Mantis religiosa* L. Fangheuschrecke, Gottesanbeterin. Grün bis braungelb; Flügeldecken über 2 mal so lang als der Thorax; 2—3″; Südeuropa. Hält zum Insektenraube die Fangbeine wie ein Betender die Hände empor.

‡* 8. *Blatta orientalis* L. Küchenschabe, Brodschabe, Kakerlake (Fig. 109.). Lederbraun; ♀ kurz geflügelt; After mit scharfem Längskiel; 1″. Nächtliche, sehr flinke, aus dem Oriente eingewanderte und jetzt überall in Häusern, vorzüglich bei Bäckern verbreitete, mit Waaren auch nach Amerika verschleppte Thiere, welche alles Eßbare benagen und selbst Schuhwerk abschaben (Schaben). Enten und Igel fressen gern Schaben; auch vertilgt man sie durch Verstopfen der Löcher und Legen von Leimruthen oder durch Töpfe, in

welche man Eßwaaren thut und die Töpfe mit Tüchern umwickelt, damit die Schaben leichter an den Rand gelangen und hineinfallen können.

* *B. germanĭca* L. Deutſche Schabe. Gelblich; Thorax mit 2 ſchwarzen Längsflecken; 5‴; nur einzeln in Wäldern.

†* *B. lapponĭca* L. Lappländiſche Schabe. Gelblich; Thorax in der Mitte ſchwarzbraun; Flügeldecken ſchwarz punktirt; 4‴; in Wäldern; an den Fiſchvorräthen der Lappländer häufig ſchädlich.



Fig. 109.
Küchenſchabe (§. 182.).

III. Ohrwürmer (Forficulina). §. 180. §. 183.
Nächtliche, ſich gern in Höhlungen verkriechende Thiere ohne gerade für die Ohröffnung des Menſchen eine beſondere Vorliebe zu haben. Sie benagen gern reife, ſüße Früchte, zerfreſſen auch wohl Nelken, Georginen ꝛc. In Schweinsklauen, Tuten, Rohrſtengel, kleine mit Moos gefüllte Blumentöpfe ꝛc. laſſen ſie ſich leicht verlocken und dann tödten.

†* **9.** *Forfĭcula auricularĭa* L. Gemeiner Ohrwurm. Braun, unbehaart; Fühler 14gliederig; 7—10‴; häufiger als der kleine Ohrwurm (*F. minor*).

IV. Blaſenfüße (Physapŏda). §. 180. §. 184.
Selten über 1‴ lange Schmarotzer an Pflanzen, deren oberflächliche Blattſchicht ſie abnagen. Oft zu hundert in Geſellſchaft ihrer röthlichen Larven in Pflanzenblüthen.

†* **10.** *Thrĭps* (*Physăpus*) *haemorrhoidālis*. Gemeiner Blaſenfuß. Schwärzlich; After roth; Beine gelblich; Schenkel und Flügelbaſis weiß; 1/4‴; häufig in Treibhäuſern, wo die ausgeſogenen Blätter bald welken. Können durch Abbürſten und kräftiges Wachsthum der Pflanzen vertilgt werden.

* *Th. fasciātus* L. Bandirter Blaſenfuß. Schwarz; Flügel weiß, mit 2 ſchwarzen Querbinden; 1/2‴; häufig in Pflanzenblüthen.

B. Ungeflügelte, unechte Gradflügler (Aptĕra). §. 185.

V. Lappenſchwänze (Thysanūra). §. 180. Leben häufig zwiſchen abgefallenem Laube, unter Baumrinden, auch auf Pfützen und können ſich durch ſchnelles Ausſtrecken der Springgabel weit fortſchnellen (Springſchwänze) — oder leben verſteckt unter Baumrinden, abgefallenen Blättern ꝛc. und können ſchnell laufen, ſich aber mit ihren Borſten am Hinterleibe nicht fortſchnellen (Borſtenſchwänze).

* **11.** *Podūra aquatĭca* L. Waſſer-Springſchwanz. Schwarz, weißhaarig; 1‴; häufig auf Pfützen und ſchwimmenden Blättern der Waſſerpflanzen.

* *P. plumbĕa* L. Bleigrauer Sp. Bleigrau; Fühler, Kopf und Beine gelblich; 1 1/2‴; häufig unter Baumrinden und unter moderndem Holze.

* **12.** *Lepisma saccharĭna* L. Zuckergaſt, Fiſchchen. Silberglänzend beſchuppt; 4‴; nächtliches, in Speiſekammern, Kramläden und moderndem Holze häufiges, flinkes Thierchen.

VI. Pelzfreſſer, Thierläuſe (Mallophăga). §. 180. §. 186.
Beſtändig u. paraſitiſch auf Säugethieren und Vögeln (Vogelläuſe), von deren Federn, Wollhaaren oder Haut [illegible] lebende, Läuſen ähnliche Thierchen, welche aber nie, wie die eigen[illegible]iſe, Blut ſaugen.

†* **13.** *Philo[illegible] communis* N. Gemeiner Federling. Gelb, mit braunen Seitenflecken; Kopf groß, breit, mit ſpitzen Hinterecken; 1/2‴; auf Vögeln häufig.

†* **14.** *Trichodectes latus* N. Hunde-Haarling. Hinterleib weißlich, mit gezähnten Rändern; Kopf vorn abgeſtutzt, gelblich; 3/4‴; auf Haushunden.

†* **15.** *Liothēum pallĭdum* N. Haftfuß. Auf Haushühnern.

VII. Ordnung. Hemiptĕra L. (Rhynchōta F.) §. 187.

Halbflügler, Schnabelkerfe (§. 124 b.) Vier ungleichartige Flügel (Wanzen) oder 4 gleichartige Flügel (Zirpen) oder nur

2 Flügel (♂ der Schildläuse) oder gar keine Flügel (Läuse); stets ein Saugrüssel oder Schnabel, welcher aus einer gegliederten, schnabelförmigen Scheide und 4 darin liegenden Borsten besteht (Fig. 110.). Verwandlung unvollkommen (nur bei ♂ Schildläusen vollkommen), und die 3 verschiedenen Zustände oft schwer unterscheidbar. Der Schnabel, welcher meist gegen die Brust zurückgeschlagen ist, bildet den Hauptcharakter und scheint nur den ♂ Schildläusen zu fehlen. Fühler 3—25gliederig, faden- od. borstenförmig; meist Gangbeine, seltner Springbeine, noch seltner Schwimmbeine. Der Körper im Habitus sehr verschieden, sich den Insekten anderer Ordnungen oft nähernd. **Nahrung:** Mit Ausnahme einiger Wanzen saugen alle Halbflügler, welche auf dem Lande leben, mit ihrem Schnabel flüssige Stoffe ein, meist Pflanzenstoffe; daher oft den Pflanzen schädlich (Schildläuse). Die Wanzen sind hier die nützlichen Räuber, welche meist andere Insekten, selten Pflanzen aussaugen und dann wie die flügellosen, beständigen Schmarotzer auf Thieren zu den schädlichen Insekten gehören. Einige Schildläuse liefern nützliche Stoffe (§. 193.).



Fig. 110. Kopf der rothbeinigen Wanze (*Cimex rufipes* §. 189, 3).
a Augen;
b erstes Fühlerglied der abgeschnittenen Fühler;
c Oberlippe;
d viergliederige, vorgestreckte, aber in der Ruhe ganz unter den Leib zurückgeschlagene Schnabelscheide.

§. 188. Uebersicht der 6 Familien u. deren vorzüglichsten Gattungen.

I. Wanzen oder **Ungleichflügler** (Heteroptĕra). Vier Flügel, Oberflügel am Grunde hart, an der Spitze häutig; Schnabel an der Spitze der Stirn entspringend.

- Fühler wenigstens von halber Körperlänge: **I. Landwanzen**
  - Schnabelscheide 4gliederig; 2 Haftlappen neben den Klauen
    - Schildchen groß, wenigstens bis zur Mitte d. Hinterleibes reichend
      - Beine mit starken Stacheln; Körper oben gewölbt. — **Dickwanze** ..... 1) *Cydnus* F.
      - Beine wehrlos
        - Brustbein gekielt. — **Kielwanze** 2) *Acanthosŏma* F.
        - Brustbein nicht gekielt. — **Feldwanze** (Fig. 111.) ..... 3) *Cimex* F.
    - Schildchen klein, die Mitte des Hinterleibes nicht erreichend
      - Fühler faden- oder borstenförmig
        - an der Oberseite des Kopfes eingelenkt; letztes Fühlerglied dicker. — **Raubwanze** .... 4) *Corĕus* F.
        - an d. Unterseite des 3eckigen Kopfes; letztes Fühlerglied nicht dicker als die übrigen
          - Schenkel nicht verdickt. — **Rothwanze** 5) *Pyrrhocŏris.*
          - Schenkel verdickt. — **Dickscheukel** . . 6) *Pachymĕrus.*
      - Fühler borstenförmig, mit haarfeinem Endgliede, dicht vor den Augen eingesetzt; Leib lang gestreckt. — **Pflanzenwanze** 7) *Phytocŏris.*
  - Schnabelscheide 3gliederig; keine Haftlappen
    - ungeflügelt; Schnabel in einer Rinne. **Bettwanze** (F. 112.) 8) *Acanthĭa* F.
    - geflügelt; Schnabel nie in einer Rinne
      - Kopf hinter den Augen halsförmig abgeschnürt; leben auf dem Lande
        - Schnabel bis zu den Mittelbeinen reichend — **Sch[illegible]wanze** 9) *Nabis* Latr.
        - Schnabel [illegible] Vorderbeine reichend — **Schreitwanze** . 10) *Reduvius* F.
      - Kopf nicht abgeschnürt; leben auf der Oberfläche des Wassers
        - Beine sehr lang; Hinterleib schmal. — — **Wasserläufer** ..... 11) *Hydrométra* F.
        - Beine gewöhnlich; Hinterleib breit ..... 12) *Velia* Latr.
- Fühler sehr klein, unter den Augen in Gruben versteckt: **II. Wasserwanzen**
  - Vorderbeine **Raubbeine** (verdickt oder verlängert)
    - Hinterleib mit langem Athemrohre. — **Wasserscorpion** (Fig. 113.) . 13) *Nepa* F.
    - Hinterleib ohne Athemrohr. — **Wasserwanze** ..... 14) *Naucŏris* F.
  - Vorderbeine keine Raubbeine
    - Vordertarsen 3gliederig. — **Rückenschwimmer** ..... 15) *Notonĕcta* F.
    - Vordertarsen 1gliederig. **Schwimmwanze** ..... 16) *Corixa* Latr.

II. Gleichflügler (Homoptĕra). Vier Flügel, meist von gleicher Substanz und häutig; Schnabel an der Unterseite des Kopfes nahe an der Brust entspringend.

a. **Zirpen.** Fühler klein, 3—6gliedrig; 3 Tarsenglieder.

- Stirn und Scheitel weit nach vorn verlängert. — **Laternenträger** ..... 17) *Fulgŏra* L.
- Stirn und Scheitel wenig oder gar nicht verlängert
  - Fühler 6gliedrig; Flügel häutig, mit gablig getheilten Rippen. — **Cicade** (Fig. 114.) ..... 18) *Cicāda* L.
  - Fühler 3gliedrig; Oberflügel pergamentartig; Scheitel dreieckig. — **Schaumzirpe** ..... 19) *Aphrophŏra* Germ.

b. **Pflanzenläuse.** Fühler lang, 4—10gliedrig; 2 Tarsenglieder. Geflügelte und ungeflügelte Pflanzenschmarotzer.

- Fühler 10gliedrig; springen. — **Blattfloh** ..... 20) *Peylla* Geoff.
- Fühler höchstens 7gliedrig; springen nicht: **Blattläuse**
  - Fühler 7gliedrig, meist lang; meist 2 lange Saftröhren am Hinterleibe; Gabelader der Vorderflügel 3zinkig. — **Blattlaus** 21) *Aphis* L.
  - Fühler 6gliedrig, kurz
    - Gabelader 2zinkig. — **Blattlaus** ..... 22) *Schizoneura* Htg.
    - Gabelader fehlt; leben nur in Pflanzengallen. — **Blasen-Blattlaus** ..... 23) *Pemphigus* Htg.
  - Fühler kurz, dick, 5gliedrig; Gabelader fehlt, oder Flügel fehlen ganz; nur auf Nadelhölzern. — **Gallen-Blattlaus** 24) *Chermes* L.

III. Flügellose (Aptĕra). Keine Flügel oder ♂ nur mit 2 Flügeln. Schmarotzer.

- Pflanzenschmarotzer: ♂ mit 2 Flügeln; ♀ ungeflügelt, festsitzend. — **Schildlaus** 25) *Coccus* L.
- Thierschmarotzer: ♂ und ♀ ungeflügelt. — **Laus** ..... 26) *Pediculus* L.

1. Landwanzen (Geocŏres). §. 188. Schnabel meist lang, in einer Rinne unter der Brust. Nützen durch Aussaugen von andern Insekten (Raupen, Blattläusen ꝛc.). Von Pflanzensäften nähren sich manche Arten wohl erst dann, wenn ihnen thierische Nahrung fehlt. Sie leben auf Pflanzen oder zwischen Steinen ꝛc., nur die Gattung 11. und 12. auf dem Wasser. — Die meisten verbreiten, vorzüglich beim Berühren, einen unangenehmen Geruch, dessen Ursache (nach Westwood) eine Feuchtigkeit sein soll, welche sich aus einer Spalte unten am Brustkasten absondert; Ratzeburg hält indeß diese Spalte nur für ein Luftloch. §. 189.

* **1.** *Cydnus bicŏlor* L. Zweifarbige Dickwanze. Schwarz; Rand des Vorderrückens und 2 winklige Flecken am Flügeldeckenrande weiß; $3\frac{1}{2}$‴; häufig.

* **2.** *Acanthosŏma haemorrhoidāle* L. Gemeine Kielwanze od. Rothafter. Gelbgrün; Hinterleib, vorzüglich nach der Spitze zu, roth; erstes Fühlerglied am längsten, roth; Vorderrücken beiderseits mit rothem, breitem, spitzem Lappen; 7‴; häufig.

* **3.** *Cimex rufipes* L. Gemeine Feldwanze oder rothbeinige Wanze (Schnabel: Fig 110.). Vorderrücken jederseits mit breitem Lappen; Körper gelblich- oder röthlichbraun; Spitze des Schildchens, Fühler und Beine roth; 5‴; häufig.



Fig. 111. Schwarzfühlerige Wanze (*Cimex nigricŏrnis* §. 189.).

* *C. nigricŏrnis* F. Schwarzfühlerige Wanze (Fig. 111.). Vorderrücken wie vorher, schwarz gestreift; Körper [illegible] Beine und Hinterleibsrand rothgelb, letzter [illegible] gefleckt; 5‴; häufig.

* *C. dissimil[illegible]* Vorderrücken abgerundet; Körper ungefleckt, grasgrün, gelblich gerandet; letztes Fühlerglied rothbraun; 5‴; häufig.

* *C. baccārum* L. Qualster. Vorderrücken abgerundet; Körper röthlich- oder gelblichbraun, unten weißlich, schwarz punktirt; Fühler weiß geringelt; Spitze des Schildchens und Randflecken des Hinterleibes weiß; $4\frac{1}{2}$‴; sehr häufig auf Bäumen und durch ihren Geruch noch unangenehmer wie die vorhergehenden Arten.

†* *C. oleracĕa* L. Kohlwanze. Vorderrücken mit deutlichem Querwulste;

§. 189. Körper blau oder grün, Außenrand, eine Mittellinie des Vorderrückens und Spitze des Schildchens weißlich (♂) oder blutroth (♀); 3‴. Schaden jungen Gemüsepflanzen durch Aussaugen der Säfte, sind aber nicht häufig.

* *C. acuminātus* L. Spitzkopf. Kopf keglig zugespitzt; Körper bleichgelblich, mit 3 weißlichen Längslinien; 5‴; häufig, vorzüglich auf Feldern.

* **4.** *Corēus marginātus* L. Gemeine Randwanze. Rothbraun; Kopf in 2 nach innen gewendete Dorne endend; letztes Fühlerglied schwarz; 6‴; sehr häufig.

* **5.** *Pyrrhocŏris aptĕrus* L. Ungeflügelte oder gemeine Rothwanze. Schwarz; Vorderrücken und Hinterleib rothgerandet; Flügeldecken roth, mit 2 schwarzen Punkten; Unterflügel meist fehlend; $4\frac{1}{2}$‴. Saugen todte Insekten, Lindensamen, auch wohl junge Blätter von Linden aus, an deren Fuße sie Frühjahrs in Menge sich begatten.

* **6.** *Pachymērus pini* L. Gemeiner Dickschenkel. Schwarz; Vorderrücken seitlich und hinten bräunlichgelb wie die Flügeldecken, welche einen rautenförmigen, schwärzlichen Mittelfleck haben; $3\frac{1}{2}$‴; überall häufig.

* **7.** *Phytocŏris dolabrātus* L. Hobelwanze. Langgestreckt; gelblichweiß ins Röthliche; Vorderrücken mit 2 schwarzen Streifen, und Schildchen am Grunde schwarz; $3\frac{1}{2}$‴; sehr häufig.

* *Ph. pabulīnus* L. Futterwanze. Langgestreckt; ungefleckt grün; Tarsen schwärzlich; 3‴; häufig.

‡* **8.** *Acanthĭa lectularĭa* L. Bettwanze, Wandlaus (Fig. 112.). Braunroth; ungeflügelt; $2\frac{2}{3}$‴. Schon dem Aristoteles bekannt, welcher sie aus dem Schweiße entstehen läßt. Soll von Ostindien aus sich verbreitet haben und ist in Bettstellen und altem Holzwerk jetzt fast überall häufig und Nachts durch ihre Blutgier dem Menschen eins der lästigsten Insekten. Sie nähren sich indeß auch von andern Substanzen und können jahrelang in altem Holzwerke und in Wänden fortleben ohne menschliches Blut zu kosten. Das ♀ legt im März, Mai, Juli und September jedesmal etwa 50 Eier; die Septemberbrut geht aber fast immer zu Grunde und nur die vollkommenen Insekten, welche in 11 Wochen ausgewachsen sind, überwintern und können starke Kälte ertragen und lange hungern. Gegen kein Insekt sind wohl so viele Vertilgungsmittel angerathen und angewandt. Reinlichkeit bleibt immer ein nöthiges Erforderniß, obgleich sie kein Schutzmittel ist, da Wanzen auch in die reinlichsten Gebäude durch alte Hausgeräthe aus Häusern, welche mit ihnen überhäuft waren, ja selbst durch Bücher kommen können. Um sie zu vertilgen, schlage man die alten Bettstellen auseinander und setze sie der Zugluft und Witterung aus, streiche sie dann mit Oelfarbe an, der man grünen Vitriol oder besser weißen Arsenik beimischt, entferne alte Tapeten, unter deren Fugen besonders die, Fliegenbreck ähnlichen Eier liegen, so wie altes Bretterwerk, ihren Lieblingsaufenthalt, und übertünche die Schlafzimmer neu mit Kalk und Vitriolwasser. Setzt man Schilfmatten oder Tannenbretter mit vielen hineingebohrten Löchern unter die Bettstellen, so kriechen die Wanzen häufig hinein und können [illegible] herausgeklopft werden. Um sich auf Reisen Nachts vor Wanzen zu [illegible] spritze man Citronsaft aufs Bettzeug oder lasse einige Lichte brennen.

Fig. 112. Bettwanze (§. 189, 8).

* **9.** *Nabis vagans* F. Umherschweifende Schnabelwanze. Gelblichgrau; Kopf und Seiten des Körpers schwarzbraun gestreift; 5‴; sehr häufig auf Wiesen.

* **10.** *Reduvius personātus* L. Kothwanze od. gemeine Schreitwanze. Schwarzbraun; Beine rothbraun, Schienen am Grunde weiß; 8‴; ein nächtliches Thier; Larve häufig in Häusern unter Kehricht, oft ganz mit Staub bedeckt.

* **11.** *Hydrométra lacŭstris* L. Schuster. Schwarzbraun; Vorderrücken hinten gekielt; 3 — 4‴; häufig auf Gewässern, stoßweise rudernd.

* **12.** *Velĭa currens* F. Weißfleckiger Wasserläufer. Schwarzbraun; Flügeldecken mit 6 weißen Flecken; 3‴; daselbst häufig.

2. Wasserwanzen (Hydrocŏres). §. 188. Schnabel kurz, gebogen, abstehend. Leben im Wasser von thierischer Nahrung; stechen empfindlich und fliegen Nachts von einem Gewässer zum andern. §. 190.

* **13.** ***Nepa cinerĕa*** L. Wasserscorpion-Wanze (Fig. 113.). Graubraun; Hinterleib oben scharlachroth; 10‴; überall häufig in stehenden Gewässern und empfindlich stechend.

* **14.** ***Naucŏris cimicoĭdes*** L. Gemeine Wasserwanze. Eirund, flach, grüngelb; Kopf und Vorderrücken schwarzbraun punktirt; Flügeldecken und Schildchen schwarzgrün; $5\frac{1}{2}$‴; häufig daselbst.

†* **15.** ***Notonĕcta glauca*** L. Grauer Rückenschwimmer. Walzig, graugelb; Schildchen sammetschwarz; Kopf und Vorderrücken weißgrün; 7‴; häufig und der Fischbrut schadend.

* **16.** ***Corĭxa striāta*** L. Querstreifige Schwimmwanze. Gelblich; Vorderrücken und Flügeldecken schwarzgrün, letztere mit gelben, welligen Querlinien; 4‴; häufig.

* *C.* ***punctāta*** Burm. Ebenso, aber Flügeldecken gesprenkelt; $5\frac{1}{2}$‴.

3. Zirpen (Cicadīna). §. 188. Sie saugen nur Pflanzensäfte. Die größte Zahl derselben lebt in heißen Ländern. §. 191.

17. ***Fulgŏra laternarĭa*** L. Surinamscher Laternenträger. Stirn blasig aufgetrieben; Flügel gelblich; die Hinterflügel mit großem Augenflecke in der Spitze; 2″; der Kopf leuchtet (S. 20,2) vielleicht nur zur Begattungszeit, weshalb das Leuchten von Vielen behauptet, von Manchen geläugnet wird.

F. ***candelarĭa*** L. Chinesischer L. Stirnfortsatz kegelförmig; Flügeldecken grün, gelb gefleckt; Flügel gelb, mit schwarzer Spitze; $1\frac{1}{3}$″; in China und Ostindien.

18. ***Cicāda orni*** L. (Fig. 114.). Eschen-Singzirpe, Manna-Cicade. Gelblich, schwarzbraun gefleckt; Vorderflügel mit 2 Reihen schwärzlicher Flecken; 14‴. — Diese so wie mehre verwandte Arten leben in Südeuropa auf der Manna-Esche, deren Zweige das ♂ mit dem Schnabel, das ♀ auch mit dem Legestachel anbohrt, um den Saft zu saugen, der auch noch nach dem Stiche ausfließt, sich verdickt und als **Manna** für die Apotheken in Handel gebracht wird. Noch häufiger indeß gewinnt man in Calabrien die Manna durch künstliche, horizontale Einschnitte in die Rinde. Der zirpende Gesang dieser Thiere wurde schon von Anakreon besungen. Er wird durch ein, wie ein Trommelfell ausgespanntes und durch einen starken Muskel in Bewegung gesetztes Häutchen an der Basis des Hinterleibes hervorgebracht.

†* **19.** ***Aphrophŏra spumarĭa*** L. Schaumzirpe. Gelbgrau; Vorderflügel

Fig. 113. Wasserscorpion (§. 190.).
Die geöffneten Flügel lassen auf der Abbildung einen Theil der Vorderbeine sehen. Die Oberflügel sind an der Spitze häutig und durchsichtig. Hinterleib am Ende mit 2 langen, borstenförmigen Röhren zum Athmen.

Fig. 114.
Manna-Cicade (*Cicāda orni* §. 191.).

mit 2 schrägen, weißlichen Binden; 3‴. Das ♀ legt die Eier im Herbste zwischen Baumritzen, im April schlüpfen die grasgrünen Jungen aus und schaden durch Aussaugen der jungen Zweige, auf welchen sie unter so genanntem Kuckucksspeichel (dem aus ihrem After hervorgetriebenen Schaume) bis zur Beflügelung sitzen und sich so gegen Feinde, besonders Vögel sichern. Am häufigsten auf Weidenbäumen wie folgende auf Schaumkraute (II. §. 188, 7).

* *A. bifasciāta* L. Zweibändrige Sch. Gelblich; Flügeldecken schwarzbraun oder mit schwarzbraunen Flecken oder Binden; 2‴; auf Wiesen sehr häufig.

§. 192. **4. Pflanzenläuse** (Aphidīna). §. 188. Sowohl Blattläuse als Blattflöhe leben auf Pflanzen, vorzüglich Holzpflanzen (keine auf Kryptogamen), meist auf der Unterseite der Blätter, und schaden durch Aussaugen der Säfte mehr oder weniger.

Unter den Blattläusen sind ♂ und ♀ an Größe und Färbung gewöhnlich verschieden. Die meisten haben am Ende des Hinterleibes 2 Röhren (Honigröhren, Saftröhren oder Luftlöcher?), aus welchen sie einen honigartigen Saft absondern sollen, welcher aber auch aus dem After kommt und von Blattläusen ohne Honigröhren am meisten abgesondert wird, daher denn die Ameisen die Blattläuse mit und ohne Honigröhren besuchen. Auch durch den Stich der Blattläuse selbst fließt aus den Pflanzen ein Saft, welcher meist sehr klebrig ist und Honigthau heißt. Bei der Metamorphose bleiben die Häute oft an diesem Honigthau hängen und bilden den sogenannten Mehlthau. Honigthau entsteht aber nicht allein durch Blattläuse, sondern auch von Entartung der Säfte durch klimatische Einflüsse, wodurch dann Blattläuse angelockt werden. Aus dem Honigthaue bilden sich später Pilze, welche ebenfalls als Mehlthau bekannt sind. Der Glaube, daß der Mehlthau (Melldreck) bei Gewitterregen aus der Luft falle, hat wohl darin seinen Grund, daß sich die Blattläuse bei feuchtwarmer Witterung am stärksten vermehren; doch hat man auch schon mehre Male ungeheure Züge auswandern und dann in solcher Menge aus der Luft fallen und Menschen und Pflanzen so damit bedeckt gesehen, daß man an letztern die Farbe nicht unterscheiden konnte. Die Blattläuse erscheinen meist im Herste erst geflügelt, begatten sich, und legen dann ihre Eier an Zweige und zwischen Baumrinden, wo solche überwintern. Im nächsten Frühjahre kriechen die jungen Blattläuse aus den Eiern, häuten sich 4 mal und legen wieder Eier oder gebären, was am häufigsten geschieht, wieder lebendige Junge, oft schon nach 4 — 10 Tagen, und zwar höchst merkwürdiger Weise ohne Paarung und immer nur Weibchen, welche bis zur zehnten Generation und darüber immer ohne Begattung wieder junge Weibchen gebären bis zum Herbste hin, wo erst die überhaupt sehr selten sich findenden Männchen geboren werden. Eine von Kyber im Zimmer unterhaltene Colonie brachte sogar vier Jahre hindurch ohne ♂ immerfort Junge zur Welt (§. 20b.). Die Blattläuse werden durch ihre starke Vermehrung (in 5 Generationen kann ein ♀ eine Nachkommenschaft von 5 Millionen haben) und große Geselligkeit vorzüglich schädlich. Sie sammeln sich im Frühjahre dicht um die aufbrechenden Knospen und kommen später an die jungen Triebe, welche sie oft ganz bedecken, so daß die Blätter sich krümmen und welken; auch verursachen einigen Pflanzen Auswüchse. Man kann sie durch Tabacksdampf, welchen man unter einen, über die Pflanzen gehängten Tuch bringt, durch Tabacksla[illegible] eine Abkochung von grünen Wallnußschalen, so wie durch Bestreuen der Pflanzen mit Gyps od. Kalkstaub vertreiben. Ihrer zu großen Vermehrung in der Natur werden schon durch viele Insekten fressende Vögel, so wie durch Insekten selbst Grenzen gesetzt, da unter den Käfern vorzüglich die Sonnenkälbchen oder Sonnenkäfer (§. 144.), unter den Zweiflüglern viele Schwebfliegen (§. 172, 30), unter den Netzflüglern die Florfliegen (§. 177.), und endlich auch viele Aderflügler als eifrige Blattlausvertilger bekannt sind. Die meisten Blattläuse sind streng auf bestimmte Pflanzen angewiesen.

* **20.** *Psylla alni* L. Erlen-Blattfloh. Grün; Thorax mit 3 graugelben Flecken; Fühlerspitze schwarz; 1¼‴; häufig in den Blattachseln auf

der Erle, auf welcher auch die mit flockiger Wolle bedeckten Larven truppweise leben.

†* **21.** *Aphis cerāsi* F. Kirschenbaum-Blattlaus. Glänzend schwarz; Saftröhren fast von halber Hinterleibslänge. Die jungen Blätter werden durch ihren Stich unförmlich zusammen gekräuselt.

†* *A. malī* F. Grüne Apfel-Bl. Mattgrün, mit bläulichem Scheine; keine Saftröhren. Unter zurückgerollten Blättern des Apfelbaums.

†* *A. rosae* L. Rosen-B. Grün, ausgewachsen schwärzlich; Saftröhren fast von Hinterleibslänge; Fühler schwarz; $\frac{1}{2}$ — 1‴; häufig auf Rosenbüschen.

†* *A. tanacēti* L. Rainfarn-Blattlaus. Rothbraun; Rücken des Hinterleibs grün; $\frac{3}{4}$‴; auf Rainfarn.

†* *A. brassicae* L. Kohl-Blattlaus. Auf der Unterseite der Kohlblätter. Mehlthau der Landleute.

†* *A. sambūci.* Flieder-Blattlaus. Auf Fliedern. — * *A. vitellinae* und *salicis.* Dotterweiden- und Weidenblattlaus ꝛc.

†* **22.** *Schizoneura lanuginōsa* Htg. Rüster-Haargallen-Blattlaus. Fast schwarz; bewirkt durch ihren Stich die großen, weichhaarigen Blattblasen an Rüsterblättern, welche eine gummiartige Substanz enthalten, die, wie die glänzenden Flocken auf den Blättern, eine Secretion (Ausscheidung körperlicher Feuchtigkeit) der Blattläuse sind.

‡* *Sch. lanigĕra* Htg. Wollige Apfel-Bl., Blutlaus. Hinterleib honiggelb, überall mit weißlicher, flockiger Wolle bedeckt; lassen zerdrückt einen blutrothen Flecken zurück und leben nur an der Rinde der Apfelbäume, vorzüglich an Wunden der jungen Bäume und in den Krebsschäden und Rissen alter Stämme. Im Spätherbste erscheinen die geflügelten Weibchen, welche ihre Eier an die Wurzeln der befallenen Stämme legen, von wo aus die Jungen dieser schädlichsten aller Blattläuse immer höher auf die Stämme steigen und im dichten Zusammenleben dadurch nachtheilig wirken, daß sie den Rüssel bis tief in den Splint einsenken, wodurch die Bäume krank werden und absterben, indem auch die etwaigen Risse und Wunden vom Beschneiden der Bäume nicht vernarben können. Zerdrücken der Blattläuse mit einer scharfen Bürste ist wohl das zweckmäßigste Vertilgungsmittel.

‡* **23.** *Pemphigus bursarius* L. Pappel-Blasenblattlaus. Schwarzgrün, wollig; Beine gelbbraun; $1\frac{1}{4}$‴. Bewirkt an Blattstielen der Pappeln gewöhnlich lockenförmig gekrümmte Gallen.

†* *P. affinis* Klt. lebt ebenfalls an Pappeln und bewirkt auf der Oberfläche der Blätter hellere, blasige Auftreibungen. Eine ähnliche Art bewirkt in nassen Jahren an Zwetschenbäumen die sogenannten Hungerzwetschen, große, steinlose, ungenießbare Taschen.

†* **24.** *Chermes coccinĕus* Rtz. Rothe Fichtenrindenlaus. Braunroth, mit weißer Wolle bedeckt; $\frac{2}{3}$‴; sticht wie *C. viridis*, grüne F., an jungen Fichtentrieben die Nadeln am Grunde an, wodurch sich diese schuppenartig ausbreiten und tannenzapfenähnliche Gallen mit hohlen Räumen für die Jungen bilden.

†* *Ch. laricis* [illegible]chenlaus oder Lerchen-Blattsauger. Ihr Stich bewirkt [illegible]deln eine knieförmige Umbiegung.

5. Scharla[illegible]se oder Schildläuse (Coccina). S. 188. S. 193.

Männchen mit 2 Flügeln (nur das ♂ der häufig auf Schöllkraute lebenden *Aleurŏdes chelidonii* hat 4 schneeweiß bestäubte Flügel), ohne Schnabel und mit vollkommner Metamorphose; ♀ meist ungeflügelt, mit einem Schnabel und mit unvollkommner Verwandlung, rundlich, halbkuglig oder schildförmig, oft mit weißen Flocken bedeckt (nur auf der Bauchseite erkennt man Schnabel und Beine). Sie saugen sich mit dem Schnabel an Baumrinden und Blättern fest, legen die Eier unter sich und bleiben unbeweglich darauf sitzen. Nach dem Tode des ♀ kriechen die Jungen hervor, und suchen sich auf der Pflanze einen bequemeren Platz zum Ansaugen. Beständige

Schmarotzer auf Pflanzen. Werden durch Aussaugen der Säfte, vorzüglich in Treibhäusern, oft schädlich und können durch Abbürsten und Abwaschen der Pflanzen mit einer Tabacksabkochung vertilgt werden. Nur wenige Arten sind nützlich, indem sie Farbestoffe, Manna und Schellack liefern.

25. *Coccus cacti* L. Echte Cochenillelaus. Blutroth; ♂ $^1/_4$‴, mit 2 weißen Flügeln und 2 langen Schwanzborsten; ♀ $1^1/_4$‴, eiförmig, mit geringeltem, weiß bestäubtem Körper. Leben auf Nopalpflanzen (Cochenillen-Fackeldistel, *Cactus opuntia* u. s. w. II. §. 186.) und sind von Mexiko aus nach andern Ländern verpflanzt (zu Malaga in Spanien seit 30 Jahren; kommen auch in Warmhäusern der botanischen Gärten in Deutschland fort). Die Weibchen liefern die berühmte Cochenille zu Scharlach- und Carminfarbe. Auf ein Pfund gehen etwa 70,000 Thierchen. Nach Humboldt führte Amerika im Anfange dieses Jahrhunderts jährlich für 6 Mill. Gulden aus.

C. lacca. Gummilack-Schildlaus. Lebt in Ostindien auf dem indischen und heiligen Feigenbaume (II. §. 266,3), aus welchem durch deren Stich das Gummilack (Stocklack, Körnerlack, **Schellack**) ausfließt, wegen seiner Benutzung zu Firnissen, Kitten, Siegellack u. s. w. ein bedeutender Handelsartikel.

C. mannipărus Ehbg. Manna-Schildlaus. Bewirkt durch Anstechen der Manna-Tamariske in Arabien, besonders in der Umgegend des Berges Sinai, das Hervorquellen einer, an der Luft bald erhärtenden, aber beim Regen herabtröpfelnden Manna.

C. ilicis L. Kermes-Schildlaus. Lebt auf der südeuropäischen Kermeseiche (II. §. 273.), und liefert die Kermes- od. Scharlachkörner des Handels (erbsengroße, mit rothem Safte gefüllte Hüllen), welche statt der theuren Cochenille in der Färberei, so wie zur Bereitung eines schlechten Carmins benutzt werden. Von Kermeskörnern hat die kermesin- oder carmoisinrothe Farbe den Namen.

* *C. polonicus* L. Polnische oder deutsche Cochenille, Johannisblut. Die Eiersäcke finden sich nicht selten an den Wurzeln des jährigen Knäuls (*scleranthus*, II. §. 171.), einiger Habichtskrautarten u. s. w. Sie wurden vor Einführung der echten Cochenille zum Färben gebraucht und vorzüglich in Polen, besonders um Johannis (Johannisblut) eingesammelt.

‡* *C. adonidum* L. Kaffe-Schildlaus und *C. hesperidum* L. Orange-Schildlaus. Beide in Treibhäusern oft eine große Plage.

‡* *C. racemosus* Rtz. Fichtenquirl-Schildlaus. Bildet an dem Astquirlen der Fichte braune Blasen, so daß die Zweige oft ein fast schwarzes Ansehen bekommen und absterben.

†* *C. persicae* Schk. Pfirschen-Sch. An jungen Pfirschenbaumzweigen.

§. 194. **6. Läuse** (Pediculina). §. 188. Ungeflügelte Schmarotzer oder Parasiten (§. 121.) auf Säugethieren, deren Blut sie an stark behaarten Stellen mit ihrem, ganz einstülpbaren Rüssel (Fig. 115 b.) saugen. Sie vermehren sich stark, kleben ihre birnförmigen, lederhäutigen und deshalb beim Zerdrücken knallenden Eier (Nisse) an Haaren fest; die Eier öffnen sich mit einem Deckel, wenn die junge Laus hervorkriecht. Sie sind den Pelzfressern (§. 186.) im Aeußern sehr ähnlich, aber durch ihre Freßwerkzeuge sehr verschieden, pflanzen sich durch Begattung fort, scheinen aber auch [illegible] Zeugung (§. 20 a.) unter gewissen Bedingungen entstehen zu kön[illegible]

†* **26.** *Pedicŭlus pubis* L. Filzlaus (Fig. 115 d.) [illegible]ch; mit kleinem Brustkasten, der kaum geschieden ist vom fast 4eckigen Hinterleibe mit vorstehenden Segmenten an den Seiten; $^1/_2$‴; bei unreinlichen Menschen an stark behaarten Stellen des Körpers. Werden durch vorsichtiges Einreiben von Quecksilbersalbe oder Tabacksjauche vertrieben.

†* *P. suis* L. Schweinelaus. Braungelb; Hinterleib breit, Segmente seitlich vorstehend, letztes mit 2 schwarzen Flecken; $1^1/_2$‴; an Hausschweinen häufig.

†* *P. capĭtis* L. Kopflaus (Fig. 115 a. u. b.). Aschgrau; Hinterleib eirund; Segmente bräunlich gerandet; $^3/_4$—1‴. Vorzüglich am Hinterhaupte des Menschen. Die Jungen kriechen nach 9 Tagen aus den Nissen hervor und sind nach 18 Tagen fortpflanzungsfähig (§. 121.).



Fig. 115. Läuse.

a Kopflaus (*Pediculus capitis*).

b Schnabelscheide der Kopflaus: ungegliedert, ganz einziehbar, am Grunde mit steifen Borsten, am Ende mit doppeltem Hakenkranze, welcher dem Thiere zur Befestigung des Schnabels in der Haut beim Blutsaugen dient. Aus der mittlern, runden Oeffnung werden die 4 borstenförmigen, hornigen Kiefern hervorgeschoben.

c Kleiderlaus (*Pediculus vestimenti*).

d Filzlaus (*Pediculus pubis*).

†* *P. vestimenti* N. Kleiderlaus (Fig. 115c.). Gelblich, schmäler und länger als die Kopflaus; Hinterleibssegmente ungefleckt; $1\frac{1}{4}'''$; nur auf dem Leibe (nie dem Kopfe) und nur bei unreinlichen Menschen.

†* *P. tabescentium.* Läusesuchtslaus. Blaßgelb; Brustkasten sehr groß, 4eckig, Hinterleibssegmente nicht zusammengeschnürt; $1\frac{1}{4}'''$. Findet sich am Menschen während der Läusesucht, durch welche die Haut krankhaft, runzlig und welk wird und sich in Schüppchen ablöset, unter welchen die Läuse hervorkriechen, aber nicht zu gesunden Menschen übergehen. Sie entstehen, wie viele Milben, durch Urzeugung (§. 20a.). Der deutsche Kaiser Max und der spanische König Philipp II., so wie Herodes und Sulla starben an genannter Krankheit.

VI. Klasse. **Arachnidae. Spinnenthiere** (§. 23.). S. 195.

Weißblüthige, flügellose Gliederthiere mit verschmolzenem Kopfe und Bruststücke, mit häutiger oder pergamentartiger Körperbedeckung, 8 Beinen und 2—12, stets einfachen Augen, keinen Fühlern und keiner Verwandlung, aber mehrmaliger Häutung. — Kopf und Bruststück sind ganz zu einem Stücke, dem Kopfbruststücke, verschmolzen. Dieses ist a. entweder mit dem Hinterleibe eng verbunden, und also der Hinterleib sitzend (Milben und Scorpione Fig. 116) oder b. mit einem schmalen Stiele am Hinterleibe befestigt und der Hinterleib also gestielt (Spinnen Fig. 117.). Die Mundtheile bestehen meist a. aus 2 Oberkiefern; b. aus 2 Unterkiefern, an welchen c. zwei oft große, bald faden-, bald zangen-, bald scheerenförmige Taster eingelenkt sind, welche [illegible]igen für Füße angesehen werden; d. aus einer Unterlippe, Lip[illegible]ge. Die Oberkiefern heißen Scheerenkiefern, wenn das klau[illegible]Glied seitlich, und Klauenkiefern, wenn es am Ende des letzten [illegible]oberkiefergliedes eingelenkt ist und zurückgeschlagen werden kann. Die innern Athmungsorgane münden am Hinterleibe und bestehen bei den Spinnen und Scorpionen aus 2 gefalteten Luftsäcken (Lungen) oder bei den Afterspinnen und Milben aus mehren, ästigen Luftröhren (Tracheen). Die Spinnenthiere sind getrennten Geschlechts und pflanzen sich durch Eier fort; nur einige Milben entstehen wohl durch Urzeugung (§. 20a.). Fast alle nähren sich als Räuber von animalischen Stoffen; die meisten vom Fange lebender Insekten, welche sie aussaugen; manche schmarotzen auf Thieren und einige leben von zersetzten organischen Stoffen. Mit Ausnahme einiger Wassermilben leben alle auf dem Lande. Die meisten leben am Tage gern an dunkeln Stellen,

in Schlupfwinkeln verborgen und kriechen Nachts hervor, und dies, so wie das unangenehme Aeußere und die Giftigkeit einiger (Scorpione) macht alle Arachniden bei vielen Menschen zu verhaßten Thieren, obgleich die meisten ihrer Nahrung wegen uns nützlich sind. Man kennt über 3000 Arten (§. 7.).

§. 196. Uebersicht der 4 Ordnungen und deren Hauptgattungen.

A. Kopf und Bruststück verschmolzen.

1) Scorpione. Hinterleib geringelt, sitzend; Kiefertaster mit Scheeren; Haut hart, 2—12 Augen; keine Spinnwarzen.

- Schwanz gegliedert, Schwanzende mit Giftstachel; Scheerentaster: **Scorpione** — 6 Augen. — **Scorpion**. 1) *Scorpio* L.
- Schwanz gegliedert, Schwanzende mit Giftstachel; Scheerentaster: **Scorpione** — 8 Augen. 2) *Buthus* Leach.
- Schwanz fehlend; kein Giftstachel: **Afterscorpione** — Hinterleib oval; mit Scheerentaster; 2 Augen. — **Bücherscorpion**. 3) *Chelifer* Leach.
- Schwanz fehlend; kein Giftstachel: **Afterscorpione** — Hinterleib walzig; Taster nicht scheerenförmig, wie die Beine gebildet. — **Walzenspinne**. 4) *Galeödes* Latr.

2) Spinnen. Hinterleib ungeringelt, kurz gestielt; 2 klauenförmige Kiefern; Haut weich; 6—8 Augen; Spinnwarzen.

- 4 Spinnwarzen; Stellung der Augen — **Buschspinne**. 5) *Theraphōsa* Walck.
- 6 Spinnwarzen; machen kein Gewebe: Jagdspinnen; Augen — **Krabbenspinne**. 6) *Thomisus* Walck.
- 6 Spinnwarzen; machen kein Gewebe: Jagdspinnen; Augen — **Sprungspinne**. 7) *Salticus* Latr.
- 6 Spinnwarzen; machen kein Gewebe: Jagdspinnen; Augen — **Sackspinne**. 8) *Lycōsa* Latr.
- 6 Spinnwarzen; machen ein Gewebe: Weber; Augen — **Hausspinne**. 9) *Tegenaria* Walck.
- 6 Spinnwarzen; machen ein Gewebe: Weber; Augen — **Wasserspinne**. 10) *Argyronēta* Latr.
- 6 Spinnwarzen; machen ein Gewebe: Weber; Augen — **Webespinne**. 11) *Theridium* Walck.
- 6 Spinnwarzen; machen ein Gewebe: Weber; Augen — **Kreuzspinne**. 12) *Epeira* Walck.
- 6 Spinnwarzen; machen ein Gewebe: Weber; Augen — **Sommerspinne**. 13) *Tetragnātha* Latr.

3) Afterspinnen. Hinterleib geringelt, nur durch einen schmalen Eindruck vom Kopfbruststücke geschieden; Kiefern scheerenförmig; Taster (Fühlerfüße) fadenförmig; 2 Augen; keine Spinnwarzen.

- Mundtheile frei hervorragend; Beine lang und dünn. — **Weberknecht**. 14) *Phalangium* L.
- Mundtheile verdeckt; Beine kurz und dick. 15) *Trogūlus* Latr.

B. Kopf, Bruststück und Hinterleib [illegible].

4) Milben. Hinterleib ungegliedert; mit oder [illegible].

- Körper weich; 2 Augen; Taster in der Mitte verdickt; Augen gestielt. — [illegible]. 16) *Trombidium* F.
- Körper weich; 2 Augen; Taster geknickt. — **Büchermilbe**. 17) *Cheylētus* Latr.
- Körper weich; 4 Augen; Beine mit Schwimmborsten; leben im Wasser. **Wassermilbe**. 18) *Hydrāchna* F.
- Körper weich; keine Augen: Thier- und Pflanzenschmarotzer; Füße mit Saugscheibe; Taster verkümmert; Körper oval, mit einigen langen Borsten; Saugscheibe herzförmig. — Milbe (Fig. 118). 19) *Acārus* F.
- Körper weich; keine Augen: Thier- und Pflanzenschmarotzer; Füße mit Saugscheibe; Taster verkümmert; Körper rundlich, fast haarlos; Saugscheibe rund. — **Krätzmilbe**. 20) *Sarcōptes* Latr.
- Körper weich; keine Augen: Thier- und Pflanzenschmarotzer; F. mit Saugscheibe; Taster fadenförmig; Leib mit einem Schilde; Beine lang. — **Schmarotzermilbe**. 21) *Gamāsus* Latr.
- Körper weich; keine Augen: Thier- und Pflanzenschmarotzer; F. mit Saugscheibe; Taster fadenförmig; Leib ohne Schild. 22) *Dermanyssus*.
- Körper lederartig, mit einem Hornschilde; Füße mit zwei Klauen und einer Haftscheibe (Fig. 99.). — **Holzbock**. 23) *Ixōdes* Latr.

1. Scorpibne (Arthrogästra). S. 196. Lichtscheue, durch Biß und Stich S. 197. lästige und gefährliche Thiere.

1. ***Scorpio*** L. Scorpion. Der Schwanz endigt in einen blasigen, an der Spitze gebogenen, durchbohrten Stachel, durch welchen beim Stiche das Gift aus der Giftdrüse des letzten Schwanzgliedes fließt. Sie laufen mit emporgehobenem Schwanze, fassen ihren Raub (Insekten) mit den Scheeren und tödten ihn mit dem Giftstachel, tödten sich aber nie selbst. Nächtliche Thiere heißer Länder, wo ihr Stich tödtlich werden kann; der Stich der südeuropäischen Arten verursacht wohl heftige, durch Einreiben mit Oel zu lindernde und durch innerliche und äußerliche Anwendung von Ammoniak zu hebende Schmerzen, ist aber nicht tödtlich.

† *S. europaeus* L. Europäischer Scorpion (Fig. 116.). Dunkelbraun; Beine u. Schwanzstachel heller; Scheeren herzförmig, kantig; 1—1½"; Italien.

Armen- oder scheerenförmige Kieferntaster (eine Scheere an der Spitze).

Sechsgliedriger Schwanz; Endglied mit einem Giftstachel; vorletztes Glied mit dem After.

Fig. 116. Europäi[illegible]pion von unten, um die kammförmigen Anhänge unter der [illegible]ung vor dem letzten Fußpaare zu zeigen.

‡ **2.** *Buthu[illegible]* Afrikanischer S. Ist 6" lang; Stich tödtlich.

* **3.** *Chelife[illegible]crōides* L. Bücherscorpion. Verkehrteiförmig, rothbraun; Körper 2"', so lang als die Fangarme (Taster) ohne die Scheeren; frißt vorzüglich Milben, deshalb unschädlich; häufig zwischen alten Papieren ꝛc.

4. ***Galeōdes araneoīdes*** F. Walzenspinne. Spinnen ähnlich; graubraun; fast 2"; im Oriente, wo man ihren Biß fürchtet.

2. Spinnen (Araneïna). S. 196. S. 198.

Die 2gliederigen Oberkiefern haben ein klauenförmiges, gegen das Wurzelglied einschlagbares Endglied, unter dessen Spitze eine Spalte, in welche die Giftdrüse mündet. Bei dem ♂ ist das Endglied der Taster verdickt, enthält aber nur Reizorgane, keine Begattungsorgane; diese liegen am Hinterleibe unten

§. 198. in der Nähe des Anheftungsstiels. Sie athmen durch Lungensäcke (§. 195.), leben einsiedlerisch vom Raube der Insekten (vorzüglich von Zweiflüglern), welche sie mit ihrem, aus den durchbohrten Oberkiefern strömenden Gifte tödten und dann aussaugen. Sie sind sehr gefräßig, schonen selbst ihres Gleichen nicht, können aber auch lange hungern. Die im Freien lebenden Spinnen sterben meist zu Anfang des Winters. Der eiweißartige Spinnstoff ist flüssig und klebrig, erhärtet an der Luft, sobald er aus den 4—6 Warzen, deren jede aus vielen, feinen Röhren besteht, gezogen ist. Die zahlreichen Fäden vereinigen sie mit Hülfe der Füße gleich beim Herausziehen zu einem Faden, welcher mehren Arten zum Ueberspinnen der Eierhaufen zum Schutze der auskriechenden Jungen dient; andere weben aus diesen Fäden ein Netz zur Wohnung oder zum Fange ihres Raubes. Man rechnet, daß mehre tausend Fäden aus den Poren unser gemeinen Hausspinne erst etwa die Dicke eines Haares vom Menschen haben. Auch der sogenannte Mädchensommer oder fliegende Sommer, welchen man im Frühjahre und Herbste so häufig in der Luft fliegen sieht, besteht aus solchen Spinnfäden, die nach Einigen nur von Jungen der Gattung *Epēira*, *Thomīsus* und *Lycōsa*, welche zum Spinnen ganzer Gewebe noch nicht genug Spinnstoff haben, ausgespritzt sind, nach Andern aber von besondern, nur 3—4‴ großen Arten herstammen, welche sich willkürlich von ihren Fäden tragen lassen und so in der Luft umherschwimmen können. Nach Bechstein und Stark machen *Araněa obtectrix*, nach Murray *A. aëronautica* und *geometrica junior*, nach Gravenhorst *Tetragnātha extensa Ok.* solche Gespinnste und schiffen damit in der Luft umher. Man hat solche auf die Hand gesetzte Spinnen mit aufgerichtetem Hinterleibe viele Fuß lange Fäden horizontal, schief und auch gerade aufwärts treiben und dann an denselben hinaufklettern und fortfliegen gesehen. — Die größern Ausländer mögen in heißen Ländern durch ihr Gift wohl selbst den Menschen gefährlich werden können; die europäischen Arten sind den meisten Menschen nur durch ihr Aeußeres, durch ihre überall aufgehängten Gewebe, so wie durch ihren Unrath, der auf weißer Wäsche schwärzliche Flecken bildet, unangenehme Thiere. Außer dem Nutzen im allgemeinen Haushalte der Natur, kommt hier wohl nur der früher medicinische Gebrauch ihres Gewebes gegen Wechselfieber und zum Blutstillen, so wie ihre Wetterprophezeiung in Betracht. Verfolgt und verzehrt werden die Spinnen von Affen, Vögeln, Eidechsen, Fröschen, Kröten, Schlupfwespen und Fangheuschrecken.

† **5.** *Theraphōsa avicularĭa* L. Vogelspinne, Buschspinne. Schwarzbraun, sehr behaart; Spitzen der Beine und Palpen und die Haare unter dem Munde rostroth; $1\frac{1}{2}$‴; Beine $2\frac{1}{2}$‴; Südamerika; ihr Biß wird sehr gefürchtet. Frißt Insekten, aber wohl keine Kolibri, saugt aber jungen Vögeln das Blut aus und wird von größern Vögeln gefressen.

Th. cementarĭa Latr. Maurerspinne, Minirspinne. Sie lebt in sandigen Gegenden Südfrankreichs und gräbt sich 1—2′ tiefe, mit Gespinnst austapezirte, unterirdische Gänge, welche mit einer künstlich angelegten, aus Gespinnst und Erde bereiteten, mit einem Scharnier versehenen Fallthür verschlossen werden können (S. 22.). Die äußere Oberfläche des Deckels ist rauh und dem Ansehen nach kaum von der umgebenden Erde zu unterscheiden, die innere Oberfläche ist glatt.

* **6.** *Thomīsus citrĕus.* Gelbe Krabbenspinne, [illegible]gelb; Vorderseiten des Bauches mit blutrothem Streife; $4\frac{1}{2}$‴; auf [illegible] häufig; laufen vor-, rück- und seitwärts.

* **7.** *Saltĭcus scenĭcus* L. Gemeine Tigerspinne. Schwarz; Bruststück weiß gerandet; Hinterleib mit 3, in der Mitte unterbrochenen, weißen Querbinden; ♀ mit weißen, ♂ mit weißgeringelten Beinen; $2\frac{1}{2}$‴; jagt häufig an Mauern und Bretterwänden und überfällt ihre Beute im Sprunge.

* **8.** *Lycōsa saccāta* L. Sackspinne. Schwarzbraun; Rand des Bruststücks, ein Mittelstreif desselben, ein Längsstreif am Grunde des Hinterleibes und Ringel der Beine gelbweiß; Hinterleib mit 2 Reihen weißlicher Punkte; 4‴; häufig. Tragen ihren Eiersack mit sich umher.

§. 198.



Fig. 117. Tarantelspinne.
Ueber derselben die Stellung der Augen.

L. tarantula L. Tarantel (Fig. 117.). Aschgrau; Bruststück weiß gesäumt; Hinterleib oben mit weißen Querstreifen, unten safrangelb mit schwarzem Querbande; 1—1½". Lebt in Südeuropa (Tarent) in Erdlöchern. Ihr Biß wird kaum mehr gefürchtet als bei uns der Stich der Mücken. Daß die von ihr Gebissenen unwillkürlich tanzen müssen und nur durch Musik geheilt werden können, ist Fabel. Der Tarantelntanz ist eine Art Milzsucht, welche namentlich in Tarent die Weiber befällt; Tarantella nennt man auch den beliebten Nationaltanz der Italiener.

* **9.** *Tegenaria domestica* L. Haus-, Fenster- oder Winkelspinne. Gelbbraun; Hinterleib mit 2 Reihen gelblicher Flecke; Beine mit paarig genäherten, schwärzlichen Ringen; 5‴; in ganz Europa. Das horizontale Gewebe meist zwischen 2 Eckwänden in Häusern. Disjouval hält sie nebst der Kreuzspinne für die beste Wetterprophetin, nach denen er 1791 eine starke Kälte prophezeiete.

* **10.** *Argyro[illegible]ica* L. Gemeine Wasserspinne. Rothbraun; Hinterleib grau[illegible] eingedrückter Punkte; 7‴; überall in stehenden Gewässern, der[illegible]e Luftblase gehüllt schwimmend und in einem dichten, wasserleeren, n[illegible]en offenem Gewebe wohnend und von hier ihre Fangfäden an Wasserpflanzen ausspannend.

* **11.** *Theridium redimitum* L. Gemeine Weberspinne. Weißgelb; Hinterleib mit großem, gelbem, breit rosenroth umgränztem und von brauner Längslinie und Punkten durchzogenem Flecke; 2½‴; überall gemein.

* **12.** *Epeira diadema* L. Kreuzspinne. Braunroth bis schwärzlich; Hinterleib mit weißen oder gelben, ein Kreuz bildenden Flecken; Beine schwärzlich geringelt; 6—8‴. Häufig in Gebäuden so wie im Freien ihre senkrechten Netze ausspannend und darin gefangene Insekten aussaugend.

* **13.** *Tetragnatha extensa* L. Sommerspinne. Gelblichgrün; Bauch

an den Seiten silberglänzend, gelblich oder röthlich, oben mit schwarzer, geflederter Längslinie; ausgewachsen 7—9‴. Diese Spinnen verstecken sich in den Röhren der Stoppeln, und leben auch zwischen Schilf an Gewässern. Von ihnen soll vorzüglich der fliegende Sommer herrühren, welcher im Herbste Felder und Wiesen überzieht. An schönen Herbsttagen sieht man die Jungen mit den Geweben in der Luft fliegen. — *Aranea obtectrix* (S. 216.) ist etwas rauh und schwarzbraun, mit gelben Beinen; die 8 Augen liegen im zirkelrunden Kreise; ausgewachsen nur $^1/_2$‴.

§. 199. **3. Afterspinnen** (Opilionina). §. 196. Nächtliche, bei Tage sich verbergende Spinnen, deren langen, dünnen, in der Ruhe weit ausgestreckten Beine leicht ausgerissen werden, und nach dem Ausreißen noch lange nachher zittern (daher Weberknechte).

* **14.** *Phalangium opilio* L. Gemeiner Weberknecht. Bräunlich; Hinterleib auf der Mitte schwarzbraun; Fühlerfüße des ♂ am dritten Gliede erweitert; $3^1/_2$‴; Beine fast 2″; überall in und außer Gebäuden häufig.

* **15.** *Trogulus tricarinatus* L. Grau, platt, rauh; Hinterleib mit erhöhetem Längs- und 3 Querkielen; 6‴; unter Steinen, nicht häufig.

§. 200. **4. Milben** (Acarina). §. 196. Meist kleine Schmarotzer, deren Junge nur 6 Beine haben und besonders häufig an Insekten leben. Die Milben leben von kleinen Thieren im Wasser oder von Pflanzen auf der Erde unter Steinen; einige schaden unsern Lebensmitteln (Käsemilbe), andere schmarotzen an Thieren (Krätzmilbe, Holzböcke).

* **16.** *Trombidium holosericeum* L. Rothe Erdmilbe. Blutroth; Bauch fast 4eckig, niedergedrückt, hinten schmaler; $1^1/_4$‴; häufig unter Gebüschen und zwischen Gartenerde, besonders im Frühjahre; die Larven häufig an den Beinen der Weberknechte schmarotzend. Verzehren junge Raupen.

* **17.** *Cheylētus eruditus* Schk. Büchermilbe. Lebt von Kleister unter Einbänden von Büchern an feuchten Orten.

* **18.** *Hydrāchna aquatica* L. Gemeine Wassermilbe. Lebt mit ihren zahlreichen, oft schön gefärbten Verwandten häufig in allen stehenden Gewässern.

†* **19.** *Acārus siro* L. Käsemilbe (Fig. 118.). Weißlich gelb; $^1/_6$‴; an altem Käse.



Fig. 118. Käsemilbe (*Acārus siro* §. 200, 19).

†* *A. telarius*. Milbenspinne, rothe Spinne. Zeigen sich in Treibhäusern an zu trocken und warm gehaltenen Pflanzen als kleine, rothe Punkte unter den Blättern und lassen sich durch Schwefeldämpfe tödten.

†* *A. farinae*. Mehlmilbe. In altem Mehle. — Auch der weiße Ueberzug auf trocknen Feigen, Zwetschen u. s. w. besteht oft nur aus kleinen Milben.

‡* **20.** *Sarcōptes exulcĕrans* L. Krätzmilbe des Menschen. Platt, rundlich, weißlich gestreift; Rücken höckerig; $^1/_{10}$‴. Bohrt sich in die Furchen der Oberhaut des Menschen ein, gräbt haarfeine Gänge, welche mit einer Pustel oder Krätzblase endigen. Das Thierchen selbst sitzt in den Gängen, verursacht ein starkes Jucken der Haut, [illegible] und verbreitet die Krätze.

‡* *S. equi*. Pferde-Krätzmilbe. Lebt auf rät[illegible]den.

* **21.** *Gamāsus coleopteratōrum* L. Käfermilbe. Eiförmig, weißgelb; $^1/_4$‴; in der Erde und sich gelegentlich Mist- und Aaskäfern in großer Menge anhängend.

†* **22.** *Dermanyssus avium*. Vogelmilbe. Häufig auf Taubenschlägen, Hühnerställen, so wie an Stubenvögeln, denen sie Nachts Blut aussaugen und deshalb röthlich gefärbt sind.

Auch die berüchtigte Giftmilbe Persiens (*Argas persicus*), oft als Giftwanze von Miana in Reisebeschreibungen erwähnt, gehört hierher. Sie lebt in Wänden und Mauern und soll die Einwohner aus mehren Dörfern Persiens vertrieben haben.

†* **23.** *Ixōdes ricinus* L. Gemeiner Holzbock oder Zecke. Blaugrau; vorn auf dem Leibe mit einem kleinen Hornschilde; nüchtern nur $^3/_4$‴,

vollgesogen an Menschen, Hunden u. s. w. oft von Bietsbohnengröße; überall häufig auf Gebüschen.

†* *I. marginātus* Latr. Gerandeter H. (Fig. 119.) Blaugrau; Hornschild den Leib bis auf einen schmalen Rand bedeckend; nüchtern $^3/_4$‴. Häufig.

Fig. 119. Gerandeter Holzbock oder Hundszecke (*Ixōdes marginātus* §. 200, 23).

VII. Klasse. **Crustacea. Krustenthiere, Krebse** (§. 124 b.). §. 201.

Weißblüthige, flügellose Gliederthiere, deren Körperbedeckung kalkig, hornig oder lederartig, selten häutig ist; 2—4 Fühler; einfache oder facettirte, gestielte oder ungestielte Augen; Leib mit vielen, meist ungleichen Ringeln und mit 10 oder mehren, sehr verschiedenartig gebildeten Beinen, an deren Grunde Kiemenblätter.

Der Körper dieser Durchgangsgruppe besteht aus dem Kopfe, Brustkasten und Bauche; zwischen der Grenze der letztern liegt die meist doppelte Geschlechtsöffnung. Am Kopfe befinden sich die Augen und meist 4, selten 2 Fühler, zuweilen mit fadenförmiger Verlängerung (Geißel), und meistentheils auch der Mund. Als Kauwerkzeuge haben die meisten Krebse nur 1 Paar Oberkiefern, welche zwischen Ober- und Unterlippe (Zunge) liegen; alle übrigen sogenannten Mundtheile (Unterkiefer und Kaufüße) liegen in der Nähe außerhalb des Mundes und sind nur als Hülfsorgan zum Kauen, als Hülfskinnladen, richtiger als Füße zu betrachten. Die größte Verschiedenheit im Baue zeigen diese Bewegungsorgane. Sie heißen a) Beine, mit einfacher Klaue endend, zum Gehen (Fig. 120.); b) Scheeren, mit einer Zange endend, zum Greifen (Fig. 120.); c) Raub-, Greif- oder Klammerfüße (Fig. 121 d.), mit einem zurückklappbaren Endgliede, zum Festhalten; d) Flossenfüße (Fig. 121 g.), gespaltene, gegliederte Fortsätze, zum Schwimmen; e) Rankenfüße, sehr lange, spiralig aufgerollte Flossenfüße (Fig. 126.); f) Blattfüße, gespaltene, ungegliederte, häutige Fortsätze, ebenfalls nur zum Schwimmen. Deutlich zeigt sich hier, wie die Natur mit ähnlichen Materialien durch geringe Umbildung die verschiedensten Zwecke erreicht (§. 22.). Der Kopf ist entweder vom Bruststücke getrennt oder innig mit demselben verschmolzen, wie bei den Spinnen, und heißt dann Kopfbruststück. Der Hinterleib (Bauch und Schwanz) ist von verschiedener Länge, trägt nur Flossen- oder Blattfüße und endet meist in Borsten oder Lappen (Fig. 121.). Die Kiemen sind büschelförmig oder blasig und liegen immer außerhalb des Körpers am Grundgliede der Bewegungsorgane. Die feste Hülle der Krebse ist eine Art Epidermis, unter welcher die den höhern Thieren analoge Lederhaut liegt. Diese Hülle wächst nicht und muß bei fortschreitendem Wachsthume abgeworfen werden, wie bei Schlangen und Insekten. Krebse haben eine große Reproductionskraft. **Nahrung:** Alle Krebse leben von thierischer Nahrung und sind meist [redacted]bewohner; nur die Tausendfüßler und einige Asseln leben [redacted] Lande und athmen, wie die Insekten, durch Tracheen (S. 131. [redacted]hme der Rankenfüßler und einiger Parasiten sind alle getrennten [redacted] Bei einigen sind die ♂ gegen die ♀ so klein, daß sie gleich Schm[redacted]rn an dem ♀ hängen. Die ♀ tragen die Eier mit sich umher bis zum Auskriechen der Jungen, welche bei den Kiemenfüßlern erst durch mehrmalige Häutungen ihre nachherige, ganz abweichende Gestalt bekommen und also eine vollständige Metamorphose haben, wie die Insekten (S. 132.). Rankenfüßler und einige Parasiten sind nur in der Jugend den Krebsen ähnlich und verkümmern später dadurch, daß sie Augen, Fühler und deutlichen Kopf in dem Maße verlieren, daß die Parasiten den Eingeweidewürmern, die Rankenfüßler den Molusken ähneln und diesen auch früher, als man ihren innern Bau noch nicht so genau kannte, zugeordnet wurden. — Viele Krebse liefern den Menschen Nahrung (Flußkrebs, Hummer, Taschenkrebs, Garneelen) und früher auch Heilmittel (Krebsaugen, Asseln). Man kennt an 1500 Arten von Krustenthieren (§. 7).

§. 202. Uebersicht der III Ordnungen und 11 Familien mit den vorzüglichsten Gattungen.

I. Malacostráca. Schalenkrebse. Kopf und Leibesringe deutlich; Körperbedeckung meist hart, kalkig, seltner hornartig.

A. Leib in **ungleiche** Ringel getheilt; Brustringel unter einem Panzer; Augen gestielt, beweglich.

- 10 Beine; Kopf u. Bruststück verwachsen: **1) Zehnfüßer od. echte Krebse**
  - Hinterleib (Schwanz) lang: **Langschwänze**
    - Hinterleib mit Schale
      - Körper von oben her zusammengedrückt
        - 6 Füße scheerenförmig, die 2 ersten Scheeren größer — **Flußkrebs** ..... 1) *Astăcus* F.
        - alle Füße scheerenförmig — **Hummer** ..... 2) *Homărus* Edw.
      - Körper seitlich zusammengedrückt
        - Füße ohne Scheeren, erstes Paar groß, Raubfüße — **Garneele** ..... 3) *Crangon* F.
        - 2 ersten Fußpaare mit Scheeren — **Garnat** ..... 4) *Palaemon* F.
    - Hinterleib nackt; Vorderbeine dicker, mit Scheeren; Hinterbeine kürzer, scheerenförmig, zum Festhalten in leeren Schneckenschalen — **Eremitenkrebs** .. 5) *Pagūrus* F.
  - Hinterleib sehr kurz: **Kurzschwänze oder Krabben**
    - Rücken ohne Beine
      - Brustpanzer viel breiter als lang, vorn abgerundet
        - letztes Fußglied krallenförmig, zum Gehen — **Taschenkrebs** (Fig. 120.) ..... 6) *Cancer* F.
        - letztes Fußglied flach, zum Schwimmen — **Schwimmkrabbe** ..... 7) *Portūnus* F.
      - Brustpanzer kreisrund (♀) oder fast kugelrund (♂), Scheeren gleich groß — **Pinnenwächter** ..... 8) *Pinnothēres* Latr
      - Brustpanzer fast herzförmig abgerundet, hoch gewölbt; Scheeren gleich groß — **Landkrabbe** ..... 9) *Geocarcinus* Leach.
      - Brustpanzer dreieckig, nach vorn verlängert, gleichmäßig dornig, 6 Dornen am Seitenrande — **Meerspinne** ..... 10) *Maja* Lam.
    - Rücken mit 2 verkürzten, kleinern Beinpaaren, welche scheerenförmig enden — **Rückenfüßer** ..... 11) *Dromia* F.
- Mehr als 10 Beine; Kopf vom Brustücke getrennt: **2) Maulfüßer**
  - 16 Beine, die 10 ersten in der Nähe des Mundes, mit zurückschlagbaren Haken — **Heuschreckenkrebs** ..... 12) *Squilla* F.

B. Leib in **gleichgestaltete** Ringel getheilt; Brustkasten gegliedert; Augen nicht gestielt, unbeweglich.

- 14 Beine
  - die vordern von den hintern verschieden
    - erstes Segment des Bruststücks vom Kopfe gesondert: **3) Flohkrebse**
      - Mit Springbeinen; auf der Seite schwimmend; Körper seitlich zusammengedrückt — **Flohkrebs** (Fig. 121.) ..... 13) *Gammărus* F.
      - Mit Gangbeinen; Körper walzig — **Wälzer** ..... 14) *Corophium* Latr
    - erstes Segment mit dem Kopfe verwachsen und das erste Fußpaar tragend: **4) Kehlfüßer** — Körper oval, flach; [illegible] 15) *Cyămus* Latr.
  - alle gleichartig **5) Asseln**
    - Wasserthiere: Schwanzanhänge gablig [illegible] *Asĕllus*.
    - Landthiere (Kellerasel)
      - äußere Schwanzanhänge [illegible] gend; kugeln sich vollkomm[illegible] **Rollassel** ..... 17) *Armadillo* Leach.
      - äußere Sch. vorragend
        - Fühler 7gliedrig — **Kellerwurm** ..... 18) *Porcellio* Latr.
        - Fühler 8gliedrig — **Mauerassel** (Fig. 122.) ..... 19) *Oniscus* Latr.
- mehr als 14 Beine: **6) Tausendfüßer**
  - Leib langgestreckt
    - völlig drehrund, hart — **Tausendfuß** ..... 20) *Julus* L.
    - oben flach
      - mit scharfem Seitenrande — **Vielringer** ..... 21) *Polydēsmus* Latr
      - mit abgerundetem Seitenrande — **Scolopender** (Fig. 123.) ..... 22) *Scolopēndra* L.
  - Leib drund-länglich, wie bei den Asseln; können sich kugeln — **Schalenassel** ..... 23) *Glomēris* Latr.

II. Entomostrăca. Kiemenfüßer oder **Muschelkrebse.** Kopf deutlich; Körperbedeckung weich, dünn, entweder ein breites Schild od. eine 2klappige Muschelschale bildend; zahlreiche, gleichförmige, blattartige Schwimmbeine (oft über 100). Meist kleine Wasserthiere, welche sich erst nach der dritten Häutung fortpflanzen können.

- Maul kieferlos, mit 10 Scheerenfüßen umgeben, deren stachlige Hüfte als Kauwerkzeuge dienen: **7) Stachelfüßer** — Körper mit 2 Schildern; Kopfschild hufeisenförmig; Hinterleib mit langem Stachel — **Stachelschwanz** 24) *Limŭlus* F.
- Maul mit Kiefern
  - über 10 platte, gewimperte Schwimmbeine: **8) Blattfüßer** — Leib nur mit einem Schilde; Hinterleib mit 2 langen, vielgliedrigen Borsten — **Blattfuß** ..... 25) *Apus.*
  - nicht über 10 Beine mit walzigen Gliedern: **9) Büschelfüßer**
    - Schale zweiklappig, oval, Kopf und Rumpf umschließend — **Muschelkrebs** ..... 26) *Cypris* Müll.
    - Schale aus einem Stücke gebildet
      - Hinterleib mit 2 Borsten endend; 4 lange Fühler 27) *Cyclops* Müll.
      - Hinterleib ohne Borsten; 2 zweiästige Fühler — **Wasserfloh** (Fig. 125.) 28) *Daphnia* Müll.

III. Pseudocephăla. Kopflose. Kein eigentlicher Kopf, indem der undeutlich oder gar nicht geringelte, vorn abgerundete Körper keine Sinnesorgane zeigt und auf der Unterseite meist einen rüsselförmig verlängerten Saugmund mit Kiefern hat.

- Schmarotzer auf Wasserthieren, vorzüglich Fischen: **10) Fischläuse, Schmarotzerkrebse** — 12 Beine; 2 Fühler; 2 lange Schwanzfäden; Brust unter einem Hautschilde — **Fischlaus** ..... 29) *Caligus* Müll.
- Meerthiere in großen kalkigen, mehrschaligen, immer festsitzenden Muscheln oder in einer weichen, häutigen Hülle: **11) Rankenfüßer**
  - Schale kalkig
    - Schale zusammengedrückt, aus 5 ungleich großen Stücken bestehend — **Entenmuschel** (Fig. 126.) ..... 30) *Anatifa* Lam.
    - Schale tulpenförmig, mit 6 dreieckigen Stücken und 4 Deckelstücken
      - unten geschlossen. — **Seetulpe** .. 31) *Balănus* Brug.
      - unten offen. — — **Wallfischpocke** 32) *Coronŭla* Lam.
  - Schale meist lederartig, nur aus 2 kleinen Schalstückchen bestehend und mit 2 ohrförmigen Röhren — **Langhals** ..... 33) *Otion* Leach.

1. Echte Krebse, Zehnfüßer (Decapŏda) (§. 202.). Die am meisten entwickelten Krustenthiere, bei welchen man sogar Gehörorgane findet, welche an der Basis der äußern Fühler liegen und aus einer kleinen Höhle mit einem ausgespannten Häutchen und einem Säckchen mit Flüssigkeit bestehen. Verjüngen wie alle Krebse im Sommer ihre Schalen. Heißen Langschwänze, wenn sie einen langen, gerade ausgestreckten Hinterleib (Schwanz) mit 5 Endflossen haben; Kurzschwänze oder Taschenkrebse (Fig. 120.), wenn der Hinterleib klein, ohne Endflossen und im Leben gegen die Brust umgeschlagen ist. — Beide Abtheilungen liefern ein geschätztes, aber schwer verdauliches Nahrungsmittel. §. 203.

* **1.** *Astăcus fluviatĭlis* F. Gemeiner Flußkrebs. Innenrand der Scheeren fein gezähnt, Stirnfortsatz vorn und am Grunde jederseits mit einem Zahne; grünlichbraun, [redacted]th; 6″; ♀ mit breiterem Schwanze; ♂ mit größeren Scheeren; in Erdlöchern an Bächen und Flüssen von lebenden und todten Thieren [redacted]fig gegessen. Reproduciren Fühler und Scheeren schnell wieder. Im August, kurz vor der Abwerfung der Schale, finden sich vorn im Raume zwischen der äußern und innern Magenhaut 2, einer halben Erbse ähnliche Steine, welche als Krebssteine oder Krebsaugen früher in der Heilkunde gebraucht wurden. Durch die Häutung, bei welcher sich auch die innere Magenhaut abschält, gelangen die Steinchen (nach Rathke's Beobachtungen) in den Magen, wo sie aufgelöset und zur Bildung des Panzers wieder verwendet werden. Viele Arten dieser und verwandter Gattungen versteinert im Jurakalke.

* **2.** *Homărus vulgāris* Edw. Hummer. Stirnfortsatz jederseits mit 3 — 4 Zähnen; die vordern Scheeren sehr groß, ungleich, die linke mit starken

§. 203. Höckerzähnen; $1\frac{1}{2}$′. In der Nord- und Ostsee werden jährlich in sogenannten Hummerkörben über 1 Million gefangen und als Leckerbissen versandt.

* **3.** ***Crangon vulgaris*** F. Garneele, Garnate. Grünbläulich, grau punktirt, durchscheinend; Bruststück glatt; Stirnfortsatz mit kleinem Zahne am Grunde; 2—3″; häufig und gesellig an unsern Meeresküsten und des angenehmen Geschmacks wegen häufig gegessen.

4. ***Palaemon squilla*** L. Französische Garneele (Salicoques). Stirnfortsatz oben mit 6, unten mit 4 Zähnen; 2—3″; an Frankreichs und Italiens Küsten häufig und sehr schmackhaft.

* **5.** ***Pagūrus Bernhārdus*** L. Bernhards- oder Diogeneskrebs, gemeiner Nacktschwanz. Beine und Scheeren stachlig; rechte Scheere viel größer; 3″; häufig an europäischen Küsten in Schneckenschalen, besonders in Wellhörnern (§. 224,57) umherkriechend, in welchen sie sich mit den 4 hintern Füßen festhalten.

* **6.** ***Cancer pagūrus*** L. Breiter Taschenkrebs (Fig. 120.). Stirn mit 3, Bruststück jederseits mit 9 stumpfen Kerbzähnen; Scheerenspitzen schwärzlich. Wird fast 1′ breit und 5 Pfund schwer. Nicht häufig in europäischen Meeren, aber sehr schmackhaft.



Fig. 120. Breiter Taschenkrebs (*Cancer pagūrus* §. 203, 6.).

* **7.** ***Portūnus puber*** L. Sammetkrabbe. [redacted] Haarüberzuge; Stirn mit 8 Stacheln; Bruststück mit 5 vorwä[redacted]hnen jederseits; Scheeren gefurcht, mit schwarzblauen Spitzen; [redacted] wohlschmeckend.

P. Maenas L. Gemeine Krabbe. Brust[redacted] erseits 5zähnig; Stirn stumpf, 3zähnig; Scheeren kantig, an der Spitze schwa zlich; 2″; zu Millionen an der europäischen, vorzüglich adriatischen Küste, so wie in den Lagunen Venedigs (jährlich für 60,000 Thlr.). Schmackhaft und deshalb wichtiger Handelsartikel.

8. ***Pinnothēres veterum.*** Pinnenwächter der Alten. Kaum $\frac{1}{3}$″ lang; im Mittelmeere. Lebt wie die übrigen Arten wegen des weichen Bruststücks in Gehäusen von lebenden Conchylien, besonders Steckmuscheln (***pinna*** §. 226,90). Schon den Alten bekannt, welche glaubten, daß sie die Muschelthiere vor Gefahr warnten.

9. ***Gecarcinus ruricola*** L. Turturu oder Landkrabbe. Blutroth; Bruststück mit H-förmigem Eindrucke; Stirnkante fein gezähnelt; 2″; Antillen. Leben gegen die Gewohnheit der übrigen echten Krebse in feuchten Löchern auf dem Lande, ja fallen sogar (nach Edwards) in Asphyxie (S. 105.), wenn sie ins Wasser gesetzt werden, weil der Sauerstoff im Wasser für ihre lebhafte Respiration nicht ausreicht. Sie gehen Nachts auf Nahrung aus und wandern jährlich schaarenweise dem Meere zu, um ihre Eier abzulegen. Werden häufig gefangen und als sehr wohlschmeckend gegessen.

10. ***Maja cornuta*** F. Meerspinne. Stirn mit 2, das höckerige Bruststück jederseits mit 5 großen Stacheln; 4″; häufig im Mittelmeere; schmackhaft. Als ***Maja*** schon abgebildet auf den Münzen der alten Griechen, welche ihnen große Klugheit zuschrieben.

11. ***Dromia Rumphii*** F. Rumph's Rückenfüßer. Mit braunem Filze überzogen; $2\frac{1}{2}$″; Mittelmeer. Verbergen sich unter Seeschwämmen u. s. w., welche sie mit ihren Rückenfüßen über sich halten.

2. Maulfüßer (Stomatopoda). §. 202. Der Hinterleib lang, vielgliedrig. §. 204.

12. ***Squilla mantis*** L. Bärenkrebs. Fangklauen mit 6 Zähnen; Hinterleib mit 6 erhabenen Längsleisten; 6—8″; im Schlamme des Mittelmeeres häufig. Werden schon gesotten in Venedig verkauft.

3. Flohkrebse (Amphipoda). §. 202. Kleine Krebse mit 7 Bein- oder Fußpaaren, meist mit gabeligen oder stielförmigen Afterfüßen (Fig. 121 f.) und Schwanzanhängen (Fig. 121 h.). Können mit den Afterfüßen kurze Zeit auf dem Trockenen hüpfen, wenn sie aus dem Wasser genommen werden. Am Grunde der Füße liegen die durch eine Platte bedeckten, blasenförmigen Kiemen. §. 205.

* **13.** ***Gammarus fossarum***. Flußgarneele. Gelbbraun, jederseits ein schwarzbrauner Längsstreif; Schwanzschilder ohne Stachelspitzen; $\frac{1}{2}$″; häufig in Gräben und Bächen; leben von Wasserlarven und dienen den Fischen zur Nahrung.

* ***G. pulex*** L. Gemeiner Bach-Flohkrebs (Fig. 121.). Gelbbraun; Schwanzschilder des 14ringligen Körpers mit kleinen Stachelspitzen; $\frac{3}{4}$″; häufig daselbst.



Fig. [illegible] Bach-Flohkrebs (§. 202, 13 u. 205.).
a. Zwei obere, b[illegible] Fühler; c. Freßklaue oder Kiefernfuß;
d. zwei vordere [illegible]füße, mit zurückschlagbaren Haken, kürzer und dicker als die hintern [illegible];
e—f. fünf hin[illegible] Baue von den vordern verschieden. Die 3 letztern Paare f. sind verlängerte, stielförmige Afterbeine oder Springbeine;
g. gegliederte Anhänge oder Flossenfüße an dem 6ringligen Hinterleibe;
h. stielförmige Schwanzanhänge.

* **14.** ***Corophium longicorne*** F. Langfühleriger Wälzer. Kaum 1″ lang. Zu Millionen Sommers an den Küsten der Nordsee den Schlamm nach Nahrung, besonders Gliederwürmern, durchwühlend.

4. Kehlfüßer (Laemodipoda). §. 202. Meerthiere mit verkümmertem Hinterleibe; frei oder schmarotzend; einige Gattungen den Arachniden sich annähernd. §. 206.

15. ***Cyámus ceti*** L. **Wallfischlaus.** Eiförmig, flach; Füße mit kräftigen Krallen; 1‴. Sitzen als Schmarotzer an Wallfischen so fest, daß sie nicht leicht unverletzt abgerissen werden können.

§. 207. **5. Asseln, Gleichfüßer** (Isopŏda). §. 202. Wasser- oder Landthiere; letztere aber nur an feuchten Orten unter Steinen u. s. w.

* **16.** ***Asĕllus aquatĭcus*** L. **Gemeine Wasseraffel.** Braun, gelb gefleckt; 6‴; einzige europäische Art; unter Schlamm überwinternd und in allen Wassergräben gemein.

* **17.** ***Armadĭllo vulgāris.*** **Gemeine Roll- oder Kugelassel.** Ungefleckt, grau; 4—8‴; unter Steinen und an feuchten, dunklen Stellen gemein.

A. officinārum. **Officinelle Kugelassel.** Graugrünlich, mit 2—3 Längsreihen gelber Flecken; 6—8‴. Kleinasien. Früher als Arzneimittel (millepĕdes) gebräuchlich.

* *A. pulchĕllus* Pz. **Schöne Kugelassel.** Grau, weißgelblich gefleckt; unter Steinen, wie vorige, häufig.

* **18.** ***Porcellĭo scaber.*** **Rauher Kellereselo** oder **Kellerwurm.** Schwarzgrau, ungefleckt oder gelblich marmorirt, gerandet und grob gekörnelt; 4—6‴; häufig.

* *P. pĭctus.* **Bunter Kellereselo.** Gelbgrau, mit schwefelgelben Flecken in Längsreihen; 5‴; häufig.

†* **19.** ***Onĭscus asĕllus*** L. **Gemeiner Maueresel.** (Schweinigel) Fig. 122. Schwarzbraun, mit 2 Reihen gelblicher Flecken und mit gelblich weißem Außenrande; 5—6‴; einzige europäische Art. Nächtliches, den Pflanzen in Gärten zuweilen schädliches Thier, welches gern in hohle Körper (Schweinsklauen, Knochen, Kürbisse u. s. w.) kriecht und deshalb leicht vertilgt werden kann. Um Asseln in Menge zu fangen, höhle man Kürbisse, Kohlrabi ꝛc. durch ein kleines Loch aus, erhalte sie inwendig feucht durch wiederholtes Nachschaben und lege sie so, daß kein Lichtstrahl hineindringt.

Fig. 122. **Maueraffel** (*Oniscus asĕllus* §. 207) von der Oberseite gesehen. Das Grundglied d. 8gliedrigen Fühler wird hier vom Kopfschilde bedeckt.

§. 208. **6. Tausendfüßer** (Myriapŏda). §. 202. Der meist langgestreckte Leib besteht aus 12—50 vollkommen gleichen Ringeln, jeder mit 1—2 Beinpaaren. Durch Luftröhren zwischen den Ringeln athmende, lichtscheue, unter Steinen u. s. w. lebende **Landthiere**, welche Insekten und Crustaceen verbinden.

* **20.** ***Julus terrēstris*** L. **Gemeiner Tausendfuß.** Graubraun; bis 36 gelbgerandete Ringel, deren jeder 2 Beinpaare trägt; über 12‴; häufig unter Steinen und bei der Berührung sich spiralig zusammenrollend.

* *J. sabulōsus* L. Braun; 2 rothgelbe Rückenstreifen; 16‴; daselbst häufig.

* **21.** ***Polydĕsmus complanātus*** Leach. **Platter Vielringler.** Braungrau, mit 20 in der Mitte runzligen, an den Hinterecken zugespitzten Ringeln; 1‴; häufig unter Laube.

* **22.** ***Scolopēndra forfĭcāta*** L. **Gemeiner Vielfüßler.** Braun, 15 Ringel und Beinpaare; Ringel wechselweise [illegible] 1‴; häufig; ihr Biß für Fliegen tödtlich, für Menschen ganz unschädlich.

† *S. morsĭtans* L. **Beißender Scolopender** (Fig. 123.). Kaffebraun; mit 21 Ringeln und Beinpaaren, das letzte dornig; 6—8‴. Ostindien, Amerika, auch Südeuropa. Biß schmerzhaft, aber nicht tödtlich.



Fig. 123. **Beißender Scolopender** (§. 208). Neben den Fühlern jederseits vier Augen.

* **23.** ***Glomĕris pustulāta*** F. Gemeine Schalenassel. Schwarzgrau; Ringel gelb gerandet, mit 2 gelbrothen Flecken; 4‴; häufig.

* ***G. margināta*** Leach. Glänzendschwarz; Ringel hinten gelb; 6‴; häufig.

7. Stachelfüßer (Poecilopŏda). §. 202. Die Kiemen liegen unter Klappen am Hinterleibe, der mit dolchförmigem Stachel endet (Schwertschwänze). §. 209.

24. ***Limŭlus polyphēmus*** L. Molucкischer Krebs. An 2′ lang mit dem Stachel; Eier zu einer Art Caviar (§. 116.); Stachel zu Pfeilen der Wilden.

8. Blattfüßer (Phyllopŏda) §. 202. Maul mit 2 großen, starken Kiefern; Hinterleib am Ende mit Borsten oder Schwimmblättern. §. 210.

* **25.** ***Apus cancriformis*** Leach. Gemeiner Blattfuß. Keine Klappe zwischen den Schwanzborsten; $1\frac{1}{2}$ — 2″; im Schlamme der Pfützen; schwimmt auf dem Rücken und bekommt die zahlreichen Schwimmbeine (an 120) erst durch die Häutungen. — Hierher gehören auch die für die alten Gebirgsformationen so wichtigen ***Trilobiten*** (Fig. 124, a), ausgezeichnet durch die von 2 Längsfurchen in 3 Reihen getheilten Quersegmente. Viele Arten können sich wie Aſſeln zusammenrollen (Fig. 124, b). Die Zahl der Körperringel, welche sich bei Krebsen nicht nur in derselben Familie, sondern auch in jeder Ordnung gleich bleibt, war bei den Trilobiten sehr schwankend, daher kann die Zahl der Brustkastenringel bei den Trilobiten nur als Gattungsmerkmal dienen, während die Menge der Schwanz- und Hinterleibsringel nur Artmerkmale giebt. Durch die Metamorphose nahm die Zahl der Körperringel bis zum reifen Lebensalter hin zu. Fühler fehlten ihnen wahrscheinlich ganz. Von den mehr als 400 bekannten fossilen Arten ist ***Calymĕne Blumenbachii*** Brong. (***Entomolīthus paradŏxus*** Bl.) fast in allen Welttheilen in den silurischen Schichten (in der untern Grauwacke des Uebergangsgebirges) gefunden.

9. Büschelfüßer (Lophyropŏda) §. 202. Nur mit 1 Auge und mit langen, ästigen Fühlern; selten über 1‴ große Süßwasserthiere. §. 211.

* **26.** ***Cypris conchacĕa*** L. Gemeiner Muschelkrebs. Schalen gelblichweiß, glatt, nierenförmig; 1‴; häufig in Regensteinen.

* **27.** ***Cyclops quadricōrnis*** L. Vierhörniger Hüpferling. Brustſtück oval, 4gliedrig; 4 nicht verästelte Fühler; 2‴; in Pfützen und Teichen häufig. Schwimmt wie folgender hüpfend oder ruckweise, und trägt die Eiersäcke frei am Grunde des Hinterleibes. Eine Begattung wirkt, wie bei den Blattläusen (§. 192.), auf mehre Generationen.

* **28.** ***Daphnĭa pulex*** L. Gemeiner Wasserfloh (Fig. 125.). Röthlich; Darm und Eier grünlich; 2 verästelte Fühler; $\frac{2}{3}$‴; häufig, zuweilen das Wasser färbend.



a b

Fig. 124.
Calymĕne Blumenbachii. Blumenbach's Trilobit.
a Oberseite.
b Zusammengerollt von der Seite.



Fig. 125.
Gemeiner Wasserfloh. (*Daphnĭa pulex*, §. 211.).
Unter der lederartigen, nur mit dem Kopfe verwachsenen, übrigens den Leib frei umgebenden Schale scheinen die oben am Rücken liegenden Eier und der etwas tiefer liegende Darm deutlich durch.

§. 212. **10. Schmarotzerkrebse,** Fischläuse (Parasīta) §. 202. Alle schmarotzen an Wasserthieren, vorzüglich Fischen. Nach der ersten Häutung erscheinen die Klammerfüße mit Saugnäpfchen oder Krallen, mit welchen sie sich dann für immer festklammern und die Flossenfüße verlieren (§. 201.). Einige bleiben aber auch immer frei beweglich und diese behalten die Flossenfüße.

29. ***Caligus piscinus*** L. Gemeine Fischlaus. Bleibt beständig beweglich; schmarotzt an Lachsen und Schellfischen; ***Lernaea branchialis*** L. dagegen sitzt für immer in der Haut des Dorsches fest.

§. 213. **11. Rankenfüßer** (Cirrhopŏda) §. 202. Sich selbst befruchtende Zwitter (§. 20,4) des Meeres, welche im vollkommenen Zustande in einer kalkigen, mehrschaligen Muschel oder in einer häutigen Hülle stets an Klippen, Fischen, Mollusken ꝛc. festsitzen. Sie wurden der Schalen wegen früher zu den Mollusken gestellt, unterscheiden sich aber von diesen durch gegliederte Rankenfüße (Fig. 126,4), Nervensystem und eine höchst merkwürdige Verwandlung, indem das aus dem Ei kriechende Thier 1 Auge, 2 lange Fühler und 6 Flossenfüße hat und erst nach mehrmaligen Häutungen, wobei Augen und Fühler verlorengehen, eine Schale bekommt und sich dann mit derselben festsetzt.

30. ***Anatifa laevis*** Lam. Glatte Entenmuschel (Fig. 126.). Mit glatten Schalen; 1″; in europäischen Meeren häufig. Die Alten glaubten, daß Enten aus ihnen entständen.

31. ***Balānus tintinnabŭlum*** L. Seetulpe, Meerglocke. Schale röthlich, längs- und quergestreift; 2″; eßbar; europäische Meere.

32. ***Coronŭla balaenārts*** Gm. Wallfischpocke. Die 6 innern Schalenstücke quergestreift; Zwischenräume strahlig gefurcht. Auf Wallfischen.

33. ***Otion aurītum*** L. Gemeiner Langhals. Auf 4″ langem Stiele an Meerkörpern, besonders im Nordmeere an Wallfischen.



Fig. 126.
Glatte Entenmuschel (*Anatifa laevis*, §. 213.).
1—3. Drei der 5 Schalenstücke sichtbar.
4. Sechs gegliederte, gespaltene Rankenfüße, mit welchen sie einen Strudel im Wasser erregen und kleine ihrem Munde als [illegible] zuführen.
[illegible] artiger, runzliger, ausdehnbarer [illegible] welchem das [illegible] sitzt.

§. 214. VIII. Klasse. **Vermes. Würmer**
(Ringel- und Eingeweidewürmer S. 24.).

Gliederthiere mit einem deutlich oder schwach geringelten, langgestreckten, wurmförmigen, runden oder flachen, weichhäutigen Leibe; keine oder ungegliederte Bewegungsorgane. — Leib nackt oder mit Schuppen, Stacheln, Borsten, Wimpern ꝛc. bedeckt und Schleim od. Kalksubstanz zu Röhren absondernd. Viele haben einfache Augen, fleischige Fäden (tentacŭla) an den Lippen oder gegliederte Fäden und Fühler (antennae). Saugnäpfe, Haken, Borsten oder mit Borsten besetzte Fleischhöcker dienen als eigenthümliche, ungegliederte Bewegungsorgane. Die im Wasser lebender[illegible] Athmungsorgane und ein deutliches Gefäßsyste[illegible] rothem Blute, aber immer ohne Herz; die Ei[illegible] würmer haben keine Athmungsorgane und weiß[illegible] Der meist deutliche Darmkanal endet blind oder mit [illegible] einem After. Einige gebären lebendige Junge, andere legen Eier; einige vermehren sich auch durch Selbsttheilung. Manche Eingeweidewürmer an den unzugänglichsten Stellen z. B. im Fleische, im Gehirn ꝛc. entstehen auch wohl durch Urzeugung (S. 17.). Alle sind nur auf thierische Nahrung angewiesen und deshalb zum großen Theile beständige oder nur temporäre Schmarotzer; alle können nur in feuchter Umgebung leben. Mehr oder weniger schädlich sind alle Eingeweidewürmer, der Regenwurm ꝛc.; nützlich dagegen ist der Blutegel und mehre als Köder beim Fischfange brauchbare Würmer. Man kennt über 1200 verschiedene Arten (§. 7.).

Uebersicht der III Ordnungen und 11 Familien mit den vorzüglichsten Gattungen. S. 215.

I. Annulāta. Roth-, Ringel- oder Rundwürmer. Leib drehrund; entweder Borsten oder Fußhöcker mit Borsten als Bewegungsorgane; keine Sauggrube; After und Mund getrennt.

- Leib gegliedert; Blut roth oder weiß
  - mit Borsten; Blut roth: **Borstenwürmer**
    - mit büschligen, äußern Kiemen: Meerthiere
      - leben frei: 1) **Fühlerwürmer**
        - Fußhöcker deutlich; außer den Borsten noch Gliedfäden
          - Leib kurz, dick, mit 13 Paar weichen Rückenschuppen und steifen, goldglänzenden Borstenbündeln an den Fußhöckern — **Goldraupe** ..... 1) *Aphrodite* L.
          - Leib lang, schnurförmig, ohne Rückenschuppen, aber mit 2 Schwanzfäden — **Meerscolopender** ..... 2) *Nerēis* C.
        - Fußhöcker kaum hervorragend; einfache Borsten ohne Gliedfäden; Leib regenwurmähnlich — **Sandwurm** ..... 3) *Arenicŏla* Lam.
      - leben in Röhren: 2) **Röhrenw.**
        - Röhre lederartig, außen mit Sandkörnern zusammengeklebt — **Sandköcher** ..... 4) *Sabēlla* C.
        - Röhre ganz kalkig
          - spiral gewunden, immer angeheftet — **Scheibenröhre** ..... 5) *Spirŏrbis* Lam.
          - nicht spiral gewunden, frei oder angeheftet — **Wurmröhre** ..... 6) *Serpŭla* L.
    - keine Kiemen: 3) **Erdwürmer**
      - Landthiere: Leib drehrund, ohne Kopf und Augen, mit dickem Gürtel — **Regenwurm** ... 7) *Lumbrīcus* L.
      - Süßwasserthiere
        - Leib fadenförmig, rund; stecken im Schlamme — **Schlammwurm** .. 8) *Tubĭfex* Lam.
        - Leib linienförmig, durchsichtig; schwimmen schlängelnd — **Wasserschlängelchen** ..... 9) *Naïs* L.
  - ohne Borsten; Blut weiß: 4) **Fadenwürmer**
    - in Eingeweiden d. Thiere: Eingeweidewürmer
      - Leib fadenförmig, dünn, an beiden Enden gleich dünn — **Fadenwurm** ..... 10) *Filaria* Müll.
      - Leib walzig, an beiden Enden stumpf; Mund mit Spitzen umgeben — **Pallisadenwurm** 11) *Strongўlus* Müll.
      - Leib walzig, Maulende stumpfer, mit 3 Knötchen — **Spulwurm** ..... 12) *Ascāris* R.
    - frei in Flüssigkeiten: Wasserwürmer
      - L. fadenfg, bis mehre Fuß lang; After unterhalb nahe am Hinterende — **Fadenwurm** 13) *Gordĭus* L.
      - Leib fadenfg, meist mikroskopisch; After oberhalb nahe am Hinterende — **Aelchen** .... 14) *Anguillŭla* E.
- Leib ungegliedert; Blut weiß; Meerthiere: 5) **Strudelwürmer**
  - Leib flachrund, schleimig, mit Wimpern auf der Oberfläche, welche im Wasser einen Strudel hervorbringen — **Schnurwurm** 15) *Nemērtes* C.

II. Trem[illegible]augwürmer. Leib flach, meist lanzettlich, nicht oder n[illegible]elt, ohne Borsten, aber mit Sauggruben.

- frei im Wasser od. an Thieren saugend
  - Le[illegible] r[illegible] besonderer After: 6) **Blutegel**
    - Mund mit 3 harten, kammförmig eingeschnittenen Kiefern — **Blutegel** . 16) *Hirŭdo* L.
    - Mund nur mit 3 Kieferrudimenten — **Pferdeegel** ..... 17) *Aulacostŏma.*
  - Leib nicht geringelt, flach, schleimig; keine Sauggrube 7) **Plattwürmer**
    - Statt der Sauggrube an der Mitte des Bauches eine rüsselförmig ausstreckbare Mündung, zugleich als After, Mund und zum Ansaugen — **Plattwurm** ..... 18) *Planaria* L.
- in Eingeweiden der Thiere: 8) **Sabeldärmer**
  - Leib lanzettlich; 1 Sauggrube mitten am Bauche und 1 am Kopfende, mit dem Munde in der Mitte — **Doppelloch** ..... 19) *Distŏmum.*
  - Leib lanzettlich; 2 Sauggruben hinter einander am Bauche — **Doppelmund** ..... 20) *Diplostŏmum.*

III. Helmintha (Entozōa). **Eingeweidewürmer, Weißwürmer.** Leib flach oder rund, deutlich geringelt; Kopf mit Sauggruben oder mit Häkchen oder mit beiden zugleich; ohne After; nur im Innern der Thiere.

- Leib rund; Kopf mit einziehbarem, hakigem Rüssel: **9) Stachelkopfwürmer.** — nur 1 Gattung. — **Kratzer** ..... 21) *Echinorhynchus* R.
- Leib flach; Kopf eckig
  - Leib bandförmig, sehr lang: **10) Bandwürmer**
    - Kopf mit 2 od. 4 länglichen Gruben, mit oder ohne Hakenkranz. — **Grubenkopf** ..... 22) *Bothriocephälus* R.
    - Kopf mit 4 runden Sauggruben, mit oder ohne Hakenkranz. — **Bandwurm** ..... 23) *Taenia* R.
  - Leib flach, kurz, in eine Blase endend: **11) Blasenwürmer**
    - jeder Wurm erweitert sich hinten in eine kleine Wasserblase. — **Finne** ..... 24) *Cysticercus* R.
    - viele Würmchen hängen in Gruppen an einer großen Wasserblase. — **Quese** ..... 25) *Coenurus* R.

§. 216. **I. Rund- oder Rothwürmer.** Körper rund; Blut roth.

1. Fühlerwürmer. Kopf meist deutlich, mit Augen; Mund meist mit Kiefern und oft mit ungegliederten Fühlfäden. Bauchseite mit fußartigen, borstentragenden Höckern. Frei im Meere lebende ☿.

* **1.** *Aphrodīte aculeāta* L. Goldraupe. Länglich-eirund; Bauch flach wie eine Sohle; Borstenbüschel mit den schönsten Regenbogenfarben schillernd; 4—5″; häufig an allen europäischen Küsten.

* **2.** *Nerēis pelagĭca.* Gemeiner Meerscolopender. Schnurförmig, walzig, bräunlich, wie Stahl schillernd; 3 Kiemenblättchen an jedem Ringel; 5″; häufig im Sande der Nord- und Ostsee.

* **3.** *Arenicŏla piscatōrum* Lam. Der Pier oder Fischer-Sandwurm. Leib lang, walzig; jeder Ringel mit 5 Querfurchen; 18″, federkielbick; zu Millionen im Sande der Nordseeküste; zu Ködern.

2. Röhrenwürmer. Kopf undeutlich, ohne Augen und Fühler; Meerthiere, in Röhren, aus Kalkmasse oder aus Sand und Muschelstückchen zusammengeklebt lebend, wie die Frühlingsfliegen (§. 177.).

4. *Sabēlla penticillus* L. Meerpinsel oder gemeiner Sandköcher. In lederartigen, fingerdicken, 6″ langen Sandröhren (Sandköcher), in welche sie sich mit ihren rothgeringelten Kiemenfäden bei geringster Bewegung zurückziehen; Mittelmeer.

* **5.** *Spirŏrbis nautiloīdes* Lam. Gemeine Scheibenröhre. Mit scheibenförmig gewundener, 1‴ langer Kalkschale; häufig auf Conchylienschalen, Seetang ꝛc.; Nord- und Ostsee.

* **6.** *Serpŭla vermicularis* Gm. Gemeine Wurmröhre. In glatter, wenig gewundener, eckiger Kalkröhre; in allen europäischen Meeren häufig.

3. Erdwürmer. Frei im Wasser oder in [illegible] oder in feuchter Erde lebende ☿ mit steifen Borsten als [illegible]

‡* **7.** *Lumbrīcus terrēstris* L. Gemeiner [illegible]hauwurm. Röthlich; mit 80—120, durch eine Querfurche getheilten Ringeln; kurze Warzen mit steifen Borsten in 8 Reihen am Bauche und an der Seite; ein dicker Ring (Gürtel oder Sattel), vor welchem die Geschlechtsöffnungen liegen; 3—6″; wühlt Gänge in feuchter Gartenerde, kommt bei nasser Witterung Morgens und Abends hervor und lebt vorzüglich von Dammerde, greift aber auch junge Pflanzenwurzeln an. Den Aufenthalt dieser Würmer erkennt man an dem, kleinen Schlammwürstchen ähnlichen Kothe über ihren Löchern. Durch Ofenruß oder frische Gerberlohe, welche man auf der Oberfläche ausstreuet, hält man sie ab. Enten, welche in die Gärten getrieben werden, fressen sie gern und suchen sie deshalb auf; das beste Vertilgungsmittel bleibt aber fleißiges Aufleſen am Morgen und

Abend, wodurch sich zugleich die Maulwürfe zurückziehen, deren vorzüglichste Nahrung Regenwürmer sind. Reproductionskraft (§. 22, 1). — Zahl der Eier (S. 18.).

* **8.** *Tubifex rivulōrum* Blaiv. Bach-Schlammwurm. Röthlich, fadenförmig; 1‴. Zu Tausenden im Schlamme stehender Gewässer, in welchen sie auf dem Boden rothe Flecke bilden, die bei der geringsten Bewegung verschwinden, indem sich die Würmer in ihre Löcher zurückziehen.

* **9.** *Naïs vermiculāris* Gm. Wurmförmiges Wasserschlängelchen. Fadenförmig, durchsichtig; an den Seiten lange, am Bauche kurze Borsten; 2—4‴; häufig an Wasserlinsen.

4. Fadenwürmer. Ohne alle äußere Organe; mit weißem Blute; frei im Wasser oder in Eingeweiden, vorzüglich im Darmkanale anderer Thiere (Eingeweidewürmer, Entozōa).

† **10.** *Filaria medinēnsis* Gm. Medina-Fadenwurm, Medinawurm, Nesselwurm. Einer Darmsaite ähnlich; 2—10′. Eine Plage für die Tropenbewohner, besonders der alten Welt; bei Medina zuerst beobachtet; sitzt vorzüglich an Beinen unter der Haut im Zellgewebe und muß behutsam, indem man ihn um ein Stäbchen rollt, hervorgezogen werden.

* *F. erucārum* Schk. Raupen-Fadenwurm. Füllt oft den ganzen Leib der Raupen aus.

†* **11.** *Strongȳlus gigas* R. Riesen-Pallisadenwurm. An 3′ lang; in den Nieren des Pferdes, so wie *St. armātus* R. im Darmkanale desselben und *St. filaria* R., der Schafwurm, in der Luftröhre der Schafe, den Schafhusten verursachend.

†* **12.** *Ascāris lumbricoīdes* L. Gemeiner Spulwurm. An 6—15″ lang, in den Dünndärmen der Menschen ꝛc.; durch Wurmmittel (II. §. 250, 18) leicht abzutreiben.

†* *A. vermiculāris* L. Kleiner Spulwurm, Aftermade, Kinderwurm. Nur 1/2″ lang; häufig im Mastdarm der Kinder, denen sie Jucken im After und in der Nase (§. 13, III.) und oft Krämpfe verursachen.

* **13.** *Gordius aquaticus* L. Wasser-Fadenwurm, Wasserkalb. Bräunlich, Enden schwärzlich; 1/2—2′; häufig in Teichen, so wie *G. lacteus* L., der schneeweiße Fadenwurm, häufig in Blüthen der Gartenpflanzen.

* **14.** *Anguillula acēti.* Essigälchen. Kaum 1‴; in dem Häutchen des trüben Essigs, so wie *A. glutĭnis*, das Kleisterälchen, in verdorbenem Mehlkleister.

5. Strudelwürmer. Frei im Meere lebende ☿, welche durch den Strudel mit ihren Wimpern kleine Thiere zu ihrer Nahrung herbeiführen.

15. *Nemērtes* (*Borlasia*) *gigas* C. Riesen-Schnurwurm. Leib flachrund; Mund und After genau an den Enden; 6—10′; zwischen Steinen zusammengeknäult, an Englands Küsten.

II. Saugwürmer. Körper flach; Sauggruben als Bewegungsorgane. §. 217.

6. Blutegel, Schlauchdärmer, Egel. Der Darm weite Schläuche bildend. [redacted] sser von kleinern Wasserthieren oder vom Blute der grö[redacted]

* **16.** A[redacted] L. Medicinischer Blutegel. Olivengrün, körnig rau[redacted], schwarzgefleckten Längsbinden auf dem Rücken, und mit schw[redacted]gefleckten Bauche; 3—7″; in Bächen, Teichen und Seen. Wasser- und Sumpfvögel, auch die größern Wasserkäfer (§§. 132. u. 134.) vertilgen viele Blutegel, noch mehr aber werden für den Gebrauch in der Heilkunde gefangen (Frankreich soll jährlich über 33 Mill. Blutegel verbrauchen); daher ihr Vorkommen immer seltner wird, so daß man häufig den ungarischen Blutegel (*H. officinālis*) einführt. Dieser hat eine glatte Oberfläche und einen ungefleckten Bauch und Längsbinden. Die Eier der Blutegel sind mit einem, dem Badeschwamme ähnlichen Gewebe von Form eines Seidenraupen-Cocons umhüllt.

* **17.** *Aulacostŏma nigrescens.* **Pferdeegel.** Grünlichſchwarz; Bauchſeite gelblich; 3—6″; häufig; ſein Biß erregt Entzündung.

7. Plattwürmer, Aſtdärmer. Darm vielfach veräſtelt; häufig auf Waſſerpflanzen ſitzend und von kleinen Waſſerthieren ſich nährend.

* **18.** *Planaria lactĕa* Müll. Milchweißer Plattwurm. Länglich, faſt gallertartig, mit gelblich durchſcheinendem Darme; $^1/_2$″; häufig.

8. Gabeldärmer. Darm gablig. Eingeweidewürmer (Entozōa).

†* **19.** *Distŏmum hepatĭcum* L. Leberegel. Eiförmig, flach, gelbbräunlich; 6—12‴; in Gallengängen der Menſchen und beſonders der Schafe.

* **20.** *Diplostŏmum.* Doppelmund. Die Arten meiſt nur $^1/_6$‴ lang und beſonders in den Augenflüſſigkeiten der Fiſche oft ſo häufig, daß die Augen das weißgraue Anſehen des Staars bekommen.

§. 218. **III. Binnen- oder Eingeweidewürmer.** Leben als Paraſiten nur im Innern anderer Thiere (§. 13 C.); entſtehen (nach Rudolphi) durch Urzeugung und pflanzen ſich durch Eier fort.

9. Stachelkopfwürmer, Hakenwürmer. Mit Widerhäkchen zum Feſthalten. Leben im Darmkanale der Rückgratthiere.

†* **21.** *Echinorhȳnchus gigas.* Rieſenkratzer. Rüſſel faſt kuglig; 1′, das ♂ nur 3″; im Darmkanale der Schweine.

10. Bandwürmer. Die häufigſten und längſten Eingeweidewürmer; im Darmkanale und der Bauchhöhle der Rückgratthiere; jedes reife Glied des bandförmigen Körpers hat zwittrige Geſchlechtstheile (§. 20 b.); die hintern Glieder reißen häufig ab, werden ausgeworfen und durch andere wieder erſetzt.

† **22.** *Bothriocephălus latus.* Breiter Bandwurm, Grubenkopf (Fig. 127. A.). Glieder 3mal ſo breit als lang; Geſchlechtsöffnung auf der Mitte der Glieder; 10—20′; im Darme der Ruſſen, Polen, ſeltner der Deutſchen.

†* **23.** *Taenĭa solĭum* L. Langgliedriger od. Kürbis-Bandwurm (Fig. 127. B.). Glieder 2mal ſo lang als breit; Geſchlechtsöffnung abwechſelnd am Rande; an 50′; im Darme der Deutſchen und Orientalen.



Fig 127. Mittlere, reife (ausgewachſene) Glieder von Bandwürmern.

A. [illegible] m. Geſchlechtsöffnung in der Mitte der Glieder [illegible] mit 2 punktförmigen [illegible]

B. Langgliedriger Bandwurm. Geſchlechtsöffnungen b, c, d abwechſelnd am Rande.

11. Blaſenwürmer, Finnen. Stecken in Blaſen und beſtehen ſelbſt wieder aus Blaſen; im Innern der Thiere, aber nie im Darme.

†* **24.** *Cysticĕrcus cellulōsae* R. Finne, Waſſerblaſe. Schwanzblaſe von Erbſengröße; Leib $^1/_2$″; im Muskelfleiſche u. Specke der Schweine ſehr häufig.

‡* **25.** *Coenūrus cerebrālis* R. Queſe, Schafdrehwurm. Blaſe von Hühnereidicke, mit vielen, 2‴ langen Würmchen. Im Gehirne der Schafe (Queſenköpfe) und denſelben die Drehkrankheit verurſachend (§. 20 a.).

Dritte Abtheilung.

Gastrozōa (Myxozōa). Bauch- oder Schleimthiere. §. 219.

Der stets **ungegliederte** Körper ist bald länglich, bald mehr kuglig, bald scheibenförmig und hat eine weiße, sehr dehnbare, **schleimige** Haut mit großer Neigung zu kalkiger Ablagerung, welche als Schale den Körper umhüllt oder im Innern des Leibes abgesetzt wird. Die äußern Organe bestehen in Wimpern (§. 241.) oder regelmäßigen Ausstrahlungen (§. 228.) oder langen ungegliederten, nicht einziehbaren Fangarmen (§. 222.) oder einziehbaren Fühlfäden. Der Körper besteht aus gar keinen oder aus unzähligen Gliedern (Haarsterne §. 231.), welche aber nie den Gliedmaßen der Gliederthiere (§. 121.) ähnlich sind. — Von den innern Organen ist das Verdauungssystem am meisten entwickelt. Der Darm bildet entweder einen gewundenen Kanal mit Schlund, Magen, Dünn- und Dickdarm und Leber (Mollusken §. 220.) oder stellt nur einen einfachen geschlängelten Kanal (Stachelhäuter §. 231.) oder einen blinden Sack ohne Ausgang (Blumenthiere §. 235.) dar, oder besteht endlich aus vielen rundlichen Magen, welche an dem hintern, offenen Darmkanale hängen (§. 242.). Die Respiration geschieht durch Kiemen oder Lungensäcke oder durch die äußere Haut selbst; im letztern Falle fehlt das mit der Respiration im innigen Verhältnisse stehende Gefäßsystem. Das Nervensystem ist sehr unvollkommen und besteht, wo es deutlicher wird, aus einem Schlundringe, von welchem regelmäßige Radien auslaufen und dessen Verdickung über dem Schlunde das Gehirn darstellt (§. 13. IV.). Die Fortpflanzung geschieht durch Eier (Mollusken) oder durch Theilung u. Sprossenbildung (Infusorien und Polypen) oder durch beides zugleich, da den niedrigsten Familien besondere Fortpflanzungsorgane ganz fehlen und nur die vollkommensten getrennten Geschlechts sind.

Die meisten Bauchthiere sind kopflos und haben keine Sinnesorgane bei deutlicher Sinneswahrnehmung; nur einige haben einen deutlichen, vom übrigen Leibe getrennten Kopf mit Augen, Fühlfäden (§. 14, 1) und selbst mit Gehörorganen (Kopffüßer §. 222.). Die meisten sind Wasser-, vorzüglich Meerbewohner und leben meist von thierischen Stoffen; nur wenige leben auf dem Lande an feuchten Stellen und fressen auch Pflanzen (Lungenschnecken §. 224.). Viele, zu Millionen in südlichen Meeren lebende, sind Mitursache vom Leuchten des Meeres (Quallen und Infusorien). Eintheilung §. 23.

IX. Klasse. Mollusca. Weichthiere. §. 220.

Schleim[illegible] einem Mantel, d. h. von weichen, viel Schleim absondernden Hautlappen umhüllt sind, aus welchen sich bei den meisten ein Kalkgehäuse absondert. Sie haben entweder einen deutlichen Kopf mit Sinnesorganen (die einzigen unter allen Bauchthieren) oder sind kopflos; bei allen sind aber die Organe des Kreislaufes, der Verdauung und Athmung sehr ausgebildet, so daß sie ihrer vollkommnern innern, wie die Gliederthiere ihrer vollkommnern äußern Organisation wegen den Wirbelthieren am nächsten stehen.

§. 220. Der weiche, schlüpfrige, sehr ausdehnbare Körper wird mehr oder weniger locker von einem verschieden gestalteten Hautsacke (**Mantel**) umschlossen, dessen Schleimnetz meist ein kalkiges, schon im Embryo des Eies als dünne Hülle erkennbares **Gehäuse** absetzt, dessen schichtenweise Bildung man am ausgebildeten Gehäuse meist noch deutlich erkennt. Die sehr verschiedene Bildung des Gehäuses ist ganz vom Mantel abhängig. Die Mollusken mit Gehäuse heißen vorzugsweise **Schalthiere**, die ohne Gehäuse **nackte Weichthiere**. Schalthiere mit einschaligem, gewundenem Gehäuse nennt man **Schnecken** (cochlĕae), mit 2 Schalen **Muscheln** (conchae). Das Thier wird entweder ganz oder nur theilweise vom Gehäuse bedeckt; selten ist das Gehäuse sehr klein und ganz im Mantel versteckt. Die vollkommnern Mollusken haben am deutlich geschiedenen Kopfe als **Sinnesorgane**: Fühler, Augen, Zunge und oft hornige Kauwerkzeuge; die Kopffüßer haben auch Gehörsorgane. Die ganze, stets feuchte Oberhaut sieht man als Gefühlsorgan an. Ihre **Bewegungsorgane** sind: **1**) flossenförmige Häute oder fleischige Arme, zugleich zum Greifen, oder **2**) eine fleischige Sohle unten am Bauche, Fuß genannt, womit sie sich festhalten oder langsam fortschieben können. Als **Verdauungsorgane** besitzen sie einen gewundenen Darm und eine meist große Leber; die **Athmungsorgane** liegen meist äußerlich am Leibe unter dem Mantel und bestehen in gefäßreichen Lungenhöhlen oder Kiemen. Der Centralpunkt des Gefäßsystems ist ein muskulöses Herz, welches das bläulichweiße Blut aus den Athmungsorganen empfängt und dem Körper zuführt. Der Hauptstamm des Nervensystems (Fig. 4.) besteht in einem Nervenringe, welcher über dem Schlunde liegt und oben zu einem Markknoten, Gehirnknoten, anschwillt und zahlreiche Körpernerven aussendet. Die Mollusken sind entweder getrennten Geschlechts, oder sich selbst oder gegenseitig befruchtende Zwitter; wohl wenige haben nur einen Eierstock, an welchem sich die Eier ohne Befruchtung entwickeln; nur wenige gebären lebendige Junge; die meisten legen Eier, oft in Menge zusammen, wie man nicht selten in Sammlungen solche getrocknete, erbsengroße, leere, zusammengeballte Eierhüllen vom Wellhorne (§. 224, 57) sieht. Sie sind über die ganze Erde verbreitet und fast überall zu finden, wo ruhiges Gewässer oder feuchter, kalkhaltiger Boden ist; ihre Zahl nimmt nach den Polen hin ab, nach dem Aequator hin zu. Die meisten bewohnen das Meer, wenigere das Land und noch wenigere die Süßgewässer. Die Land- und Süßwasserbewohner, so wie die meisten auf hohem Meere lebenden Arten haben ein **dünnes, zerbrechliches**, die **Küstenbewohner** dagegen meist ein **dickes, festes Gehäuse**, ein Schutzmittel gegen das Ungestüm der Brandungen. Die Wasserbewohner leben vorzüglich von Wasserthieren, die übrigen meist von Vegetabilien.

Am **Gehäuse** unterscheiden wir: **1**) Die Färbung und Zeichnung, welche **a**. von der das Gehäuse überziehenden Oberhaut (epidermis), **b**. von der Stellung der am Mantelrande liegenden Drüsen und **c**. von der Einwirkung des Lichts abhängt, weshalb auch die Bewohner der heißen Zone und der Küsten lebhafter gefärbte, die der kalten Zonen und aus Meerestiefen meist weiß gefärbte Gehäuse haben. Nach der Zeichnung unterscheidet man: punktirt, betropft, besprengt, gefleckt (Fig. 130.), gewürfelt, geflammt, wolkig, marmorirt, netzartig, zickzackstreifig, streifig, bandirt, liniirt, [illegible] gegürtet u. s. w. **2**) Die Sculptur, d. h. die verschiedenartigen [illegible] Vertiefungen: liniirt, gerippt, gefurcht, gefaltet, gestreift, gegit[illegible]t (Fig. 154.), höckerig (Fig. 129.), stachlig (Fig. 131.) u. s. [illegible]. Das **gewundene Gehäuse** ist entweder **a**. gewunden (Fig. 128 — 130.) oder **b**. nicht gewunden (Fig. 131. u. 132.). An den gewundenen **Schneckengehäusen** unterscheiden wir **a**. die Windungen (Fig. 129. u. 130, 7), welche stielrund, niedergedrückt, zusammengedrückt, bauchig, gekielt u. s. w. sein können; **b**. den Wirbel oder die oberste Spitze, mit welcher die Bildung des Gehäuses beginnt (Fig. 128 — 130, 8); **c**. die Basis, den untersten, breitesten Theil mit der größten Windung und der Mundöffnung (Fig. 129. u. 130.); **d**. die Achse oder die senkrechte Linie von der Spitze bis zur Basis (Fig. 130, 2—8); **e**. das Gewinde oder alle Umgänge mit Ausnahme des letztern (Fig. 130, 7). Das

Fig. 128.

Natica lineāta. §. 224, 36.
Linirte Nabelschnecke.

Fig. 129.

Strombus auris Diānae. §. 224, 47.
Dianenohr.

Fig. 130. *Mitra papālis.*
§. 224, 61. Papstkrone.

Fig. 131.

Cytherēa Dione. §. 226, 1
Echte Venusmuschel



6.

132. *Tellina radiāta.* §. 226, 105. Gestrahlte Teilmuschel.

1. Mündung oder Mundöffnung;
2. Basis, untere Seite oder unten;
3. u. 20. rechter Mundsaum, äußerer Rand oder Lippenrand;
4. linker Mundsaum, innerer Rand oder Spindelrand (bei Fig. 130. mit Falten);
5. Spindel oder Spindelsäule;
6. Nabel oder Nabelloch, in Fig. 128. mit einer dicken Schwiele.
7. Windung oder Umgang;
7. 7. 7. Gewinde oder Umgänge;
8. Wirbel oder oben;
9. u. 22. Unterrand der linken Schale.
10. Vorderrand und
11. Hinterrand der linken Schale;
12. Schloß;
13. Wirbel oder Buckel;
14. Schloßband und Schloßleiste;
15. Schloßleiste;
16. Muskeleindrücke;
17. Feldchen, Hofraum (lunula);
18. Schildchen mit dem Schloßbande;
19. rückwärts gebogener Kanal;
20. flügelförmig ausgebreitete Außenlippe;
21. rechte Schale.
22. linke Schale.

§. 220. Gewinde ist erhoben (Fig. 130.), eingesenkt (Tellerschnecke Fig. 148.), eingerollt (Porzellanschnecke, Blasenschnecke); **f.** die Spindelsäule oder Spindel, die wirkliche oder eingebildete Achse, um welche sich das Gehäuse dreht (Fig. 128,5); **g)** den Nabel oder das unten befindliche, mehr oder weniger tiefe Loch, welches entsteht, wenn die Umgänge nicht ganz aneinander schließen (Fig. 128,6). Die Perspectivschnecke ist weit genabelt, die Weinbergsschnecke bedeckt genabelt u. s. w.; **h.** die Mündung oder Mundöffnung oder die bei einigen durch einen Deckel verschließbare Oeffnung, aus welcher das Thier hervorkriecht (Fig. 128. u. 130.); **i.** den Mundsaum (peristŏma) oder den äußern Rand der Mündung (Fig. 128. u. 130,3 u. 4); **k.** den Spindelrand oder Innenrand, den innern, auf der Spindel liegenden Rand der Mundöffnung (Fig. 128. u. 130, 4 u. 5); **l.** den Lippenrand oder Außenrand (labrum) oder den dem Innenrande entgegengesetzten äußern Rand (Fig. 128. u. 130,3). Die Mündung kann kreisrund, eiförmig, halbkreisförmig, mondförmig, birnförmig (Fig. 145.) u. s. w. sein. **m.** Die Form des Gehäuses. Diese ist: kuglig, eiförmig, kreiselförmig, kegelförmig (Fig. 141.), thurmförmig oder gethürmt (Fig. 153.), spindelförmig (Fig. 145.), walzenförmig, scheibenförmig (Fig. 148.), ohrförmig u. s. w.

An der Muschel unterscheidet man **a.** den Unterrand, den Theil, wo die Schalen oder Klappen sich öffnen (Fig. 132,9); **b.** den Oberrand, der jenem entgegengesetzt ist und Wirbel und Schloßband enthält (Fig. 132,16—16); **c.** den Vorderrand (Fig. 131.) oder das stumpfere, meist kürzere Ende; **d.** den Hinterrand (Fig. 131.) oder das längere, spitze Ende; **e.** die linke und rechte Schale (Fig. 131.21 u. 22). Wenn wir eine Muschel auf die Oeffnung stellen, das stumpfere vordere Ende von uns ab und das längere, spitzere Ende mit dem Schloßbande zu uns her gerichtet, so liegt uns die rechte Schale rechts und die linke links; **f.** das Schloß (cardo Fig. 132,12) oder die aus Zähnen (Schloßzähnen) und Leisten (Schloßleisten, Seitenzähnen) gebildete Vorrichtung, durch welche die Schalen sich aneinander schließen; **g.** das Schloßband (ligamentum Fig. 132,14), das knorpelige Band hinter dem Schlosse, welches durch seine Zusammenziehung die Muschel öffnet; diesem Bande entgegen wirken 1 oder 2 Muskeln, welche im Innern der Schale sich jederseits **h.** in Muskeleindrücke (Fig. 132,16) oder Vertiefungen der Schalen ansetzen und die Schalen schließen; **i.** die Buckel, Wirbel, Schnäbel (umbŏnes, nates Fig. 131. u. 132,13), die beiden Erhöhungen der Schale neben dem Schlosse; **k.** das Schildchen (arĕa Fig. 131,18), den vor den Wirbeln liegenden, meist anders gefärbten Theil der Schale; **l.** das Feldchen, den Hofraum, das Mahl (lunŭla Fig. 131,17), den hinter den Wirbeln liegenden Theil. Die Muschel heißt: *a)* klaffend, wenn die Ränder nicht fest zusammenschließen, *b)* gleichseitig (Fig. 172.), *c)* ungleichseitig (Fig. 131.), *d)* gleichschalig (Fig. 131.), *e)* ungleichschalig (Fig. 157—159.).

Die Mollusken nützen: **1)** als Nahrungsmittel, da fast in allen Ländern Mollusken gegessen werden: Sepien, Weinbergsschnecken, Austern, Napfschnecken, Kammmuscheln, Mießmuscheln, Herzmuscheln, Trigamuscheln, Messerscheiden u. s. w.; **2)** durch ihre Perlen und Perlmutter: Fluß- und Meerperlmuschel; **3)** durch eigenthümlichen [illegible] färben. Der Purpur wurde, ehe die Cochenille (§. 193,25) in Gebrauch kam, vom Weitmunde, vom Meerhasen, Janthina u. s. w. gewonnen [illegible] die schöne, als Sepia bekannte Malerfarbe und in ihrer [illegible] Sepiae) ein Polirmittel und Zahnpulver. **4)** Als Scheidemünze werden in Bengalen und andern Ländern die Kauri gebraucht; aus manchen Arten machen die Irokesen ihre Wampums oder Denkschnüre. **5)** Zu Kleidungsstücken wird der gelbbraune Bart von Steckmuscheln verarbeitet; zu Kunstarbeiten, Gefäßen, Löffeln, Dosen, dienen die Schiffsboote, Kammmuscheln, Porzellanschnecken u. s. w.

Schädlich sind nur: **1)** einige Landschnecken, vorzüglich die nackten und gefräßigen Ackerschnecken und in heißen Ländern Achatina zebra und mauritiana etc.; **2)** die Bohrmuscheln, Pfahlmuscheln u. s. w., welche Schiffe und Dämme durchbohren. — Man kennt über 11,000 Arten Mollusken (§. 7.).

Uebersicht der Weichthiere nach den Gehäusen ohne Rücksicht auf die verschiedene Bildung des Thieres. §. 221.

- **Mit einer Kalkschale (Gehäuse)**
  - **Gehäuse einschalig**
    - ohne Fächer oder Abtheilungen im Innern und nicht spiral gewunden ..... I. Nr. 1—9.
    - viele Fächer im Innern (Fig. 133, C.) ..... II. Nr. 10—14.
    - nur ein Fach im Innern und Gehäuse spiral gewunden
      - Mundöffnung weder kanalartig noch ausgerandet . III. Nr. 15—48.
      - Mundöffnung kanalartig oder ausgerandet ..... IV. Nr. 49—74.
  - **Gehäuse mehrschalig**
    - 2schalig
      - in oder an einer Kalkröhre befestigt oder frei in derselben ..... V. Nr. 75—77.
      - frei und ohne Kalkröhre
        - Schalen ungleich groß und ohne Fortsätze beiderseits am Schlosse ..... VI. Nr. 78—87.
        - Schalen gleich groß oder fast gleich groß ..... VII. Nr. 88—121.
    - vielschalig ..... VIII. Nr. 122—125.
- **ohne Kalkschale** ..... IX. Nr. 126—131.

I. Gehäuse einschalig, nicht spiralförmig gewunden und ohne Fächer oder Abtheilungen im Innern.

- **Eine Rückenplatte im Mantel des Thieres**
  - Rückenplatte schwert- oder lanzettförmig, hornig — **Kalmar** ..... 1) *Loligo* Lam. §. 221.
  - Rückenplatte elliptisch, porös, kalkig — **Dintenfisch** . 2) *Sepia* L. §. 222,3.
  - Rückenplatte scheidenförmig, flach, strahlig gestreift, hornartig — **Seehase** ..... 3) *Aplysia* L. §. 224,65.
- **Eine kalkige, äußere Schale**
  - röhrenförmig*), beiderends offen, einem Elephantenstoßzahne ähnlich — **Meerzahn** ..... 4) *Dentalium* L. §. 224,73.
  - im Scheitel mit einem Loche — **Schlitzschnecke** 5) *Fissurella* Lam. §. 224,68.
  - mützen- od. napfförmig — Scheitel ohne Loch
    - Vorderrand gespalten — **Mützenschnecke** ..... 6) *Emarginula* Lam §. 224,69.
    - Vorderrand ganz
      - Schale stark (im Meere) **Napfschnecke** ..... 7) *Patella* L. §. 224,78.
      - Schale dünn, zerbrechlich (im Süßwasser) — **Finnnapfschnecke** .. 8) *Ancylus* Geoffr. §. 224,71.
  - blasenförmig, hornig, an den Seiten gespalten, hinten mit 3 Spitzen ..... 9) *Hyalaea* Lam. §. 223.

II. Gehäuse einschalig, vielfächerig d. h. mit vielen Abtheilungen oder Kammern im Innern.

- **Spiralgewunden**
  - mit Loben d. h. Wände der Kammern mit ihren Rändern auf- u. niedergebogen und dadurch in die Außenschale mit Zähnen eingreifend (Fig 133, B); meist alle Umgänge äußerlich sichtbar; Nervenröhre (Siphо) längs des Rückens zwischen den Kammerwänden und der äußern Schale liegend, oft einen Randkiel bildend (Fig. 138.) — **Ammonshorn** 10) *Ammonites* Lam. (Fig. 133.). §. 222,7.
  - ohne Loben d. h. Wände der Kammern ohne Zähne eingreifend; nur der letzte Umgang sichtbar und die übrigen ganz oder großen Theils bedeckend und einschließend
    - Nervenröhre in der Mitte der vertieften Scheidewände — **Schiffsboot** . 11) *Nautilus*. §. 222,5.
    - N. fehlend. (Ist richtiger zu den Korallen zu zählen) — **Numulit** ..... 12) *Numulina* d'Orb. §. 222,6.
- **Gerade, kegelförmig**
  - einfach, aus einer Reihe uhrglasförmiger, auf einander gesetzter Kammern bestehend, welche in der Mitte nach dem Rücken eine Nervenröhre haben — **Geradhorn**. 13) *Orthocëras* Lam. (Fig. 141.). §. 222,8.
  - doppelt, äußere Scheide einen innern, kegelförmig mit zahlreichen, am äußersten Rande [illegible] versehenen Querwänden umschließt (Fig. 142. u. 143.) ..... 14) *Belemnites*. §. 222,9.

Fig. 133.
A *Ammonites nodōsus* §. 222,7. Knotiges Ammonshorn. Ansicht von der Seite.
B Dasselbe vom Rücken her, um die Loben zu zeigen.
C Ein durchschnittenes Ammonshorn, um die Kammern zu zeigen.

*) Die röhrenförmigen Gehäuse, an welchen noch 2 kleine Schalen sitzen, welche das eigentliche Gehäuse bilden, suche man unter den zweischaligen Gehäusen oder Muscheln auf Seite 239.

§. 221. **III. Gehäuse einschalig, mit einem Fache; Umgänge volls**

Umgänge des dünnen quergerippten, kahnförmigen Gehäuses völlig concentrisch, so daß d

Umgänge nicht concentrisch

Windungen nicht oder nur wenig hervorstehend, nicht schraubenförmig (nur bei einigen Nabelschnecken schraubenfg, dann aber durch die Schwiele am Nabel kenntlich)

Gehäuse ohrförmig, links mit eine

Gehäuse nicht ohrförmig

Umgänge beiderseits

Umgänge nur oben

Windungen mit der Spitze über die äußern Umgänge hervorstehend u. daher die Umgänge mehr oder weniger schraubenförmig

Mundöffnung mit Zähnen oder Falten . . . . . .

Mundöffnung ohne Falten und ohne Zähne

Mundöffnung etwa so hoch als

Mundöffnung höher als breit.

Spiralig gewunden; Mundöffnung weder kanalartig noch ausgerandet. §. 221.

- große Windung die übrigen ganz einschließt — **Papierboot** . . . . . 15) *Argonauta* L. §. 222,4.
- Becher — **Seeohr** . . . . . 16) *Haliōtis* L. §. 224,67.
- nach Innen gekerbt; Gehäuse flach kreiselförmig — **Perspectivschnecke** . . 17) *Solarium* Lam. §. 224,38.
- nicht gekerbt; Gehäuse scheibenförmig, wie ein Band aufgerollt — **Tellerschnecke** (Fig. 148.) . . . . . 18) *Planorbis* Brug. §. 224,23.
- Gehäuse außen scharf gekielt, linsenförmig — **Lampenschnecke** . . . . . 19) *Caracōlla* Lam. §. 224,14.
- Gehäuse außen mit Lappen oder Höckern — **Lappenschnecke** . . . . . 20) (32) *Delphinŭla* Lam. §. 224,30.
- Gehäuse nicht so
  - ohne Nabel
    - Windungen in das eiförmige Gehäuse fast ganz eingesenkt; Mundöffnung von Länge des Gehäuses; Spindelseite S förmig gekrümmt — **Blasenschnecke** . . . . . 21) *Bulla* Lam. §. 224,66.
    - W. nicht eingesenkt, wenig hervorstehend; Mundöffn. halbkreisrund oder halboval
      - rechter Mundsaum mit Zähnen oder Kerben — **Mondschnecke** . . . . 22) *Nerita* Lam. §. 224,37.
      - rechter Mundsaum ohne Zähne und ohne Kerben — **Schwimmschnecke** . . 23) *Neritīna* Lam. §. 224,38.
  - mit Nabel
    - durch eine Schwiele mehr oder weniger verdeckt (Fig 152.) — **Nabelschnecke** . . . . . 24) *Natica* Lam. §. 224,36.
    - nicht verdeckt, weit offen. Einige Schnirkelschnecken . . . . . 25) (28, 31, 36) *Helix* L. §. 224,13.
- Gehäuse linksgewunden, spindelförmig; Mundsaum nicht unterbrochen; Mundöffnung birnförmig — **Schließmundschnecke** (Fig. 145.) . . . . . 26) *Clausilia* Drap. §. 224,16.
- Gehäuse rechtsgewunden
  - Gehäuse walzig-eiförmig; Mundsaum unterbrochen, Mündung halbeiförmig — **Moosschraube** (Fig. 146.) . . . . . 27) *Pupa* Drap. §. 224,17.
  - Gehäuse plattgedrückt-kuglig; Mündung mit mehren Falten, halbmondfg. — Einige Schnirkelschnecken . . . . . 28) (25, 31 u. 36) *Helix* L. §. 224,13.
  - Gehäuse kegelförmig; Spindel nach Innen mit einem stumpfen Zahne — **Einzahn** . . . . . 29) *Monodōnta* Lam. §. 224,33.
- Gehäuse weit genabelt, kreisel- od. scheibenfg
  - Gehäuse glatt, dünnschalig (Land- und Süßwasserschnecken)
    - Mundsaum nicht unterbrochen; Mündung rund; Gehäuse kreisel- oder scheibenförmig — **Kammschnecke** . . . . . 30) *Valvāta* Müll. §. 224,25.
    - Mundsaum unterbrochen; Mündung halbmondförmig. — Einige Schnirkelschnecken . 31) (25, 28, 36) *Helix*. §. 224,13.
  - Gehäuse nicht glatt, dickschalig (Meerschnecken)
    - Windungen mit Lappen oder Höckern — **Lappenschnecke** . . . . . 32) (20) *Delphinŭla* Lam. §. 224,30.
    - Windungen mit scharfen Längsrippen — **Wendeltreppe** . . . . . 33) (37) *Scalaria* Lam. §. 224,34.
- Gehäuse nicht oder nur eng genabelt; Basis des Gehäuses flach, daher die Mundöffnung niedergedrückt, fast 4eckig — **Eckmund** . . . . . 34) *Trochus* L. §. 224,29.
- Gehäuse nicht oder nur eng genabelt; Basis gerundet
  - Mundöffnung **halbmondförmig**
    - Gehäuse glasig, durchsichtig, fast kuglig (Süßwasserschnecken) — **Glasschnecke** . . . . . 35) *Vitrina* Drap. §. 224,20.
    - Gehäuse nicht glasig und nicht durchsichtig (Landschnecken) — **Schnirkelschnecke** . . . . . 36) (25, 28, 31) *Helix* L. §. 224,13.
  - Mundöffnung kreisrund oder rundlich eiförmig
    - Windungen mit Längsrippen — **Wendeltreppe** . 37) (33) *Scalaria* Lam. §. 224,34.
    - dickschalig (Meerschnecken)
      - W. ohne Längsrippen
        - rechter Mundsaum mit einer Ausbucht in der Mitte; Gehäuse thurmförmig, mit Querrippen — **Schraubenschnecke** . . . . . 38) *Turritella* Lam. §. 224,35.
        - rechter Mundsaum nicht so
          - Mundöffnung fast kreisrund — **Kreiselschnecke** . . . . . 39) *Turbo* L. §. 224,31.
          - Mundöffnung rundlich-eiförmig, oben spitz — **Uferschnecke** . . . . . 40) *Littorina* Fer. §. 224,32.
    - dünnschalig (Land- und Süßwasserschnecken)
      - Mundsaum stets scharf; Mundöffnung oben etwas winklig. (Im Wasser) — **Sumpfschnecke** (Fig. 150.) . . . . . 41) *Paludina* Lam. §. 224,26.
      - im Alter zurückgeschlagen; Mundsaum Umgänge kreisrund. (Auf dem [illegible] **Kreismund** . . . . . 42) *Cyclostōma* Lam. §. 224,21.
- äußerer Mundsaum [illegible] zurückgeschlagen; Mundöffnung spitz eiförmig; Gehäuse [illegible] — **Vielfraßschnecke** . . . . . 43) *Bulimus* Lam. §. 224,15.
- äußerer Mundsaum stets scharf und nicht zurückgeschlagen
  - Mundsaum unter der Spindel ausgeschweift; Gehäuse thurmförmig — **Kronschnecke** (Fig. 151.) . . . . . 44) *Melania* Lam. §. 224,27.
  - Mundsaum nicht ausgeschweift
    - Spindelsäule an der Basis abgestutzt; Gehäuse länglich-eiförmig — **Achatschnecke** . . . . . 45) *Achatina* Lam. §. 224,18.
    - Spindelsäule nicht abgestutzt; letzte Windung fast das ganze Gehäuse bildend
      - rechts gewunden
        - Spindelsäule mit lamellenartigem Umschlage — **Schlammschnecke** . . 46) *Limnaeus* Lam. §. 224,24. (Fig. 149.)
        - Spindelsäule ohne Umschl.; Geh wachsgelb, durchsichtig — **Bernsteinschnecke** (Fig. 147.) . . 47) *Succinĕa* Drap. §. 224,19.
      - links gewunden — **Blasenschnecke** 48) *Physa* Drap. §. 224,23.

§. 221. IV. Gehäuse wie vorher, aber Mundöffnung mit einem Kanale oder einer Ausrandung.

- **Kanal gerade oder gekrümmt**
  - **rechter Mundsaum nicht ausgebreitet**
    - **ohne Mundwulst (wulstig verdickter Rand der Außenlippe)**
      - **Spindel mit Falten**
        - Gehäuse spindelförmig, mitten bauchig; 2—3 schräge Falten auf der Spindel. — **Bandhorn** ... 49) *Fasciolaria* Lam. §. 224, 39.
        - Gehäuse thurmförmig; Umgänge mit erhabener Naht; 1-2 Falten auf der Spindel, erscheinen auf Steinkernen als Rinnen. — Nur versteinerte Arten (Fig. 153.) ... 50) *Nerinaea.* §. 224, 40.
      - **Spindel ohne Falten**
        - Gehäuse thurmförmig; Mündung länglich und schief gegen die Längsachse; rechter Mundsaum oben mit kleiner Rinne. — **Hornschnecke** 51) *Cerithium* Brug. §. 224, 41.
        - Gehäuse bauchig: Bauch in der Mitte oder unten. — **Spindel** .. 52) *Fusus* Lam. §. 224, 42.
        - Gehäuse bauchig: Bauch über der Mitte. — **Feige** ... 53) *Pyrula* Lam. §. 224, 43.
    - **mit Mundwülsten**
      - nur ein Mundwulst; Gewinde kurz; Gehäuse bauchig-eiförmig; Außenlippe meist innen gezähnt. — **Sturmhaube** ... 54) *Cassis* Lam. §. 224, 49.
      - mehre Mundwülste: Mundwülste auf jedem Umgange 3 od. mehre fortlaufende (d. h. zusammenhängende), höckerige, dornige oder blättrige Längsreihen bildend. — **Stachelschnecke** ... 55) *Murex* L. § 224, 44
      - M. keine fortlaufende Längsreihen bildend, sondern um 3/4 Umgänge auseinander stehend. — **Trompetensch.** ... 56) *Tritonium* C. §. 224, 45.
  - **rechter Mundsaum flügelartig ausgebreitet**
    - Ausschnitt im Flügel mit dem Kanal zusammenfließend; Flügel gezähnt oder gelappt. — **Schnabelschnecke** ... 57) *Rostellaria* Lam. §. 224, 46.
    - Ausschnitt vom Kanale getrennt: Flügel ungetheilt. — **Flügelschnecke** (Fig. 155) 58) *Strombus* L. §. 224, 47.
    - Flügel mit fingerförmigen Fortsätzen. — — **Flügelhornschnecke** ... 59) *Pterocĕras* Lam. §. 224, 48.
- **Statt des Kanals eine schiefe, rückwärts gehende Ausrandung**
  - **Spindel ohne Falten**
    - Mundöffnung so hoch od. fast so hoch, als das aufgerollte Gehäuse und sehr schmal, fast linienförmig
      - Gehäuse eiförmig
        - Mündung nur an einer Seite gezähnelt. — **Eischnecke** 60) *Ovŭla* Lam. §. 224, 50.
        - M. beiderseits durch Querfalten gezähnt. — **Porzellanschnecke** ... 61) *Cypraea* L. §. 224, 51.
      - G. umgekehrt-kegelig, M. linienf., fast so hoch als das Gehäuse. — **Kegel** 62) *Conus* L. §. 224, 52.
    - **Mundöffnung kürzer und breiter**
      - Geh. bauchig, nicht 2mal höher als die ovale Mündung
        - Gehäuse thurmförmig, mit langem, spitzem Gewinde, wenigstens zweimal höher als die Mündung; Spindelbasis gewunden. — **Schraube** 63) *Terĕbra* Lam. § 224, 53.
        - Sp. unterwärts nicht flach: Spindel unterwärts gerade, flach; Mundsaum schneidend. — **Purpurschnecke** 64) *Purpŭra* Lam. §. 224, 54.
        - Geh. ohne scharfe Längsrippen: Geh mit scharfen Längsrippen; Windungen sehr kurz. — **Harfe** 65) *Harpa* Lam. §. 224, 55.
        - G. sehr bauchig, dünnschalig, mit kurzem, stumpfem Gewinde, quergereift: Mundsaum wellig. **Tonne** 66) *Dolium* Lam. §. 224, 56.
        - G. eiförmig verlängert, dickschalig, mit langem, spitzem Gewinde; Mundsaum nicht wellig. — **Hornhorn** 67) *Buccinum* L. §. 224, 57.
  - **Spindel mit Falten**
    - Mundsaum so hoch als das Gehäuse ... 68) *Volvaria* Lam. §. 224, 58.
    - **Mundsaum kürzer**
      - rechter Mundsaum verdickt: äußerlich ver... **schnecke** ... innerlich ver... **Täubchen** ... *Marginella* Lam. §. 224, 59. *Columbella* Lam. §. 224, 60.
      - rechter Mundsaum scharf
        - wenige, aber scharf auffreizende Spindelfalten
          - obere größer: **Mitraschnecken** ... 71) *Mitra* Lam. §. 224, 61.
          - untere größer
            - Gewinde mehr oder weniger vorstehend. — **Rollschnecken** 72) *Volūta* L. §. 224, 62.
            - Gewinde kurz, stumpf, fast versteckt. — — **Gondeln** ... 73) *Cymbium* L. §. 224, 63.
        - viele, aber nur linienförmige, fast horizontale Spindelfalten; Gehäuse fast walzenförmig. — **Olive** ... 74) *Oliva* Lam. §. 224, 64.

V. Gehäuse zweischalig, in oder an einer Kalkröhre (Scheide) §. 221 befestigt oder frei in derselben.

- Gehäuse (2 kleine Muscheln) auf dem Rücken der keulenförmigen Kalkröhre eingewachsen; Kalkröhre am verdickten Ende mit röhrenförmigen Oeffnungen wie die Brause einer Gießkanne. — **Siebmuschel** . . . . . 75) *Aspergillum* Lam. §. 226, 117.
- Gehäuse nicht mit der Kalkröhre verwachsen (Thiere bohren sich in Stein und Holz)
  - Schalen klein, ringförmig, nur am Ende des langen, wurmförmigen Thieres. — **Bohrwurm** . . . . . 76) *Terēdo* L. §. 226, 116.
  - Schalen groß, länglich, bauchig, klaffend, an der Stelle des fehlenden Schlosses auswärts umgeschlagen. — **Bohrmuschel** . . . . . 77) *Pholas* L. §. 226, 115.

VI. Gehäuse zweischalig; Schalen ungleich groß und ohne Seitenfortsätze am Schlosse.

- Buckel der größern Schale durchbohrt (mit einem Loche). — **Lochmuschel** (Fig. 157.—159.) . . . . . 78) *Terebratŭla* Brug. §. 225, 74.
- B. nicht durchbohrt
  - eine der Schalen pantoffelförmig. — **Pantoffelmuschel** (Fig. 163.) . . . . . 79) *Calceŏla* Lam. §. 225, 76.
  - eine der Schalen mit 3, den Nasen- und Augenhöhlen eines Todtenkopfs ähnlichen Löchern. — **Todtenkopfmuschel** 80) *Cranĭa* Brug. §. 225, 75.
  - Schloß zahnlos
    - Sch. dick, stark
      - Schalen papierartig, dünn, durchscheinend, unregelmäßig verbogen. — **Bastardmuschel** . . . . . 81) *Anomĭa* L. §. 226, 82.
      - Buckel gerade, auseinander stehend; Schloßband in einer Grube. **Auster** . . . . . 82) *Ostrĕa* L. §. 226, 77.
      - Buckel gekrümmt
        - eine, vom Buckel ablaufende Furche schneidet einen flügelartigen, vordern Schalentheil ab. — **Habichtsmuschel** (Fig. 165.) . . 83) *Gryphaea* Lam. §. 226, 78.
        - nicht so
          - Buckeln seitwärts umgebogen, daher die Schalen ohrförmig oder nierenförmig. — — **Schnörkelmuschel** . . . . 84) *Exogўra* Sow. §. 226, 79.
          - Buckeln stark gegen einander einwärtsgekrümmt; zahlreiche, parallele Bandgrübchen; Schalen faserig. — **Fasermuschel** (Fig. 166.) . . . . 85) *Inocerămus* Sow. §. 226, 83.
    - nicht so
      - Schloß mit Zähnen
        - ein großer Zahn für eine entgegenstehende Grube; Oberschale flach, Unterschale gewölbt; Buckel ungleich, gekrümmt. — **Klappmuschel** . . . . . 86) *Chama* L. §. 226, 96.
        - zwei starke Zähne für 2 tiefe Gruben; Schalen gerippt; Rippen mit langen Stacheln. — **Stachelmuschel** . . . . 87) *Spondўlus* L. §. 226, 84.

§. 221.

- Vom Schlosse aus einer- oder beiderseits geflügelt
  - Schloß mit Zähnen . . . . . .
  - Schloß zahnlos oder mit 1 Zahne; eine Grube für das Schloß
- nicht geflügelt
  - Schalen 3seitig
    - spitz-dreiseitig-keilförmig, fast gleichschenklig, unten klaffend; innere Sch
    - stumpf-dreiseitig
      - ungleichseitig
        - ohne Schloßzähne, verlängert eiförmig
        - mit Schloßzähnen . . . . . .
      - gleichseitig . . . . . .
  - Schalen schmal, fast walzig . . . . . .
  - Schalen weder 3seitig noch walzig
    - Schalen zahnlos . . . . . .
    - Schloß mit Zähnen
      - Schloßzähne zahlreich . . .
      - nicht über 4 Schloßzähne . .



Fig. 134.
Gestrahlte Tellmuschel (*Tellina radiāta*).

Fig. 135.
…hte Venusmuschel (*Cytherea Dione*).

ürfe, deutliche Zähne; Schalen gerippt, mit langen Stacheln. — **Stachelmuschel** 87) *Spondȳlus* L. §. 226, 84.
e schwielenförmige, oft undeutliche Zähne; Schalen beiderseits, in der Richtung des gradlinigen Schloßrandes flügelartig verlängert. — **Schwalbenmuschel** 88) *Avicŭla* Lam. §. 226, 94.
reiche, kerbartige Zähne, in einer Reihe, parallel einander gegenüberstehend. — **Schinkenmuschel** . . . . . 89) *Perna* Lam. §. 226, 81.

alen blättrig, meist T förmig. — **Hammermuschel** . . . . . 90) *Mallĕus* Lam. §. 226, 80.
nicht ittrig: einerseits klaffend, länglich, immer weiß. — **Feile** (Fig. 170.) . . . 91) *Lima* Brug. §. 226, 87.
nicht klaffend, gerundet, meist radiensig gefurcht; beiderseits geöhrt. — **Kammmuschel** (Fig 168). 92) *Pecten* Brug. §. 226, 85.
einerseits geöhrt. — **Einohr** . . . . . 93) *Monōtis* Bronn. §. 226, 86.

Schale blättrig, äußere faserig. — **Steckmuschel** . . . . . 94) *Pinna* L. §. 226, 90.
e zugespitzt und mit dem Buckel endend. — **Miesmuschel** . . . . . 95) *Mytĭlus* L. §. 226, 91.
e gerundet und sich noch etwas vor dem Buckel ausbreitend . . . . . 96) *Modiŏla* Lam. §. 226, 92.

Loßzähne gefurcht, $4/2$; mit ausgezeichneter, hinterer, schildförmiger Fläche, in welcher das Muskelband liegt. — **Dreieckmuschel** (Fig. 173.) . . . . . 97) *Trigonĭa* Lam. §. 226, 103.
Loßzähne nicht gefurcht, $2/2$; Schale queroval-dreiseitig, mit sehr kurzer, meist schief abgestutzter Hinterseite vom Schlosse aus. — **Stumpfmuschel** . . 98) (118) *Donax* L. §. 226, 111.
: klaffend an der Vorderseite; Ränder der gerippten Schalen zackig in einander greifend; Schloß wie bei *Unio*. — **Dreifpaltmuschel** . . . . . 99) (108) *Tridācna* Lam. §. 226, 88.
t klaffend; Ränder nicht zackig; eine 3eckige Grube für das Schloßband; ein kleiner Zahn und dünne Seitenzähne zwischen 2 Leisten der rechten Schale eingreifend. — **Trogmuschel** . . . . . 100) (111) *Mactra* Lam. §. 226, 104.
t klaffend, an beiden Enden stumpf. — **Steinbohrer** . . . . . 101) *Lithodŏmus* C. §. 226, 93.
: klaffend an beiden Enden. — **Messerscheide** . . . . . 102) *Solen* L. §. 226, 99.
ppig, rundlich, dickschalig (im Meere lebend). — **Perlmuschel** . . . . . 103) *Meleagrīna* Lam. §. 226, 95.
t schuppig, länglich-eiförmig, dünnschalig (im Süßwasser). — **Teichmuschel** 104) *Anodŏnta* Lam. §. 226, 102.
ne in gerader Reihe; Gehäuse quer. — **Arche** . . . . . 105) *Arca* Lam. §. 226, 97.
ne in gebogener Reihe; Gehäuse fast kreisrund (Fig. 172.) . . . . . 106) *Pectunculus* Lam. §. 226, 98.
Löffelförmiger Zahn in der rechten und eine Grube in der linken Schale, beiderends klaffend. — **Klaffmuschel** . . . . . 107) *Mya* L. §. 226, 100.

Schalen: nur ein Muskeleindruck deutlich, längs dem Unterrande; Schalen gerippt — Vorderseite mit weiter Oeffnung klaffend. — **Dreifpaltmuschel** . . . . . 108) (99) *Tridācna* Lam. §. 226, 88.
Vorderseite nicht klaffend. — **Pferdefuß** 109) *Hippŏpus* Lam. §. 226, 89.

beide Muskeleindrücke deutlich: hinterer Muskeleindruck mit 2—3 Feldern; $2/1$ Schloßzähne und $2/1$ Leisten. — **Flußmuschel** . . . . . 110) *Unio*. §. 226, 101.
eine 3eckige Grube für das Schloßband; Schloßzähne $1/1$. — **Trogmuschel** . . . . . 111) (100) *Mactra* Lam. §. 226, 104.

b. M. einfach: Schloßzähne nie mehr als $2/2$; S. immer deutlich; Schloßzähne nur $2/2$: Seitenzahn mehr od. weniger deutlich; eine Falte längs d. Hinterrande; Schloßzahn $2/2$, seiten $1/1$. — **Tellmuschel** (Fig. 134.) 112) *Tellina* L. §. 226, 105.
Buckel weit auseinander stehend: Rand innen gefaltet; 2 Seitenzähne. — **Herzmuschel** . . . 113) *Cardium* L. §. 226, 106.
Rand innen eben; 1 Seitenzahn. — — **Ochsenherz** . . . 114) *Isocardia* Lam. §. 226, 107.
B. dicht aneinander liegend: vorderer Muskeleindruck bandförmig; Schalen kreisrund. — **Lucine** . . 115) *Lucina* Brug. §. 226, 108.
b. M. einfach: Seitenzahn lamellenförmig; Schalen dünn und klein (im Süßwasser): Geh. fast gleichseitig. — **Kugelmuschel** 116) *Cyclas* Lam. §. 226, 109.
Geh. ungleichseitig. — **Erbsenmuschel** 117) *Pisidium*. §. 226, 110.
S. nicht lamellenförmig; Hinterseite vom Schlosse aus kurz, stumpf. — — **Stumpfmuschel** 118) (98) *Donax* L. §. 226, 111.

keine Grube

Schloßzähne nie weniger als $3/3$: Schloßzähne $3/3$: Schwielen unter d. Schloßbande sehr groß; 1 od. kein Seitenzahn. — **Cyprine** (Fig. 175) 119) *Cyprina* Lam. §. 226, 112.
Sch. fehlend; 3 Zähne unter den Buckeln, keiner unter dem Feldchen. — **Venusmuschel** 120) *Venus* L. §. 226, 113.
Sch. $3/4$; 3 Zähne unter d. Buckeln, 1 unter d. Feldchen, in eine Vertiefung der rechten Schale passend. — **Cytheree** (Fig. 135.) 121) *Cytherēa* Lam. §. 226, 114.

§. 221. VIII. Gehäuse vielschalig.

- Schalen in einer einfachen Reihe quer liegend und ein elliptisches, gewölbtes Gehäuse bildend — **Käferschnecke** . . . . . 122) *Chiton* L. §. 224, 73.
- Schalen im Kreise neben einander gestellt. (Rankenfüßer §. 213.)
  - Schalen verwachsen, tulpenförmig, meist 6, dreieckig, ein oben offenes Gehäuse bildend
    - am Boden durch eine kalkige Platte geschlossen — **Seetulpe** . . . . . 123) *Balānus* Brug. §. 213.
    - am Boden offen — **Seekrone** . . . . . 124) *Coronūla* Lam. §. 213.
  - Schalen nicht verwachsen, ein zusammengedrücktes Gehäuse mit 5 Schalenstücken bildend, deren 2 gegenständigen sich gleich — **Entenmuschel** (Fig. 126.) . . . . . 125) *Anatīfa* Lam. §. 213.

IX. Gehäuse nur eine lederartige Hülle oder ganz fehlend.

- Hülle lederartig
  - Hülle nur an den beiden, nie entgegengesetzten Oeffnungen mit dem Körper verwachsen: **Seescheiden**
    - Thiere auf langem Stiele, nicht gruppenweise verwachsen . . . . 126) *Ascidia* L. §. 227.
    - Viele Thiere in einer gemeinschaftlichen Hülle, sternförmig zusammengruppirt . . . . . 127) *Diazōna*. §. 227.
  - Hülle ganz mit dem Körper verwachsen, die 2 Oeffnungen einander gegenüber stehend: **Salpen**
    - Thiere walzig, frei; Vorderöffnung groß, Hinteröffnung kleiner — **Walzenscheide** . . . . . 128) *Salpa*. §. 227.
- Hülle fehlend; also nackte Schnecken
  - Mit 8 langen, gleichartigen, mit 2 Reihen Saugnäpfen besetzten Fangarmen — **Meerspinne** . . . . . 129) *Octōpus* Lam. §. 222, 3.
  - Keine Fangarme
    - Kopf mit 2 abgerundeten Lappen (Flossen) zum Schwimmen im Meere — **Wallfischaas** 130) *Clio* L. §. 223.
    - Kopf ohne Lappen, mit 4 Fühlern; Rücken mit einem Schilde (Mantel) — **Wegschnecken** . . . . . 131) *Limax* L. §. 224, 12.

§. 221 b. Uebersicht der VII Ordnungen nach der verschiedenen Bildung der Thiere.

- Kopf mehr od. weniger deutlich gesondert; fast immer mit Augen und Fühlern. A. **Kopf-Weichthiere** §. 222.
  - ohne Fuß
    - Kopf deutlich, mit langen Fangarmen; Rumpf in einem sackförmigen, vorn offenen Mantel — (Dintenfisch) . . . . . 1) **Kopffüßer.** § 222.
    - Kopf undeutlich; 2 flügelartig ausgebreitete Flossen oben am Rumpfe — (Wallfischaas) 2) **Flossenfüßer.** §. 223.
  - mit einem Fuße
    - Fuß bildet eine fleischige Sohle an d Bauchseite zum Kriechen; Mantel groß, den Rumpf umhüllend — (Weinbergschnecke) . . . . . 3) **Bauchfüßer.** §. 224.
    - Fuß flossenförmig zusammengedrückt, mitten am lang gestreckten Rumpfe; Ma[illegible] den Rumpf nicht umhülle[illegible] schnecke) . . . . . [illegible] **Kielfüßer.** §. 224.
- Kein Kopf; Mund vorn in einer Vertiefung zwischen den Mantellappen. B. **Kopflose Weichthiere** §. 225.
  - mit zweiklappiger Schale; Mantel 2lappig
    - Körper an an[illegible] befestigt; M[illegible] zwischen 2 g[illegible] einrollbaren [illegible] *brutūla*) . . . . . **Armfüßer.** §. 225.
    - Körper frei (Schale bei einigen festsitzend); Bauch in einen kiel- oder beilförmigen Fuß zum Ansetzen verlängert — (Muster) . . . 6) **Muschelthiere.** §. 226.
  - ohne Schale; Körper ganz von dem, nur vorn und hinten offenen, oft knorpeligen oder lederartigen Mantel umschlossen — (Eier-Seescheide) . . . . . 7) **Mantelthiere.** §. 227.

A. Kopf-Weichthiere (Cephalophŏra). Kopf mehr oder weniger deutlich; Mund frei. §. 222.

I. Kopffüßer. Cephalopŏda (S. 242.). Kopf deutlich (Fig. 142.), mit 2 großen Augen u. mit Gehörsorganen (§. 14,5); Mund mit 2 einem Papageienschnabel ähnlichen Kiefern u. mit gezähnter Zunge; Mundöffnung von vielen, mit Saugnäpfchen versehenen Fangarmen umgeben. Rumpf entweder mit einem sackförmigen, vorn offenen Mantel umschlossen, oder mit einer Schale. Meerthiere, getrennten Geschlechts, pflanzen sich durch Eier fort.

1. Einkammerige Kopffüßer. Nur eine Rückenplatte oder eine Schale ohne Scheidewand.

* **1.** *Lolīgo vulgāris* (§. 221,1). Gemeiner Kalmar. Mit 2 dreieckigen Hautlappen hinter der Mitte; 3—4″; Mittelmeer und Nordsee. Haben eßbares Fleisch und wie folgende Gattung eine Blase (Dintenblase) mit bräunlicher Flüssigkeit, mit welcher sie das Wasser färben, um sich gegen Verfolgung zu sichern. Eingetrocknet liefert diese Flüssigkeit die als **Sepie** geschätzte Malerfarbe.

* **2.** *Sepĭa officinālis* L. (§. 221 2). Gemeiner Dintenfisch. Mit abgerundeten Hautlappen und weißlicher, roth und schwarz getüpfelter Haut; 1½′; in allen europäischen Meeren (bei Nordernei häufig). Die Eier heißen wegen ihrer Gestalt Meertrauben; die Rückenplatte (*os sepiae*) dient zu Zahnpulver und zum Poliren, der Saft aus der Dintenblase als Malerfarbe (Sepie); Fleisch zähe.

* **3.** *Octōpus vulgāris* Lam. (§. 221,129). Gemeine Meerspinne (Polyp der Alten). Haut körnig; Arme 6 mal länger als der Körper; 2′; Mittelmeer und Nordsee; gemeinste Art. Gab vielleicht Veranlassung zur Fabel vom Kraken.

4. *Argonauta argo* L. (§. 221,15). Papierboot (wegen der zerbrechlichen Schale). Rippen glatt; 7″; Mittelmeer. Rudern mit ihren fleischigen Armen auf stiller See, und bewegen sich auch durch Ausspritzen des Wassers aus einem fleischigen Trichter fort, der zugleich den Auswürfen des Körpers den Ausgang gestattet. Daß sie bei Sturm und Gefahr alle Arme einziehen und untersinken, ist Fabel.

2. Vielkammerige Kopffüßer. Schale mit vielen Scheidewänden.

5. *Nautĭlus pompĭlius* L. (§. 221,11). Gemeines Schiffsboot. Milchweiß, rothbraun gestreift; 1′, häufig an den Molukken.

* *N. bidorsātus.* Doppeltrückiges Schiffsboot. Mit zweitheiligem Rücken; 1′. Ist Leitmuschel für die oberen Schichten des Muschelkalks, in denen es bei Göttingen, Hildesheim ꝛc. mit *Ammonītes nodōsus* zusammen vorkommt.

6. *Numulīna laevigāta* Lam. (§. 221,12). Glatter Numulit. Versteinert und für den unte[illegible]alk (Numulitenkalk) bezeichnend. Diese Gattung, wie *Nodosaria*, *[illegible]ina* ꝛc., welche unter dem Namen *Foraminifera*, weil die [illegible]n oder mehre Löcher durchbohrt mit einander in Verbindung [illegible]lgny hierher gestellt wurden, gehören nach Ehrenber[illegible]*ryozoen* unter den Korallen §. 238. Sie finden sich [illegible] Rimini in solcher Menge, daß 6 Unzen Sand über 6700 [illegible] Auch in unsern tertiären Ablagerungen bei Dickholzen und [illegible] ist *Robulīna subnodōsa* in Unzahl vorhanden, so wie auch ein großer Theil unsers Kreidegebirges, ja die Kreide selbst oft fast bloß aus *Bryozoen* besteht.

7. *Ammonītes* Lam. (§. 221,10). Ammonshorn. Diese Thiere bewohnten die frühern Meere bis zu Ende der Kreidebildung, mit welcher sie verschwinden. Man findet sie häufig in der Jura- und Kreideformation, meist als Steinkerne ohne die dünne, äußere Schale. Sie sind für die Altersbestimmung der Gebirgsbildungen von größter Wichtigkeit und durch Leopold v. Buch zuerst systematisch geordnet. Man kennt über 500 Arten, deren wichtigsten:

§. 222. *A.* (*Goniatites*) ***costulātus*** (Fig. 136.). Gekielter Goniatit. Die Goniatiten zeichnen sich durch ihre ungezähnten, winkligen Loben unter den Ammonshörnern aus und gehören dem obern Uebergangsgebirge (Goniatitenkalk) und dem Kohlenkalksteine an.

* *A.* (*Ceratites*) ***nodōsus*** Brug. (Fig. 133.). Knotiges Ammonshorn. Meist 4—5 Umgänge; Rücken flach gewölbt; Mündung fast 4seitig; Windungen mit dicken, knotig endenden, sehr variirenden Rippen; 3—8″. Als Leitmuschel in den obern Schichten des Muschelkalks bei Hildesheim, Göttingen ꝛc. überall verbreitet.

* *A.* ***capricōrnus*** v. Schl. (Fig. 137.). Steinbockshorn. Windungen im Querschnitte fast breiter als hoch; Rippen dick, gerundet, auf dem Rücken breiter werdend und meist rautenförmige Flächen bildend. Hauptleitmuschel für den untern Lias.

* *A.* ***amalthēus*** v. Schl. (Fig. 138.). Amaltheenhorn. Flach scheibenförmig; Knotenzahl des Kiels die wenig gebogenen Sichelfalten um mehr als das Doppelte übertreffend; meist mehr oder weniger zahlreiche dornige Erhöhungen auf den Windungen; 2—3″. Für die mittlern Schichten des Lias charakteristisch. Goslar ꝛc.

* *A.* ***biplex*** Sow. (Fig. 139.). Gabelrippiges Ammonshorn. Windungen mit starken, gabelig oder zweispaltig getheilten, auf dem gewölbten Rücken

Fig. 136.
Goniatites costulātus. Gekielter Goniatit.
A Seitenansicht } Zeigen die, in wellenförmigen
B Rückenansicht } Zickzackbiegungen (Loben) zusammentreffenden Kammern.

Fig. 137.
Ammonites capricōrnus. Steinbockshorn.
A Seitenansicht.
B Rückenansicht, um die rautenförmigen Rippen zu zeigen.

Fig. 138.
Ammonites amalthēus (*margaritātus*).
Amaltheenhorn.



Fig. 139.
Ammonites biplex. Gabelrippiges Ammonshorn.
A Seitenansicht.
B Umriß der Mündung, um das Uebergreifen oder die Involubilität der Windungen zu zeigen.

sich vereinigenden Rippen; bis 10″. Leitmuschel für den obern Theil der Jura- §. 222.
formation (Korallenkalk). Bei Hildesheim (Heersum; Spitzhut) ꝛc.

* *A. **varians*** Sow. (Fig 140.). Veränderliches A. Windungen schnell an Höhe zunehmend, die vorhergehenden halb umfassend; auf dem flachen Rücken ein glatter Kiel, neben welchem beiderseits mehre Reihen spitzer Knoten; Mündung höher als breit; meist 3—4″. Goslar, Sarstedt, Alfeld ꝛc. Leitmuschel für die obere Abtheilung der Kreideformation (Plänerkalk).

S. *Orthocĕras annulātum* (§. 221, 13). Geringeltes Geradhorn (Fig. 141.). Fast walzig, mit starken, glatten Ringen, zwischen welchen feine Streifen liegen. Für die untern Schichten der Kohlenperiode charakteristisch, welche in deutschen Gebirgen keine einzige Art dieser Gattung überlebt hat.

* **9. *Belemnites*** (§. 221, 14). Donnerkeil, Belemnit, Teufelsfinger, Albesstein. Eine der merkwürdigsten und bekanntesten Thiergattungen der Vorwelt, über welche mehr als 100 Schriftsteller bereits geschrieben haben. Früher hielt man sie bald für Wallfischzähne, bald für Hörner, Fischstacheln, bald für Stacheln von Seeigeln ꝛc.; erst Linné erklärte sie für Conchylien und erst Voltz, Buckland, Agassiz und besonders Owen haben uns ihre wahre Natur und richtige Stellung gelehrt. Die Belemniten bestehen **a**) aus einem kegelförmigen, oft fingerförmig breitgedrückten Theile (Teufelsfinger), der Scheide oder Spitze, welche sich am häufigsten findet; **b**) aus einem innern Kern (Alveole. Fig. 142 a.), welcher kegelförmig ist, aus über einander liegenden, uhrglasähnlichen Schalen besteht, den Kammern eines Orthoceratiten ähnlich, und an der Basis der Scheide in einer kegelförmigen Vertiefung steckt. Das Thier (Fig. 142.) war muthmaßlich unsern Dintenfischen (S. 243.) ähnlich, ragte mit dem Kopfe aus der Scheide hervor und hatte 10 lange Fangarme. Der Belemnit lag, wie bei den Sepien der Sepienknochen (*os sepiae*) frei auf dem Rücken des Thieres unter dem Mantel und ist von ähnlicher Bildung wie der Sepienknochen. Die Belemniten sind auf das Jura- u. Kreidegebirge beschränkt u. in deren Schichten oft in unzähliger Menge



A B

Fig. 140.
Ammonites varians.
Veränderliches Ammonshorn.
A Seitenansicht.
B Rückenansicht.

Fig. 141.
Orthocĕras annulātum.
Geringeltes Geradhorn.



Fig. 142.
Idealer Belemnit.
a Innerer Kern od. Alveole.

zusammengehäuft. Nehmen wir nach der Analogie an, daß das Thier 8—10mal länger war, als der Belemnit, so erreichte der Riesenbelemnit (*Belemnites aalensis* oder *gigantēus*), dessen Scheide von 2′ Länge gefunden wird, 18—20′ Länge.

* *B. digitālis* (Fig. 143.). Fingerförmiger Donnerkeil. Die 3″ lange Scheide ist fingerförmig plattgedrückt, mit elliptischem Querschnitte und abgestumpfter Spitze und findet sich häufig im obern Lias (bei den Zwerglöchern in der Nähe Hildesheims z. B. sehr häufig).

* *B. mucronātus* (Fig. 144.). Stachelspitziger D. Die 3—4″ lange Scheide ist walzig, endet oben plötzlich in eine kurze Spitze und ist an der Basis der Scheide mit einer Längsspalte versehen. Bezeichnend für die weiße (oberste) Kreide u. die Mergel gleichen Alters. Bei Hannover, Peine ꝛc. sehr häufig.

§. 223. **III. Flossenfüßer.** Pteropŏda (S. 242.). Kopf fehlend oder klein, neben demselben 2 flügelartige Mantellappen zum Schwimmen. Selten über 2″ lange Meerthiere; Zwitter; mit oder ohne Schale. Nur eine Familie:

3. Flossenfüßer.

10. *Clio boreālis* L. (§. 221,130). Nordisches Wallfischaas. Ohne Schale; Haut hellbläulich, durchscheinend; Flossen fast 3eckig; 1″; häufig im Eismeere; gewöhnliche Nahrung der Wallfische.

11. *Hyalaea tridentāta* Lam. (§. 221,9). Dreizähnige Hyaläe. Schale gelblich, halbdurchsichtig, quergestreift; 3—4‴; Mittelmeer; häufig.

§. 224. **III. Bauchfüßer.** Gasteropŏda (S. 242.). Sehr verschieden organisirt, aber immer am Bauche mit einer fleischigen Scheibe (Fuß). Kopf mit 2 oder 4 einziehbaren Fühlern. Die meisten sind Zwitter (Lungenschnecken), wenige getrennten Geschlechts (Kammkiemer), noch wenigere haben nur einen Eierstock (Napfschnecken). Meer-, Süßwasser- und Landthiere, meist mit, selten ohne Schale.

4. Lungenschnecken. Athmen durch Lungen. Gehäuse dünn, gewunden, bei erster Gattung fehlend. Meist Landthiere.

a) Landschnecken. Leben auf dem Lande.

* **12.** *Limax empiricōrum* Fer. (§. 221,131). Große Wegschnecke. Athemloch vor der Mitte des gekörnelten Schildes; Oberseite unterbrochen quergerunzelt; schwarz oder rothgelb; 3—5″; häufig in Wäldern und Gärten; von Pflanzen lebend. Die Fleischbrühe der rothen früher gegen Auszehrung gebräuchlich.

†* *L. agrēstis* L. Ackerschnecke. Weißlichgrau, mit schwärzlichen Fühlern und concentrischen Furchen auf dem Schilde; 1″; häufig (nur vor Sonnenaufgang umherkriechend); schädlich in Gärten und auf Feldern. Durch Bestreuung des Bodens mit Asche, Gyps oder Flachsschebe können sie von kleinern Ackerstücken abgehalten werden; durch frisch abgeschälte Zweige von Weiden, durch nasse Strohbündel und Gemüseabfall kann man sie zusammenlocken und dann leichter ablesen, sie auch durch Enten, welche gern Schn… abzusuchen lassen.

* **13.** *Helix pomatia* L. (§. 221, 25, 28, 31 …gedrückt, mittel… Weinbergsschnecke. Gehäuse kuglig, mit bedecktem …, mit verloschenen, rothbraunen Querbinden; 18‴ hoch …größte deutsche Art; überall häufig; deckelt sich gegen den Win… Deutschland gemästet und besonders als Fastenspeise geg… den ganze Schiffsladungen davon nach Wien geschickt.

* *H. arbustōrum* L. Gefleckte Schnirkelschnecke. Ebenso, aber kastanienbraun, gelbweiß besprengt; Nabel vom weißen Mundsaume bedeckt; 8‴ hoch, 10‴ dick; häufig.

* *H. nemorālis* L. Hain-Schnirkelschnecke. Gehäuse kuglig, nicht genabelt, gelb oder röthlich, meist mit braunen Binden, immer mit braunem Mundsaume; 8‴ h., 9‴ d.; gemeinste Art.

* *H. hortēnsis* Müll. Garten-Sch. Ebenso, aber immer mit weißem Mundsaume. Wird von Einigen nur für Spielart der vorigen gehalten.

* *H. ericetōrum* Müll. Haide-Sch. Niedergedrückt, mit sehr fla-

chem Gewinde, etwas scheibenförmig; weiß oder braungelb, mit oder ohne braune Bänder; Nabel sehr weit; Mündung fast rund; 4‴ h. u. 6—9‴ d.; häufig. §. 224.

* *H. obvoluta* Müll. Aufgerollte Sch. Scheibenförmig, oben und unten glatt, dunkelrothbraun, behaart, weit genabelt; Mundsaum weiß, stark verdickt und dadurch die Mündung deutlich dreibuchtig; $2\frac{1}{2}$‴ h. u. 5‴ d.; häufig unter Gebüschen.

* *H. personata* Lam. Masken-Sch. Voriger ähnlich, aber Mündung eckig-dreibuchtig, mit 3 weißen Zähnen. Am Harze und bei Hameln am Klüt ꝛc.

* **14.** *Caracolla lapicida* L. (§. 221, 19). Gemeine Lampenschnecke od. Steinpicker. Linsenförmig niedergedrückt, letzte Windung ringsum scharf gekielt; rostbraun gefleckt; Nabel weit; 3‴ h. u. 8‴ br. Häufig unter Steinen.

* **15.** *Bulimus obscurus* Müll. (§. 221, 43). Dunkelfarbige Vielfraßschnecke. Länglich-eirund, ziemlich bauchig, fein gestreift; rothbraun; Mündung eiförmig; Mundsaum schwach zurückgebogen, weiß oder röthlich gelippt; 4‴ h. u. 2‴ d. Häufig in Laubwäldern.

* **16.** *Clausilia bidens* (§. 221, 26). Zweizähnige Schließmundschnecke (Fig. 145.). Gehäuse schwach gestreift, fast glatt; Mundsaum im Innern mit einer gebogenen, weit vorstehenden und einer kleinern, zusammengedrückten Lamelle; 7‴ l. u. 2‴ d.; häufigste unsrer zahlreichen, schwer zu unterscheidenden Arten.

* **17.** *Pupa muscorum* L. (§. 221, 27). Moosschraube (Fig. 146.). Eirundwalzig, stumpf, wenig gestreift, fast glatt, braunroth; Mundsaum zahnlos oder einzähnig, zurückgebogen, mit weißer Wulst; 2‴ l. u. 1‴ d.; unter Moos häufig.



Fig. 143.
A *Belemnites digitalis.* Fingerförmiger Donnerkeil.
B Querdurchschnitt.



Fig. 144.
Belemnites mucronatus.
Stachelspitziger Donnerkeil.

Fig. 145.
A *Clausilia bidens.* Zweizähnige Schließmundschnecke.
B Mündung vergrößert.

Fig. 146.
Pupa muscorum. Moosschraube. Die nebenstehende Linie bezeichnet die natürliche Größe.

§. 224. *P. uva* L. Bienenkörbchen. Walzig, stumpf, aschgrau, mit vielen geradelaufenden Längsfurchen; Lippenrand zurückgeschlagen, mit einer Falte; 12‴; an den Antillen.

* **18.** *Achatina lubrica* Brug. (§. 221, 45) Glatte Achatschnecke. Länglich-oval, hornfarbig, glänzend, durchsichtig; Mundsaum röthlich; Spindelsäule undeutlich abgestutzt; 3‴ l. u. 1‴ d.; unter feuchtem Moose häufig.

† *A. zebra* Lam. Die größte Landschnecke; 6″ l. u. 3″ d.; Afrika.

† *A. mauritiana* L. Auf der Insel Moritz, durch ihre Gefräßigkeit schädlich.

* **19.** *Succinea amphibia* (§. 221, 47). Gemeine Bernsteinschnecke (Fig. 147.). Eiförmig, bauchig, einfarbig; Mündung breit eirund, etwas schief, anderthalbmal so hoch als das Gewinde; 8‴ l. u. 5‴ d.; nur 3 Umgänge (Windungen); häufig.

* **20.** *Vitrina pellucida* (§. 221, 35). Durchsichtige Glasschnecke. Niedergedrückt-kuglig, glatt, meergrün; 3 Umgänge; Mündung mondförmig, so breit als hoch; 2‴ l. u. $2^1/_2$‴ d.; häufig.

* **21** *Cyclostoma elegans* Müll. (§. 221, 42). Zierliche Kreismundschnecke. Keglig-eifg., durchbohrt (genabelt), gelblich- oder violettgrau, fein gegittert; 7‴ l. u. 5‴ d.; nicht selten unter Gesträuch.

b) Süßwasserschnecken. Leben im Süßwasser.

* **22.** *Planorbis corneus* L. (§. 221, 18) Große Tellerschnecke, Posthörnchen. Kein Kiel auf der letzten Windung; beiderseits ausgehöhlt; hornfarbig; Umgänge quergestreift; Mündung mondförmig; 5—6‴ hoch und $1^1/_2$″ breit; größte deutsche Art; gemein in Wassergräben.

* *P. carinatus.* Gekielte T. (Fig. 148, A u. C). Auf der letzten Windung ein linienförmiger Kiel, genau auf der Mitte liegend; $1^1/_2$‴ hoch und 7‴ breit; häufig in Wassergräben.

* *P. marginatus.* Gerandete Tellerschnecke (Fig. 148, B). Ebenso, aber der Kiel weiter nach unten liegend; häufig.

* **23.** *Physa fontinalis* L. (§. 221, 48) Quellen-Blasenschnecke. Eirund, gelblich, durchscheinend; Mündung fast 4mal so hoch als das Gewinde; 5‴ l. u. 3‴ d.; häufig in Teichen.

* *Ph. hypnorum.* Gemeine Blasenschnecke. Ebenso, aber länglich-eirund; Mündung wenig höher als das Gewinde; 6‴ l. u. 3‴ d.; häufig.

* **24.** *Limnaeus auricularius* (§. 221, 46). Ohr-Schlammschnecke. Gewinde kurz; Gehäuse eiförmig, eng genabelt, fast so hoch als breit, gelbgrau; Mündung ohrförmig; Mundsaum stark nach Außen gebogen; 13‴ l. u. 11‴ d.; häufig in Wassergräben.

* *L. stagnalis* Müll. Sumpf-Schlammschnecke (Fig. 149.). Gewinde thurmförmig ausgezogen; Gehäuse länglich eiförmig, ungenabelt, hornfarbig; Mündung etwas höher als das Gewinde; Mundsaum bogig ausgeschweift; 18‴ l. u. 10‴ d.; gemeinste Art.

5. Kammkiemer. Athmen durch kamm[illegible]men, welche in einer besondern, vom Mantel gebildeten [illegible]en des Thieres liegen. Gehäuse stark, meist gewunden[illegible]förmig. Zu ihnen gehören die meisten ausländischen [illegible] Schnecken; fast nur Meerthiere, getrennten Gesch[illegible]

a. Mundöffnung weder ausgerandet noch kanalartig.

* **25.** *Valvata piscinalis* Müll. (§. 221, 30) [illegible]schnecke. Im Aeußern der oben beschriebenen Kreismundschnecke sehr ähnlich, weißlich; 4 stark gewölbte Windungen, die letzte groß, die übrigen sehr schnell kleiner; 3‴ h. u. 2‴ d.; häufig in Wassergräben.

* **26.** *Paludina impura* Lam. (§. 221, 41.) Schmutzige Sumpfschnecke (Fig. 150.). Ungenabelt, eiförmig, gelblich durchscheinend; Gewinde spitz, letzter Umgang bauchig; Mundsaum zurückgebogen, gelippt; 5‴ h. u. 3‴ d.; häufig, oft mit Schlamm überzogen. Pflanzen sich durch unbefruchtete Eier fort. §. 20, IV.

* **27.** *Melania striata* Sow. (§. 221, 44). Gestreifte Kronschnecke (Fig. 151.). Als Steinkern häufig fossil, 4—7″ hoch; für den obern Theil der

§. 124.



Fig. 147.
Succinĕa amphibĭa.
Gem. Bernsteinschnecke.



Fig. 148.
A u. C *Planorbis carinātus.* Gekielte Tellerschnecke.
B *P. marginātus.* Gerandete Tellerschnecke.

Fig. 149.
Limnaeus stagnālis.
Sumpf-Schlammschnecke.

Fig. 150.
Paludīna impūra.
Schmutzige Sumpfschnecke.

Fig. 151.
Melanĭa striāta.
Gestreifte Kronschnecke.

Juraformation bezeichnend wie *M. Heddingtonēnsis.* Häufig am Galgenberge bei Hildesheim ꝛc.

28. ***Solarĭum perspectīvum*** L. (§. 221,[17]) Perspectivschnecke. Hellbraun, mit weiß und braun gefleckten Querbinden und gekerbten Windungen im weiten Nabel; 2″ br. Ostindiens und Afrikas Küsten.

29. ***Trochus niloticus*** L. (§. 221,[34]). Nil-Eckmund. Kegelförmig-pyramidal, glatt, weiß, blutroth gefleckt; Spindel oben mit einem Zahne; 3″ h. und fast 4″ br.; indischer Ocean.

* *T. cinerarĭus* L. Aschgrauer Eckmund. Rundlich, gewölbt, stumpf zugespitzt, eng genabelt, aschgrau mit röthlichen, welligen Längsstreifen; 8‴; Nordsee, Mittelmeer; häufig und in Färbung und Form veränderlich.

T. agglutĭnans L. Trödelweib, weil die 4eckigen Windungen Conchylien oder Steinchen eingekittet enthalten: 21‴; Ostindiens Küsten.

30. ***Delphinŭla lactniāta*** Lam. (§. 221,[20] u. [32]). Gemeine Lappenschnecke. Grau oder roth, mit großen, krumm verzweigten Lappen auf den Windungen; 2″; an den Küsten von Ostindien häufig.

31. *Turbo* [illegible] L. (§. 221,[39]). Gemeine Kreiselschnecke od. Elster. Glatt, weit g[illegible] folgenden Arten ohne Nabel), weiß, mit bindenförmigen, schwarz[illegible] tlantisches Meer. Von dieser so wie vom Oelkruge und von ei[illegible] stammen die früher in Apotheken als Räucherklauen [illegible]

T. [illegible] Mit körnigen Querstreifen, wie die Kapsel der Roßka[illegible] aun gescheckt; 9‴; häufig an Südamerika.

T. [illegible] ***argyrostŏmus*** L. Der Gold- und Silbermund, zeich[illegible] sich durch gold- und silberfarbige Mündung aus.

T. plicatĭlis, bezeichnend für den Grünsand des Kreidegebirges.

* **32.** ***Littorīna littorĕa*** L. (§. 221,[40]). Gemeine Uferschnecke. Eiförmig, spitz, ungenabelt, mit vielen braunen Querstreifen gebändert; 10‴; Küsten Europas (Nordsee). Werden tonnenweise zum Essen in Handel gebracht.

L. murtcāta L. Grauweiß, überall gekörnelt; 4‴; Mittelmeer.

33. ***Monodonta modŭlus*** L. (§. 221,[29]). Gemeiner Einzahn. Fast rund, schief niedergedrückt, quergestreift und längsgefaltet, genabelt, unten gewölbt und concentrisch gefurcht; weiß, purpurroth gefleckt; 7‴ dick; häufig.

§. 224. **34.** *Scalaria pretiōsa* Lam. (§. 221,[33] u. [37]). Echte Wendeltreppe. Genabelt; Rippen weiß; Windungen sich nur an der Stelle der Wülste berührend; 2″; Ostindien; früher sehr theuer.

S. communis Lam. Unechte W. Ungenabelt, Windungen sich überall berührend; Rippen gefleckt; 16‴; europäische Meere, häufig.

35. *Turritēlla duplicāta* Lam. (§. 221,[38]). Doppellinige Schraubenschnecke. Windungen gewölbt, rothgelblich, längs den Umgängen mit 2 scharfen Kielen; 4—5″; Küste von Koromandel.

* *T.* (richtiger *Cerithium*) *quadrilineātum* Rr. Im Liasschiefer der Zwergslöcher bei Hildesheim.

36. *Natĭca canrēna* L. (§. 221,[24]). Gemeine Nabelschnecke. Fast kugelrund, glatt, mit weißen und rothen Binden und braunen, zickzackförmigen Längsflammen; Nabel mit einer Schwiele; 20‴; indischer Ocean; häufig.

N. mammilla L. Weiße Nabelschnecke. Eiförmig, milchweiß; Nabel ganz bedeckt; 22‴; Ostindiens Küsten.

N. lineāta Lam. (Fig. 152.). Liniirte N. Fast kuglig, glatt, weißlich, mit gedrängten, welligen, gelben Linien; Nabel halb verdeckt; 12—14‴.

* *N. gigas* (*macrostŏma* Rr.). Riesen-N. Häufig und leitend im obern Jura bei Hildesheim.

* *N. glaucĭna* L. Bläulichgraue N. Blaßgelb und bläulich, mit kurzem, schiefem Gewinde; bis 3″; an Indiens Küsten und viel kleiner in den tertiären Ablagerungen bei Klein-Freden häufig.

37. *Nerīta tesselāta* L. (§. 221,[22]). Gewürfelte Mondschnecke. Stark gefurcht, schwarz und weiß gewürfelt; 9‴; atlantischer Ocean; häufig.

N. pelorōnta L. Blutzahn. Spindel mit 2, am Grunde blutrothen Zähnen; 15‴; an den Antillen.

* **38.** *Neritīna fluviatĭlis* L. (§. 221,[23]). Fluß-Schwimmschnecke. Schräg verbreitert, glatt, roth oder violett gegittert, weiß betropft; Gewinde fast in der Mitte; 4‴ h. u. 5‴ br. Flüsse Deutschlands (Leine, Weser ꝛc.).

b. Mundöffnung unten ausgerandet oder kanalartig.

39. *Fasciolarĭa tulĭpa* L. (§. 221,[49]). Gemeines Bandhorn. Mit braunen Querlinien, mehr oder weniger roth, bald weiß, bald braunroth marmorirt oder gefleckt; Windungen an der obern Naht gekerbt; über 6″; an den Antillen.

* **40.** *Nerinaea* (§. 221,[50]). Nur fossile und für die obern Jurabildungen bezeichnende Arten: *N. suprajurēnsis* und *Visūrgis* Rr. (Fig. 153.). Goslar, Hannover, Hildesheim (am Spitzhute) ꝛc.

41. *Cerithĭum vulgātum* Brug. (§. 221,[51]). Gemeine Hornschnecke. Graugelb, rothbraun marmorirt; mit körnigen Querstreifen u. faltigen Knotenreihen mitten auf den Umgängen; Kanal zurückgebogen; $2^1/_2$″. Ostindiens Küsten.

C. vertăgus L. Der Windhund. Blaß braungelb; Windungen am obern Ende längsgefaltet und quergestreift; Spindel mit einer Falte; Kanal zurückgebogen; 3″; Ostindien.

C. margaritacĕum Brong. (Fig. 154.). B[illegible] der dicht zusammenliegenden Umgänge mit 5 enggekörnt[illegible] Querringen umgeben; $1^1/_2$″. In den Tertiärbildungen bei [illegible]ig.

42. *Fusus morĭo* L. (§. 221,[52]). Schwar[illegible]. Quergestreift; schwarzbraun, mit 2 weißen, ungleichen [illegible] in der Mitte knotig; Kanal kürzer als das Gewinde; 6″[illegible]

F. colus L. Spindel. Quergefurcht; weiß, an beiden Enden braun, auf der Mitte der Windungen zwischen querstehenden Knoten rothbraun gefleckt; Kanal länger als das Gewinde; 6″; Ostindiens Küsten.

43. *Pyrŭla ficus* L. (§. 221,[53]). Feige od. gemeine Feigenschnecke. Birnförmig, fein quergestreift; bräunlich mit weißen Bändern und braunen Flecken; Gewinde stark gewölbt; Kanal kurz und weit; 3″; Südsee.

44. *Murex brandāris* L. (§. 221,[55]). Brandhorn-Stachelschnecke. Letzte Windung mit 2 Querreihen langer, und der sehr lange Kanal mit einer gewundenen Reihe kurzer Stacheln; $3^1/_2$″; Mittelmeer; wird häufig gegessen.

M. haustēllum L. Schnepfenkopf. Mit sehr langem Kanale, aber ohne Stacheln, nur mit Knötchen; Mündung fast kreisrund; 4″; Ostindiens Küsten. §. 224.

M. saxatilis L. Krause Stachelschnecke. Kanal kurz, gebogen; mit 6 Reihen Wülsten, auf welchen blättrige Sprossen; Mündung rosenroth; $7\frac{1}{2}$″; Ostindiens Küsten.

45. *Tritonium variegātum* Lam. (§. 221,56). Tritonshorn, gemeine Trompetenschnecke, Kinkhorn (weil sie kinken, d. h. sausen, wenn man sie vors Ohr hält, was übrigens alle größern, gewundenen Schnecken thun). Gestreckt kegelförmig, letzte Windung bauchig; mit stumpfen Querrippen und braun und weiß gefleckten Gürteln; Spindel braun, mit weißen Querrunzeln; Mündung roth. $1\frac{1}{2}$′; häufig an Indien; wird von Wilden als Trompete gebraucht.

46. *Rostellaria pes pelecāni* L. (§. 221,57). Pelekansfuß. Lippe mit 3 ausgespreizten Fingern, deren hinterer sich zum Gewinde aufwärts schlägt; $1\frac{1}{2}$″; europäische Meere; häufig.

47. *Strombus gigas* L. (§. 221,58) Große oder rothmündige Flügelschnecke Kreiselförmig; weißlich bis röthlich; Mündung sehr weit, schön rosenroth; Gewinde mit kegelförmigen Höckern; an 10″; an den Antillen häufig. Junge Exemplare mit noch wenig ausgebreiteten Lippen nannte Linné *St. lucifer*.

St. auris Dianae L. (Fig. 155.). Dianenohr. Gehäuse länglich eiförmig, quer gestreift, mit kleinen Höckern; braun oder grau, Mündung lichtroth

Fig. 152.
Natica lineāta (§. 224,36).
Linirte Nabelschnecke.

Fig. 155.
Strombus auris Dianae (§. 224,47).
Dianenohr.

Fig. 154.
Cerithium margaritaceum (§. 224,41).
Perlirte Hornschnecke.

Fig. 153.
Nerinaea visurgis (§. 224,40).

§. 224. bis gelb; Gewinde (Fig. 155, 1—3) spitz; Außenlippe (Fig. 155, 4—5) dick, nach oben mit fingerförmigem Lappen; 3″; Ostindiens Küsten; häufig.

48. *Pterocĕras lambis* L. (§. 221,[59]). Gemeine Flügelhornschnecke, Teufelsklaue. Braun marmorirt; Lippe mit 6 Fingern, die mittlern gekrümmt; 6″; häufig an Ostindien. Junge Exemplare sind ohne Finger.

* *Pt. oceăni* Brong. Meer-Flügelhornschnecke. Nur fossil, meist als Steinkern; vollständig mit 10 Flügelfingern. In den obern Schichten des Jura bei Hildesheim ꝛc.

49. *Cassis cornūta* L. (§. 221,[54]). Echte Sturmhaube. Mit Grübchen netzartig bedeckt, weißlich, mit 2—3 gefleckten, nur bei ausgewachsenen Exemplaren knotigen Gürteln; Mündung gelblich; 9½″; Ostindiens Küsten.

C. rufa L. Feuriger Ofen. Röthlich, mit vielen, schwielig-knotigen Gürteln; Mündung tief purpurroth, weiß gerunzelt; 5½″; Ostindiens Küsten.

C. testicŭlus L. Eiförmig, quergefurcht, mit erhabenen Längslinien; rothbraun, ins Violette; Lippenwulst mit paarigen, schwarzbraunen Flecken; 3″; Ostindiens Küsten.

50. *Ovŭla ovifōrmis* Lam. (§. 221,[60]). Das Hühnerei. Schneeweiß; Schlund pomeranzengelb; 3″; an den Molukken.

51. *Cypraea tigris* L. (§. 221,[61]). Tiger-Porzellanschnecke, Tigermuschel. Bläulich weiß, mit vielen schwärzlich-braunen, großen, verloschenen Flecken; 4″; an Ostindien gemein; wird vorzüglich zu Schnupftabacksdosen benutzt. Häufig im ostindischen Meere und an Madagascar.

C. arabĭca L. Buchstaben-Porzellane. Mit braunen, arabischen Buchstaben ähnlichen Zeichnungen und mit einer einfachen Längslinie auf der Mitte; 3″; Ostindiens Küsten.

C. lynx L. Kakerlak. Weißlich, oben neblig, mit zerstreuten, braunen Tropfen; bis 1½″; daselbst gemein.

C. caurĭca L. Die Pocken. Ebenso, aber weniger gewölbt; Lippen stärker aufgeschwollen; bis 1½″; daselbst gemein.

C. erōsa L. Brandfleck. Gelbgrün, weiß punktirt; Lippenränder stark, mit einem violetten Flecke; bis 1½″; daselbst gemein.

C. monēta L. Otternköpfchen, Kauri. Gelblichweiß; die aufgetriebenen Lippenränder knotig; bis 1″; sehr gemein an Indien und Afrika und von Negern und Hindu als Münze (30—40 gelten 1 Pfennig) gebraucht, bei uns nebst andern ähnlichen Arten zur Verzierung von Pferdegeschirren.

C. annulāris L. Weißlich, oben mit gelbem Ringe; 1″; an den Molukken.

52. *Conus marmorĕus* L. (§. 221,[62]). Marmorkegel. Oberer Rand der Windungen mit Höckern; schwarzbraun, mit 3eckigen, weißen Flecken; 3½″; häufig an Asien.

C. hebraeus L. Bauern-Musik. Oberer Rand wie bei voriger; weißlich, mit 4eckigen, schwärzlichen Flecken in Querbinden; 1⅓″; häufig.

C. miles L. Der Soldat. Oberer Rand der Wind[illegible] ohne Höcker; gelblich, mit brauner Binde; 3″; an Ostindien gem[illegible]

C. virgo L. Die Kerze. Weiß; Spitze vi[illegible]

Der Seltenheit wegen sind mehre Spielarten [illegible] L. und besonders der Orangeadmiral (*C. aurisiăcu*[illegible] schon mit mehren 100 Thalern bezahlt.

53. *Terĕbra maculāta* L. (§. 221,[63]). Gef[illegible]emenkegelförmig; weiß, mit 2 Reihen bräunlicher oder g[illegible] auf den Windungen; 4½″; stilles Meer.

T. duplicāta od. *Basteroti*. Bezeichnend für die tertiären Ablagerungen bei Wien, in Südfrankreich ꝛc.; auch noch lebend im indischen Ocean?

54. *Purpŭra patŭla* L. (§. 221,[64]). Weitmund od. Purpurschnecke. Schwarzbraun; quergefurcht, mit höckerig-knotigen, mit dem Alter verschwindenden Gürteln; Gewinde kurz; fast 3″. Soll den Alten Purpur geliefert haben; doch halten Einige die *Janthīna commūnis* (*buccĭnum* des Plinius) für diejenige Schnecke, von welcher der tyrische Purpur kam. Auch *Murex brandāris* und viele andere Conchylien enthalten einen Purpursaft, für welchen indeß jetzt die Cochenille (§. 193.) eine weit bessere und dauerhaftere Purpurfarbe liefert.

55. ***Harpa ventricōsa*** Lam. (§. 221,65). Davidsharfe. Eiförmig- §. 224.
bauchig; rothbraun bis lillafarbig, mit weißen, von braunen Linien eingefaßten, bogigen Flecken und mit purpurrothen Rippen; $3\frac{1}{2}$‴; Ostindiens Küsten.

56. ***Dolium maculātum*** Lam. (§. 221,66). Gefleckte Tonne. Eikugelförmig, dünnschalig; weiß, Querrippen gelbbraun gefleckt und die Zwischenräume durch eine erhabene Linie getheilt; $4\frac{1}{2}$‴; Indiens Küsten.

* **57.** ***Buccinum undātum*** L. (§. 221,67). Das Wellhorn. Quergestreift, durch dicke, schiefe Längsfalten gewellt; weißgrau; 3—4‴; größte und an unsern Küsten gemeinste Art; oft eine Wohnung des Eremitenkrebses (§. 203,5).

* ***B. gregarium*** (richtiger ***Turbo gregarius***) und ***obsolētum*** (richtiger ***Melania Schlotheimii***) sind Leitmuscheln für den Muschelkalk.

58. ***Volvaria monilis*** Lam. (§. 221,68). Halsband-Wickelschnecke. Schneeweiß; 5‴; am Senegal; wird zu Halsschnüren benutzt.

59. ***Marginella lineāta*** Lam. (§. 221,69). Gemeine Randschnecke. Umgekehrt eiförmig; weiß, mit braunrothen Querlinien; Gewinde niedergedrückt; 10‴; ***M. interrupta*** nur 5‴ und mit unterbrochenen Querlinien.

60. ***Columbella mercatoria*** L. (§. 221,70). Das brütende Täubchen. Eikreiselförmig, quergefurcht; weiß mit braunen Längsflecken; 9‴; im atlantischen Ocean gemein.

61. ***Mitra papālis*** L. (§. 221,71). Pabstkrone (Fig. 156.). Mit thurmförmigem Gewinde, deren Umgänge (1—4) oben am Rande mit zahnförmigen Falten gekrönt sind; Spindel (5) mit 5 Falten und die Außenlippe (6 u. 7) mit feinen Zähnen; Gehäuse weiß, roth gefleckt; 4—6‴; ostindisches Meer. Größte und schönste Art.



Fig. 156.
Mitra papālis L. (§. 224,61).

M. episcopālis L. Bischofsmütze. Weiß oder gelblichweiß, mit Querreihen 4eckiger, rother Flecken; Gewinde glatt; 4‴; Ostindiens Küsten.

62. ***Volūta vespertilio*** L. (§. 221,72). Fledermaus-Rollschnecke. Weißlich, mit rothbraunen Zickzackstreifen; 4 Spindelfalten; Gewinde mit spitzen Knoten; 3—4‴; an Ostindien häufig.

V. musica L. Notenschnecke. Graugelblich, mit parallelen Querlinien und braunen Punkten darüber und darunter; 2—3‴; an den Antillen.

63. ***Cymbium Neptūni*** Lam. (§. 221,73). Neptunswagen. Rothbraun; Gewinde gekielt, fast verborgen; 8—9‴; persischer Meerbusen.

64. ***Oliva utriculus*** Lam. (§. 221,74). Schlauchdattel. Bläulichgrau, weiß und grau marmorirt, an der Basis mit schiefer, gelblicher, braungeflammter Binde; Gewinde [illegible]; 2‴; Indien; nebst folgender sehr hä[illegible]

O. ispidi[illegible] limmerchen. Grün und schwärzl[illegible]eift. Mündung bräunlich; Gew[illegible]". In Färbung sehr veränder[illegible]

6. [illegible]. Athmen durch verschi[illegible]dete (kamm-, blatt-, büschel- oder fadenförmige) Kiemen, welche an verschiedenen Stellen des Körpers liegen (auf dem Rücken frei oder in einer Mantelfalte oder an einer oder an beiden Seiten oder rings um den Leib oder am Halse). Meist Meerthiere, meist mit sehr verschieden gebildetem Gehäuse.

65. ***Aplysia depilans*** L. (§. 221,3). Gemeiner Seehaase od. Giftkuttel. Grau gewölkt; Hornschale klein, bedeckt; im Meere vom Seetange lebende, unangenehm riechende Thiere. Nero und Domitian damit vergiftet?

66. ***Bulla striāta*** Brug. (§. 221,21). Gestreifte Blasenschnecke.

Gehäuse eiförmig, grau oder braun gewölkt, vorn mit vertieften Querstrichen; 8‴; gemeinste Art; Mittelmeer.

B. ampulla Brug. Bauchige Blasenschnecke. Wie vorhergehende Art, aber gewölbter und ohne Querstriche; 2″; in allen Meeren.

67 ***Haliotis tuberculata*** L. (§. 221,16). Gemeines Seeohr. Marmorirt; längsgefaltet, quergerunzelt und gestreift; 3″; im Mittelmeere, sehr häufig; nur ♀ Thiere bekannt.

68. ***Fissurella barbadensis*** L. (§. 221,5). Gemeine Schlitzschnecke. Oval, Wirbelloch rund; gelbweiß, rothgefleckt; strahlende Rippen ungleich; 1″; Küsten von Barbados.

F. graeca L. Griechische Schlitzschnecke. Ebenso, aber Wirbelloch länglich; durch erhabene Linien stark gegittert; 12‴; Mittelmeer.

69. ***Emarginula fissura*** L. (§. 221,6). Gemeine Ritzschnecke. Weiß; gegittert; 8‴; um Europa.

70. ***Patella vulgata*** L. (§. 221,7). Gemeine Napfschnecke. Convex-kegelförmig; grünlich oder gelbgrau, inwendig gelb; Längsrippen zart, etwas kantig; 2″; um Europa an Felsen; werden mit einem Messer abgelöset und gegessen.

* **71.** ***Ancylus fluviatilis*** L. (§. 221,8). Flußnapfschnecke. Mützenförmig; Mündung rundlich; Scheitel rückwärts gebogen; 2‴. Häufig in Bächen.

* *A. lacustris* L. Teichnapfschnecke. Schüsselförmig; Mündung eiförmig; Scheitel links gebogen; 2‴. Häufig in stehenden Gewässern.

72. ***Dentalium elephantinum*** L. (§. 221,4). Elephanten-Meerzahn. Röhre schwach gekrümmt, mit 10 scharfen Rippen und Längsstreifen dazwischen; $2^1/_2$″; Mittelmeer.

73. ***Chiton squammosus*** L. (§. 221,122). Schuppige Käfermuschel. Grünlich; 8 längs- und quergestreifte, gekielte Schalenstücke; Mantelrand schuppig; 2″; Mittelmeer.

IV. Kielfüßer. Heteropoda §. 221 b. Ein deutlicher Kopf mit Augen, Fühlern und rüsselförmigem Maule. Der verlängerte Körper hat an der Bauchseite eine zusammengedrückte Flosse (Fuß), welche zum Schwimmen dient und mit ihrem Saugnapfe am Hinterrande zum Festsaugen. Sie schwimmen mit dem Bauche nach oben gerichtet und haben keine oder nur eine kleine, zerbrechliche und deshalb theure Schale. Nur eine gleichnamige Familie:

7. Kielfüßer.

Cartnaria cymbium Lam. Kahn-Kielschnecke. Der walzige, bläuliche Körper hat einen breiten, flossenförmigen Schwanz und eine kleine, quergestreifte, glashelle, mützenförmige Schale; 1—2″; Mittelmeer.

§. 225. **B. Kopflose Weichthiere** (Acephăla). Kein Kopf; Mund zwischen den Mantellappen oder im Grunde der Kiemenhöhle.

V. Armfüßer (Brachiopŏda) §. 221 b. [illegible] Leib hat einen zweilappigen Mantel und ist, wie die Ma[illegible] völlig gleichseitig; ja das Thier hat sogar 2 [illegible]tumläufe, so daß ein Längsdurchschnitt Thier und [illegible]eiche Theile trennt. Der Mund liegt zwischen 2 [illegible]fgerollten Armen am Bauche, welche zum Oeffne[illegible]eifen der Nahrung dienen. Die Lochmuscheln o[illegible] zur Unterstützung der Arme im Innern der Mus[illegible] knochenartiges Gestell. Sie leben nur im Meere und sind stets durch ein fleischiges Band an andern Gegenständen befestigt. Nur 1 gleichnamige, an Gattungen arme Familie:

8. Armfüßer.

* **74.** *Terebratŭla* Müll. (§. 221,78). Terebratel oder Lochmuschel. Nebst den Ammonshörnern die wichtigste Gattung für die Kenntniß des Alters der Gebirge. Man hat schon an 500 verschiedene Arten fossil, nur wenige lebend und immer auf hoher See, nie an Küsten gefunden. Sie finden sich

schon in den ältesten Schichten, am zahlreichsten aber im Juragebirge, selten in den tertiären Ablagerungen. Die Schale ist ungleichklappig und meist gewölbt; die größere oder Oberklappe (Rückenklappe) hat einen durchbohrten Schnabel, aus dessen Loche ein Muskel zur Anheftung des Thieres hervortritt. Unter dem Schnabel liegt ein 3eckiges Schalenstückchen (*Deltidium*), dessen Form für die Eintheilung dieser Muscheln sehr wichtig ist. §. 225.

* *T. communis* od. *vulgaris* v. Schl. Gemeine Terebratel (Fig. 157.). Schalen glatt; kleine Klappe in der Mitte am höchsten gewölbt; vom Wirbel herab mit einer schwach vertieften Linie. Sehr häufig und überall im Muschelkalke und deshalb nebst *Am. nodosus* (Fig. 133.) dessen wichtigste Leitmuschel.

* *T. bipticata* Sow. Zweifaltige T. (Fig. 158.). Länglich-fünfeckig, mehr oder weniger gewölbt; Rückenschale (b) mit einem, von 2 flachen Furchen begränztem Längskiele von der Mitte bis zum Rande; dem Kiele entgegen auf der Bauchschale (c) eine mittlere Bucht, von 2 starken Falten eingefaßt; bis $1\frac{1}{2}$''. Weit verbreitet im untern Jura im Würtembergschen, in Bayern, Sachsen und in Hilsgebilden bei Schöppenstedt und Vahlberg im Braunschweigschen.

* *T. oblonga* Sow. Längliche T. (Fig. 159.). Beide Klappen stark gewölbt, mit 18—30 starken Falten; höchstens 8'''. Leitmuschel für die Hilsbildungen und besonders häufig bei Schandalahe und Schöppenstedt im Braunschweigschen.

* *T. concinna* Sow. (*pinguis* Rr.) und *T. lacunosa* v. Schl. Fette und vielfaltige Terebratel. Beide sehr ähnlich, sehr gewölbt und mit vielen Falten. Leitmuscheln, welche fast überall sehr häufig im Juragebirge sich finden: letztere in Süddeutschland und erstere in Norddeutschland (bei Hildesheim am Galgenberge).

Von den übrigen, früher zu den Terebrateln gezählten, jetzt aber in besondern Gattungen abgesonderten Leitmuscheln, welche nur in den ältesten Gebirgslagen (der Grauwackenformation) vorkommen, erwähnen wir hier noch als besonders charakteristisch für die obern silurischen und devonischen Schichten und den Bergkalk: 1. *Pentamerus Knightii* Sow. (Fig. 160.), dessen Klappen stark gekrümmte,



Fig. 157. *Terebratula vulgaris* (§. 225, 74).
Ansicht von der Bau… seite; Vertiefung selte… breit wie in der Zeich… auf der Bauchklapp…

Fig. 158. *Terebratula biplicata* (§. 225, 74).
a Ansicht von der Seite, b vom Rücken, c vom Bauche aus.

Fig. 159. *Terebratula oblonga* Sow. (§. 225, 74).
a Ansicht von der Seite, b vom Bauche aus.

Fig. 160. *Pentamerus Knightii* (§. 225, 74).
a Ansicht von der Seite; b Ansicht von den Buckeln aus.

nicht durchbohrte Buckeln und 5 Längskammern im Innern haben. Sie findet sich häufig in England und bei Ilsenburg am Harze. **2.** ***Spirĭfer speciōsus*** v. Schl. (Fig. 161.). In Asien, Afrika, Amerika und Europa verbreitet (am Rammelsberge und an der Schalke unsers Harzgebirges, so wie in der Eifel ꝛc.). **3.** ***Stringocephălus Burtīni*** (***Terebratulītes rostrātus*** v. Schl.). Burtin's Eulenkopf oder geschnäbelte Terebratel (Fig. 162.). Besonders häufig in der Eifel, bei Elberfeld, in Belgien ꝛc.

75. ***Cranĭa personāta*** Lam. (§. 221,[80]). Todtenkopfmuschel. Nur 6‴; im indischen Meere und fossil bei Brattenburg in Schonen; daher Brattenburgische Pfennige genannt.

* **76.** ***Calceŏla sandalīna*** (§. 221,[79]). Pantoffelmuschel (Fig. 163.). Fossil im Uebergangskalke der Eifel und des Harzes und für die jüngere Grauwacke Leitmuschel.

Hierher auch noch eine, überall den Zechstein bezeichnende Leitmuschel: ***Prodūctus aculeātus*** (Fig. 164.). Beide Klappen stoßen am geraden, horizontalen Schloßrande eng zusammen, an dessen ganzer Länge hohle Röhren stehen, deren Zweck noch unbekannt ist. Die Arten beginnen schon in der Grauwacke, sind am häufigsten im Kohlenkalke (in Belgien allein 29 verschiedene Arten) und hören im Zechsteine auf.

§. 226. **VI. Muscheln** oder **Muschelthiere** (§. 221 b). Conchifĕra. Der kopflose Leib hat einen 2lappigen Mantel, zwischen welchem 2 Paar blättrige Kiemen und der Mund; am Bauche ein fleischiger Kiel oder Fortsatz zum Fortkriechen (Fuß). Der Leib wird von zwei, an der Rückenseite mit Zähnen ineinandergreifenden (Schloß) und äußerlich durch ein sehniges Band verbundenen Schalenklappen (Klappen) umschlossen (Fig. 131. u. 132.). Jede Klappe hat 1 oder 2 tiefere Eindrücke (Muskeleindrücke) als Befestigungspunkte der Muskeln, durch welche Thier und Schale zusammenhängen. Neben dem Fuße ist oft ein Bart (byssus), mit welchem die Thiere festgewachsen sind. Nächst den Schnecken die zahlreichsten Mollusken; Meer- und Süßwasserthiere getrennten Geschlechts.

9. Einmuskelige Muscheln. Jede Klappe nur mit einem Muskeleindrucke. Meerthiere.

* **77.** ***Ostrĕa edūlis*** L. (§. 221,[82]). Gemeine Auster. Schale etwas eiförmig-rund, an der Basis schmäler, mit schuppigen, welligen Blättern; Oberklappe flach. Seit 2000 Jahren gesammelt und lebend gegessen (todte und deshalb klaffende schmecken schlecht und sind schädlich). Um ganz Europa auf den sogenannten Austerbänken (bei Triest und Venedig die besten; die deutschen und holsteiner Kaufmannsaustern aus der Nordsee die schlechtesten). Die fossilen Austern mit zickzackförmig ineinander greifenden Klappen sind für die Kreideformation Leitmuscheln, so wie ***Ost. gregarĭa*** und ***Marshi*** für den mittlern Jurakalk.

* **78.** ***Gryphaea arcuāta*** Lam. (§. 221,[illegible] [illegible]mte Habichtsmuschel (Fig. 165.). Ist für die untern Liassch[illegible] [illegible]kalk) Leitmuschel, so wie ***G. dilatāta*** Sow. oder ***G. controvērsa*** [illegible] Jura. Wurden früher für Schnäbel des fabelhaften, vierfüßi[illegible]s) gehalten.

* **79.** ***Exogȳra spirālis*** (§. 221,[84]) un[illegible]ichnend für den obern Oolith, wie ***Ex. sinuāta*** für di[illegible]

80. ***Mallĕus vulgāris*** Lam. (§. 221,[90]). [illegible]er. Schwarzbraun; Tförmig, unregelmäßig wellig gekrümmt [illegible] Ostindien; selten.

81. ***Perna isogōnum*** L. (§. 221,[89]). Winkelhaken. Violettbraun; mit einem, wie ein Winkelhaken verlängerten Ohre; 5—6″; Indiens Küsten.

82. ***Anomĭa ephippĭum*** L. (§. 221,[81]). Die weiße Zwiebelmuschel. Weißlich; fast kreisrund, wellig, runzlig gefaltet, verflacht; 2″; Mittelmeer; häufig.

A. (***Placūna***) ***sella*** L. Polnischer Sattel. Sattelförmig gebogen. Indisches Meer.

* **83.** ***Inocerămus Lamarckĭi*** (§. 221,[85]). Lamarck's Fasermuschel (Fig. 166.). Länglich-eiförmig, mit fast gleichen Klappen, aufgeblasen, mit

Fig. 161. *Spirifer speciōsus* (§. 225, 74).

a b

Fig. 162. *Stringocephălus Burtīni* (§. 225, 74)
a Ansicht von der kleinen oder Bauchseite aus;
b Seitenansicht.

a

Fig. 163. *Calceŏla sandalīna* (§. 225, 76).

b

a Die große Schale; b der Deckel derselben.

Fig. 164. *Prodūctus aculeātus* (*Gryphites aculeātus* v. Schl.). Von der Bauchseite.

Fig. 165. *Gryphaea arcuāta* (§ 226, 78).

Fig. 166. *Inocerāmus Lamarckii* (§. 226, 83). Eine der beiden Klappen von der Seite gesehen.

Fig. 167. *Inocerāmus Cuviĕri*. Cuvier's Fasermuschel. Nur ein Stück einer Klappe, um den geraden Schloßrand mit den Bandgrübchen dieser Gattung zu zeigen.

§. 226. vielen concentrischen Runzeln und Streifen; 2—4″. Sehr verbreitet in den Kreidegebirgen Europas; hier in der Kreide bei Lüneburg ꝛc. Die verschiedenen Arten sind überhaupt sehr bezeichnend für das Kreidegebirge.

84. ***Spondȳlus gaederŏpus*** L. (§. 221,87). Lazarus-Klappmuschel. Oberklappe purpurfarbig, mit 6—8 Reihen zungenförmiger Stacheln und vielen Höckerreihen dazwischen; 3″; Mittelmeer; schmackhaft.

Sp. (***Plagiostŏma***) ***spinōsum*** ist Leitmuschel für die weiße Kreide.

85. ***Pecten maxĭmus*** L. (§. 221,92). Große Kammmuschel oder Pilgermuschel. Die größere und gewölbte Klappe mit zugerundeten, längsgestreiften Strahlen, 6″; Meere Europas; das Thier wird gegessen; die Schalen zu Löffeln ꝛc. benutzt.

P. jacobaeus L. Jacobsmantel. Ebenso, aber Strahlen scharfkantig; 4″; daselbst; schmackhaft.

P. operculāris L. Rundlich, längsgestreift; Oberklappe gewölbter; 18—20 gewölbte Strahlen; verschieden gefärbt, meist gefleckt; 3″; nebst ***P. varĭus*** gemeinste Art in den Meeren Europas.

Viele fossile Arten, von denen ***P. Münstĕri*** in den tertiären Ablagerungen bei Hildesheim ganze Lagen bildet und ***P. laevigātus*** und ***discĭtes*** im Muschelkalke sehr verbreitet sind, so wie ***P. quinque costātus*** Sow. (Fig. 168.), die fünfrippige Kammmuschel, Leitmuschel für die weiße Kreide ist und ***Pecten fibrōsus*** Sow. (Fig. 169.), die feinstreifige K., für die untern Juraschichten.

* **86.** ***Monōtis substriāta*** (§. 221,93). Feingestreiftes Einohr. Leitmuschel für die obern Liasschichten (Monotenkalk).

87. ***Lima squamōsa*** Lam. Schuppige Feile. Eiförmig, niedergedrückt, vorn gleichsam abgeschnitten; Rippen rauh, schuppig; Rand gefaltet; 3″; Meere Europas; häufig.

* *L.* (***Plagiostŏma***) ***striāta*** (Fig. 170.). Gestreifte Feile. Ist unter den versteinerten Arten die häufigste und den Muschelkalk sehr bezeichnende Art.

10. Zweimuskelige Muscheln. Jede Klappe mit 2 Muskeleindrücken (Fig. 172). Meer- und Süßwasserthiere.

a) Muskeleindrücke sehr klein und undeutlich.

88. ***Tridācna gigas*** Lam. (§. 221,99 u. 108). Riesenmuschel. Quereiförmig; Rippen stark, mit aufgerichteten, wie Hohlziegel übereinander liegenden Blättchen; 3—6′ und 500 Pfund schwer. Größtes, mit einem Byssus an Felsen befestigtes Schalthier; Fleisch eßbar; Schalenklappen zu Waschbecken ꝛc. (Beckenmuschel).

89. ***Hippŏpus maculātus*** Lam. (§. 221,109). Gefleckter Pferdefuß. Weiß; Rippen mit kleinen Schuppen und purpurrothen Flecken; Rand zackig; 10″; Indien.

90. ***Pinna squamōsa*** Gm. (§. 221,94). gedrückt, [illegible] Steckmuschel. Grauröthlich, eiförmig gerundet, mit undeutli[illegible] auf welchen abgestutzte, hohle Schuppen in bogigen Que[illegible] größte Art; Mittelmeer.

P. nobĭlis L. Edle St. Grauröthlich[illegible], welche von gedrängten, aufrecht zurückgebogenen Sc[illegible] 1′; Mittelmeer. Beide Arten werden häufig bei Tare[illegible]s (S. 256.) zu Handschuhen ꝛc. zu verarbeiten.

* **91.** ***Mytĭlus edūlis*** L. (§. 221,95). Eßbare Mießmuschel. Schale fast keilförmig, nach vorn gerade, zusammengedrückt-eckig, nach hinten gekrümmt; meist einfarbig violett; Schloß mit 4 Zähnen; 2″; fast in allen Meeren; werden häufig gegessen.

* *M.* ***polymŏrphus*** Pall. Schmutziggelb; 3seitig; 8—13‴; lebt im Süßwasser und ist durch Schiffe, an welche sie sich mit dem Byssus heftet, fast in alle größeren Flüsse (Elbe ꝛc.) verschleppt.

92. ***Modiola tulipa*** Lam. (§. 221,[96]). Die Tulpe! Dünn wie ein Tulpenblatt, länglich, oben zusammengedrückt ausgeschweift, unten zusammengedrückt geflügelt; mit weißen, rothen oder violetten Strahlen. Atlantisches Meer. §. 226.

93. ***Lithodomus lithographus*** L. (§. 221,[101]). Meerdattel, Steinbohrer. Braungelb, mit feinen, sich kreuzenden Längs- und Querstreifen; 3″. Bohrt sich in Felsen und Korallenstämme ein und ist wegen des Pfeffergeschmacks beliebt.

94. ***Avicula tarentina*** Lam. (§. 221,[88]). Gemeine Schwalbenmuschel. Grau, braungestrahlt; mit auseinander geklappter Schale einer fliegenden Schwalbe ähnlich; 3 — 4″; bei Tarent.

* *A.* ***sociālis*** Bronn. Gesellige Schwalbenmuschel (Fig. 171.). Eines

Fig. 168.
Pecten quinque costātus (§. 226,[85]).



Fig. 169.
Pecten fibrōsus (§. 226,[85]).

b

Fig. 170.
(§. 226,[87]). Gestreifte Teile.
b Seitenansicht.

Fig. 171.
Avicula sociālis. Gesellige Schwalbenmuschel (§. 226,[94]).

§. 226. der häufigsten und bezeichnendsten Petrefacten für den Muschelkalk. Sehr schief gebogen, elliptisch, mit kleinen Flügeln; Schnabel vorstehend und etwas übergebogen; 1—1½″.

b) Muskeleindrücke beide deutlich.

95. ***Meleagrina margaritifera*** L. (§. 221,103). Meer-Perlmuschel. Etwas quadratisch, nach oben abgerundet; grünbraun, weiß gestrahlt; mit schuppigen Lamellen in Längsreihen; 6—8″; rothes, persisches und indisches Meer. Werden durch Taucher herausgeholt, um die Perlen, eine Secretion (Ausscheidung) des Mantels, herauszusuchen; die Schalen liefern das bekannte Perlmutter.

96. ***Chama lazărus*** L. (§. 221,86). Lazarusklappe. Purpurroth; mit schuppigen, wellig gefalteten, etwas gelappten, schwachgestreiften Lamellen; 2″; Amerika.

97. ***Arca Noae*** L. (§. 221,105). Noa's Arche. Länglich, fast 4seitig, an der Spitze ausgerandet; Wirbel entfernt; Rand klaffend; längsgerippt, mit rostbraunen Zickzackstreifen; 3—4″; in allen Meeren häufig, wie *A. diluvii* in den tertiären Bildungen.

98. ***Pectunculus angulātus*** Lam. (§. 221,106). Eckige Sammetmuschel. Nach vorn kantig, längsgefurcht und gestreift; rostfarbig, weiß gewölkt, im Innern ein Rostfleck; 19‴. An Amerikas Küsten häufig.

* ***P. polyodonta*** Bronn. (***pulvinātus*** Brong.). Vielzähnige Kammmuschel (Fig. 172.). Fast kreisrund, dickschalig; mit feinen, ausstrahlenden und concentrischen Linien; bis 2½″. Im Mittelmeere und in den tertiären Ablagerungen bei Klein-Freden in der Nähe von Alfeld, bei Osnabrück, Cassel ꝛc.

99. ***Solen siliqua*** L. (§. 221,102). Hülsenförmige Messerscheide. Zwei Schloßzähne; Klappen fast gerade, kaum gebogen; 8″; häufig in Meeren um Europa; werden nebst den übrigen Arten gern gegessen.

* **100.** ***Mya arenaria*** L. (§. 221,107). Gemeine Klaff- oder Sandmuschel. Eiförmig, weißlich, quergestreift, hinten abgerundet, an beiden Enden fast schließend; 3″ lang und 2″ breit; Nordsee.

101. ***Unio margaritifer*** (§. 221,110). Perl-Flußmuschel od. Fluß-Perlmuschel. Keine Seitenzähne; verlängert-eiförmig, schwarzbraun; Unterrand buchtig; Wirbel stark abgerieben; Hauptzahn der rechten Schale dick, stumpf-kegelförmig; 2″ h. u. über 4″ br.; Flüsse Sachsens, Bayerns; liefert Perlen.

* ***U. pictorum*** Lam. Malermuschel. Länglich-eiförmig, hinten allmählig schnabelförmig zulaufend; grüngelblich; 3—4″ lang; Flüsse Deutschlands.

* ***U. batavus*** Lam. Breit-eirund, mit dunkelo[illegible]ahlen; 2″ lang; daselbst häufig. —. Die Arten in den Flüssen [illegible] sich durch sehr dicke und schwere Schale aus.

* **102.** ***Anodonta cygnea*** L. (§. 221,10[illegible]chmuschel. Stark gewölbt; mit grünen, concentrischen [illegible]hen. Die Anodonten sind die größten deutschen Süß[illegible]egen der Veränderlichkeit der Schale in dem verschie[illegible]rer Verschiedenheit nach dem Geschlechte schwer zu [illegible]).

* **103.** ***Trigonia*** (***Lyriodon***) ***navis*** Lam. (§. 221,97). Schiffs-Dreieckmuschel (Fig. 173.). Mit senkrecht abgeschnittener Vorderfläche (a), deren Kanten seitlich mit 10—12 starken Knoten besetzt sind, von welchen wagerechte Rippen über diese Fläche fortlaufen. Seitenflächen mit 10—12 knotigen, ausstrahlenden Rippen. Leitmuschel für den jungen Liasmergel.

* *Tr.* (***Myophoria***) ***vulgāris*** v. Schl. Gemeine Dreieckmuschel (Fig. 174.). 1 bis 2″ groß. Leitmuschel für den Muschelkalk.

104. ***Mactra solida*** L. (§. 221,100 u. 111). Gemeine Trogmuschel. Abgerundet-dreiseitig, gelblichweiß, zuweilen mit bräunlichen oder blauen Quer-

§. 226.



Fig. 172.
Pectunculus polyodonta (§. 226,98).
a Außenansicht der Schale;
b Innere Ansicht der Schale, um die 2 Muskeleindrücke und die für die Gattung charakteristische Stellung der Zähne in einem Bogen zu zeigen.



Fig. 173.
Trigonia navis (§. 226, 103).
Seitenansicht. a Senkrecht abgeschnittene Vorderfläche.

Fig. 174.
Trigonia vulgaris (§. 226, 103).

binden; 1″; am Strande um Europa. In Holland wird Kalk aus denselben gebrannt.

105. *Telli[illegible]la* Lam. (§. 221, 112). Gemeine Tellmuschel. Rundlich-dreiseit[illegible]hlich (*T. carnaria*) oder gelblich, mit concentrischen, weißen [illegible] Europas.

T. ra[illegible] [illegible]estrahlte Tellmuschel. Länglich-elliptisch, flach[illegible] wie polirt, durchscheinend, weiß, mit breitern und [illegible]rahlen; 2″. Europäischer Ocean.

T. ga[illegible] Wird auf Amboina zu einer Brühe (amboinische T[illegible] Indien überall beliebt ist.

* **106.** *Cardium edule* L. (§. 221, 113). Eßbare Herzmuschel. Rundherzförmig, schief, mit 24—26 querrunzligen Rippen; gelblichweiß; 1″; Meere um Europa; das Thier wird gegessen; aus den Schalen wird Kalk gebrannt.

* **107.** *Isocardia cor* Gm. (§. 221, 114). Ochsenherz. Rothbraun; eiförmig-kuglig; Wirbel dick, spitz, nach vorn eingerollt; 3″; Mittelmeer und fossil in tertiären Ablagerungen bei Hildesheim, wie *I. excentrica* im Juragebirge.

108. *Lucina carnaria* L. (§. 221, 115). Rothe Sonne. Rundlich-

§. 226. dreiseitig, flach gewölbt, außen und innen fleischroth, mit zarten, wellig gebogenen Streifen; 1‴; Mittelmeer häufig.

L. edentula L. Weißgelb, concentrisch gestreift, ungezähnt; $1\frac{1}{2}$″.

* **109.** ***Cyclas cornea*** Lam. (§. 221,116). Gemeine Kugelmuschel. Hornfarbig; herzförmig-kuglig, bauchig, dünn; fein gestreift, gelblich gesäumt; Wirbel stumpf; 6‴ lang und 5‴ hoch; in Wassergräben häufig.

* *C. lacustris.* Teich-Kugelmuschel. Rundlich-rautenförmig, etwas ungleichseitig und flach, fein gestreift; etwas kleiner; daselbst.

* **110.** ***Pisidium obliquum*** Lam. (§. 221,117). Schiefe Erbsenmuschel. Hornfarbig; eiförmig, schief 3seitig, bauchig, schwach gerippt-gestreift; Wirbel stumpf, nach vorn geneigt; 4—5‴ lang u. $2\frac{1}{2}$‴ dick; häufig in Wassergräben.

* **111.** ***Donax trunculus*** L. (§. 221,98 u. 118). Gemeine Stumpfmuschel. Lang quer-gestreckt, vom Wirbel herab strahlenförmig fein gestreift; Vorderseite kurz, glatt; weißlich oder bräunlich, heller gestrahlt, inwendig violettblau; 1″; Mittelmeer.

D. analina Lam. Wie vorige, aber nicht gestrahlt, vorn schief abgestutzt; daselbst.

* **112.** ***Cyprina islandica*** L. (§. 221, 119). Isländische Venusmuschel (Fig. 175.). Eiförmig, fast herzförmig, fein und unregelmäßig quergestreift; Vorderseite sehr kurz; kein deutliches Feldchen (Fig. 176, a); 2″ lang und fast 2″ breit. Nördliche Meere und fossil in den tertiären Ablagerungen bei Hildesheim ꝛc.



a b

Fig. 175.
Cyprina islandica (§. 226,112)
a Linke Klappe von Innen; b Rechte Klappe von Außen.

113. ***Venus cancellata*** L. (§. 221,120). Gegitterte Venusmuschel. Herzförmig, längsgefurcht und mit erhabenen Querleisten; 1″; häufigste Art Amerika, wie *V. verrucosa* L., die warzige Mittelmeere.

V. mercenaria L. Feile Venus. den Wampum-Gürteln der Irokesen, welche Thier auf Reisen in den Mund nehmen und

Fig. 176.
Cytherea Dione (§. 226,114).
a Feldchen; b Wirbel; c Schildchen mit dem Schloßbande.

114. ***Cytherea Dione*** L. (§. 221,12 Venusmuschel (Fig. 176.). Schief herz erhabenen, blättrigen, concentrischen Querrippen, welche nach dem Schlosse zu in lange Dorne auslaufen; hellfleischfarbig; Feldchen und Schildchen (Fig. 176. a u. c) purpurroth; 1—$1\frac{1}{2}$″; an Amerika.

115. ***Pholas dactylus*** L. (§. 221,77). Steinbohrer oder Bohrmuschel. Weiß; gestreckt, nach vorn schnabelförmig verschmälert, mit stachlig gezähnten, nach hinten verschwindenden Rippen; über 3″; an Italien; wegen des pfefferartigen Geschmacks beliebt.

‡ **116.** *Terēdo navālis* L. (§. 221,76). Gemeine Pfahlmuschel, Bohrwurm, Schiffsbohrer. Schale von einer deckelartigen Schwiele vorn begränzt; 6—10″, fingerdick; Häfen Europas; aus Indien durch Schiffe eingeschleppt und sehr schädlich, weil sie Schiffe und Pfähle der Dämme so durchbohren, daß sie das Ansehen eines Schwammes bekommen.

117. *Aspergillum javānum* Lam. (§. 221,75). Javanische Siebmuschel oder Gießkanne. Rohr glatt, am durchlöcherten Ende mit kalkigem Saume und auf dem Rücken eine kleine eingewachsene, zweiklappige Muschel, wie bei den übrigen Arten; 8″; Meer um Java.

VII. Mantelthiere od. **schalenlose Akalephen** (§. 221,b). *Tunicāta.* §. 227.
Kiemen in der erweiterten Mundhöhle (Kiemenhöhle); Körper ohne Gehäuse, von einer lederartigen, sackförmigen Hülle (Mantel) umschlossen. Meerthiere. Nur eine Familie:

11. Mantelthiere.

118. *Ascidia* (*Boltenia*) *ovifĕra* (§. 221,126). Eier-Seescheide. Leib eiförmig, steif behaart, mit dem Stiele 1″; an Felsen der amerikanischen Küste.

119. *Diazōna violacĕa* (§. 221,127). Violette Seescheide. Thiere in concentrischen Kreisen; Körper becherförmig, violett; 2″; der ganze Stock 6″; Mittelmeer.

120. *Salpa pinnāta* (§. 221,128). Gefiederte Salpe oder Walzenscheide. Gallertartig; oben 2, viermal unterbrochene Längsstreifen; 3″; Mittelmeer. Die Salpen pflanzen sich durch Generationswechsel fort, §. 20, b. IV.

X. Klasse. **Radiāta. Strahlthiere** (§. 23.). §. 228.

Schleimthiere mit weichem, nacktem oder von kalkiger oder lederartiger Hülle bedecktem Leibe, welcher in regelmäßige Strahlen ausläuft oder mit vielen Fühlfäden und Fangarmen in der Umgebung des Mundes besetzt ist.

Die eigentlichen **Strahlthiere** haben einen kugligen, cylindrischen oder regelmäßig strahlenförmigen Leib mit lederartiger, empfindlicher Haut bekleidet, in welcher entweder zerstreute Kalkstückchen sich befinden oder unter welcher ein aus Kalkstücken zusammengesetztes Gerüste liegt, mit einer unten oder am Vorderrande befindlichen Mundöffnung mit feinen, ausdehnbaren Fühlfäden (tentacŭla §. 14,1) umgeben. Im Innern liegt ein langer, gewundener, in einen After mündender Darm oder bloß ein blinder Magensack ohne After. Die Athmungsorgane, [illegible] entweder ganz und die Oberfläche des Körpers vertritt deren Stelle, [illegible] bestehen aus Bläschen im Innern, welche das Wasser durch den After [illegible] Gefäße sind nur da deutlich, wo die Athmungsorgane voll[illegible] Nervensystem bildet nur einen Nervenring um den S[illegible]

Die [illegible] lertartigen Körper, welcher eine Scheibe oder große [illegible] ngen Bande ähnelt ohne Darm und After. Die schei[illegible] an der Unterseite um den Mund 4, 8 oder 16 ho le[illegible] angarme und zahlreiche, feinere, gallertartige Fan[illegible] nge des Körpers; bei den übrigen vertreten viele ohle Saugröhren den Mund und saugen die Nahrungsmittel ein. Sie haben keine Respirationsorgane, aber viele haben Blasen, welche durch besondere Oeffnungen mit Wasser (Schwimmhöhlen) oder Luft (Schwimmblasen) sich füllen.

Alle Strahlthiere leben im Meere von thierischen Stoffen und sind entweder frei oder festgewachsen; sie pflanzen sich durch Eier- oder Keimsäcke fort (§. 20, III.). Viele leuchten im Dunkeln, manche prangen mit den schönsten Farben; einige erregen auf der Haut Brennen und Entzündung; nur wenige sind eßbar (Trepang). Man kennt an 2000 verschiedene Arten (§. 7.).

§. 229. Uebersicht der III Ordnungen und deren Familien und wichtigsten Gattungen.

- Körperhülle lederartig; Leib langgestreckt, walzig: **I. Sternwürmer**
  - mit abgeplatteter Bauchseite, welche gestielte Saugnäpfchen trägt; Rücken mit Warzen — **Spritzwurm** . . . . . 1) *Holothurĭa* L.
  - rundlich, kolbig, quergeringelt, ohne Warzen und Saugnäpfchen; ein ausschiebbarer, warziger Rüssel — **Heberwurm** . . . . . 2) *Siphuncŭlus* Gm.
- Körperhülle nicht lederartig
  - mit Kalkschalen u. Kalkstückchen: **II. Stachelhäuter**
    - Leib ohne Hauptstrahlen, kuglig oder scheibenförmig: **1) Seeigel**
      - Mundöffnung unten in der Mitte
        - After oben, dem Munde entgegengesetzt; Körper kuglig
          - Warzen nicht durchbohrt; Stacheln gleichgroß — — **Seeigel** . . . 3) *Echīnus* L.
          - W. durchbohrt; Stacheln von verschiedener Länge — **Meerturban** (Fig. 177. u. 178.) 4) *Cidarītes* Lam.
        - After unten am Rande; Körper kegel- oder fast eiförmig; Fühlergänge bis zum Munde laufend — **Helmigel** . . . 5) *Galerītes* Lam.
      - Mundöffnung unten, aber in der Nähe des Randes; After auch unten
        - Fühlergänge bis zum Rande laufend; Körper kegel- od. eiförmig — (Fig. 179.) . . . . 6) *Ananchȳtes* Lam.
        - F. kurz, blattförmig — **Blattigel** (Fig. 180.) 7) *Spatāngus* Agass.
    - Leib in mehre Hauptstrahlen getheilt
      - ohne After; Maul unten; Körper scheibenförmig, frei; **2) Seesterne**
        - Strahlen ungetheilt
          - unten flach, mit tiefer Längsfurche — **Seestern** . . . 8) *Asterĭas* L.
          - unten rund, ohne Längsfurche — **Schlangenstern** 9) *Ophiūra* Lam.
        - Strahlen mehrmals gablig getheilt — **Medusenhaupt** 10) *Euryăle* Lam.
      - mit After; Maul oben; Körper becherförmig, festgewachsen: **3) Haarsterne**
        - Säule gegen den Becher hin verdickt — **Birnlilie** . . . 11) *Apiocrinītes*.
        - Säule von gleicher Dicke
          - Säule 5kantig; Finger mit einfacher Gliederreihe — **Kantenlilie** . . 12) *Pentacrinītes*.
          - Säule rund; Finger mit doppelter Gl. — — **Meerlilie** (Fig. 181.) . . . 13) *Encrinītes*.
  - ganz gallertartig: **III. Quallen**
    - eine einfache Magenhöhle
      - Leibesfläche mit Rippen, aus kleinen Bläschen gebildet: **1) Rippenquallen**
        - Leib bandfg — **Gürtelqualle** . . . . . 14) *Cestum*.
        - Leib eiförmig [illegible] mit acht [illegible] Längsfurcht [illegible] Beröë.
      - Keine Rippen; Leib scheiben- oder glockenförmig, mit Fangarmen: **2) Scheibenquallen**
        - Scheibe flach [illegible] L.
        - [illegible] lange Fangfäden — **Haarqualle** . . . 17) *Cyanĕa*.
        - Scheibe glockenförmig, in der Mitte mit frei herabhängendem Magen; am Munde 4 kurze Lappen — **Beutelqualle** . . . . . 18) *Oceanĭa*.
    - statt derselben viele Saugröhren **3) Röhrenquallen**
      - Leib eine elliptische Blase, mit einem faltigen Kamme auf der Mitte — **Seeblase** . . . . . 19) *Physalĭa* Lam.
      - Leib scheibenfg; auf dem Rücken eine Schale, auf deren Mitte ein blattförmiger Knorpel wie ein Segel — **Segelqualle** . . . 20) *Velĕlla* Lam.

I. Sternwürmer (Holothuroděa). §. 229. Der Leib mit kurzen Fortsätzen (Füßchen) zum Fortschieben, oder nackt; Mundöffnung vorn, mit einziehbaren, gefranseten Armen; After hinten, zugleich für die Aufnahme des Wassers in das ästige Athmungsorgan. §. 230.

1. ***Holothuria tubulōsa*** L. Röhriger Spritzwurm oder Seegurke. Dunkelbraun; Bauchseite mit mehren hundert einziehbaren Füßchen; über 1′ lang; unter Steinen im Mittelmeere.

H. edūlis. Trepang. Leib walzig; mehre Zoll dick und über 1′ lang; als Leckerbissen für China wichtiger Handelsartikel.

2. ***Siphuncŭlus nudus*** Lam. Nackter Heberwurm. Quergürtel durch Längsstreifen gegittert; lappige Fühler am Mundrande; 8—12″; Mittelmeer.

II. Stachelhäuter (Echinodermăta). §. 229. §. 231.

1. **Seeigel** (§. 229.). Haben eine, aus 20 Reihen Täfelchen (Fig. 177a.) zusammengesetzte, meist halbkuglige Schalenhülle mit 2 großen Löchern (Mund und After), und mit vielen willkührlich beweglichen Stacheln (Fig. 178.) und 5 Doppelreihen von Löchern (Fühlergänge Fig. 177 b. u. 179 b.), aus welchen weiche Füßchen hervorragen. Mundöffnung mit 5zähnigem Kauapparate (Laterne des Aristoteles).

* 3. ***Echīnus esculēntus*** L. Gemeiner Seeigel. Fast kuglig, schwach warzig; Fühlergänge mit kleinen Höckern; Stacheln kurz; 3″. Um Europa; häufig in der Nordsee. Die röthlichen Eierstöcke werden gegessen.

4. ***Cidarītes hystrix*** Lam. Stachliger Meerturban. Kuglig, etwas flach gedrückt; die größern Stacheln vertieft gestreift, sehr lang; $1\frac{1}{2}$″; Mittelmeer.

* *C. crenulāris* Lam. Kerbmündiger M. (Fig. 177.). Fast kuglig; Warzen groß und von kleinern Warzen umgeben; die Warzen der Fühlergänge nach unten größer; 1″. Im Korallenkalke am Knebel bei Hildesheim ꝛc.

* *C. Blumenbachii* (*elongātus* Rr.) (Fig. 178.). Stacheln walzig, fein gerippt, mit kleinen Knötchen. Mit vorigen häufig daselbst.

3. ***Galerītes albo-galērus*** Lam. und ***vulgāris*** Lam. Bischofsknöpfe. Beide sind bezeichnend für die Kreide.



Cidarītes (Hemicidāris) crenulāris (§. 231, 3).

a Unterseite. Zeigt den 10theilig eingekerbten Mund und um demselben die 20 Reihen Täfelchen.

b Seitenansicht. Zwischen den erhabenen Warzen, auf welchen die Stacheln standen, liegen die 5 Doppelreihen Fühlergänge (hier nur 2 sichtbar), welche vom After im Scheitel bis zum Munde herablaufen.

Fig. 178.
Stachel von *Cidarītes Blumenbachii.* (§. 231, 4.)

§. 231.* **6.** ***Ananchytes ovātus*** L. (Fig. 179.). Eirund, hochgewölbt, hinten undeutlich gekielt; After auf der flachgewölbten Basis am Rande; bis 3″ lang. Unter den fossilen Arten eine der bezeichnendsten für das Kreidegebirge. Auf Rügen, bei Peine, Goslar ꝛc.

* **7.** ***Spatāngus (Echinolāmpas) Kleinii*** Ag. (Fig. 180.). Klein's Blattigel. Eiförmig kreisrund, oben gewölbt, unten ausgehöhlt; After nahe unter dem Rande quer. In den Tertiärbildungen bei Hildesheim, Osnabrück ꝛc. nicht selten.

2. Seesterne (§. 229.). Der flache, scheibenförmige Leib ist mit vielen Stacheln besetzt und in 5—25 einfache oder verästelte Arme getheilt; unten nur eine Oeffnung in der Mitte für den zahnlosen **Mund**. Weder After noch Athmungsorgane.

* **8.** ***Asterias rubens***. Gemeiner Seestern. Röthlich, mit 5 lanzettförmigen Strahlen, welche auf dem Rücken kurze, stachlige Warzen haben; 1′. An Europas Küsten nebst *A.* ***aurantiāca*** L. die häufigste Art.

9. ***Ophtūra lacertōsa*** Lam. Gemeiner Schlangenstern. Arme sehr lang, glatt, walzig; Füßchen kurz, angedrückt; 1′; an Europas Küsten häufig.

10. ***Euryāle verrucōsum*** Lam. Walziges Medusenhaupt. Ueber 1′; indisches Meer.



a b

Fig. 179.
Ananchytes ovātus (§. 231,6).
a Unterseite mit länglichem und längsgekehrtem After, entgegengesetzt.
b Oberseite mit den Fühlergängen.



a b

Fig. 180.
Spatāngus Kleinii (§. 231,7).
a Unterseite mit dem 5lappigen Munde in der Mitte.
b Oberseite mit den Blumenblättern ähnlichen, gegen den Umkreis hin schmäler werdenden Fühlergängen.

3. Haarsterne, Stylastriten (Crinoidēa). §. 229. Der becherförmige Körper ist mit einem langen, gegliederten Stiele (Säule) festgewachsen. (Die fossilen Säulenglieder heißen Trochiten.) Der Becher meist aus 5 gegliederten Armen (Fingern, Strahlen) gebildet, in deren Mitte Mund und After. Fossile Arten (nur 2 im Meere jetzt noch lebend: ***Pentacrīnus caput Medūsae*** und ***europaeus***).

* **11.** ***Apiocrinītes rotundātus*** und ***incrassātus***. Säulenglieder kurz, mit strahlenförmig gestreiften Gelenkflächen; im Korallenkalke weit verbreitet.

* **12.** ***Pentacrinītes subangulāris***. Glieder mit 5 spatelförmigen Blättern auf den Gelenkflächen; im Lias fossil.

* **13.** ***Encrinītes liliiformis*** oder ***moniliformis***. Lilienstein, gemeine Meerlilie (Fig. 181.). Säulenglieder (Rädersteine, Mühlensteine, Entrochiten, Fig. 181, d—g), mit strahligen Gelenkflächen; Kelch 3—4″; Säule 2′. Ueberall, besonders die Säulenglieder, häufig und charakteristisch für den Muschelkalk (Trochitenkalk).



Fig. 181.
Encrinītes liliiformis (§. 231, 13).
Gemeine Meerlilie
(a—d verkleinert; e—g in natürlicher Größe).

Besteht aus dem obern, lilienförmigen oder becherförmigen, zusammengeschlossenen Körper oder der Krone, deren 5 Grundglieder (b und c) Becken heißen, welches die aus vielen Kalkstückchen zusammengesetzten, zweiästigen oder zweifingerigen Arme (a) trägt, in deren Mittelpunkte der Mund liegt. Die Krone wird von einer langen, stielrunden, gegliederten, beweglichen und in der Mitte durchbohrten Säule d—f getragen, deren Glieder nach oben (d) abwechselnd breiter und schmäler sind, nach unten hin immer gleichmäßiger (e) und länger (g) werden und auf ihrer obern oder Gelenkfläche vom Kanale auslaufende Strahlen (f) zeigen. Das ganze Thier enthält über 26,000 einzelne Kalkstückchen.

III. Qual[illegible]hnsen (Acalēpha). §. 229. Vorzüglich §. 232.

in [illegible]

1. M[illegible] — Vier oder acht Längsreihen kammförmiger [illegible]ngsorgane.

1[illegible] — [illegible]ürtel. Gleichdick, bläulich weiß, durchsichtig [illegible]r.

* **15.** [illegible]e Melonenqualle. Fast kuglig; bläulich; Fangfä[illegible] weißlich, sehr lang; 1″ im Durchmesser; Nordsee, nicht selten. Mehre Arten, besonders die mikroskopische, zu Millionen in allen Meeren lebende ***Mammaria scintillans*** trägt wesentlich zum Leuchten des Meeres bei.

2. Scheibenquallen (§. 229.). Schwimmen durch Ausdehnen und Zusammenziehen der Scheibe.

* **16.** ***Medūsa aurīta*** L. Gemeine Ohrenqualle. Röthlich; Verdauungsorgan violett; Fangarme mit krauser Fransenhaut gesäumt; 6″; gemeinste Art der Nord- und Ostsee.

* **17.** ***Cyanèa capillāta*** L. Gemeine Haarqualle. Bläulich oder gelbröthlich; Scheibe mit 16 Randeinschnitten; 8″; sehr häufig in der Nord- und Ostsee; nesselt heftig.

18. ***Oceanïa pileāta.*** Hutförmige Beutelqualle. Glockenförmig; Magen roth; Scheitel der Scheibe mit durchsichtigem Knopfe; $1\frac{1}{2}$″; Mittelmeer. Mehre Arten leuchten, so wie auch ***Pelagïa noctilūca*** daselbst.

3. Röhrenquallen (§. 229.). Schwimmen durch Schwimmhöhlen, Luftblasen oder Knorpel.

19. ***Physalïa arethūsa.*** Gemeine Seeblase, Meernessel. Blase 1′, bläulich, mit rothgeadertem Kamme; Fangfäden blau, mehre Fuß lang; Saugröhren violett; größte und bekannteste Art; atlantisches Meer. Nesselt sehr stark.

20. ***Velēlla spīrans.*** Gemeine Segelqualle. Blau; Saugröhren und Schale weißlich; 2″ l. u. 1″ br.; Mittelmeer; eßbar.

§. 233. XI. Klasse. **Polўpi. Polypen.** (Korallen, Pflanzenthiere, Zoophyten.)

Schleimthiere (§. 23.) mit strahligem Baue und nach oben gewendeter, centraler Mundöffnung, welche meist von sehr empfindlichen, einfachen oder gefranseten Fangarmen (Fühlern oder Tentakeln) umgeben ist; meist gesellig, festsitzend und entweder an der Oberfläche oder im Innern Kalk- oder Hornmasse (Korallenstamm) absondernd. Die Korallen durchwanderten im Verlaufe der Zeit alle 3 Reiche, bis ihnen endlich durch Peyssonell, der sie 1723 als Thiergehäuse erkannte, ihre bleibende, allein richtige Stelle angewiesen wurde. Ihre Fangarme, die einzigen äußern Sinnesorgane (§. 14. I.), dienen zum Tasten und zum Ergreifen der Nahrung. Der Mund führt in einen einfachen Magen mit oder ohne Darm und After. Nerven und besondere Respirations- und Circulationsorgane fehlen. Fortpflanzung 1) durch Knospen oder Gemmen, warzenförmige Auswüchse mit Keimkörnern im Innern, welche sich zu einem neuen Thiere entwickeln; 2) durch freiwillige Theilung; 3) durch Eier oder Eiersäcke, d. h. längliche, hinter dem Magen liegende Schläuche. Bei den meisten finden sich mehre Fortpflanzungsarten zugleich und hiervon hängt auch die Form des Korallenstammes oder Polypenstocks ab, welcher als ein Familienkörper zu betrachten ist, an welchem Urahnen, Eltern, Kinder, Enkel und Urenkel immer fortwachsen und fortzeugen ohne sich vom Mutterthiere zu trennen. Die meisten Polypen sondern nach innen, wenige nach außen (z. B. ***Tubipŏra*** Fig. 182.), einen Polypenstock ab, welcher entweder **1**) eine feste Kalkmasse bildet (Steinkorallen Fig. 185.) oder **2**) aus einer äußeren, dünnen Kalkschicht besteht, welche innerlich noch eine, genau in der Mitte befindliche Hornmasse hat, die Achse genannt (Hornkorallen, [illegible] Fig. 187.), oder **3**) die Polypen haben nur eine hornige Rinde ohne [illegible] Zertularien) oder haben **4**) weder Horn- noch Kalkmasse, sondern [illegible] Fig. 183). Alle Korallenthiere leben im Wasser, die mei[illegible] der Meeresfläche von Infusorien ꝛc., welche sie mi[illegible]fen. Die meisten sind durch ihren Schleim auf S[illegible] manche bilden die obern, aber meist nur einige Klafter [illegible] welche man Korallenriffe nennt. Die größte[illegible]rallenpolypen anbauen und fortwachsen, entspri[illegible]sturmfluthen und niedrigen Wasserstand werden[illegible] so die Korallen und übrigen Meerthiere auf denselben getödtet. Durch Wogen und Brandungen bildet sich dann aus den Bruchstücken der gestorbenen Thiere der Boden, welcher sich durch beständig neue Anschwemmungen des Meeres über das Wasser erhebt und sich durch Treibholz, und von Vögeln und Winden herbeigeführte Samen allmählig mit Kräutern und Bäumen bedeckt, und endlich den Menschen zum Wohnplatze dient. Man kennt über 3,500 Arten (§. 7.). **Nutzen: 1**) zum Kalkbrennen, zu Mörtel, am rothen Meere auch zum Häuserbaue (die Städte Tor und Dschidda in Arabien sind meist aus Korallen-

stämmen erbauet); B) zu Schmuckſachen (Edelkoralle ꝛc.); C) zum Verhacken (die weichen Sertularien).

Ueberſicht der III Ordnungen mit deren Familien und vorzüglichſten Gattungen. §. 234.

I. Blumenthiere (Anthozōa). Körper ſtrahlig; Polypen mit Mund und Magen, aber ohne Darm und After.

Leib ganz weich od. nur innerlich Kalkmaſſe abſondernd: **I. Thierkorallen**

- über 12 Fühler um den Mund
  - ein Kalkſtamm
    - kein Kalkſtamm; Leib weich, frei, kegelförmig, oben und unten abgeſtumpft; Fühler durchbohrt. — **Seeanemone** . . . . . 1) *Actinia* L.
    - ſcheibenförmig, unten ſtrahlig geſtreift, vertieft, oben gewölbt. — **Pilzkoralle** . . 2) *Fungia* Lam.
    - kreiſel- oder keulenförmig, außen längsgeſtreift. — **Kreiſelſtern** . . . . . 3) *Turbinolia* Lam.
- 8 Fühler
  - mehre Röhren, wie Orgelpfeifen nebeneinander, durch horizontale Kalkplatten verbunden. — **Orgelkoralle** (Fig 182.) . . . . . 4) *Tubipora* L.
  - ſchreibfederähnliche Stämme, auf deren federähnlichen Aeſten die Polypen reihenweiſe. — **Seefeder** . . . . . 5) *Pennatula* Lam.
- meiſt weniger als 8 Fühler, gewöhnlich 2, 4 od. 5
  - kein Polypenſtock; nackte, weiche Süßwaſſerthiere mit kegelförmigem Leibe und Fühlern kranzförmig um den Mund. — **Armpolyp** (Fig. 183.) . . . 6) *Hydra* L.
  - Polypenſtock hornig, veräſtelt; Zweige beiderſeits mit becherförmigen Erweiterungen für die Thiere. — **Blaſenpolyp** . . . . . 7) *Sertularia* L.

Leib äußerlich Kalk- od. Hornmaſſe abſondernd, mit welcher die Thiere ſtets feſtſitzen: **II. Polypenkorallen**

- über 12 Fühler
  - Stamm aufrecht, unregelmäßig veräſtelt
    - Stamm baumförmig veräſtelt; Aeſte glatt; Zellen ſeitlich und am Ende. — **Augenkoralle** (Fig. 184.) . . . 8) *Oculina* Lam.
    - Stamm raſenartig ausgebreitet, mit vielen aufrechten, gleichlangen, nur an der Spitze Zellen tragenden Aeſten. — **Nelkenkoralle** . . . 9) *Caryophyllia* Lam.
  - Stamm halbkuglig, gelappt, oft gabelaſtig
    - Stamm kuglig; Zellen ſtrahlig, geſchloſſen, dicht zuſammenſtoßend, ohne Zwiſchenräume. — **Sternkoralle** (Fig. 185.) . . . . . 10) *Astraea* L.
    - Stamm halbkuglig; Zellen langgezogen, nicht geſchloſſen, gewunden, durch Hügelſtreifen getrennt. — **Labyrinthkoralle** . . . . . 11) *Maeandrina* Lam.
- 8 Fühler; Stamm meiſt baumartig verzweigt
  - kein hohler Kanal in der Mitte des äſtigen oder ſtrauchförmigen Stammes
    - mit runden, eingeſenkten, nicht ſtrahligen Zellen, deren Zwiſchenräume punktirt. — **Porenkoralle** . . 12) *Poecillopora* Lam.
    - Zellen ebenſo, aber ſehr klein, ſenkrecht zur Achſe des Stammes. — **Punktkoralle** . . . . . 13) *Millepora* L.
  - Stamm unbiegſam, kalkig
    - Zellen von verſchiedener Größe; eine Hauptzelle, die Richtung des Fortwachſens der Zweige beſtimmend und allein Knospen treibend. — **Orgelkoralle** . . . . . 14) *Heliopora* Ehbg.
    - Zellen alle gleichgroß, überall ſtachelähnlich vorſtehend. — **Schwammkoralle** . . . . . 15) *Madrepora* L.
    - Stamm ungegliedert, ſchief geſtreift, ganz kalkig. — **Edelkoralle** (Fig. 186.) . . . . . 16) *Corallium* Lam.
    - St. gegliedert; Glieder mit kalkigen und hornartigen, ſchmälern abwechſelnd. — **Königskoralle** 17) *Isis* L.
  - Stamm biegſam, hornig, ungegliedert
    - Oberfläche längsgeſtreift; Rinde durch Vertrocknen feſt. — **Fächerkoralle** (Fig. 187.) . . . . . 18) *Gorgonia* L.
    - Od. nicht ſo, ſondern hornig oder glatt; Rinde gallertartig, beim Trocknen verſchwindend. — **Stachelkoralle** . . . . . 19) *Antipathes* Lam.

* **17.** ***Cyanĕa capillāta*** L. Gemeine Haarqualle. Bläulich oder gelbröthlich; Scheibe mit 16 Randeinſchnitten; 8″; ſehr häufig in der Nord- und Oſtſee; neſſelt heftig.

18. ***Oceanĭa pileāta.*** Hutförmige Beutelqualle. Glockenförmig; Magen roth; Scheitel der Scheibe mit durchſichtigem Knopfe; $1\frac{1}{2}$″; Mittelmeer. Mehre Arten leuchten, ſo wie auch ***Pelagĭa noctilūca*** daſelbſt.

3. Röhrenquallen (§. 229.). Schwimmen durch Schwimmhöhlen, Luftblaſen oder Knorpel.

19. ***Physalĭa arethūsa.*** Gemeine Seeblaſe, Meerneſſel. Blaſe 1′, bläulich, mit rothgeadertem Kamme; Fangfäden blau, mehre Fuß lang; Saugröhren violett; größte und bekannteſte Art; atlantiſches Meer. Neſſelt ſehr ſtark.

20. ***Velĕlla spīrans.*** Gemeine Segelqualle. Blau; Saugröhren und Schale weißlich; 2″ l. u. 1″ br.; Mittelmeer; eßbar.

§. 233. XI. Klaſſe. **Polўpi. Polypen.** (Korallen, Pflanzenthiere, Zoophyten.)

Schleimthiere (§. 23.) mit ſtrahligem Baue und nach oben gewendeter, centraler Mundöffnung, welche meiſt von ſehr empfindlichen, einfachen oder gefranſeten Fangarmen (Fühlern oder Tentakeln) umgeben iſt; meiſt geſellig, feſtſitzend und entweder an der Oberfläche oder im Innern Kalk- oder Hornmaſſe (Korallenſtamm) abſondernd. Die Korallen durchwanderten im Verlaufe der Zeit alle 3 Reiche, bis ihnen endlich durch **Peyſſonell**, der ſie 1723 als Thiergehäuſe erkannte, ihre bleibende, allein richtige Stelle angewieſen wurde. Ihre Fangarme, die einzigen äußern Sinnesorgane (§. 14. I.), dienen zum Taſten und zum Ergreifen der Nahrung. Der Mund führt in einen einfachen Magen mit oder ohne Darm und After. Nerven und beſondere Reſpirations- und Circulationsorgane fehlen. Fortpflanzung 1) durch Knospen oder Gemmen, warzenförmige Auswüchſe mit Keimkörnern im Innern, welche ſich zu einem neuen Thiere entwickeln; 2) durch freiwillige Theilung; 3) durch Eier oder Eierſäcke, d. h. längliche, hinter dem Magen liegende Schläuche. Bei den meiſten finden ſich mehre Fortpflanzungsarten zugleich und hiervon hängt auch die Form des Korallenſtammes oder Polypenſtocks ab, welcher als ein Familienkörper zu betrachten iſt, an welchem Urahnen, Eltern, Kinder, Enkel und Urenkel immer fortwachſen und fortzeugen ohne ſich vom Mutterthiere zu trennen. Die meiſten Polypen ſondern nach innen, wenige nach außen (z. B. ***Tubipŏra*** Fig. 182.), einen Polypenſtock ab, welcher entweder **1**) eine feſte Kalkmaſſe bildet (Steinkorallen Fig. 185.) oder **2**) aus einer äußeren, dünnen Kalkſchicht beſteht, welche innerlich noch eine, genau in der Mitte befindliche Hornmaſſe hat, die Achſe genannt (Hornkorallen, [illegible] Fig. 187.), oder **3**) die Polypen haben nur eine hornige Rinde ohne [illegible] Zertularien) oder haben **4**) weder Horn- noch Kalkmaſſe, ſondern [illegible] pen Fig. 183). Alle Korallenthiere leben im Waſſer, die mei[illegible] der Meeresfläche von Infuſorien ꝛc., welche ſie mi[illegible]ſen. Die meiſten ſind durch ihren Schleim auf S[illegible] manche bilden die obern, aber meiſt nur einige Klafter [illegible] welche man **Korallenriffe** nennt. Die größte[illegible]rallenpolypen anbauen und fortwachſen, entſprie[illegible]turmfluthen und niedrigen Waſſerſtand werden[illegible] ſo die Korallen und übrigen Meerthiere auf denſelben getödtet. Durch Wogen und Brandungen bildet ſich dann aus den Bruchſtücken der geſtorbenen Thiere der Boden, welcher ſich durch beſtändig neue Anſchwemmungen des Meeres über das Waſſer erhebt und ſich durch Treibholz, und von Vögeln und Winden herbeigeführte Samen allmählig mit Kräutern und Bäumen bedeckt, und endlich den Menſchen zum Wohnplatze dient. Man kennt über 3,500 Arten (§. 7.). **Nutzen: 1**) zum Kalkbrennen, zu Mörtel, am rothen Meere auch zum Häuſerbaue (die Städte Tor und Dſchidda in Arabien ſind meiſt aus Korallen-

stämmen erbauet); 2) zu Schmuckſachen (Edelkoralle ꝛc.); 3) zum Verpacken (die weichen Sertularien).

Ueberſicht der III Ordnungen mit deren Familien und vorzüglichſten Gattungen. §. 234.

I. Blumenthiere (Anthozōa). Körper ſtrahlig; Polypen mit Mund und Magen, aber ohne Darm und After.

Leib ganz weich od. nur innerlich Kalkmaſſe abſondernd: **I. Thierkorallen**

- über 12 Fühler um den Mund
  - ein Kalkſtamm
    - kein Kalkſtamm; Leib weich, frei, kegelförmig, oben und unten abgeſtumpft; Fühler durchbohrt. — **Seeanemone** . . . . 1) *Actinia* L.
    - ſcheibenförmig, unten ſtrahlig geſtreift, vertieft, oben gewölbt. — **Pilzkoralle** . . 2) *Fungia* Lam.
    - kreiſel- oder keulenförmig, außen längsgeſtreift. — **Kreiſelſtern** . . . . . 3) *Turbinolia* Lam.
- 8 Fühler
  - mehre Röhren, wie Orgelpfeifen nebeneinander, durch horizontale Kalkplatten verbunden. — — **Orgelkoralle** (Fig 182.) . . . . . 4) *Tubipŏra* L.
  - ſchreibfederähnliche Stämme, auf deren federähnlichen Aeſten die Polypen reihenweiſe. — **Seefeder** . . . . . 5) *Pennatŭla* Lam.
- meiſt weniger als 8 Fühler, gewöhnlich 2, 4 od. 5
  - kein Polypenſtock; nackte, weiche Süßwaſſerthiere mit kegelförmigem Leibe und Fühlern kranzförmig um den Mund. — **Armpolyp** (Fig. 183.) . . . 6) *Hydra* L.
  - Polypenſtock hornig, veräſtelt; Zweige beiderſeits mit becherförmigen Erweiterungen für die Thiere. — **Blaſenpolyp** . . . . . 7) *Sertularia* L.

Leib äußerlich Kalk- od. Hornmaſſe abſondernd, mit welcher die Thiere ſtets feſtſitzen: **II. Pflanzenkorallen**

- über 12 Fühler
  - Stamm aufrecht, unregelmäßig veräſtelt
    - Stamm baumförmig veräſtelt; Aeſte glatt; Zellen ſeitlich und am Ende. — **Augenkoralle** (Fig. 184.) . . . 8) *Oculina* Lam.
    - Stamm raſenartig ausgebreitet, mit vielen aufrechten, gleichlangen, nur an der Spitze Zellen tragenden Aeſten. — **Nelkenkoralle** . . . 9) *Caryophyllia* Lam.
  - Stamm halbkuglig, gelappt, oft gabeläſtig
    - Stamm kuglig; Zellen ſtrahlig, geſchloſſen, dicht zuſammenſtoßend, ohne Zwiſchenräume. — **Sternkoralle** (Fig. 185.) . . . . . 10) *Astraea* L.
    - Stamm halbkuglig; Zellen langgezogen, nicht geſchloſſen, gewunden, durch Hügelſtreifen getrennt. — **Labyrinthkoralle** . . . . . 11) *Maeandrina* Lam.
- kein hohler Kanal in der Mitte des äſtigen oder ſtammförmigen
  - mit runden, eingeſenkten, nicht ſtrahligen Zellen, deren Zwiſchenräume punktirt. — **Porenkoralle** . . . 12) *Pocillopŏra* Lam.
  - Zellen ebenſo, aber ſehr klein, ſenkrecht zur Achſe des Stammes. — **Punktkoralle** . . . . . 13) *Millepŏra* L.
  - Zellen von verſchiedener Größe; eine Hauptzelle, die Richtung des Fortwachſens der Zweige beſtimmend und allein Knoſpen treibend. — **Erbſenkoralle** . . . . . 14) *Heteropŏra* Ehbg.
  - Zellen alle gleichgroß, überall ſtachelähnlich vorſtehend. — **Schwammkoralle** . . . . . 15) *Madrepŏra* L.

8 Fühler; Stamm meiſt baumartig verzweigt

- Stamm unbiegſam, kalkig
  - Stamm ungegliedert, ſchief geſtreift, ganz kalkig. — **Edelkoralle** (Fig. 186.) . . . . . 16) *Corallium* Lam.
  - St. gegliedert; Glieder mit kalkigen und hornartigen, ſchmälern abwechſelnd. — **Königskoralle** 17) *Isis* L.
- Stamm biegſam, hornig, ungegliedert
  - Oberfläche längsgeſtreift; Rinde durch Vertrocknen feſt. — **Fächerkoralle** (Fig. 187.) . . . . . 18) *Gorgonia* L.
  - Ob. nicht ſo, ſondern hornig oder glatt; Rinde gallertartig, beim Trocknen verſchwindend. — **Stachelkoralle** . . . . . 19) *Antipathes* Lam.

§. 235. **II. Moosthiere** (Bryozōa). §. 238. Körper nicht strahlig; Polypen mit Mund, Magen, Darm und After; an dem Munde viele einfache Fangarme; Fortpflanzung durch Keime oder Knospen.

Mit freiem, aber sich an andere Körper festsetzendem Stamme; mit durchsichtiger, häutiger Hülle: **III. Keimkorallen**

- Süßwasserpolypen: in verhärtet-häutigen Röhren, aus welchen die Polypen mit ihren vielen, gewimperten Fühlern hervorragen. — **Federbuschpolyp** . . . . . 20) *Plumatélla.*
- Meerpolypen:
  - Zellen ohne Deckel; Stamm blattförmig, biegsam, mit regelmäßig gestellten Zellen. — **Rindenkoralle** . . . . . 21) *Flustra* L.
  - Zellen mit einem Deckel:
    - Zellen nur auf der Oberfläche des flach ausgebreiteten, unbiegsamen, freie oder netzartig verzweigte Aeste bildenden Stammes. — **Netzkoralle**. 22) *Retepóra* Lam.
    - Zellen in mehren Schichten neben und übereinander liegend. — **Zellenkorallen**. . . . . 23) *Cellepóra* Lam.

§. 236. **I. Thierkorallen** (Zoocorallĭa). Freie od. festsitzende Thiere. §. 234.

1. ***Actinĭa rubra.*** Rothe Seeanemone oder Meerneffel. Röthlich, zart gestreift; Rand der Scheibe mit blauen Knöpfchen; Fühler in 3 Kreisen. Europas Meere. Diese, wie alle Actinien, haben eine große Reproductionskraft und pflanzen sich durch Eier fort. Die Eierstöcke öffnen sich in den Magen und die Eier werden dann durch den Mund ausgeworfen (geboren). Viele Arten haben einen, auf der Haut Brennen erregenden oder neſſelnden Schleim wie manche Medusen (§. 232.); manche sind auch eßbar.

2. ***Fungĭa limacīna*** Lam. Schnecken-Pilzkoralle. Länglich zungenförmig, unten stachlig; Blätter ungleich; bis 1′ lang. Indischer Ocean. Werden von den Chinesen als Reibeisen benutzt.

F. agaricifŏrmis Lam. Blätterschwammförmige Pilzkoralle. Kreisrund; Blätter gezähnelt; 3″. Im indischen Ocean häufig.

* **3.** ***Turbinolĭa intermedĭa*** v. Mst. Mittlerer Kreiselstern. Keilförmig zusammengedrückt; Seitenlamellen glattkantig; Stern länglich, mit abwechselnd breitern und schmälern Lamellen; 2‴. Unter den 20 fossilen Arten eine der häufigsten (bei Freden ꝛc.).

4. ***Tubipóra Chamissōnis*** E. (***musĭca*** L.). Gemeine Orgelkoralle (Fig. 182.). Blutroth; Röhren 6″ l. u. $^3/_4$‴ weit, durch häufige Querwände verbunden; Thier in den Röhren grasgrün; indisches Meer.

5. ***Pennatŭla rubra*** L. Rothe Seefeder. Blutroth; Schaft in der Mitte zwiebelartig verdickt; 5″; Mittelmeer. Stecken mit dem untern Ende frei im Schlamme.

* **6.** ***Hydra virĭdis*** L. Grüner Armpolyp. Lebhaft grün; Fühler kürzer als der ausgedehnte Leib; 5‴; häufig an Wasserpflanzen in Teichen, von Wasserthierchen (Wasserflöhen ꝛc.) lebend. Besitzen große Reproductionskraft (§. 22,1), so daß sich aus jedem Stücke, worin sie längs- oder quer gespaltet werden, wieder ein Polyp

A Korallenstock in natürlicher Größe.

B Ein einzelnes, durchschnittenes, 10mal vergrößertes Rohr mit der kalkigen Querplatte (a). Das aufgeschnittene, nach oben dickere u. nach Außen umgeschlagene Rohr (d—e) zeigt inwendig das Thier mit 8 gezackten Tentakeln (b), welche nach oben ausgestreckt neben einander liegen und von einer häutigen Scheide (c) umgeben sind. Der Polyp kann oben aus der Scheide, welche allmählig in die kalkigen Rinden übergeht, hervortreten.

bildet; auch treibt an jeder verwundeten Stelle ein neuer Polyp hervor, so daß ein vielköpfiger Leib entsteht, daher *Hydra*. Ein, wie ein Handschuhfinger umgestülpter Polyp verdaut mit der umgewandten Fläche eben so gut wie vorher.

* *H. fusca* L. Braunner oder langarmiger Armenpolyp (Fig. 183.). Braun, mit 5—8 Fühlern oder Armen, welche ausgedehnt 2mal länger sind als der Leib; 1‴; daselbst häufig.

* *7. Sertularia abietina* L. Gemeiner Blasenpolyp oder Meertanne. Abwechselnd gefiedert; die Becher eiförmig, fast einander gegenüber; 6‴; häufig in der Nordsee auf Steinen und Muscheln; wird zum Verpacken wie Heu benutzt.

II. Pflanzenkorallen (Phytocoralliа). Thiere in einem stets festgewachsenen Polypenstocke. §. 234.

§. 237.

8. *Oculina virginea* L. Gemeine Augen- oder Jungfernkoralle. Weiß, undeutlich gabelästig; Sterne $1\frac{1}{2}$‴ weit, theils vertieft, theils vorragend; $1\frac{1}{2}$'. Indisches und Mittelmeer. Nebst folgender früher in der Heilkunde gebräuchlich.

* *O. prolifera* L. Sprossende Augen- oder Blumenkoralle (Fig. 184.). Voriger ähnlich, aber deutlich gabelästig; Stern 4—5‴ weit und immer unmittelbar am Rande der frühern Polypenzellen sprossend, d. h. Knospen und Zweige erzeugend; die zahlreichen Lamellen fast umgerollt; 1—2' hoch mit $\frac{1}{4}$—$\frac{1}{2}$" weiten Zellen. Nordseeküsten.

9. *Caryophyllia calyculata* L. Gemeine Nelkenkoralle. Zellen



Braune auf einem

a Sieben e le und ganz einziehba

b Die stark ber Spitze eines Armes mit mehren gruppirten, bewimperten Warzen, in deren Mitte eine größere Zelle mit

c dem Nesselorgane, mit welchem die Polypen ihre Nahrung fangen.

d Das stark vergrößerte Nesselorgan besteht aus einem Bläschen, am Ende mit 3 Zacken umgeben und an einem langen Faden (Fang- od. Angelschnur e) befestigt, mit welchem dasselbe zurückgezogen und herausgeschleudert werden kann.

e Eine Tasche am dicken Theile des Rumpfes, welche Eier enthält.



Fig. 184.
Oculina prolifera (§. 237, 8).
Sprossende Augenkoralle.

§. 237. gedrängt neben einander, trichterförmig, mit hervorragendem Mittelpunkte; 3"; Mittelmeer; bei Neapel ganze Felsenreihen überziehend.

10. ***Astraea cavernosa*** Esp. Große Sternkoralle. Stern groß, zirkelrund, 24strahlig, außen mit gezähnelten, strahligen Lamellen; 2—6" dicke Massen bildend; Meere an Amerika. Mehre Arten auch versteinert als Sternsteine, von denen *A. helianthoides* (Fig. 185.) den obern Jura charakterisirt. Diese ist scheibenförmig, mit großen, 5seitigen, sich berührenden, flach trichterförmigen, 30—40 strahligen Sternen.

11. ***Maeandrina labyrinthica*** L. Gemeine Labyrinthkoralle. Mit sehr langen, stark gewundenen Furchen und einfachen, etwas scharfen Hügelstreifen; bis 1' im Durchmesser; häufig an den caraibischen Inseln.

12. ***Pocillopora damicornis*** Lam. Gemeine Poren- oder Dammhirschkoralle. Sehr ästig; Aeste gewunden, verschieden getheilt; Aestchen kurz, stumpf, 1' hoch; indischer Ocean; häufig.

13. ***Millepora alcicornis*** L. Gemeine Punktkoralle oder Elenusgeweihe. Mit handförmig-zerschlitzten, etwas ästigen, zugespitzten Lappen und sehr kleinen, zerstreueten Poren; 2' breit und hoch; Antillen; häufig.

14. ***Heteropora muricata*** Esp. Strahlige Kronen-Dornkoralle. Aeste rund, dick, einfach oder ästig; Röhrenzellen ungleich, gestreift, die größern gerad-, die kleinern schräg abgestutzt; Endzelle $1\frac{1}{4}$''' br. In amerikanischen Meeren.

15. ***Madrepora (Porites) digitata*** Pall. Fingetförmige Schwammkoralle. In Indien so häufig, daß daselbst fast aller Kalk zum Bauen aus denselben gebrannt wird.

16. ***Corallium rubrum*** Lam. (***Isis nobilis*** L.) Rothe oder Edelkoralle (Fig. 186.). Mennigroth, ästig; 1' hoch; Mittelmeer; bedeutender Handelsartikel zu Schmuckfachen.



Fig. 185. *Astraea helianthoides* (§. 237, 10). Sonnenstrahlige Sternkoralle.



Fig. 187. *Gorgonia flabellum* (§. 237, 18). Venusfächel. Der untere Theil zeigt den hornigen, von der dicken Kalkschicht entblößten Polypenstock. Auf der Kalkschicht am obern Theile der Figur sind viele kleine Poren, in welchen die Polypen saßen.

237, 16).

Der untere Theil zeigt den entblößten, der obere Theil den mit der fleischigen, thierischen Rinde überzogenen Korallenstock. Aus den warzigen Stellen der Rinde ragen die Polypen hervor.

17. *Isis hippuris* L. Weiße oder Königskoralle. Rinde glatt, dick; Achse mit unregelmäßigen, gefurchten Gliedern; Ostindien; häufig ohne Rinde in Sammlungen.

18. *Gorgonia flabellum* L. Venusfächel (Fig. 187.). Fächerförmig verflacht; Aestchen netzförmig; Kalkschicht gelb oder röthlich; 3—6′ h. u. 1—2′ br.; Ostindien; gemeinste Art.

19. *Antipathes.* Dornkoralle. An 30, meist im indischen Ocean lebende Arten, deren Thiere indeß noch wenig bekannt sind. Die im Oriente so hoch geschätzte schwarze Koralle (*Gorgonia antipathes* L.) gehört auch hierher.

III. Moosthierchen (Bryozōa). §. 235. §. 238.

* 20. *Plumatella cristata* Lam. Kammförmiger Federbuschpolyp. Röhren unregelmäßig verästelt, mit runder Mündung und halbmondförmig gestellten Fühlern; 1″ dicke, schwammähnliche Massen bildend, häufig an Wasserpflanzen in Teichen. Erhalten durch Wirbeln ihrer Fühler Nahrung (kleine Infusorien); ziehen bei Berührung Fühler und Leib in die häutige Röhre zurück.

* 21. *Flustra foliacea* L. Blattartige Rindenkoralle od. Blätter-Seerinde. Stamm beiderseits mit Zellen, lappig getheilt; Lappen keilförmig, stumpf, abgerundet; 5—8″; um Europa gemein.

* *F. pilosa* L. Haarige Seerinde. Stamm nur einerseits mit Zellen, verschieden getheilt und andere Meerkörper überrindend; Zellen mit gezähnter Mündung und einem Härchen. Besonders häufig auf dem bekannten Carraghen-Moose (*Fucus* oder *Sphaerococcus crispus* II. §. 337, 4).

22. *Retepora cellulosa* L. Zellige Netzkoralle oder Neptunsmanschette. Stamm sehr dünn, netzartig gegittert (mit Löchern wie ein Gitter), welligkraus, am Grunde etwas röhrig; handgroß; Mittelmeer.

23. *Cellepora spongites* L. Gemeine Zellenkoralle od. Schwammstein. Mit der Basis andere Meerkörper überrindend und dann kreiselförmig-röhrig, ästig und verschieden zusammengewachsen sich ausbreitend; einige Zoll hoch und fingerdick. Mittelmeer, häufig in Badeschwämmen steckend und nebst *C. pumicosa* früher als Heilmittel gebräuchlich.

Als Anhang mögen auch hier noch die Seeschwämme und Koral- §. 239.
linen stehen. Sie sind nicht thierisch belebt und werden deshalb von Zoologen zurückgestoßen; auch die Botaniker wollen sie nicht, weil sie in ihrer chemischen Zusammensetzung mehr mit den Thieren als Pflanzen übereinstimmen; am richtigsten möchte wohl zu den Meeralgen (II. §. 337.) ins Pflanzenreich gehören.

[redacted] mme bilden vielgestaltige, festsitzende, faserig-filzige, von Go[redacted]gene Meerkörper; die Korallinen dagegen gegliederte, [redacted]ige Stämmchen aus Kalkerde, mit vielen Poren üb[redacted]

1. [redacted]emeiner oder levantischer Waschschwa[redacted]förmig, oben flach gewölbt, mit weiten Oeffnu[redacted] häufig.

S. [redacted]er Badeschwamm. Kreiselförmig, filzig, sehr porö[redacted] Reihen stehenden Löchern. Die besten und feinsten Schwämme von der amerikanischen Küste.

* *S.* (*Spongilla*) *fluviatilis* Blainv. Flußschwamm. Grün, sehr zerreiblich, mit vielen Körnchen angefüllt; häufig in Wassergräben.

2. *Corallina officinalis* L. Korallenmoos. Mit gefiederten Aesten und keilförmig zusammengedrückten Gliedern; 3—4″; Mittelmeer. Bildet oft den größten Theil des früher als Wurmmoos (II. §. 337, 4) in Apotheken gebräuchlichen Heilmittels.

§. 241. Uebersicht der II Ordnungen mit den Hauptfamilien und wichtigsten Gattungen.

- **Räderorgane mit Wimpern: I. Räderthierchen**
  - Nur ein Wimperkranz
    - Wimperkranz einfach, zusammenhängend: **Ringräderthierchen** — weder Panzer noch Augen; Rücken unbehaart; ein kurzer Gabelschwanz — **Wimperfischchen** — 1) *Ichthydium* E.
    - W. in Lappen getheilt: **Kerbräderthierchen** — kein Panzer; 2 Augen; Körper kolbig; Räderorgane zweilappig — **Sonnenschirmthierchen** . . . . . — 2) *Megalotrŏcha.*
  - 2 oder mehre Wimperkränze
    - viele Wimperkränze: **Vielräderthierchen**
      - panzer- u. augenlos, kolbig, vorn gerade abgestutzt; ein Gabelschwanz — **Krystallthierchen** — 3) *Hydatīna* E.
      - Panzer durchsichtig; keine Augen; Leib flach niedergedrückt; ein Gabelschw. — **Schuppenthierchen** . . . . . — 4) *Lepadēlla.*
    - 2 von einander abgesonderte W.: **Doppelräderthierchen** — panzerlos; 2 Sternaugen; Leib spindlig, Gabelschw. mit 6 Spitzen — **Wirbelthierchen** — 5) *Rotĭfer.*
- **Keine Räderorgane, aber Wimpern als Bewegungsorgane und viele Magen: II. Magenthierchen**
  - **darmlose Magenthiere** (§. 240.)
    - Keine veränderliche Füße oder Fortsätze
      - ohne Panzer und ohne willkührliche Formveränderung, kuglig oder länlich — **Punktthierchen** . . . . . — 6) *Monas* Müll.
      - viele Thiere in einem Panzer
        - allseitige Selbsttheilung
          - Panzer glatt . . — 7) *Chlamydomŏnas* E.
          - Panzer mit Körnern besetzt — **Kugelthierchen** (Fig. 188.) — 8) *Volvox* L.
        - einseitige Selbsttheilung
          - in stab-, spindel- od. fadenförm. Körper sich theilend — **Spindelthierchen** — 9) *Closterĭum.*
    - vortretende oder fußähnliche Fortsätze zur Bewegung
      - ohne Panzer; Körperform sehr veränderlich — **Aenderling** . — 10) *Proteus* Müll.
      - mit Panzer
        - Panzer 2schalig, kettenförmige Fäden bildend — **Dosenketter** . . — 11) *Gallionēlla* E.
        - Panzer 2- od. 4schalig, zickzackartige Bänder bildend — **Stabthierch.** — 12) *Bacillarĭa* Müll.
  - **darmführende Magenthiere** (§. 240.)
    - Mund und After am Körperende
      - Panzer einschalig, kuglig, mit [illegible] — 13) *Xanthidĭum* E.
      - [illegible] Ok.
      - [illegible] Müll.
      - [illegible] zenthierchen . . . . . — 16) *Enchēlys.*
    - Mund und After am bewimperten Bauche; Mund vorstreckbar; Körper panzerlos, nierenförmig — **Pantoffelthierchen** (Fig. 190.) . . . . . — 17) *Colpŏda* Müll.

§. 242. I. Räderthierchen (Rotatorĭa). Mit Räderorganen. §. 240.

* **1.** ***Ichthydĭum podūra*** **Müll. Gelbliches Wimperfischchen. Länglich, oben gewölbt, unten flach; 1/12‴; häufig an Wasserlinsen.**

* **2.** ***Megalotrócha socialis*** **(*Hydra socialis* L.).** Geselliges Sonnenschirmthierchen. Walzig, kolbig; Schwanz von doppelter Leibeslänge; $^1/_2$‴; um einen gemeinschaftlichen Mittelpunkt mit den Schwänzen sich strahlig vereinigende, erbsengroße Massen bildende Thiergruppen an den Wurzeln der Wasserlinsen ꝛc.

* **3.** ***Hydatina senta*** Müll. Gemeines Krystallthierchen. Farblos, fast kegelförmig, mit sehr kurzem Schwanze; bis $^1/_6$‴; häufig unter Wasserlinsen.

* **4.** ***Lepadella ovalis*** Müll. Eiförmiges Schuppenthierchen. Mit eiförmiger, hinten und vorn abgestutzter Schale; $^1/_{30}$‴; in Sümpfen unter Wasserfäden häufig.

* **5.** ***Rotifer vulgaris*** E. Gemeines Wirbelthierchen. Röthlich; $^1/_4$‴; Schwanz von $^1/_4$ der Leibeslänge; durch Einziehen der Räder und des Schwanzes verschiedene Gestalten annehmend; häufig an Wasserpflanzen; faulende Grashalme oft wie Schimmel überziehend. Lebt nach Jahren nicht wieder auf.

II. Magenthierchen oder eigentliche Aufgußthierchen (Polygastrica). Im Innern mit zahlreichen Blasen (Magenblasen nach Ehrenberg). §. 240. §. 243.

* **6.** ***Monas termo*** Müll. Kleinstes Punktthierchen oder Punktmagenthierchen. Kugelrund, wasserhell; $^1/_{300}$‴ bis $^1/_{3000}$‴; in allen Aufgüssen. Die kleinsten bis jetzt erkannten Thiere, von denen 500 Millionen in einem Wassertropfen leben können.

* ***M. tingens*** E. Färbendes P. Grün; $^1/_{300}$‴; färbt die Gewässer oft grün.

* **7.** ***Chlamydomonas pulviscus*** E. Staubartiges Punktthierchen. Eiförmig, mit doppeltem Rüssel; grün; Augen roth; $^1/_{150}$‴; überall in Aufgüssen; auf stehenden Gewässern eine grüne Oberhaut oder an Holz und Steinen einen grünlichen Schleim bildend.

* **8.** ***Volvox globator*** L. Grünes Kugelthierchen (Fig. 188). Eine kuglige, klare Hülle, $^1/_3$‴ im Durchmesser; enthält viele, oft mehre 1000 grüne, nur $^1/_{500}$‴ große Thierchen; füllt oft die Oberfläche der Teiche bis auf einige Fuß Tiefe fast ganz an und findet sich schon beim ersten Sonnenschein des Frühlings. Durch das Platzen der Hülle treten die jungen Thierchen hervor.

* **9.** ***Closterium lunula*** Müll. Mondförmiges Spindelthierchen. Halbmondförmig gekrümmt, an beiden Enden verschmälert, mit grünlichen Drüsen; $^1/_4$‴; in Bächen zwischen Wasserfäden häufig.

Fig. 188.
Volvox globator (§. 243, 8).
Grünes Kugelthierchen.
A Eine große, blasenförmige Hülle umschließt viele kleine, kuglige, durch Ausläufer mit einander zu einer Familie verbundene Thierchen. Die 8 größeren Kugeln, deren je 2 und 2 sich einander gegenüber stehen, sind Knospen, welche ebenfalls wieder kleinere Thierchen enthalten und sich beim Zerreißen der alten Familie trennen und dann selbstständig wieder eben solche Familie bilden, worin sich auch wieder Knospen bilden.
B Ein einzelnes der kleinen Thierchen aus der großen Blase noch mehr vergrößert. Mit 2 Mundfäden, hinter welchen ein rothes Auge, 2 größere Blasen und zahlreiche Magentaschen liegen.

§. 243. **10.** ***Proteus diffluens*** Müll. Der Aenderling. Ein durchsichtiges Schleimklümpchen, bei der Zusammenziehung kuglig, durch Ausdehnen alle möglichen Formen annehmend; $^1/_{24}$‴; einzeln unter Wasserpflanzen.

* **11.** ***Gallionella ferruginea*** E. Rostfarbiger Dosenketter. Dünne, rostfarbige, gegliederte Fäden, welche in vielen Torfgewässern als flockige, eisenrostähnliche Masse Alles unter dem Wasser überziehen und durch ihren Niederschlag das Raseneisenerz bilden.

* **12.** ***Bacillaria vulgaris*** E. Gemeines Stabthierchen. Breit linealisch, 3—4 mal länger als breit, fein quergestreift, grün; $^1/_{30}$‴; oft als schleimiger Filz auf Wasserfäden. Die Stabthierchen bilden oft fußlange, aneinander hängende Massen.

13. ***Xanthidium ramosum***. Aestige Stachelkugel (Fig. 189.). Die Arten dieser Gattung finden sich lebend und auch häufig in Feuersteinen der Kreide versteinert. Nach Zersetzung der weichen Theile sind die Kieselschalen im Feuersteine zurückgeblieben, wie sie Fig. 189. darstellt.

* **14.** ***Stentor Müllèri*** E. Gemeines Trompetenthierchen. Farblos, mit weißen Eiern; $^1/_2$‴; verändert seine Gestalt durch Zusammenziehen des Körpers; gewöhnlich zu mehren in Gesellschaft an Wasserlinsen ꝛc.

* **15.** ***Vorticella convallaria*** Müll. Maiblumen-Glockenthierchen. Wasserhell, länglich glockenförmig; $^1/_{24}$‴; in stehenden Gewässern auf Schneckenschalen ꝛc. häufig und dem unbewaffneten Auge als Schimmel erscheinend.

16. ***Enchelys pupa*** E. Puppenförmiges Walzenthierchen. Flaschenförmig, 4mal so lang als breit, wasserhell oder grünlich; $^1/_{12}$‴; in faulendem Wasser.

* **17.** ***Colpoda cucullus*** Müll. Kappenförmiges Pantoffelthierchen (Fig. 190.). Nierenförmig, farblos; $^1/_{24}$‴; eines der gemeinsten *Infusorien*, überall in Aufgüssen, namentlich auf Heu, daher auch Heuthierchen genannt.



Fig. 189. *Xanthidium ramosum* (§. 243, 13).
Aestige Stachelkugel.
a Ein Feuersteinstückchen zeigt 5 Exemplare in natürlicher Größe.
b Ein Exemplar stark vergrößert.

Fig. 190. *Colpoda cucullus* (§. 243, 17).
Kappenförmiges Pantoffelthierchen
(stark vergrößert).

Alphabetisches Register.

Die Umlaute ä, ö und ü folgen immer nach a, o und u. Ein Vokal vor einem Vokale in der vorletzten Sylbe wird hier in den lateinischen Wörtern immer kurz gesprochen, wenn nicht das Gegentheil bezeichnet ist.

§.

Aal 110
Aalmutter 101, 7; 102, 7
— raupe 109, 3
Aelchen. 215, 14; 216, 14
Aaskäfer 127, 35; 131, 35
— vogel 64
Abart 8
Abdomen 122
Abdominales .. 98a; 105
Abendfalter 156
— — pfauenauge 159, 14
Abgottschlange 93, 3
Abrämis ... 106, 8; 107, 8
Abschüssige Säugethiere 26b; 52
Absorption 17
Abtheilung 8
Acaena . 156, 50; 163, 50
Acalepha 229; 232
Acanthia 112 Fig.; 188, 8; 189, 8
Acanthopterygii 98a
Acanthosoma 188, 2; 189, 2
Acanthurus 99, 16; 100, 16
Acarina 196; 200
Acarus .. 196, 19; 200, 19
Accentor . 39 Fig.
Accipitrinae
Acephala
Acerina
Ach
Ach
Ache
Achet
Achse des Gehäuses 130 Fig.; 220
Acidalia . 156, 46; 163, 46
Acipenser 67 Fig.; 115; 116
Ackermännchen 69, 3
— schnecke 224, 12

§.

Ackerspitzmaus 37
Acridium . 180, 2; 181, 2
Acronycta 156, 34; 162, 34
Actinia ... 234, 1; 236, 1
Aculeata 42
Aculeus 146
Adela ... 156, 62; 166, 62
Aderflügler . 21, 4; 124b; 146
— lasser 100, 16
Adern der Flügel 86 Fig.; 122
— — system 10; 18
Adler 64; 65
Admiral 157, 3
Adonis 157, 7
Affe, türkischer 31
Affen 26a u. b; 29; 30; 31
— felle 43
Afterbeine 121 Fig.; 148
— bremse 172, 32
— flossen 64 u. 121 Fig.; 97
— frühlingsfliege . 175; 177
— gabelraupen 156, 25
— klaue 25; 51
— [illegible]ode 216, 12
— [illegible]pen 87 Fig.; 122; 148
— [illegible]pion 196
— [illegible]en .. 196; 199
— [illegible] 91
— [illegible]raupe .. 156, 2
— [illegible]e 155
— [illegible] 25
— [illegible] 89
Aggregatzustand 6
Aglia .. 156, 22; 161, 22
Agrilus 127, 11; 129, 11
Agrotis 156, 36; 162, 36
Ahrenblattkäfer . 143, 94
— — fisch 99, 23; 100, 23
Ai 45

§.

Akalephen 227
Alander 107, 2
Alauda .. 42 Fig.; 68, 15; 69, 15
Albatros .. 81, 13; 82, 13
Albino 14, 2; 28
Alca . 59 Fig.; 81, 19; 82, 19
Alcedo 66; 67
Alces 53, 4
Alcidae 81, 19
Alectorides 78
Aleurodes 193
Alken 63b; 81, 19; 82, 19
Alligator 89; 90, 2
Alpenflüevogel 39 Fig.; 69, 8
— — forelle 107, 1
— — murmelthier .. 43, 5
— — steinbock 53
Alucita 156, 11
Alveole 222, 9
Alveolstein 143 Fig.; 222, 9
Alytes 95, 5; 96, 5
Amaltheenhorn 138 Fig.; 222, 7
Amara 127, 8; 128, 8
Amazonen-Schildkröte 87
Amber oder
Ambra 25, 2; 59
Amboß 14, 5
Ameisen 153
— — bär oder -fresser 44; 45
— — eier 153
— — igel 45
— — löwe 21b; 176; 177
— — puppen 153
— — säure 153
— — zunder 178
— —, weiße 178
Ameiva 89, 5; 90, 5
Amerikanische Rasse ... 28
Ametabola (insecta) 124b
Ammer ... 68, 16; 69, 16

§.

Ammon 53
Ammonites 133 u. 137 bis 140 Fig.; 221, 10; 222, 7
Ammonshörner 133 u. 137 bis 140 Fig; 221, 10; 222, 7
Ammophila.....153
Amphibia.....83
Amphidasis 156, 44; 163, 44
Amphipoda.....205
Amphisbaena 89, 21; 90, 21
Amsel .....69, 3—8
Anabas..99, 20; 100, 20
Anableps 106, 11; 107, 11
Anakonda.....93, 3
Ananchytes 179 Fig.; 229, 6; 231, 6
Anarrhichas 101, 8; 102, 8
Anas....55 Fig.; 81; 82
Anatidae 81
Anatifa 126 Fig.; 202, 30; 213
Anatomie.....9
Anchovis.....107, 16
Ancylus . 221, 8; 224, 71
Aenderling 241, 10; 243, 10
Aeneas.....40
Angoraziege.....53
Anguilla.....111
Anguilliformes 110
Anguillula 215, 14; 216, 14
Anguinea.....95
Angüis ...89, 17; 90, 17
Anisotoma . 127, 47; 135
Annulata 89; 215
Anobium 127, 13; 129, 13
Anodonta 221, 104; 226, 102
Anomala. 127, 27; 130, 27
Anomia 221, 81; 226, 82
Anprallen.....155
Anser...64 Fig.; 81; 82
Anta.....48
Antennae.....122; 214
Antennarius 101, 6; 102, 6
Anthomyia 169, 24; 172, 24
Anthonomus 127, 71; 139, 71
Anthophilae 154
Anthophora 147, 28; 154, 28
Anthozoa.....234
Anthrax 169, 16; 172, 16
Anthrenus 127, 37; 131, 37

§.

Anthus 68, 4; 69, 4
Antilope.....62; 53
Antiopa 157, 3
Antipathes 234, 19; 237, 19
Antlata 168
Apar.....45
Apatura . . 156, 5; 157, 5
Apfelblattlaus 192, 21 u. 22
— blattnager..139, 66
— rüsselkäfer..139, 71
— wickler.....165, 55
Aphidina.....192
Aphidius 147, 14; 151, 14
Aphis..188, 21; 192, 21
Aphodius 127, 21; 130, 21
Aphrodite 215, 1; 216, 1
Aphrophora 188, 19; 191, 19
Apiocrinites 229, 11; 231, 11
Apion..127, 59; 139, 59
Apis ...147, 30; 154, 30
Aplysia..221, 3; 224, 65
Apoderes 76 Fig.; 127, 56; 139, 56
Apodes.....98a; 110
Apollofalter 157, 11
Apotheker-Skink ..90, 15
Apparat.....10
Aptenodytes 81, 21; 82, 21
Aptera 185; 188
Apteryx 75, 5; 76, 5
Apus 202, 25; 210
Aquila 64; 65
Ara.....66, 6; 67, 6
Arachnidae 23; 195
Aranina .....
Arbeiter 15
Arbeitsbienen...
Arca oder
Arche..221, 105;
Archenmuschel .
Arctomys...42
Arctopithèci ..
Ardea.....
Ardeadeae.....
Area.....131 Fig.; 220
Arenicola. 215, 3; 216, 3
Areola..88 Fig.; 122; 146
Argali.....53
Argas.....200, 22
Argonauta 221, 15; 222, 4
Argusfalter.....156, 7

§.

Argynnis . 156, 2; 157, 2
Argyronèta 196, 10; 198, 10
Aries 53, 11
Arm.....2 Fig.; 11; 12
Armadill oder Gürtelthier ... 44, 3 u. 45, 3
Armadillo 202, 17; 207, 17
Armfloffer 101, 5
— füßer.....225
— geflecht . . 3 Fig.; 13
— molch 95, 13; 96, 13
— polyp 183 Fig.; 22; 234, 6; 236, 6
Arolsae....99 Fig.; 122
Arrau 87
Art 8
Artefakte.....1
Arterien Fig. 5—7
— — blut..... 18 D
— — system.....18
Arthrogastra.....197
Arthrozoa.....22; 121
Artsche 69, 17
Arzneimittel von Insekten 124a
Ascaris. 215, 12; 216, 12
Ascidia 20; 221, 126; 227
Asellus....202, 16; 207
Asilus..169, 10; 172, 10
Asopia. 156, 53; 164, 53
Aspalax . . 42, 12, 43, 12
Aspergillum 221, 75; 226, 117
Asphyxie 97
Aspis 93, 9
Assein.....202; 207
Assimilation 15
Astacus . .202, 1; 203, 1
...217, 7
...229, 8; 231, 8
...231
...234, 10;
...237, 10
...49
...2
...3, 44
...65
...157, 3
...30; 31
Ateuchus.....130, 23
Atherina 99, 23; 100, 23
Athmen.....19
Athmungssystem..10; 19
Aethiopische Rasse....28
Atropos 159, 18
Atychia. 156, 17; 160, 17

§.

Auchenia 52; 53
Auctorität 9
Auerhahn 74
— ochs 53
Aufgußthierchen 23; 240
Auffangung 17
Augen 14; 42
— — falter 157, 6
— — haut 14, 2
— — koralle 184 Fig.; 234. 3; 237, 8
— — stern 14
Aulacostŏma ... 215, 17; 217, 17
Aulostŏmi 103
Aurorafalter 157, 9
Ausdünstung 15
Aust 176
Auster .. 221, 82; 226, 77
Austerndieb 79; 18
Austernfischer 78, 18
Außenrand des Gehäuses 128 Fig.; 220
Aves ..... 23; 60; 63 a
Avicŭla 171 Fig.; 221, 88; 226, 94
Axolotl ... 95, 11; 96, 11
Aye-Aye 43, 6

Baas 100
Babirussa 48
Bache 48
Bachflohkrebs 121 Fig.; 205, 13
— mücke . 169, 8; 178, 8
— schlammwurm 216, 8
— stelze ... 68, 3; 69, 3
Bacillaria 241, 12; 243, 12
Backenhörnchen
— — tasch
— — zähn
Badeschw
Balaen
Ba
Ba
Ba
Bal
Bälge ...
Balistes 113; 114
Baltimore-Vogel .. 69, 25
Bandfisch 98 b; 101, 11; 102, 11
— horn 221, 49; 224, 39
— schwebfliege 172, 30

§.

Bandweiden-Blattkäfer 143, 94
— wurm 127 Fig.; 20; 215, 23; 218
Bankivahahn 74
Barbe 107, 5
Barbus ... 106, 5; 107, 5
Bären .... 26 b; 36; 37
— fett 25, 2
— krebs 204
— raupe 156, 32; 161, 32
— spinner .. 156, 32; 161, 32
Baribal 37
Barsche ... 64 Fig.; 98 b; 99; 100
Bart 60
— der Muscheln .. 226
— borsten 60
Barten (Fischbein) 18 Fig.; 59
— — wall 59
Bartfäden der Fische 67 Fig.
— geier oder Lämmergeier 64
— meise 69, 13
— mücke . 169, 2; 170, 2
— vögel 63 b; 66; 67
Basiliscus 89, 10; 90, 10
Basilosaurus 90
Basis des Gehäuses 130 Fig.; 220
Bassansgans 82, 10
Bassus . 147, 11; 150, 11
Bastarde 8
Bastardmuschel .. 221, 81
Bastkäfer 127, 77; 140, 77
[illegible]achia oder Ba[illegible]
[illegible]hier 94
[illegible]beine 87 Fig.; 122; [illegible] 148; 155
[illegible]ossen 64 Fig.; 97
[illegible]osser 105
[illegible]ßer .. 221 b; 224
[illegible]öhle 11
[illegible]eme 14, 2; 119; 120
[illegible]ippen .. 2 Fig.; 11
[illegible]sauger 108, 8
— speicheldrüse 16; 17
— thiere 23; 219
— weichflosser 98; 105
— zitzen 25
Bauernmusik 224, 52
Baumagamen 89
— falke 65

§.

Baumkletterer ... 100, 20
— läufer 47 Fig.; 68, 33; 69, 33
— marder 37
— pieper 69, 4
— schlange 92, 7
— weißling 157, 9
Bebrüten 20
Beckenknochen 2 Fig.; 11
— — muschel ... 226, 88
Bedecktkiemer .. 98 a u. b; 115
Bedeguar 152, 18
Beerenfresser 68
Begattung 20
Beidleber 83
Beine 11; 12
— der Insekten 71 Fig.; 122
— des Menschen 2 Fig.
— der Vögel Fig. 20 ꝛc.
Beinhaut 11
— waaren 25, 4
Beisa-Antilope 53
Beißheuschrecke 180, 6
Bekassine 79, 14
Belemnites 143 Fig.; 221, 14; 222, 9
Belŏne . 106, 13; 107, 13
Beluga 116
Belzebuth 31
Benutzung der Säugethiere 25
Bergfink 69, 17
Berlinerblau ..... 25 f
Bernhardskrebs ... 203, 5
Bernsteinschnecke 147 Fig.; 221, 47; 224, 19
Berŏs .. 229, 15; 232, 15
Bettwanze 112 Fig.; 188, 8; 189, 8
Beutelqualle ... 229, 18; 232, 18
— — ratte 39
— — thier 20 a u. b; 38
Bewegungsorgane ... 12
— — — nerven ... 12
Bezoar 25, 2; 53
— — ziege 53
Bibbe 107, 10
Biber 11 Fig.; 21 b; 42; 43
— geil 25, 2; 43
— maus 43
Bibio 169, 6; 170, 6

§.

Biene 90 Fig.; 21 b; 147, 30; 154, 30
Bienenglasflügler 160, 19
— — körbchen..224, 17
— — schwarm..154, 30
— — schwärmer 160, 19
— — wolf 127, 30; 131, 30
Biesfliege.....172, 31
Bimäna .....26 a; 28
Bingelkraut-Flohkäfer 143, 91
Binnenwürmer.....218
Binsenfänger 40 Fig.; 68, 10; 69, 10
Birkenblattroller. 139, 57
— — blattwespe .148, 2
— — fuchs.....37
— — spanner ..163, 44
— — stecher....139, 57
Birkhahn 74
Birnbaum-Schwebfliege 192, 30
Birnblattnager ..139, 66
— lilie 229, 11
— mücke.....170, 3
Bisam 25, 2
— — ente.....82, 3
— — ratte.....37; 43
— — schwein.....48
— — stier.....53
Bischofsknöpfe....231, 5
— — mütze...224, 61
Bison 53
Bisülca.....26 a; 51
Bitterfisch.....107, 9
Blaps 127, 51; 137
Blasenblattlaus 188, 23; 192, 23
— — fuß 107 Fig.; 180, 10; 184
— — polyp 234, 7; 236, 7
— — schnecke 221, 21 u. 48; 224, 23 u. 66
— — wurm 215, 11; 218
Bläße.....79
Bläßhuhn...51 Fig.; 79
Blatta.....180, 8; 182
Blattfloh 188, 20; 192, 20
— fuß...202, 25; 210
— füße 201
— füßer....202; 210
— hörnige Käfer 126; 127; 130
— igel 177 Fig.; 229, 7; 231, 7
— käfer 126; 127; 143, 94

§.

Blattlaus .20; 188, 21; 192, 21
— — bohrer 151, 14
— — fliege.172, 30; 175; 177, 9
— — käfer.....144
— nager.....139, 66
— nasen....26 b; 33
— roller 127; 56; 139, 56
— sauger.....192
— schneider ...154, 29
— wespe, grüne 86 Fig.
— wespen 146; 147; 148
Blättermagen 15 Fig.; 51
— — -Seerinde 238, 21
Blaufalke..... 65
— fuchs 37
— fuß.....65
— kehlchen.....69, 10
— kopf.....162, 35
— meise.....69, 13
— racke.....67
— sieb.....161, 28
— specht 46 Fig.; 69, 32
Blei.....107, 8
Blendlinge.....8
Blennius .101, 7; 102, 7
Blindbremse ... 169, 34; 172, 34
— darm.....16
— fisch 120
— maulwurf .. 14, 2; 43
— maus 14, 2; 42; 43
— sack.....16
— schleiche 89, 17; 90,
— wühle 14, 2;
Blödauge...92, 1
Blumenfliege...
— — koralle
234, 8
— — schlamm
— — thiere....
— — wespe 147; 154
Blut.....15; 18; 25 f
— adern 5—7 Fig.; 18
— egel .215, 16; 217, 16
— fink 69, 17
— hänfling 69, 17
— kuchen.....18

§.

Blutkügelchen 18
— lauf Fig. 5—7
— laus 192, 22
— regen.....157, 9
— sauger.....34
— wasser.....18
— zahn 224, 37
Boa..25, 3; 92, 3; 93, 3
Bock.....53, 11
— käfer 21, 4; 126; 127; 142
— sblut.....25, 2
Bogengänge.....14, 5
Bohrer.....146
Bohrkäfer.....129
— muschel ... 221, 77; 226, 115
— wurm 221, 76; 226, 116
Boltenia..221, 126; 227
Bombardirkäfer ... 128, 5
Bombinator .95, 6; 96, 6
Bombus. 147, 31; 154, 31
Bombycilla 68, 22; 69, 22
Bombycodea 156
Bombylius 169, 15; 172, 15
Bombyx 156, 23; 161, 23
Borkenkäfer 81 Fig.; 140
— — thier.....58; 59
Borlasia.....216, 15
Borsten.....25
— — förmige Fühler 98 Fig.; 122
— — igel.....37
— — schwänze.....185
— — würmer.....215
— — zähne.....97
Bo... .....52; 53
... 77 u. 81 Fig.;
... 34; 140, 74
... .5
... 127 Fig.
... 218, 22
... 7
... 54
... 132
... 172
... 28, 5
... .225
Brachkäfer 130, 26
Brachsen oder Brassen 106, 8; 107, 8
Brachvogel.....78
Brachydéres ... 127, 13; 151, 13
Bracon..147, 13; 151, 13

§.

Bradypŏda 44
Bradypus.....44; 45
Branchiae 97
Branchiostĕgi 98 a; 115
Brandente.....82, 3
— — eule.....65
— — fleck.....224, 51
— — fuchs.....37
— — hirsch 53
— — hornstachelschnecke 224, 44
— — maus.....43
Brassen..106, 8; 107, 8
Brattenburg'sche Pfennige.....225, 75
Braunelle...68, 8; 69, 8
Braunfisch.....59
— — kehlchen.....69, 9
— — wurz-Knollenkäfer 131, 37
Brechfliege.....172, 23
Breitling.....107, 15
— nase.....29
— rand.....133
Bremen 169, 35; 172, 35
Bremse..169, 31; 172, 31
Bremsfliege 169, 32; 172, 32
Brennnessel-Zünsler 164, 54
Brettspiel.....157, 6
Brieftauben.....60; 71
Brillenkaiman.....90, 2
— — schlange 92, 9; 93, 9
Brotkäfer.....129, 13
— schabe 109 Fig.; 182
Bruchschlange 90, 17
Bruchus...127, 55; [illegible]
Brüllaffe..21, [illegible]
Brummer..[illegible]
Brunnenaff[illegible]
Brust..[illegible]
— h[illegible]
— [illegible]
— [illegible]
— [illegible]
— [illegible]
— [illegible]
— [illegible]
— [illegible]
— höhle.....11
— kasten....121; 122
— knochen.....11
— kugelkäfer.....144
— rippen 11
— stück.....122
— zitzen.....25

§.

Bryozōa.....235; 238
Bubălus.....53
Bubo 65, 13
Bucc[illegible]num 221, 67; 224, 57
— des Plinius ..224, 54
Bucco 66; 67
Bucconĭdae 66
Bucephăla 161, 30
Bucerĭdae.....66
Bucĕros 66; 67
Buchdrucker 81 Fig., 140, 74
Buchenborkenkäfer 140, 74
— gallmücke..170, 3
— minirkäfer 139, 72
— spinner 161, 25 u. 31
— springer .139; 72
Buchfink.....69, 17
Buchstaben-Porzellane 224, 51
Bücherbohrer...127, 14; 129, 14
— laus 178, 13
— milbe 196, 17; 200, 17
— scorpion ..196, 3; 197, 3
Buckel d. Muschein 131 Fig.; 220
— ochs 53
Bücklinge.....107, 15
Büffel 53
Buffoniten.....102, 8
Bufo.....95, 8; 96, 8
Bulĭmus 221, 43; 224, 15
Bulla ..221, 21; 224, 66
Buntspechte 67
[illegible]ga .68, 27; 69, 27
[illegible]is 127, 10; 129, 10
[illegible]aupen ..156, 31
[illegible]rüse.....60
[illegible]ne 196, 5; 198, 5
[illegible]ger ..202; 211
[illegible]mer . 98 b; 103
.....64
.....64; 65
..196, 2; 197, 2
.....109
Byrrhus 127, 36; 131, 36
Byssus.....226

C album 157, 3
C, weisses 157, 3
Cabinetkäfer.....131, 37
Caccabu.....66; 67

§.

Cacătus 66; 67
Cachelot 59
Caecilia..95, 15; 96, 15
Caja.....161, 32
Calamita 96, 9
Calandra..80 Fig.; 127, 68; 139, 68
Calceŏla 163 Fig; 221, 79; 225, 76
Calĭgus...202, 29; 212
Callidium 127, 82; 142, 82
Calmar ..221, 1; 222, 1
Calosōma .127, 4; 128, 4
Calymēne 124 Fig.; 210
Cameloparděalis .52; 53
Camēlus 52; 53
Canarienvogel....69, 17
Cancer 120 Fig.; 202, 6; 203, 6
Cancrōma 78; 79
Canina.....36
Canis.....36; 37
Cantharíden-Pflaster 138
Canthăris 127, 17; 129, 17
Capella 52; 53
Capillaranziehung ...17
— gefäße 18
Capra.....52; 53
Capreŏlus.....53
Caprificatio 152
Caprimŭlgus 48 Fig.; 68, 40; 69, 40
Caput.....122
Capybāra 43, 14
Carabicina 126; 127; 128
Carăbus. 71 Fig.; 127, 3; 128, 3
Caracŏlla 221, 19; 224, 14
Carassius .106, 4; 107, 4
Carbo.....81, 8; 82, 8
Carcharias 118, 1
Cardium .221, 113; 226, 106
Cardo....132 Fig.; 220
Carettschildkröte.....87
Carinaria .....124, IV.
Carmin.....193, 25
Carnivŏra 26a; 35
Carpio.....107, 3
Carpocāpsa 156, 55; 165, 55
Carpus.....11; 146
Carthäuser Katze ...37
Caryocatăctes ...69, 30
Caryophyllia 234, 9; 237, 9
Caschelot 59, 4
Cassĭcus . 68, 25; 69, 25

§.

Cassïda 127, 90; 143, 90
Cassis .. 221, 54; 224, 49
Castor .. 11 Fig.; 42; 43
Castoreum 43
Caſtnar 75
Casuarius 75; 76
Cathārtes 64; 65
Catoblépas 52; 53
Catocāla 156, 43; 162, 43
Caudāta 95
Cavia 42; 43
Cavïar .97; 100, 22; 116
Cavicornia 52
Cebus 30; 31
Cecidomyia 169, 3; 170, 3
Cellepŏra 235; 238
Centauren 28
Centētes 36; 37
Centrïscus 103; 104
Cephalophŏra 222
Cephalopŏda 222
Cephus ... 147, 8; 149, 8
Cepŏla. 101, 11; 102, 11
Cerambyx 127, 81; 142, 81
Cerāstes .. 92, 12; 93, 12
Ceratītes 133 Fig.; 222, 7
Ceratopōgon 169, 2; 170, 2
Cercopithēcus .. 30; 31
Cerebralſyſtem ... 10; 13
Cerebro-Spinalſyſtem 13
Cerithium 154 Fig.; 221, 51; 224, 35 u. 41
Certhia 47 Fig.; 68, 33; 69, 33
Cervīna 52
Cervus 52; 53
Cestum. 229, 14; 232, 14
Cetacea 26a; 57
Cetaceum oder Wallrath 59, 4
Cetonia. 127, 29; 130, 29
Ceutorrhȳnchus 127, 73; 139, 73
Chagrin 97; 117
Chama. 221, 86; 226, 96
Chamaeleon .. 17; 89, 8; 90, 8
Charadriädae 78
Charadrius 78; 79
Cheiroptéra ... 26a; 32
Chelïfer .. 196, 3; 197, 3
Chelmon. 99, 18; 100, 18
Chelōnae 86
Chelonia 86; 87
Chelys 86; 87
Chemie 9

§.

Chermes 188, 24; 192, 24
Chersïnae 86
Chersobătae 99, 6
Cheylētus 196, 17; 200, 17
Chimaera 115, 116
Chimpanſe 31, 1
Chique 171, 9
Chirŏmys 42; 43
Chirōtes .. 89, 20; 90, 20
Chirurg 79; 99, 16
Chiton 221, 122; 224, 73
Chlamydomŏnas 241, 7; 243, 7
Chlamydophŏrus 44; 45
Choloepus 44; 45
Chondracānthi. 98; 112
Chromis. 99, 25; 100, 25
Chryſalïdeh 155
Chrysis 147; 153
Chrysochlōris .. 36; 37
Chrysomēla 127, 94; 143, 94
Chrysomelïna 126; 127; 143
Chrysŏphrys 99, 28; 100, 28
Chrysops 169, 34; 172, 34
Chylus 17
Chymusbildung 17
Cicāda .114 Fig.; 21, 4; 188, 18; 191, 18
Cicadïna 188; 191
Cicigua 90, 16
Cicindēla 127, 1; 128, 1
Ciconia. 53 Fig.; 78; 79
Cidaria. 156, 47; 163, 47
Cidarïtes 177 Fig.; 229, 4; 231, 4
Cimbex .. 147, 2; [illegible]
Cimex 110 u. 1[illegible] 188, 3[illegible]
Cinchilla .. 42. 19[illegible]
Cinclus .... 6[illegible]
Cingulāta ....
Circulation ....
Cirrhopŏda ....
Cïtronvogel ....
Claſſification ....
Classis .....
Clausilia .. 145 Fig.; 221 26; 224, 16
Clavicornia 126; 127; 131
Clavïger . 127, 100; 145
Cleŏnus 127, 64; 139, 64
Clima 21
Clio 221, 130; 223

§.

Closterium 241, 9; 243, 9
Clupea. 106, 15; 107, 15
Clupeacei 106
Clypeus ... 84 Fig.; 122
Clythra. 127, 95; 143, 95
Clythus 82 Fig.; 127, 83; 142, 83
Cobïtis. 106, 10; 107, 10
Coccidŭla. 127, 97; 144
Coccīna 193
Coccinēlla 127, 98; 143, 98
Coccinellïna .126; 127; 144
Coccothraustes .. 69, 17
Coccus. 188, 25; 193, 25
Coccyx. 156, 58; 165, 58
Cochenille 193, 25
— laus .. 193, 25
Cochléae 220
Cocon 91 u. 94 Fig.; 122; 155
Coenūrus 215, 25; 218, 25
Coleoptĕra .. 124b; 125
Colïas. 156, 10; 157, 10
Collāre 122
Colpŏda 190 Fig.; 241, 17; 243, 17
Colŭber 60 Fig.; 92, 5; 93, 5
Columba ... 49 Fig.; 71
Columbae 63a; 70
Columbatſcher Mücke 101 Fig; 170, 5
Columbella 221, 70; 224, 60
Columbïne 70
[illegible]mbïdae 81
[illegible] 81, 17; 82, 17
[illegible] 220
[illegible] 226
[illegible] 21; 65
[illegible] 68
[illegible] 12
[illegible] 60
[illegible] 25
[illegible] 4, 52
[illegible] 30, 22
[illegible] 90, 4
Coracias .66, 16; 67, 16
Corallen .. 66; 67; 233
— moos ... 239, 2
— riffe 233
— ſtamm 233
Corallia 233
Corallinen 239

§.

Corallium 186 Fig.; 234, 16; 237, 16
Cordylea 90, 11
Corēus ...188, 4; 189, 4
Corixa .188, 16; 190, 16
Coronŭla..202, 32; 213
Corophium 202, 14; 205, 14
Corrodentia 178
Corvīnae 68
Corvus 45 Fig.; 68, 28; 69, 28
Coryphaena 99, 14; 100, 14
Corythāix 66; 67
Cossus .156, 28; 161, 28
Costa der Flügel ...146
Cottus ...101, 3; 102, 3
Coxa der Inſekten 85 Fig.; 122
Crabro 147; 153, 21 u. 25
Crangon .202, 3; 203, 3
Crania .221, 80; 225, 75
Crassamentum 18
Creoſen 28
Crepuscularia 156
Crex 78; 79
Cricētus.....42; 43
Crinoidea 231
Crista sterni.....62
Crocodilus ...89; 90, 1
Crotălus..92, 15; 93, 15
Crotophăga.....66; 67
Cruor.....18
Crustacea 23; 201
Cryptobrānchus...96, 9
Cryptocephălus 127, 96; 143
Crypturĭdae
Cryptūrus
Ctenoidei
Cuati
Cub
Cu
Cuc
Cucu
Cugua
Culex .10 169,
170, 1
Cunicularia 42
Cupidohuhn 74
Curaßthier 45
Curculio 139, 63
Cursōres 63a; 75
Cursoria 182

§.

Cyămus ...202, 15; 206
Cyanea .229, 17; 232, 17
Cyclas 221, 116; 226, 109
Cycloīdei.....120b
Cyclops...202, 27; 211
Cycloptĕrus 108,8; 109,8
Cyclostŏma 221, 42; 224, 21
Cyclostŏmi...98a; 119
Cydnus ..188, 1; 189, 1
Cygnus 54 Fig.; 81; 82
Cymbium .221, 73; 224, 63
Cynips 89 Fig.; 147, 17; 152, 17
Cynocephălus...30; 31
Cypferfahe 37
Cypraea 221, 61; 224, 51
Cyprīna..175 Fig.; 221, 119; 226, 112
Cyprinoidei 106
Cyprīnus .106, 3; 107, 3
Cypris 202, 26; 211
Cypsĕlus .68, 40; 69, 40
Cysticĕrcus 215, 24; 218, 24
Cytherēa 176 Fig.; 221, 121; 226, 114

Dachs.....36; 37
Dachshund 37
Dactyloptĕrus 101,2; 102, 2
Dammhirſch.....53
— — koralle 237,12
Daphnia 125 Fig.; 202, 28; 211
Darm 15; 16
— bein .....2 Fig.
— kanal 15
— niten 25, 4
— ſyſtem 10; 16
— tule 172, 31
— ge 172, 31
.....44
27, 16; 129, 16
.....39; 40
.....224, 64
.....11
— harfe 224, 55
Decapŏda 203
Decken od. Flügeldecken 79
Deckfedern 60
Dectĭcus .180, 6; 181, 6
Degenfiſch 102, 10
Delphin ..19 Fig.; 26b; 58; 59

§.

Delphinodea....58; 59
Delphinŭla 221, 20 u. 32; 224, 30
Delphīnus 19 Fig.; 58; 59
Deltidium 225, 74
Dentalium 221, 4; 224, 72
Dentirōstres 68
Dermanyssus ..196, 22; 200, 22
Dermatoptĕra.....33
Dermēstes 127 31; 131, 31
Deßman.....37
Devēxa 52
Dianenohr 155 Fig.; 224, 47
Diazōna ..221, 127; 227
Dichroa 147, 26; 154, 26
Dickdarm 16
— häuter 26b; 46; 47; 48
— kopf 156, 12
— kopffliege 169, 12; 172, 12
— ſchenkel 136; 148, 2; 188, 6; 189, 6
— wanze 188, 1; 189, 1
— züngler ...84b; 89
Dicotўles.....47; 48
Didēlphys 39; 40
Didus 75, 4; 76, 4
Digeſtionsſyſtem 16
Digitāta 26a; 27
Digĭti.....11
Digitigrāda 36
Dille 60
Dillenkante 60
Dintenblaſe 222, 1
— fiſch 221, 2; 222, 2
Dioctria 169, 11; 172, 11
Diŏdon 113; 114
Diogenes-Krebs ..203, 5
Diomedēa 81, 13; 82, 13
Diplostŏmum ..215, 20; 217, 20
Diptĕra 124b; 168
Dipus 42; 43
Discoböli 108
Discoidalzellen .86 Fig.; 146
Diſtelfalter 157, 3
Diſtelfink 69, 17
Diſtel-Flohkäfer .143, 91
Distŏmum 215, 19; 217, 19
Ditrŏcha 147
Diūrna 156
Dogge 37

§.

Dohle 69, 28
Dolium .221, 66; 224, 56
Domesticirung .....21 c
Dompfaff 43 Fig.; 69, 17
Donacia 127, 88; 143, 88
Donax 221, 98; 226, 111
Donnerkeil 143 Fig.; 221, 14; 222, 9
Doppelloch 215, 19
— mund 215, 20; 217, 20
— räderthierchen 141
— schleiche 89, 21; 90, 21
— schnepfe ...79, 14
Dorade ..99, 14; 100, 14
Doritis .156, 11; 157, 11
Dorneidechse 89, 11; 90, 11
— koralle 237, 14
— raupen 156
Dorsch 109, 1
Dosenkotter 241, 11; 243, 11
Dosenschildkröte 87
Dotter 20
— haut 20
Dotterweiden-Blattkäfer 143, 94
Dotterweiden-Blattlaus 192, 21
Drache 90, 9
Drachenfisch 99, 6
Draco 89, 9; 90, 9
Drahtwurm 129, 9
Drehkrankheit ...218, 25
Drehwurm 218, 25
Dreieckmuschel .173 Fig.; 221, 97; 226, 104
Dreiklaue 86
Dreizehige Käfer ...126
Drohnen 154, 30
— schlacht .154, 30
Dromedar 53
Dromia 202, 11; 203, 11
Dronten .....63 b
Drossel 38 Fig.; 68, 6; 69, 6
Dudu 24; 76
Dunen 60
Dungfliege 169, 26; 172, 26
Dungkäfer 127, 21; 130, 21
Dünndarm 16
— schnäbler 63 b; 68, 5; 69, 5
Durchblätterte Fühler 122 a
Drüsen 25

§.

Dryŏphis ..92, 7; 93, 7
Dytiscus 75 Fig.; 127, 43; 133

Eber 48
Ecaudāta (reptilia) ..95
Eccoptogāster .77 Fig.; 127, 76; 140, 76
Echenëidae 108
Echenëis .108, 9; 109, 9
Echĭdna 44; 45
Echinodermăta 231
Echinolampas ...231, 7
Echinorhȳnchus 215, 21; 218, 21
Echĭnus ..229, 3; 231, 3
Eckflügler 156, 4
— mund 221, 34; 224, 29
— schupper .....120 b.
— zähne ....1 Fig.; 11
Eckige Puppe ...91 Fig.
Edelhirsch 53
— koralle 186 Fig.; 234, 16; 237, 16
— marder 37
Edentăta .....26 a; 44
Egel 215; 217
Ehrenpreis-Falter 157, 1
Ei 20
— weiß 6; 20
Eichenblattgallwespe 89 Fig; 152, 17
— bock 142, 81
— gallwespe 147, 18; 152, 18
— kernkäfer ..140, 75
— wickler ...165, 57
Eichhörnchen 26 b; 42; 43, 1
Eidechsen 84; 88; 89; 90, 7
— könig 90
Eiderdaunen ....
Eiderente od. Ei...
gans 81
Eierringel ....
— säcke ....
Eier-Seescheid...
Eingeweidener...
— — wü...
214; 215;
Einhorn.....
— hornfisch ....
— hufer .....26 a; 49
— miether 152
— ohr .221, 93; 226, 86
— tagsfliege ..105 Fig.; 175; 176
Eintheilung der Insekten .....124 b.

§.

Einzahn 221, 29; 224, 33
Eisbär .....21 c; 37
— falter 157, 4
— fuchs 37
— sturmvogel 82, 12
— vogel .24 Fig.; 63 b; 66; 67
Eischnecke 221, 60
Elăphrus .127, 2; 128, 2
Elaps 92, 8; 93, 8
Elater 72 u. 78 Fig.; 127, 9; 129, 9
Elch 53
Electoralschaf 53
Electricität 21, 3
Electrischer Apparat der Fische 97
Elemente 6
Elennthier 53
Elennsgeweihe ...237, 13
Elephant 12 Fig.; 47; 48
Elephanten-Meerzahn 224, 72
Elĕphas 12 Fig.; 47; 48
Eleutherāta 125
Eleutherobranchii ..98 a
Elfenbein 48, 1
— — gebranntes 25, 4 b
Elle 11
Ellenbogenbein ....2 Fig.
Ellerütze 107, 9
Elpēnor 159, 13
Elster 68, 29; 69, 29
— (Schnecke) .224, 31
Elytra .....71 Fig.; 122
Email 11
Emarginŭla 221, 6; 224, 69
Endborste d. Insektenfühler 168
— dorn d. Insektenbeine .....85 Fig.
Endosmose 17
Engerling 130, 25
Engflügler 126; 127; 136

§.

Engmäuler. 84 b; 92; 93
Engraulis 106, 16; 107, 16
Enhydris 36; 37
Ennomos 156, 49; 163, 49
Enten ..55 Fig.; 81; 82
— muſchel 126 Fig.; 202, 30; 213
— ſtößer 65
Enterich 82, 3
Entomolithus 210
Entomostraca 202
Entozoa 215; 216
Entrochiten 181 Fig.; 131, 13
Epeira .196, 12; 198, 12
Ephemera 175; 176
Epidermis 14; 220
Episema 156, 35; 162, 35
Eproboscidea 169
Eques...99, 10; 100, 10
Equus ..14 Fig.; 49; 50
Erbſeneule 162, 39
— käfer.....139
— muſchel 221, 117, 226, 110
Erdagamen.....89
— floh 143, 91
— hummel 154, 31
— milbe 196, 16; 200, 16
— molch ...95, 9; 96, 9
— raupe 162, 36
— ſalamander 96, 9
— vögel 72
— wühler 36
— würmer ...215; 216
Eremit od. Diogenes-krebs 203, 5
Erinacei 3
Erinaceus .....
Eriomys.....
Eristalis 104

Erlenbla
—
—
—
Ernähr
Erpel ..
Eſchen-Bo
— -Singwe
144 Fig.; 188, 18; 191, 18.
Eſel 50
Esocini 106
Esox...106, 12; 107, 12
Eſpenbock 142, 85
— blattkäfer .143, 94

§.

Eſſigälchen ..20; 216, 14
Eulen 63 b; 64; 65; 156, 6; 162
Eulenkopf.....225, 74
Euphone .68, 20; 69, 20
Euprepia 156, 32; 161, 32
Eurycle 229, 10; 231, 10
Eurystoma 92
Euſtachiſche Röhre..14, 5
Exocoetus 106, 14; 107, 14
Exogyra 221, 84; 226, 79
Exosmoſe 17
Extremitäten 11

Facetten d. Augen. 122 b
Fadenförmige Fühler 122 a
Fadenwürmer 215; 216, 10 u. 13
Fahne 60
Fächerkoralle ..187 Fig.; 234, 18; 237, 18
Fächerfinger .89, 13; 90, 13
Falco ..32 Fig.; 64; 65
Falken 32 Fig.; 63 b; 64; 65
Fallkäfer 127, 96; 143, 96
Falter 156, 8
Faltflügler 175
Familia 8
Fangarme. 12; 228; 233
— bäume 140, 74
— beine d. Inſekten 113 Fig.; 122
— fäden.....229
— gräben 155
— heuſchrecke ..180, 7; 182
.....64
...hler ..100, 29
...weſpe ..152
.....73; 74
221, 49; 224, 39
.....6
...166 Fig.;
, 85; 226, 83
.....6
...falter ...157, 7
Faulthier ..26 b; 44; 45
Fauna 5
Feder 60
— buſchpolyp 235; 238
— felder 60
— ling ..180, 13; 186
— motten 156, 63; 167
Fehlzüngler.....84 b

§.

Feige...221, 53; 224, 43
Feigen-Gallweſpe ..152
Feigenſchnecke ...224, 43
Feile .170 Fig.; 221, 91; 226, 87
Feinde der Fiſche 97
Feldchen d. Muſcheln 131 Fig.; 220
Feldflüchter 71
— grylle 181, 3
— heuſchrecken 180
— huhn 73; 74
— kröte.....96, 8
— lerche 69, 15
— maus .....21 b; 43
— ſperling 69, 17
— taube 71
— wanze 188, 3; 189, 3
— weichkäfer...129, 17
Felina 36
Felis 36; 37
Felle 25, 3
Felſenhuhn 68, 21; 69, 21
Femur..85 Fig; 11; 122
Fenſterſpinne.....198, 9
Ferae 36
Ferſenbeine .....2 Fig.
— — gelenk.....61
Feßler 95, 5; 96, 5
Fett 12
— floſſen 97
— körper d. Inſekten 122
— magen 51
— ſchabe 164, 51
— ſteiße.....21 a, 1
Feuerkröte ..95, 6; 96, 6
— ſalamader ...96, 9
— ſchröter ...130, 28
— wurm 129, 18
Fiber 42; 43
Fibrine 6; 18
Fichtenblattweſpe .148, 3
— borkenkäfer 140, 74
— eule 162, 40
— holzweſpe .149, 7
— neſtwickler 165, 58
— quirl-Schild-laus.....193, 25
— rindenlaus 192, 24
— ſchwärmer 159, 13
— ſpanner ..163, 45
— ſpinner 161, 24 u. 29
Fidonia 156, 45; 163, 45
Filaria .215, 10; 216, 10
Filzlaus ..115 Fig.; 194

§.

Finger .....2 Fig.; 11
— fisch 99, 8; 100, 8
— spitzen.....14, 1
Finken...68, 17; 69, 17
— habicht 65
Finnen 215, 24; 218, 24
Finnfisch. 58; 59
Firste 60
Fischaar.....65
— adler 31 Fig.; 64; 65
— bein 18 Fig.; 58; 59
— brühe 100, 11
— chen 185
— eidechsen.....90
— haut 117
— laus ..202, 29; 212
— leim.....97; 116
— molche 84b
— otter 36; 37
— reiher 79, 26
— säugethiere.....57
— teufel 102, 5
Fische 18; 21, 4; 23; 97; 98
— , deren Blutlauf 7 Fig.; 18
Fischersandwurm ..216, 3
Fissirōstres.....68, 6
Fissurēlla 221, 5; 224, 68
Fistularia.....103; 104
Fistulāti.....98; 103
Flammingo.....78; 79
Flaumfedern.....60
Flechsen 12
Fledermaus-Rollschnecke 224, 62
Fledermäuse 14, 1; 21, 5; 26 a u. b; 33; 34
Fleischblumenfliege..172, 24
— fliege 169, 20; 172, 20
— fresser.....26b
Fleischerhund.....37
Flete.....118, 5
Fliederblattlaus...192, 2
Fliege, spanische 138
Fliegen..... 168; 169
— schnäpper 37 Fig.; 68, 1; 69, 1
— vogel.....69, 37
Fliegender Sommer 198
Floh..102 Fig.; 169, 9; 171
— bartmücke....170, 2
Flohkäfer 83 Fig.; 127, 91
— krebse 121 Fig.; 202, 13; 205

§.

Flohpulver 171, 9
Flora 5
Floretseide 161, 23
Florfliege ...175; 177, 8
Flossen d. Fische 64 Fig.; 97
— — der Insekten 105 Fig.; 176
— — füße d. Säugeth. 17 Fig.; 54
— — — d. Krebse 121 Fig.; 205
— — füßer 221b; 223
— — säugethiere 26a; 54
Flückhäringe.....107, 15
Flugeidechse.....89, 9
— fisch ..... .107, 14
— hahn 101, 2; 102, 2
— hörnchen 42
Flügevogel 39 Fig.; 69, 8
Flügel 12
— der Insekten..122
— decken 71 Fig.; 122; 125
— hornschnecke ..221, 59; 224, 48
— lose Insekten 124b; 188
— mahl d. Insekten 86 Fig.; 146
— scheiden 125
— scheider 125
— schnecke 155 Fig.; 221, 58; 224, 47
— zellen 86 Fig.; 146
Flunder 107, 15
Flußaal 1
— adler .....
— barsch 64 F
— garneele
— krebs 22
— muschel
— napfschn
— otter ...
— perlmusch
— pferd .....
— pricke.....120
— schildkröte.....86
— schwamm 239
— schwein 43, 14
— schwimmschnecke 224, 38
Flustra 235; 238
Föhreneule.....162, 40

§.

Foraminifēra 222, 6
Forelle.....107, 1
Forficŭla ...180, 9; 183
Forficulina 183
Formica 147, 19; 153, 19
Fortpflanzungssystem 10; 20
— — der Fische....97
— — der Reptilien 83
Fossile Fische 97; 120b
— — Saurier 99
— — Thiere.....7
Fregattenvogel 81, 7; 82, 7
Freikiemer.....98a; 112
Freßspitzen 123c
Freßwerkzeuge der Insekten 122c
Frettchen 37
Fringilla...68, 17; 69, 17
Frischling.....48
Froschfische 98b; 101, 5; 102, 5
— hecht.....107, 12
— larven.....94
— lurche 84b; 95; 96
— regen 83
— reptilien 94
Frösche 17; 21, 4; 22, 3; 84b; 95, 4; 96, 4
Frostschmetterling 163, 46
Fruchtfresser....26b; 39
Frugivŏra 39
Frühlingsfliege 21b; 176; 177, 4
— — käfer..130, 20
— — roßkäfer..130, 20

...uchs (Säugethier)...37
...Schmetterling)
...95 Fig.; 157
...131, 36
...Insekten
...Fig.; 122
...233
...Fig.
...214
...231
— — schaft 122
— — würmer 215; 216
Fühlfäden 14, 1
— käfer 145
Fulgŏra. 188, 17; 191, 17
Fulica 27 u. 51 Fig.; 78; 79
Fulicariae 78
Fuligŭla. ...81, 5; 82 5

§.

Functionen 10
— der Ernährung..15
Fünffeder.....167
— zehige Käfer...126
Fungia...234, 2; 236, 2
Furchenzähne 83
Furchtkäfer.....143, 92
Fusus...221, 52; 224, 42
Fuß.....11
— der Insekten...122
— der Weichthiere .226
— ballen..99 Fig.; 168
— beuge.....61
— glieder.....Fig. 85
— stummel 91
— wurzelknochen 2 Fig.; 11

Futterwanze.....189, 7

Gabelbein.....62
— — därmer..215, 8; 217, 8
— — schwanz .161, 25
— — weihe 65
Gabler.....53
Gadini.....108
Gadus....108, 1; 109, 1
Gährungspilz.....20
Galago.....31
Galathea.....157, 6
Galea.....174; 179
Galeodes..196, 4; 197, 4
Galeopithecus...33; 34
Galerites..229, 5; 231, 5
Galle.....16; 17
Gallen-Aleppo.....15
— — blase...
— — blattlau
— — bohrer
— — od. G
Galleria
Galler
Galler
Gallic
Gallina
Gallinac
Gallinula
Gallionella 241, 11; 243, 11
Gallmücken 168; 169, 3; 170, 3
Gallus.....73; 74
Gallwespen....98 Fig.; 146; 147; 152
— — befruchtung 152
Gamasus 196, 21; 200, 21

§.

Gamma-Eule....162, 41
Gammarus....121 Fig.; 202, 13; 205, 13
Gangbeine der Vögel 22 bis 25 Fig.; 61
— — der Insekten.....122
— füße..25 Fig.; 61
Ganglien.....13, IV.
— — system 10; 13, IV.
Ganglion (Markknoten) 121
Ganoidei.....120b
Gans...54 Fig.; 81; 82
Gänsefuß-Eule...162, 39
Garnaten od. **Garneelen** 202, 3 u. 4; 203, 3 u. 4
Garrulus..68, 31; 69, 31
Gartenammer....69, 14
— — haarmücke..170, 6
— — laubkäfer .130, 27
— — laufkäfer...128, 3
— — rosen-Wickler 165, 57
— — rothschwänzchen 69, 10
— — schläfer.....43
— — schnirkelschnecke 224, 13
— — schlammfliege 172, 29

Garum..100, 11; 107, 16
Gasterobranchus...119; 120

Gasteropoda.....224
Gasterosteus....101, 4; 102, 4
...cha 96 Fig.; 156, 24; 161, 24
...23; 219
...31; 172, 31
.....8
...60 Fig.; 83
...89 u. 90, 3
.....53
...ndes 1 Fig.
...ühler..122a
Fühler..122a
Gecarcinus 202, 9; 203, 9
Geckonen.....89
Gefäße.....18
Gefäßhaut.....14
— system....10; 18
Gefühlssinn.....14
Gehäuse.....220
Gehefstete Füße 21 Fig.; 61

§.

Gehirn.....3 Fig.; 13
— knoten..121; 220
— nervenpaare 3 Fig.
— queise.....172, 31
Gehörgang, äußerer 1 Fig.
— organe der Insekten.....122
Gehörssinn.....14
Geier 30 Fig.; 63 b; 64; 65
Geistchen.....156, 11
Geißel der Fühler 201; 122, 9
Gekämmte Fühler..122a
Gekko.....89; 90, 19
Geknickte Fühler....122a
Geknopfte Fühler 95 Fig. 122a
Gekröse.....19
Gelappte Fühler...122a
Gelbartsche.....69, 17
— ling.....156, 10
— rand..75 Fig.; 133
Gelenkfortsatz 1 Fig.; 11
— kopf...2 Fig.; 11
Gemeinfliege.....169, 22
Gemmen.....233
Gemse.....52; 53
Gemsenkugeln.....52, 2
Gemüseeule.....162, 39
— mücke....170, 8
Generatio.....20
Generation.....20; 155
Generationswechsel...20
Genus.....8
Geocores.....189, 1
Geometrae.....156, 7
Gerabflügler.....179
— horn...141 Fig.; 221, 13; 222, 8
Gerber.....142, 80
Geruchssinn.....14
Gesägte Fühler....122a
Geschlecht.....8
Geschmackssinn.....14
Geschulterte Flügel 156, 8
Gesicht.....11
— — der Insekten 122
Gesichtssinn.....14
— — winkel.....28
Gestielter Hinterleib 90 u. 117 Fig.; 195
Gewinde der Schnecken 128 Fig.; 220
Gewitterfliege....172, 24
Gewölle.....62
Gewundenes Gehäuse 128 Fig.; 220

§.

Gibbon.....31
Gießkanne 226, 117
Giftdrüse.....91
— — der Insekten 122
— kuttel.....224, 65
— milbe 200, 22
— otter.....92, 10
— schlangen 84b
— wanze 200, 22
— zähne..60 Fig.; 83; 91
Gimpel.....69, 17
Giraffe.....52; 53
Gitterflügler.....174
— laufkäfer...128, 3
Glander.....139, 68
Glanzschupper.....120b
Glasflügler.....160, 19
— körper.....14
— schlange 89, 19; 90, 19
— schnecke....221, 35; 224, 20
Glattbiene .147, 26; 154 26
— nasen.....26b; 33
— natter 93, 5
— roche 118, 5
Gleichflügler 156, 19; 188
— füßer.....207
Gleißkäfer 129, 12
Gliederthiere....23; 121
Gliedmaßen...2 Fig.; 11 u. 12
Glimmerchen.....224, 64
Glires 26a; 41
Glockenthierchen 241, 15; 243, 15
Gloměris ..202, 23; 208
Glossāta 155
Glossologie.....9
Glossopētrae 117
Glucken.....156, 24
Gnitzen.....170, 2
Gnu 52; 53
Gobio....106, 7; 107, 7
Gobioidei 101
Gobius ...101, 9; 102, 9
Goldadler.....65
— after.....161, 29
— ammer.....69, 16
— amsel 69, 5
— auge.....177
— brasse 99, 28; 100, 28
— fasan 74
— fisch.....107, 4

§.

Goldfliege. 172, 22
— fuchs.....37
— hähnchen...68, 14; 69, 14
— karpfen....100, 14
— maulwurf..36; 37
— mund 224, 31
— puppe 155
— raupe 215, 1; 216, 1
— regenpfeifer 79
— schleihe 107, 6
— schmied 128, 3
— vogel.....157, 7
— wespe...147; 153
— wolf 37
Gondeln 221, 63
Goniatites 136 Fig.; 222, 7
Gorami.....90, 21
Gordius.215, 13; 216, 13
Gorgonia 187 Fig.; 234, 18; 237, 18 u. 19
Gottesanbeterin.....182
Grabbiene.....122
— heuschrecke 180
— käfer.....128, 6
— wespe 153
Gracŭla 69, 17
Grabflügler ..124b; 179
Grallae.....63a; 78
Grasblattkäfer ..143, 94
— eule.....162, 37
— frosch 96, 4
— hecht.....107, 12
— hüpfer...180; 181
— mücken 69, 10
Grätenfische.98a u. b; 99
Grauartsche.....69, 17
— drossel.....
— fink.44 Fig.
— gans..
— kehlchen
— lachs.
Greif.....
Greiffüße..
Greßling...
Griebeln...
Grimmdarm.
Grimpe....
Gröppe....
Großkopf.....161, 29
— mäuler 84b; 92; 93
— ohr 33; 34
— schnäbler 63a; 66; 67
Grubenkopf....127 Fig.; 215, 22; 218, 22
Grundel.....106, 10

§.

Grundstoffe.....6
— wolle 25
Grünader.....157, 9
Gründeln 80
Gründling.106, 7; 107, 7
Grünspecht 67
Grus ...50 Fig.; 78; 79
Gryllen ...21, 4; 180, 3; 181, 3
Gryllotālpa 180, 4; 181, 4
Grill-Lumme 82, 20
Gryllus ...180, 3; 181, 3
Gryphaea 165 Fig.; 221, 83; 226, 78
Gryphus ..... .65
Guacharo-Oel....69, 42
Guanako 53
Guano 70
Gueparb.....37
Gulo 36; 37
Gummi 6
— lack.....193, 25
— — -Schildlaus 193, 25
Gürtelschwebfliege..172, 30
— thiere 26b; 44; 45
— qualle 229, 14
Gymnodōntes.....113
Gymnosŏma ...169, 21; 172, 21
Gymnothōrax..110; 111
Gymnōtus 110; 111
Gypaëtos.....64; 65
Gyrīnus ...127, 44; 133

.....25, 3
elraupe 156, 30
.....18
180, 14; 186
6; 170, 6
232, 17
..25
66, 59
101, 10; 102, 10
— stern 229; 231
Habicht.....64
Habichtsfliege ..169, 11; 172, 11
— — muschel 165 Fig.; 221, 83; 226, 78
Hackengelenk.....61
Hadēna..156, 38; 162, 38

§.

Haftfuß ...180, 15; 186
— kiefer.....98a; 113
— kiemer....98a; 116
— lappen 99 Fig.; 122; 168
Hahnentritt.....62
Häher....68, 31; 69, 29
Hähnchen 127, 89; 143, 89
Hai.....20
Haibschnucken..... .53
Haifisch...68 Fig.; 98b; 117; 118
Hainbuchenspinner..161, 21
— flohkäfer....143, 91
— schnirkelschnecke 224, 13
Hakenfortsatz.....11
— lachs.....107, 1
— würmer....218, 9
Hältster.....69, 29
Halbaffen..26b; 30; 31
— decken 111 Fig.; 122
— flügler..124b; 187
— hufer..26b; 42; 43
— hühner.....73
— ringe.....91
Halcyonidae.....66
Haliaëtos...31 Fig.; 64; 65
Haliōtis..221, 16; 224, 67
Halmatūrus.....39; 40
Halobātes S. 133; §. 122
Halsbandraupen.156, 24
— — regenpfeifer 79
— — wickelschnecke 224, 58
— dornraupen..156, 2 u. 4
— flossen..64 Fig.
— käfer 126
— theil d. J...
— wirbel...
Haltappare...
Halter...
Halt...
Halt...
Hamau...
Haematop...
172, 36
Haematōpus..78; 79, 19
Hammel.....53
Hammer.....14, 5
— —, polnischer 226, 80

§.

Hammerfisch...117; 118
— — muschel..221, 90
— — schmied..161, 22
Hamster 21b; 42; 43, 10
Hand.....11; 25
— flügler....26b; 32
— habe....2 Fig.; 11
— wurzelknochen 2 Fig.; 11
Hänfling od. Artsche 69, 17
Hapāle.....30; 31
Harder...98b; 99; 100
Harfe..221, 65; 224, 55
Häring...21b; 106, 15; 107, 15
— , fliegender 107, 14
Häringskönig ...107, 15
Harlekin.... ...163, 48
Harmelen.....37
Harnblase.....62
Harpa..221, 65; 224, 55
Harpālus..127, 7; 128, 7
Harpyia 156, 25; 161, 25
Harthäuter...98b; 113; 114
Harzgallmücke....170, 3
— nachtigall....69, 17
— rüsselkäfer..139, 69
Haselblattroller..139, 56
— huhn.....74
— maus.....43
— nußbohrer..139, 70
— — wurm..139, 70
— schläfer.....43
— wurm.....90, 17
Hasen.....26b; 42; 43
— mäuse 26b; 42; 43
...hund.....37
....15 Fig.; 51
...he.....69, 15
...e.....69, 15
...ier...82, 18
.....116
...97; 107, 3; 116
.....82, 3
.....82
...ücke...69, 10
...108 Fig.; 181, 3
— hahn.....74
— huhn.....74
— katze.....21d; 37
— marder.....37
— maus.....43

§.

Hausratte.....43
— rothschwänzchen 69, 10
— schaf.....53
— schwalbe....69, 38
— schwein.....48
— sperling.....69, 17
— spinne.....196, 9; 198, 9
— taube.....71
— ziege.....53
Haustellum 100 Fig.; 168
Haut.....14; 25
— drüsen.....14
— flügler.....146
— gebilde.....6
— poren.....14
— schmiere.....14
— skelett.....12; 121
— wärzchen.....14
Häute.....25, 3
Heberwurm 229, 2; 230, 2
Hecht 98b; 106; 107, 12
— barsch.....100, 3
— könig.....107, 12
Heckenweißling 91 Fig.; 157, 9
Heerschnepfe.....79, 14
— wurm.....170, 2
Hefe.....20
Hefenalge.....20
Heftzeher.....63b; 66
Heidelerche.....69, 4
Heidenhuhn.....74
Heiligbutt.....109, 6
Heiligenbein.....11
Heimchen 108 Fig.; 181, 3
Helix 221, 25 ꝛc.; 224, 13
Helm.....174; 179
— igel.....229, 5
— kerfe.....179
— kuckuck.....66; 67
Helmintha.....215
Hemerobius 175; 177, 8
Hemipodius.....73
Hemiptĕra...124b; 187
Henīochus 99, 19; 100, 19
Henne.....74
Hepiālus 156, 20; 161, 20
Herbstkleid.....60
Hermaphroditen.....20
Hermelin.....37
— — spinner 161, 25
Heros.....142, 81
Herpēstes.....36; 37

§.

Herz..5—7 Fig.; 11; 18
— beutel.....18
— kammern 18
— muschel ...221, 113; 226, 106
— ohren.....18
— schläge.....18, D.
— venen 18
Hesperia ..156, 12; 158, 12
Hesperĭdae.....156
Heteromĕra.....126
Heteropŏda ....224, IV.
Heteropŏra 234, 14; 237, 14
Heteroptĕra 188
Heukrebs 202, 13
— pferdchen.....181, 5
— schrecken 21 b; 180; 181
— — vogel 68, 21
— thierchen....243, 17
Himantŏpus..78; 79, 19
Himbeerkäfer....129, 16
— — würmer .129, 16
Hinterbeine d. Insekten 122
— brustring.....122
— flügel d. Insekten 155; 122
— glieder 11
— haupt d. Insekt. 122
— hauptsbein 11
— — loch....11
— leib 121; 122
— — d. Insekten, sitzender 86 Fig.; 122
gestielter 90 Fig.; 122
— rand.....155
— — d. Muscheln 132 Fig.; 220
— rücken 168
Hipparchia 156, 6; 157, 6
Hippobŏsca ...169, 37; 173, 37
Hippocāmpus 103; 104
Hippopotămus ..47; 48
Hippŏpus 221, 109; 226, 89
Hirnknoten...4 Fig.; 13
— schale 11
Hirsch.....26 b; 52; 53
— bezoar.....53
— eber 13 Fig.; 47; 48

§.

Hirschhorn.....25, 2
— käfer 127, 28; 130, 28
Hirūdo 215, 16; 217
Hirūndo..68, 38; 69, 38
Hister..127, 32; 131, 32
Hobelwanze 189, 7
Hochgucker 106, 11
— zeitskleid 60
Höcker, großer 2 Fig.; 11
— schwan 82
— raupen ...156, 27
Hofgans.....82, 2
— raum d. Muscheln 131 Fig.; 220
Hohlhäringe.....107, 15
— hörner.....52
— rüsselkäfer ...139, 64
Höhlenbär 37
Höllennatter.....93, 10
Hollunderspanner 163, 50
Holothuria 229, 1; 230, 1
Holothurodea 230
Holzbock 196, 23; 200, 23
— fresser...126; 127; 140; 141
— hacker.....66
— häher.....69, 31
— laus..175; 178, 12
— raupen.....156, 28
— taube ..49 Fig.; 71
— wespen..146; 147; 149
Homărus 202, 2; 203, 2
Homo.....28
Homoptĕra 188
Honigbär.....37
— biene 84 u. 90 Fig. [illegible]
— dachs [illegible]
— kuckuck [illegible]
— sauge [illegible]
— schab [illegible]
— thau [illegible]
Hopfenspinn [illegible]
Hopfer [illegible]
Hornbock [illegible]
— fisch 16 [illegible]
— haut [illegible]
— hecht [illegible] 13
— korallen 233
— schlange 92, 12; 93, 12
— schnecke....221, 51; 224, 41

§.

Hornisse.....153
Hornthiere 26 b; 52; 53
— vieh.....53
— vogel.....66
Hornungshecht...107, 12
Hörnerraupen.....156, 5
Horst.....64
Hosen der Insekten 154, 30
Huf 25
— eisennase 9 Fig.; 33; 34
— säugethiere 26 a; 46
Hüftbein.....2 Fig.; 11
— kopf d. Insekten 122
— loch.....2 Fig.; 11
— nerv....3 Fig.; 13
Hüfte d. Insekten 85 Fig.; 122
Hühner 63a u. b; 73; 74
— — ei.....224, 50
— — stelzen 63 b; 78; 79
— — hund 37
Hülsensamenkäfer...138
— — stecher ...139, 59
— — würmer 106 Fig.; 177
Hummeln 147, 31; 154, 30
Hummer..202, 2; 203, 2
Hund 21 b; 26 b; 36; 37
— , fliegender.....34
Hundehaarling.....186
Hundsteke 119 Fig.; 200, 23
— zahn.....11
Hunger 17
— — zwetschen 192, 23
Hüpferling.....211
[illegible] 116
[illegible] ...221, 9; 223
[illegible] ...36; 37, 13
[illegible] 37, 13
[illegible] 8
[illegible] 242, 3
[illegible] 4, 6;
[illegible] 242, 2
[illegible] 200, 18
[illegible] 90
[illegible] 27, 46; 134
Hydrocantharĭda ..126; 127; 133
Hydrochoerus...42; 43
Hydrocŏres.....190
Hydromĕtra....188, 11; 189, 11

§.
Hydrophilīna 126; 127; 134
Hydrophĭlus 75 Fig.; 127, 45; 134
Hyla 95, 3; 96, 3
Hylaeus 147, 27; 154, 27
Hylesīnus 127, 77; 140, 77
Hylobătes 30; 31
Hylobius 127, 63; 139, 63
Hylotŏma 147, 1; 148, 1
Hymenoptĕra 124 b; 146
Hyponomeuta ..156, 60; 166, 60
Hypophloeus ..127, 48; 135
Hypudaeus 42; 43
Hystrix.....42; 43

Jacobsmantel...226, 85
Jagdfalke.....65
— häringe.....107, 15
— leopard.....37
— spinnen.....196
Jaguar.....37
Janthīna 224, 54
Jassana 79
Ibex.....53
Ibis.....78; 79
Ichneumon 36; 37; 150, 9
Ichneumon...36; 147, 9 150, 9
Ichneumonĭdae 150
Ichthydium 241, 1; 242, 1
Ichthyocolla.....116
Ichthyosauri.....90
Jerboa.....43
Igel.....26 b; 36;
— fisch.....
Ilk .....
Iltis.....
Ilysia ....
Imāgo
Imm
Indi
Indi
Indri
Inēpti
Infusions
Infusoria 21, 2 23; 240
Innenrand d. Flügel 155
— — d. Gehäuses 128 Fig.; 220
Inocerămus 166 Fig.; 221, 85; 226, 83

§.
Inquilinen.....152
Insecta..14, 5; 23; 125; 122
— — ametabŏla 124 b
— — metabŏla..124 b
Insekten.....122
— — fresser 26 b; 36
— — pulver...171, 9
Insectivŏra 36
Inseparables.....67, 7
Instinkt.....21 b
Intestīna 16
Inŭus 30; 31
Jo.....157, 3
Jochbein.....2 Fig.; 11
— fortsatz 11
Jocko 31
Johannisblut...193, 25
— — beerspanner 163, 45
— — — schwebfliege 172, 30
— — haarmücke 170, 6
— — schwärmer 160, 18
— — würmchen 21, 2; 129, 18
Iris 14, 2
Isis 186 Fig.; 237, 16 u. 17
Isocardia 221, 114; 226, 107
Isopŏda.....207
Jubarte 59
Jugendkleid 60
Jugulāres.....98; 101
lus.....202, 20; 208
ernkoralle 184; 234, 8; 237, 8
.....130, 26
23; 200, 23
...66; 67
8, 1; 109, 2
.....50
124 b; 125
...201, 21
oder
— ...e ..221, 122; 224, 73
Kaffee-Schildlaus 193, 25
Kahlbäuche ...98 b; 110
— rücken 110
Kahnbein.....2 Fig.; 11

§.
Kahnschnabel.....78
— kielschnecke..224, IV.
Kaiman.....89, 90
Kaiseradler 65
— mantel.....157, 2
Kakadu 66, 67
Kakerlak...109 Fig.; 28; 182; 224, 51
Kalanderlerche 42 Fig.; 69, 15
Kalb.....53
Kalmar...221, 1; 222, 1
Kameel.....52; 53
— — garn 53
— — halsfliege ...175; 177
— — mist.....25, C.
Kämelgarn....25, 3; 53
— ziege 53
Kamichi.....79
Kammgeier 64
— kiemer.....224
— muschel 168, 169 u. 172 Fig.; 221, 92; 226, 85
— schnecke...221, 30; 224, 25
— schupper....120 b
Kampfhahn.....78; 79
Kanalkäfer 128, 8
Kanarienvogel....69, 17
Känguruh.....39; 40
Kaninchen.....21 d; 43
Kantenlilie 229, 12
Kapaun 74
Kappenvogel 66
Kapschaf 82, 13
Kapuziner.....130, 25
— — affe.....31
Karausche.....107, 4
Karmin.....193, 25
Karpfe ....98 b; 106, 3; 107, 3
Karpfenkönig 107, 3
Karthäuserkatze ...37, 14
Kartoffelwurm...130, 25
Kaschmirziege.....53
Käsefliege 169, 25; 172, 25
— made.....172, 25
— milbe 118 Fig.; 200, 19
— wurm 172, 25
Kastanien 49
Kasuar 75; 76
Katzen 21, 4; 26 b; 36; 37
— maki.....30; 31

§.

Kaukasische Rasse.....28
Kaulbarsch 99, 4; 100, 4
— kopf.....102, 3
— quappe 62 Fig.; 94; 102, 3
Kauri.....224, 51
Kauz.....64; 65
Kauzähne.....11
Kegel..221, 62; 224, 52
— schnäbler 63 b; 68; 69, 3
— schnecke.....224, 52
Kehle der Insekten..122
Kehlflosser.....101
— füßer.....202; 206
— kopf.....19
— stachelflosser 98; 101
— weichflosser 98; 108
Keilbein.....2 Fig.; 11
— haken.....79, 15
Keiler.....48
Keimbildung.....20
— bläschen.....20
— korallen.....235
— säcke.....20
Kellereſel.....207, 18
— wurm 202, 18; 207
Kerbräderthierchen..241
— thiere.....121
Kerfe.....122
Kermeskörner...193, 25
— — schildlaus 193, 25
Kernbeißer.....69, 17
Kerze.....124, 52
Keulenförmige Fühler 92 Fig.; 122 a
— hörnige Käfer 126; 127; 131
— käfer...127, 100; 145
Kiebitz.....78; 79
Kiefern.....11; 24; 60
— bastkäfer..140, 77
— blattwespe 148, 3
— borkenkäfer 140, 74
— gallmücke...170, 3
— knospen-Wickler 165, 58
— processionsspinner 161, 24
— rüsselkäfer 139, 63
— schwärmer 159, 13
— spanner..163, 45; 163, 49
— spinner...161, 24
— taster.. 122

§.

Kieferntrieb-Wickler 165; 58
Kiekbeeren.....170, 3
Kieleidechse.....90, 12
— füßer.....224, IV.
— natter.....92, 6
— schnecke.....224, IV.
— schuppen.....83
— wanze 188, 2; 189, 2
Kiemen..18, D.; 19; 97
— — der Insekten 105 Fig.; 122
— — deckel.....97
— — füßer.....202
— — öffnungen 68 Fig.
Kinderwurm.....216, 12
Kinkhorn 224, 45; 224, 57
Kinn.....122 c
— backen 104 Fig.; 122 c
— furche.....91
— laden.....122 c
— — taster....122
Kinostērnon....86; 87
Kirschenbaum-Blattlaus 192, 21
— — spinner..161, 24
Kirschfink.....69, 17
— vogel.....69, 5
Kiwi.....24; 76
Klaffende Muscheln 220
— muschel...221, 107; 226, 100
Klaiber.....69, 32
Klammeraffe....30; 31
— — füße 20 Fig.; 61; 201
Klappbrust.....86
— muscheln...221, 86
Klapperschlange..92
— — storch
Klasse.....
Klauen der
— — glie
— — kiefer
Kleiderlaus
— — mott
— — voge
Klein-Schmet
156, IV.
Kleisterälchen 20; 216, 14
Kletterbarsch....100, 20
— — fisch.....99, 20
— — füße 22 Fig.; 61

§.

Klettervögel 63 a u. b; 66
Klima.....21
Klippfisch.....109, 1
Klopfkäfer 127, 13; 129, 13
Klumpfisch 66 Fig.; 114
Knebelbart.....168
Kniescheibe...2 Fig.; 11
Knoblauchkröte.....96, 7
Knöchel.....2 Fig.; 11
Knochenfische.....99
— — gerüst 2 Fig.; 11
— — hecht...106, 17; 107, 17
— — mark.....11
— — system...16; 11
— — thiere.....23
— — waaren....25, 4
Knollenkäfer.....131, 37
Knoppern.....152, 17
Knorpelfische...98 a u. b; 112
Knospenbildung 20; 233
Knöterich-Blattkäfer 143, 94
Knurrhahn 101, 1; 102, 1
Koala.....39; 40
Kochenille.....193, 25
Kofferfisch.....113
Kohlblattlaus...198, 21
— eule.....162, 39
— fliege.....172, 24
— meise.....69, 13
— raupe.....157, 9
— walzenfliege 172, 17
— wanze.....189, 3
— weißling 13; 157, 9
— — —, dessen Nerven 4 Fig.
— zünsler....164, 54
[illegible]hlenstoff.....6
[illegible].....155
[illegible].....96, 11
[illegible]8, 37; 69, 37
[illegible]....100, 9
[illegible].....69, 28
[illegible]
[illegible]0, 5
[illegible]..65
[illegible]30, 25
[illegible]154, 30
[illegible].....65
— — [illegible]..234, 17; 237, 17
— — schlange....93, 3
Kopf.....2 Fig.; 11
— der Honigbiene 84 Fig.

§.

Kopf der Insekten ..122
— brustſtück.....121
— füßer ...221 b; 222
— laus 115 Fig.; 121; 194
— loſe Krebſe.....202
— nervenpaare 3 Fig.
— ſchild der Inſekten 84 Fig.; 122
— weichthiere...221 b; 122

Koprolithen 90
Korallen.....233
— — moos....239, 2
— — prunkadder 93, 8
— — riffe.....233
— — ſtamm.....233
Korallinen.....239
Kornferkel.....43
— motte 98 Fig.; 166; 59
— wurm.....127, 68
— —, rother 139, 59
— —, ſchwarzer 127, 68; 139, 68
— —, weißer 166, 59
Körbchen d. Bienen 154, 30
Körnerfreſſer....68; 69
— — lack.....193, 25
— — laufkäfer...128, 3
— — ſchupper...120 b
Körperarterie.....18
Kothſcheltweſpe..150, 10
— dungfliege...172, 26
— wanze.....198, 10
Krabben....202; 203, 7
— — ſpinne...196, 6; 198, 6
Krähe.....69
Kraken .....
Krallen der
— — der
— — af

Kräuterdieb 127, 15; 129, 15
Krebs.....14, 5; 201
— , echte 202
— , molukiſcher..209

§.

Krebsaugen.....203, 1
— ſtein 203, 1
Kreiſelſchnecke..221, 39; 224, 31
— ſtern 234, 3; 236, 3
Kreislauf des Blutes 5—7 Fig. 18, D.
— — , großer u. kleiner 18, D.
— mundſchnecke...221, 42; 224, 21
— ſchupper.....120 b
Kreuzbein 11
— kröte.....96, 4
— otter 60 Fig.; 91; 93, 10
— ſchnabel 68, 18; 69, 18
— ſpinne....196, 12; 198, 12
— wirbel 2 Fig.; 11
Kreuzung.....8
Kriebelmücke 169, 5; 170, 5
Kriekente.....82, 3
Krokodile..84 b; 89; 90
Kronendornkoralle 237, 14
— — fortſatz 1 Fig.; 11
— — koralle..234, 14; 237, 14
— — zahn..1 Fig.; 11
Kronſchnecke 151 Fig.; 221, 44; 224, 27
Kropf.....62
— gans.....81, 9
Kröte 84 b; 95, 8; 96, 8
Krötenſteine 102, 8
Krüppler.....44
Kruſtenthiere..24 b; 201
Kryſtallkörper.....14
— thierchen 241, 3; 242, 3
— [illegible]he 109 Fig.; 182
— [illegible]92, 14; 93, 14
— [illegible].....207, 17
— [illegible]e 169, 21; 172, 21
— [illegible]126; 127; 144
— [illegible]el..221, 116; 226, 109
— [illegible]rchen 188 Fig.; 241, 8; 243, 8
Kuh.....53
— vogel.....69, 25
Kuckuck 34 Fig.; 63 b; 66; 67

§.

Kuckucksbein.....11
— — ſpeichel..191, 19
Kunſtproducte.....1
— ſprache.....9
— trieb.....21 b
Kupferlachs.....107, 1
— — natter....93, 10
Kuppe.....60
Kuppennagel.....25
Küraßthier.....45
Kürbisbandwurm 127 Fig.; 218, 23
Kurzflügler...126; 127; 132
— hals.....139, 61
— ſchwänze 202; 203
— züngler...84 b; 89
Kutſchenmotte....166, 59
Kutſcherfiſch 99, 19; 100, 19

Laberdan 108, 1; 109, 1
Labium.....122 c
Labmagen...15 Fig.; 51
Labrax.....99; 100
Labroidei.....99, 24
Labrum des Gehäuſes 128 Fig.; 220
— — d. Inſekten 122 c
Labrus..99, 24; 100, 24
Labyrinth.....14, 5
— — koralle 234, 11; 237, 11
Lacerta.....89, 7; 90, 7
Lachesis 92, 13; 93, 13
Lachmöve.....82, 14
Lachs 21 b; 98 b; 106; 107
— forelle 107, 1
Lagomys.....42; 43
Lagostomi.....42
Laſchen.....97
Lama.....52; 53
Lamellicornia 126; 127; 130
Lamia..127, 84; 142, 84
Lämmergeier.....65
Laemodipoda.....206
Lampenſchnecke..221, 19; 224, 14
Lamprete.....120
Lampyris 127, 18; 129, 18
Landbär.....37
— heuſchrecken....180
— krabbe.....203, 9
— krieche..98 b; 99; 100

§.

Landschildkröten 84 b; 86
— schnabelthier 44
— schnecken 220
— vögel.....63 a
— wanzen.....189, 1
Langarm 30; 31
— hals ..202, 33; 213
— händer.....68, 6
— hörner ...175; 177
— schwänze 202; 203
Lanius...36 Fig.; 68, 1; 69, 1
Lappenfüße.....61
— — schnecke 221, 20 u. 32; 224, 30
— — schwänze 180; 185
Laridae.....81
Larus ..58 Fig.; 81, 14; 82, 14
Larven d. Eintagsfliegen 105 Fig.; 176
— — d. Frühlingsfl. 106 Fig.; 177
— — d. Insekten..122
— — gänge.....140
— — schwein.....48
Laterne d. Aristoteles 231
Laternenträger 21, 2; 188, 17; 191, 17
Latonia.....157, 2
Latridius 127, 78; 141, 78
Latschfliege 172, 24
Lauben.....107, 9
Laubfrosch..95, 3; 96, 3
— heuschrecken..180, 5; 181, 5
— holzrüsselkäfer 139, 65
— käfer.....127; 130
— vögel.....69, 10
Lauf.....61
— beine der Insekten 71 Fig.; 122
— füße der Vögel 21 Fig.; 61
— käfer....126; 127; 128, 3
— vögel..63 a u. b; 75
Läufer.....180; 182
Laufliegen ...169; 173
Läuse 115 Fig.; 188; 194
— suchtslaus 20; 194
Laute der Thiere...21, 4
Lazirfisch 100, 29
Lazarusklappe...226, 96
— klappmuschel 226, 84

§.

Leben.....3
Lebendiggebären 20
Lebensbedingungen...21
— erscheinungen .21
Leber.....11; 16
— egel.....217, 19
— thran.....109, 1
Leder.....25, 3
— blattkäfer ..143, 94
— haut 14
— fische.98 b; 99; 100
— laufkäfer 71 Fig.; 128, 3
— raubkäfer....128, 3
— schildkröte..86; 87
Lefze 100 u. 104 Fig.; 122, C
Legeröhre..88 Fig.; 146
Leibesringe 122
Leichenwürmer...172, 20
Leichhuhn.....65
Leierschwanz.....68, 12
Leim.....25, g
Leistenzitzen 25
Leithund 37
Lema...127, 89; 143, 89
Lemming ...21 b; 42, 8; 43, 3
Lemmus....42, 8; 43, 8
Lemur ...30, 11; 31, 11
Lendenwirbel 2 Fig.; 11
Lengfisch.....109, 3
Leopard.....37
Lepadella 241, 4; 242, 4
Lepidoptera 124 b; 155
Lepidosteus 106, 17; 107, 17
Lepisma ..180, 12; 185
Leporina.....
Leptis..169, 14;
Leptura 127, 86
Lepus.....
Lerchen 42 F
— blattsaug
— falke...
— laus...
Lernaea....
Lethargie....
Leuchten im Du
Leuchtkäfer 127, 18; 129, 18
Leucīscus 106, 9; 107, 9
Libellula .216; 175; 176
Lichanotus 30; 31

§.

Licht.....21
— motten .156, 8; 164
Ligamentum 132 Fig.; 220
Ligusterschwärmer 92 Fig.; 159, 13
Lilienhähnchen 21, 4
— käfer.....143, 89
— steine 181 Fig.; 231, 13
Lima 170 Fig.; 221, 91; 226, 87
Limax 221, 131; 224, 12
Limenītis..156, 4; 157, 4
Limnaeus 221, 46; 224, 24
Limnobia 169, 7; 170, 7
Limulus...202, 24; 209
Lindenschwärmer 159, 14
Linke Schale der Muscheln 132 Fig.; 220
Linōta 69, 17
Liothēum..180, 15; 186
Lipăris 156, 29; 161, 24 u. 29
Lippen 100 Fig.; 14, 1
— enrand des Gehäuses 128 Fig.; 220
— entaster 70 u. 84 Fig.; 122
— fische 98 b; 99; 100
Listkäfer oder Listbock 127, 82; 142, 82
Lithodŏmus 221, 101; 226, 93
Lithosia 156, 26; 161, 26
Littorina 221, 46; 224, 32
Lochmuschel 157-158 Fig. 225, 74
— wühle 95, 14; 96, 24
— motivität 12
...180, 5; 181, 5
...Fig.; 81, 3; 82, 3
...käfer
...143, 94
...21
...24
...1
...30 43
...127;
...177
Longimanus.....68, 6
Lootsenfisch.....100, 13
Lophioidei 101
Lophius..101, 5; 102, 5
Lophobranchii.....103
Lophyropŏda.....211

§.

Lophyrus 147, 3; 148, 3
Loricaria 106, 20; 107, 20
Loricata 60
Lork 96, 8
Lota 108, 3; 109, 3
Lothgänge 140
Löwe 37
Löwenäffchen 31
Loxia 68, 18; 69, 18
Lucanus 127, 28; 130, 28
Luchs 37
Luckenzähne ... 1 Fig.; 11
Lucina 221, 115; 226, 108
Luciopera 99, 3; 100, 3
Luft 21
— druck 21
— gliederthiere 122
— kanäle 19
— knochen 11
— löcher 94 Fig., 122 C.
— röhren 87 Fig.; 122 C.; 19
— säcke 60
— vögel ..... 63 a; 64
Lumbricus 215, 7; 216, 7
Lumme 81, 20; 82, 20
Lump 109, 8
Lungen 11; 19
— arterien ... 18; 19
— schnecken 224
— system 10; 19
— venen 18; 19
Lunula ... 131 Fig.; 220
Lupera 127, 93; 143, 93
Lupus (Fisch) 100
— (Säugethier) 37, 12
Lurche 83; 94
Lutra 36; 37
Lycaena .. 156, 7; 15[illegible]
Lychnissamen-[illegible]
Lycosa ... 1[illegible]
Lyctus . 12[illegible]
Lyda ....
Lymex[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
Ly[illegible]
Ly[illegible]
[illegible]
Ma[illegible]
Machetes [illegible], 13; 79, 13
Macroglossa 156, 16; 159, 16
Mactra 221, 100; 226, 104
Maden 122; 168
— fresser 66; 67

§.

Madenhacker 68, 27; 69, 27
Madjes 107, 15
Madrepora 234, 15; 237, 15
Mädchenhäringe . 107, 15
— sommer 198
Maeandrina 234, 11; 237, 11
Maena ... 99, 29; 100, 29
Maenas 203, 7
Maenura .. 68, 12; 69, 12
Märzhecht 107, 12
Mäusebussard 65
Magdalis 127, 58; 139, 58
Magen 16
— der Wiederkauer Fig. 15.
— säcke 240
— saft 17
— thiere 20; 23; 240; 243
Magot 30; 31
Mahl der Muscheln 131 Fig.; 220
— zähne .... 1 Fig.; 11
Maiblumen-Glockenthierchen 241, 15; 243, 15
— käfer 127, 25; 130, 25
— wurm 136
Maja ... 202, 10; 203, 10
Makako 31
Maki 34
Makrele 98 b; 99, 11; 100, 11
Malacopterygii 98
Malacostraca 202
Malapterurus 106, 19; 107, 19
Malayische Rasse 28
[illegible]ermuschel ... 226, 101
[illegible]s 221, 90; 226, 80
[illegible]ga 186
[illegible]ter 158, 12
[illegible]6, 39; 162, 30
[illegible] ... 23; 25
[illegible] 232, 15
[illegible] 48
[illegible] 58
[illegible] 58; 59
[illegible]he 67
[illegible]e ..... 122 c.
Mantel 31
Manguste 37
Manis 44; 45
Manna 191, 18
— cicade 191, 18
— schildlaus . 193, 25

§.

Mantel 220
— thiere 221 b; 227
Mantis 180, 7; 182
Marabu 79, 25
Marcus-Haarmücke 170, 6
Marder ..... 26 b; 36; 37
Marginella 121, 69; 224, 59
Marienkäfer 143, 98
Marikina 31
Marinirte Fische 97
Mark 11; 13
— halsband 4 Fig.; 13, IV.
— knoten 121; 13, IV.
— öl 69, 31
— substanz 13
— verlängertes 3 Fig.
Marmorkegel 224, 52
Marsupialia .... 26 a; 38
Masken-Schnirkelschnecke 224, 13
Mastdarm 16
— bremse 172, 32
Mastodon 12 Fig; 47; 48
Matamata 86; 87
Matrose 129, 19
Maueraffel 122 Fig.; 202, 19; 207
— biene 154, 28
— läufer 68, 34
— schwalbe 20 Fig.; 69, 38
— specht 69, 34
— wespe 154, 28
Maulesel 50
— füßer 202; 204
— thier 50
— wurf 26 b; 36; 37
— wurfsgrylle 180, 4; 181, 4
— wurfsmäuse 26 b; 42; 43
Maurerspinne 198, 5
Maus 42; 43
Mausern 60
Mäuse .... 26 b; 42; 43
Maxilla ..... 122 c.
Medina-Fadenwurm 216, 10
— wurm ... 216, 10
Medusa 229, 16; 232, 16
Medusen 229, 16; 232, 16
— haupt 229, 10; 231, 10
Meeradler 65
— äsche 99, 22; 100, 22

§.

Meerbarbe.....99, 5
— brassen 98b; 99; 100
— dattel.....226, 93
— drache 90; 103 u. 104
— engel....117; 118
— flügelhornschnecke 224, 48
— glocke.....213
— grundel 98b; 101; 102
— hase.....224, 65
— hecht.....109, 4
— jungfer.....59
— katze.....30; 31
— könig.....90
— lilien 181 Fig.; 129, 13; 131, 13
— nadel....103; 104
— nessel 232, 19; 236, 1
— otter.....37
— perlmuschel 226, 95
— pinsel.....216, 4
— rettigblattkäfer 143, 94
— schnepfe.....104
— schwämme.....239
— schwein.....59
— schweinchen .42; 43
— scolopender . 215, 2; 216, 2
— spinne 203, 10; 221, 129; 222, 3
— tanne.....236, 7
— teufel.....102, 5
— trauben.....222, 2
— turban 177 Fig.; 229, 4; 231, 4
— wolf 101, 8; 102, 8
— zahn 221, 4; 224, 72
Megachīle 147, 29; 154, 29
Megaera.....157, 6
Megalotrŏcha 241, 2; 242, 2
Megatherium.....45
Mehlmilbe.....200, 19
— thau.....192
— wurm.....137, 52
— zünsler....164, 53
Meise 41 Fig.; 68, 13; 69, 13
Melania 221, 44; 224, 27 u. 57
Melanosomăta 126; 127; 137
Meldeneule.....162, 40
Meleagrīna 221, 103; 226, 95

§.

Meleāgris.....73; 74
Meles.....36; 37
Melitaea..156, 1; 157, 1
Melithrēptus 68, 36; 69, 36
Melldreck.....192
Meloë.....127, 54; 138
Melolontha 127, 25; 130, 25
Melonenqualle...232, 15
Melophăgus 169, 38; 173, 38
Mensch.....28
Mephītis.....36; 37
Mergus 56 Fig.; 81, 6; 82, 6
Merinoschaf.....53
Merlāngus 108, 2; 109, 2
Merle.....69, 19
Merlucius 108, 4; 109, 4
Merŏdon 169, 28; 172, 28
Mesothōrax...168; 122
Messerfisch.....103
Messerscheide 221, 102; 226, 99
Mestize.....28
Metabŏla (insecta) 124b
Metacarpus.....11
Metatarsus.....11
Metamorphose.....26
— — der Insekten 122
Metathōrax...168; 122
Microlepidoptĕra 56, IV.
Midas.....33; 31
Mießmuscheln 221, 95; 226, 91
Milan.....64
Milben.....196; 200
— spinnen..200, 19
Milch der Fische....
— ner.....
— saft.....
— zähne.....
Millepŏra 23[illegible]
Millepĕdes[illegible]
Milvus.....
Milz.....
Mineralogie.....
— reich.....
Minirkäfer.....
— raupen.....
[illegible]66, 59
— spinne.....198, 5
Misteldrossel.....69, 6
— freund.....132, 40
— käfer.....127; 130
— dungfliege...172, 26

§.

Mistdungkäfer...130, 21
Mitesser.....14
Mitra 156 Fig.; 221, 71; 224, 61
Mitraschnecke 221, 71; 224, 61
Mittelbeine der Insekten 122
— brustringe....122
— finger.....11
— fuß...2 Fig.; 11
— fußknochen.....11
— hand..2 Fig.; 11
— rücken.....168
— schnepfe....79, 14
— zehe.....146
Modiŏla 221, 96; 226, 92
Mohren.....130, 25
Mokoko.....31
Molche.....84b; 95
Moluckischer Krebs 22; 209
Mollūsca 13, IV.; 21; 23; 220
Monăcha.....161, 29
Monas....241, 6; 243, 6
Mönch.....69, 10
Mondfisch.....113; 114
— hornkäfer 127, 22; 130, 22
— schnecke 221, 22; 224, 37
Mongolische Rasse....28
Monĭtor....98, 4; 90, 4
Monŏdon.....58; 59
Monodōnta 221, 29; 224, 33
Monogamisch.....62
Monophagen.....155
Monōtis 221, 93; 226, 86
[illegible]ămăta.....44
[illegible].....147
[illegible].....81, 5
[illegible]....79, 26
[illegible] Fig.;
[illegible] 14
[illegible]
[illegible]17
[illegible]238
[illegible].37
[illegible]136
[illegible]153
Mosaesaurus.....90
Moschus...25, 2; 52; 53
Moschusbock.....142, 81
— thier....52; 53
Mosel-Eidechse.....90
Mosquitos.....170, 1

§.

Motacilla ...68, 3; 69, 3
Motten....156, 10; 166
Möven 58 Fig.; 63b; 81, 14; 82, 14
Mücken...169, 1; 170, 1
— vogel.....69, 37
Muflon.....53
Mugil...99, 22; 100, 22
Mugiloidei.....99, 7
Mühlensteinchen 181 Fig.; 231, 13
Mulatte.....28
Müller 79 Fig.; 130, 25; 127, 52; 137
Mullus....99, 5; 100, 5
Multungüla.....26a; 46
Mundhöhle.....16
— öffnung oder Mündung des Gehäuses 128 Fig.; 220
— saum des Gehäuses 128 Fig.; 220
— theile der Honigbiene 84 Fig.
Mungos.....37
Muraena.....110; 111
Muräne.....110; 111
Murex..221, 55; 224, 44
Murina.....42
Murmelthier.....42; 43
Mus.....42; 43
Musca..169, 22; 172, 22
Muscardine.....161, 23.
Muscheln.....220
— krebse 202, 26; 211
— thiere 221b; 226
Muscicapa 37 Fig.; 68, 1

Myriapoda.....208
Myrmecoleon .175; 177
Myrmecophaga..44; 45
Myrmica 147, 20; 153, 20
Mytilus 221, 95; 226, 91
Myxine.....120
Myxozoa.....219

Nabel des Gehäuses 128 Fig.; 220
— schnecke 152 Fig.; 221, 24; 224, 36
— schwein.....48
Nabis....188, 9; 189, 9
Nachschieber 93 u. 87 Fig; 122; 148; 156
Nachtfalter.....156
— igall.....69, 10
— papagei.....69, 42
— pfauenauge 161, 21
— schwalbe 48 Fig.; 68, 40; 69, 40
Nackte Puppe.....155
— fliege 169, 23; 172, 23
— häuter....84b; 94
— furche.....84b
— schwanz.....203, 5
— zähne 98b; 113; 114
Nagel.....25
— roche.....117, 5
— säugethiere.....27
Nager (Insekten) 124b; 175; 178
— (Säugethiere) 26a; 41
Nagethiere 26a u. b; 41
— zähne..Fig. 11; 43
Nahrung.....17
— stoffe von Insekten 124a
215, 9; 216, 9
92, 9; 93, 9
..215, 9;
216, 9
.....75
221, 7; 224, 70
chenkelfliege
172, 28
.....58
Nase.....14, 4; 24
— nbein....2 Fig.; 11
— nbremse 172, 31
— nthier.....36
Naseus..99, 17; 100, 17
Nashorn.....47; 48
— fisch 100, 17

Nashornkäfer..127, 24; 130, 24
— vogel 63b; 66; 67
Nasua.....36; 37
Natatores.....60
Nates....132 Fig.; 220
Natica 152 Fig.; 221, 24; 224, 36
Natrix.....93, 6
Nattern.....92
— hemd.....83
Naturalien 1
— beschreibung.....2
— erzeugnisse 1
— geschichte.....2
— körper.....1
— kunde.....1
— lehre.....2
— philosophie.....1
— producte.....1
— system.....7
— wissenschaft.....1
Naucoris 188, 14; 190, 14
Naucrates 99, 13; 100, 13
Nautilus 221, 11; 222, 5
Nebelkrähe 45 Fig.; 69, 28
Nebenaugen 84 Fig.; 122b; 168
Necrophorus 73 Fig.; 127, 34; 131, 24
Neger.....14
Nektar.....146
Nelkenkoralle....234, 9; 237, 9
Nematocera 170
Nemertes 215, 15; 216, 15
Nepa 113 Fig.; 188, 13; 190, 13
Neptunsmanschette 238, 22
— — wagen ..224, 63
Nereis....215, 2; 216, 2
Nerinaea 153 Fig.; 221, 50; 224, 40
Nerita..221, 22; 224, 37
Neritina 221, 23; 224, 38
Nerven.....12; 13
— — knoten....13, IV.
— — system 3 u. 4 Fig.
— — — , animal. 10; 13
— — — d. Insekten 112
— — — , vegetativ 10; 13, IV.
Nestelwurm 216, 10
Nestflüchter 63a

§.
Nesthocker.....63 a; 64
Netzflügler...124 b; 174
— haut.....14
— koralle 235; 238
— magen.....51
Neufundländer.....37
Neunauge 119; 120; 122b
— tödter.....69, 1
Neuroptĕra..124 b; 174
Neustria.....161, 24
Nieren.....11
Nilkrokodil.....90, 1
— eckmund.....224, 29
— pferd.....47; 48
— schildkröte.....87
— warneidechse....90, 4
Nimmersatt.....78; 79
Nisus.....65
Nitidŭla 127, 33; 131, 33
Noa's Arche.....226, 97
Noctuacea.....156
Noctuae.....156
Noctūrna.....156
Nodosaria.....222, 6
Nomenclatur.....9
Nonne.....161, 29
Nordkaper.....59
Notenschnecke....224, 62
Notodōnta 156, 27; 161, 27
Notonēcta 188, 15; 190, 15
Nucifrăga 68, 30; 69, 30
Numenius..... 78; 79
Numĭda..... 73; 74
Numulīna 221, 12; 222, 6
Numulit 221, 12; 222, 6
Nußbohrer.....139, 70
— häher.....69, 31
— würmer.....139, 70
Nutriafelle.....43
Nutzen der Fische.....97
— — Insekten 142 a
— — Reptilien..83
— — Säugeth...25
— — Vögel.....62
Nymphe 122 Fig.; 91; 94

Oberarm...2 Fig.; 11
— flügel d. Insekten 122; 155
— haut....14; 220
— kiefer 2 Fig.; 11; 122, C.
— lippe.....122, C.
— rand d. Muscheln 132 Fig.; 220
— schenkel..... 61

§.
Oberschenkel der Insekten 122
Obstblüthennager 193, 71
— spannraupe 163, 46
Oceania 229, 18; 232, 18
Ocēlli.....122 b
Ochs.....53
Ochsengalle.....25, 2
— herz 221, 114; 226, 107
Octōpus 221, 129; 222, 3
Oculīna 184 Fig; 234, 8; 237, 8
Ocyptĕra 169, 17; 172, 17
Ocȳpus 127, 39; 132, 39
Oedemēra 127, 50; 136
Ofen, feuriger...224, 49
Ohiothier.....48
Ohr.....14, 5; 24
— affe.....30
— eule.....64; 65
— finger.....11
— muschel.....14, 5
— robbe.....55; 56
— rüsselkäfer...139, 67
— schlammschnecke 224, 24
— trompete.....14, 5
— wurm....180; 183
Ohrenqualle.....232, 16
Olīva...221, 74; 224, 64
Olive.....221, 74
Olm 14, 2; 18; 94; 96, 12
Oelkäfer...127, 54; 138
Omnivŏra.....48
Onīscus..122 Fig.; 202, 19; [illegible]
Onthophăgus..12[illegible]
Ophidia.....[illegible]
Ophion 147, [illegible]
Ophiosauru[illegible]
Ophiūra..229[illegible]
Opilionīna....[illegible]
Opossum....[illegible]
Orang.....[illegible]
— =Utang[illegible]
Orangen=Admiral 224, 52
— — =Schildlaus 193, 25
Orchēstes 127, 72; 139, 72
Ordensband.....162, 43
Ordnung.....8
Ordo.....8

§.
Organ.....3
Organisation.....4
Organische Körper..3; 4
Organist..68, 20; 69, 20
Organogene.....6
Organographie.....10
Organsystem.....10
Orgelkoralle 182 Fig.; 234, 4; 236, 4
Orgyia 156, 31; 161, 31
Oriŏlus.....68, 5; 69, 5
Ornithorhȳnchus 44; 45
Orthagoriscus 66 Fig.; 113; 114
Orthocĕras 141 Fig.; 221, 13; 222, 8
Orthoptĕra..124 b; 179
Ortolan.....69, 16
Ortygomētra....78; 79
Orȳctes 127, 24; 130, 24
Osmērus..106, 2; 107, 2
Osmȳlus....175; 177, 9
Osphromĕnus...99, 21; 100, 21
Os Sepiae 222, 2; 222, 9
Ostacanthi.....98 a; 99
Osteozōa.....23
Ostracion.....113; 114
Ostrea..221, 82; 226, 77
Oestrus 169, 31; 172, 31
Otaria.....55; 56
Otion.....202, 33; 213
Otiorrhȳnchus 127, 67; 139, 67
Otis.....78; 79
Otolīcnus.....30; 31
Otter...60 Fig.; 92, 10
[illegible] köpfchen....224, 51
[illegible]....52; 53
[illegible]0; 224, 61
[illegible]2; 132, 42
[illegible]....37
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]47
[illegible]9, 6
[illegible]12
[illegible]
Pagurus..[illegible] 203, 5
Pako.....53
Palamedēa....78; 79, 2
Palaemon 202, 4; 203, 4
Pallisadenwurm 215, 11; 216, 11
Palmbohrer 80 Fig.; 139, 68

§.

Palmipēdes....63a; 80
Palmipedia.....42
Palpi.....70 Fig.; 122
Paludina.150 Fig.; 221, 41; 224, 26
Pancreas.....17
Pandion.....64; 65
Pangolin.....45
Panorpa....175; 177, 6
Pansen.....15 Fig.; 51
Panther.....37
Pantoffelmuschel 163 Fig. 221, 79; 225, 76
— — thierchen 190 Fig.; 241, 17; 243, 17
Panzerthier.....44
— — wangen 98b; 101, 1; 102, 1
— — welš 106, 20; 107, 20
Papageichen.....66
— — en 63b; 66; 67
— — fisch 99, 27; 100, 27
— — taucher 59 Fig.; 82, 19
Papierboot 221, 15; 222, 4
— — laus oder Bücherlaus.....178, 13
— — weſpe.....153
Papilio...156, 8; 157, 8
Papilionina.....156
Papillarkörper.....14
Papillen.....14, 3
Pappelblattkäfer 143, 94
— — blattlaus.192. 23
— — falter.
— — geier.
— — schwä
— — spri
Pappwesp
Parab
—
Par
Par
Parg
— — der Schmetterlinge...155
Pardalis.....37
Pardelkatze.....37
Pardor.....37
Parforcehund.....37
Parra.....78; 79

§.

Parus 41 Fig.; 68, 13; 69, 13
Paſeng.....53
Passer...44 Fig.; 69, 17
Passēres.....63a; 68
Pastor....68, 24; 69, 24
Patella..221, 7; 224, 70
Pauke.....1 Fig.; 11
Paukenfell.....14, 5
— — höhle.....14, 5
Pavian.....30; 31
Pavo.....73; 74
Pecten..168u. 169 Fig.; 221, 92; 226, 85
Pectinibranchii.....98a
Pectunculus...172 Fig.; 221, 106; 226, 98
Pedes der Insekten 71 Fig.; 122
Pediculina.....194
Pediculus 188, 26; 194, 26
Pegasus.....103; 104
Peitsche der Fühler 122a
Pekari.....47; 48
Pelagia.....232, 18
Pelamys..92, 16; 93, 16
Pelecanidae.....81
Pelecanus...81, 9; 82, 9
Pelekan 29 Fig.; 81, 9; 82, 9
Pelekansfuß.....224, 46
Pelias....92, 10; 93, 10
Pelobates...95, 7; 96, 7
Pelzflatterer...26b; 33; 34
— fresser....180; 186
— käfer.....131, 31
— motte.....166, 59
— laus 188, 23; 192, 23
[illegible]4, 5; 236, 5
[illegible]. 229, 12; 231, 12
[illegible]s.....231
[illegible].....126
[illegible]160 Fig.; 225, 74
[illegible]56; 165, 56
Pepsin.....17
Perca..64 Fig.; 99; 100
Percoidei.....99
Perdix.....73; 74
Pergament.....25, 3
Perla.....175; 177
Perleidechse.....90, 7

§.

Perlen, echte..226, 95 u. 101
— — schottische.107, 9
Perleule.....65
— flußmuschel.226, 101
— huhn.....73; 74
— muschel...221, 103; 226, 95
— mutter.....226, 95
— — falter.156, 2; 157, 2
Perna..221, 89; 226, 81
Perspectivschnecke 221, 17; 224, 28
Peterfisch.....100, 15
— männchen...100, 6
Petromyzon...119; 120
Pfahlmuschel...226, 116
Pfau.....73; 74
Pfauenauge 157, 3; 159, 14
— — fasan.....74
Pfefferfraß.....67
Pfeifenfisch.....103
— — mäuler..98; 103
Pfeifer.....163, 52
Pfeifhase.....42; 43
Pfeileule.....162, 34
— krautrohrkäfer.143, 88
— schwanz.....118, 6
Pfennige, Brattenburgsche.....225, 75
Pferde 14 Fig.; 21a u. b; 49; 50
— — bremsfliege 172, 32
— — egel 215, 17; 217, 17
— — fuß 221, 109; 226, 89
— — krätzmilbe.200, 20
— — lausfliege.173, 37
— — mücke.....170, 8
— — schweif 3 Fig.; 13
Pfirschen-Schildlaus 193, 25
Pflanzenauswüchse.123, 5
— — korallen...234; 237
— — läuse.188; 192
— — reich.....5
— — schmarotzer.188
— — thiere.....233
— — weſpen....148
Pflasterkäfer 127, 53; 138
— — zähne.....97

§.

Pflaumenrüſſelkäfer 139, 58
— — ſpanner 163,49
Pfote 25
Pfriemenhörner ..175; 176
— — ſchnäbler..63b; 68; 69,2
— — — , Schwingen der, 35 Fig.; 63b; 68; 69, 2
Phacochoerus...47; 48
Phaëton...81,11; 82,11
Phalaena.....156
Phalaenodea.....156, 7
Phalangium 196,14; 199
Pharaonsratte.....37
Phascolārctus...39; 40
Phasiānus.....73; 74
Phatagin.....45
Philonthus 127,40; 132, 40
Philoptĕrus 180,13; 186
Phoca.....55; 56
Phocīna.....55
Pholade oder
Pholas 221, 77; 226, 115
Phoenicoptĕrus .78; 79
Phryganea....175; 177
Phyllobius 76 Fig.; 127, 66; 139, 66
Phyllopŏda.....210
Phyllostŏma....33; 34
Physa..221, 48; 224, 23
Physalia 229, 19; 232, 19
Physapŏda.....184
Physāpus.....184
Physēter.....58; 59
Phyſik 2
Phyſiographie.....2
Phyſiologie.....9
Phytocorallia.....237
Phytocŏris 188, 7; 189, 7
Pica.....68, 29; 69, 29
Picĭdae.....66
Picus...33 Fig.; 66; 67
Pieper.....68, 4; 69, 4
Pier 216, 3
Piezāta.....146
Pigment.....14, 1 u. 2
Pilgermuſchel....226, 85
Pillenkäfer 130, 23; 127, 36; 131, 36
Pilot....99, 13; 100, 13
Pilzkoralle.234, 2; 236, 2
Pimelōdes.....107, 19

§.

Pimpla 88 Fig.; 147, 12; 150, 12
Pinguin ..81, 21; 82, 21
Pinna ..221, 94; 226, 90
Pinnenwächter...202, 9; 203, 9
Pinnipedia.....26a; 54
Pinnothēres 202, 8; 203, 8
Pinſelaffe.....30; 31
Piophĭla 169, 25; 172, 25
Pipa... ...95, 1; 96, 1
Pippel.....63a
Pirol.....68 5; 69, 5
Piſangfreſſer..63b; 66; 67
Pisces 97
Pisidium 221, 117; 226, 110
Pissōdes 127, 69; 139, 39
Pithēcus.....30; 31
Placoidei.....120b
Placūna.....226, 82
Plagiostŏma....226, 84
Plagiostŏmi...98a; 117
Planaria.215, 18; 217, 18
Planōrbis 148 Fig.; 221, 18; 224, 22
Plantigrăda.....36
Platalea.....78; 79
Platēssa..108, 5; 109, 5
Plattbauch.....176
— finger 98, 14
— fiſch.....108
— flügler.....175
— fußgänger 25
— nagel.....
— würmer .215;
Platydactylus 8
Platypus 12
Plecōtus
Plectognāth
Plesiosauri.
Pleuronectae
Ploceus...
Plötze. ...
Plumatella
Plusia..156, 41; 162, 41
Pneumacität 60
Pochkäfer.....135
Pocillopŏra....234, 12; 237, 12
Poecilopŏda.....209
Pocken.....224, 51

§.

Pöckelhäringe....107, 15
Podalirius.....157, 8
Podārgus.68, 41; 69, 41
Podĭceps .81, 18; 82, 18
Podinĕma ..89, 6; 90, 6
Podūra....180, 11; 185
Polarfuchs.....37
Polychlōros.....157, 3
Polydēsmus.202,21; 208
Polydrūsus 127, 65; 139, 65
Polygamiſch.....62
Polygastrĭca.....243
Polynēmus..99, 8; 100, 8
Polyp der Alten..222, 3
Polypen.....23; 233
— — ſtock.....233
Polyphagen.....155
Polypi.....23; 233
Polyplectron....73; 74
Pommer.....37
Pompĭlus.....147; 153
Pongo.....31
Pontia....156, 9; 157, 9
Porcellaria 57 Fig.; 81, 12; 82, 12
Porcellio..202, 19; 207
Porcus.....47; 48
Porenkoralle....234, 12; 237, 12
Porites.....237, 15
Portūnus .202, 7; 203, 7
Porzellanſchnecke 221,61; 224,51
Poſthörnchen....224, 22
Pottfiſch.....59
— wall 58
— köpfchen.....74
127, 10; 129, 10
....68, 19
.....43
120
80
18
769
22
24
11,24
.36; 37
Productus 164 Fig.; 225, 76
Prosimii.....30; 31
Proteus (Amphibie) 95, 12; 96, 12
— — (Aufguſſth.) 241, 10; 243, 10

§.

Porthōrax 122
Prunkadder 93, 8
Prunkotter 92. 8
Psalter.....51
Pselaphīna 126; 127; 145
Pselăphus 127, 99; 145
Pseudocephăla 202
Pseudŏpus .89, 18; 90, 18
Psila...169, 23; 172, 23
Psittacīna 66
Psittacŭla .... .66; 67
Psittăcus 66; 67
Psocus ...175; 178, 12
Psophia 78; 79
Psyche .156, 33; 161, 33
Psychōda 169, 4; 170, 4
Psylla..188, 20; 192, 20
Pterocĕras 221, 59; 224, 48
Pterodactȳli 90
Pteromălus 147, 16; 151
Pterŏmys.....42; 43
Pterophorĭdae ..156, 11
Pterophŏrus 156, 63; 167
Pteropŏda.....223
Pterŏpus 33; 34
Pterostĭchus 127, 6; 128, 6
Pterȳlae 60
Ptilīnus 127, 14; 129, 14
Ptinus .127, 15; 129, 15
Ptyodactȳlus 89, 13; 90, 13
Pulex .102 Fig.; 169, 9; 171, 9
Pulicīna.....171
Pulsadern ...5—7 Fig.
— adern .....18 D
— schläge .....18 D
Puma 37
Punktaugen 14
— band..
— korall
— mage
Pu
Pu
Pup
Pup
— bohrer ...151, 16
— räuber 127, 4; 128, 4
Purpur.....224, 54
— schnecke ..221, 64; 224, 54
Purpŭra 221, 64; 224, 54

§.

Puter 74
Pygaera 156, 30; 161, 30
Pyralĭdae 156, 8
Pyrălis .156, 51; 164, 51
Pyrrhocŏris 188, 5; 189, 5
Pyrrhŭla 43 Fig.; 69, 17
Pyrŭla (Schnecke) 221, 53; 224, 43
Python 92, 4; 93, 4

Quadrumăna .26 a; 29
Quagga 50
Quallen ..21; 229; 232
Qualster.....189, 3
Quappe ..108, 3; 109, 3
Quastenkiemer.89 b; 103
Quäker 69, 17
Quellen-Blasenschnecke 221, 48; 224, 23
Quermäuler 98 a u. b; 117
— zahn ....1 Fig.; 11
Quese ..215, 25; 218, 25
Quesenköpfe.....218, 25

Raasch.....107, 19
Raben 45 Fig.; 63 b; 68, 28; 69, 28
— krähe 25 Fig.; 29, 28
— schnabelfortsatz 2 Fig.
— fisch.....99, 25
Racke 66
Racundafelle 43, 16
Rademacher.....67
Radialzelle .86 Fig.; 146
Radiāta 23; 228
Radieschenfliege . 172; 24
Radius .....86 Fig; 146
[illegible]erorgane.....240
[illegible]einchen . 181 Fig.; 131, 13
[illegible]chen .240; 242
[illegible]17, 5; 118, 5
[illegible].....117
[illegible]laus 198, 21
[illegible]....78; 79
[illegible].....78
[illegible]....78; 79
[illegible]e 66
[illegible].....66
Rana.....95, 4; 96, 4
Randader ..86 Fig.; 146
— mahl 146
— schnecke 221, 69; 224, 59
— wanze 188, 4; 189, 4

§.

Rankenfüße....201 Fig.
— füßer ..202; 213
Rapāces .....63 a; 6
Raphidia ...175; 177, 5
Rapientia 153
Rappskäfer 131, 33
Rasirmesser.....99, 26
Rassen 8
— der Menschen..28
Ratten.....43; 9
— schwanzmaden 172, 29
Raubbeine d. Insekten 113 Fig.; 122
— fliege 169, 10; 172, 10
— füße 113 Fig.; 201
— käfer 74 Fig.; 38 u. 39
— thiere 26 a u. b.; 35
— vögel 63 a u. b; 64
— wespen.146; 147; 153
Rauchschwalbe....69, 38
Räucherklaue 224, 31
Rauhschwanz 39; 40
Rauhung 25
Raupen ...93 Fig.; 122
— fadenwurm 216, 10
— fliege ...169, 18; 172, 18
— nester, kleine 157, 9;
— — große 161, 29
— tödter 150
Rautenschlange....93, 13
Rebenstecher.....139, 57
Rebhuhn 73, 74
Rechte Schale d. Muscheln...131 Fig.; 220
Recurvirōstra ...78; 79
Reduvius 188, 10; 189, 10
Regenbogenhaut ..14, 2
— breme 169, 36; 172, 36
— pfeifer 63 b; 78; 79
— wurm 20; 215, 7; 216, 7
Regnum 8
Regŭlus ..68, 14; 69, 14
Reh 53
Reich 8
Reiher....63 b; 78; 79
— beize 79, 26
Reisdieb 69, 17
— kornwurm ..139, 68
— vogel.....69, 17

§.

Reißzähne....1 Fig.; 11
Reitmaus... 43
Rellmaus.....43
Rennfüße.....61
— thier.....53
— thierbremse.172, 31
Reproductionskraft d. Reptilien.....83
Reptilia.....23; 83
Repitilien 83
— —, deren Blutlauf .....6 Fig.
Republikaner 21 b; 69, 17
Reservezähne.....91
Respiration.....15; 19
— — sorgane ..19
— — ssystem...19
Retepŏra 235; 238
Rhagium 127, 87; 142, 87
Rhamphostŏma 89; 90, 3
Rhaphidia.....177, 5
Rhea 75; 76
Rheinlachs.....107, 1
Rhinocĕros 47, 48
Rhinolŏphus 9 Fig.; 33 u. 34
Rhizotrōgus 127, 26; 130 26
Rhodītes 147, 18; 152 18
Rhombus 65 Fig.; 108, 6; 109, 6
Rhynchītes 127, 57; 139, 57
Rhynchophŏra 126; 127; 139
Rhynchops 81, 16; 82, 16
Rhynchōta 187
Ricĭnus.....200, 23
Ricke 53
Riesenbovist 20
— — faulthier 45
— — kratzer ...218, 21
— — muschel...226, 88
— — nabelschnecke .224, 36
— — pallisadenwurm 216, 11
— — pinguin....82, 21
— — prachtkäfer 129, 10
— — salamander .96, 9
— — schildkröte.....87
— — schlange 92, 3; 93, 3
— — schnurwurm 216, 15
— — wespe.....149, 7

§.

Rindenfamiliengang 140, 77
— — käfer.....140
— — koralle..235; 238
— — raupen...156, 44
Rinder ...52; 53
bremse...172, 31
Rindsbreme ...172, 35
Ringeleidechsen 84 b; 89; 90
— — fuß.....161, 29
— — natter.....93, 6
— — raupe....161, 24
— — spinner ..96 Fig.; 161, 24; 155
— — taube.....71
— — würmer 214; 215
Ringfinger.....11
— räderthierchen ..241
Rinnenschilder 91
— — zähne..... 83
Rippen .....2 Fig.; 11
— — knorpel 2 Fig.; 11
— — köpfchen 2 Fig.; 11
— — quallen ..229, 15; 232
Ritter ..99, 10; 100, 10;
Ritzschnecke 221, 6; 224, 69
Robben 26 b; 54; 55; 56
Robulīna.....222, 6
Roche 20; 98 b; 117; 118
Rogen 97
Rogener.....97
Rohrammer 69, 16
— dommel.....79 26
— käfer 127, 88; 143, 88
— huhn 78; 79
— sänger .....69, 1[illegible]
— sperling ....6[illegible]
Röhrenmäuler 98 b[illegible]
— nasen [illegible]
— qualle[illegible]
— wü[illegible]
Rolle ...[illegible]
Rollassel 20[illegible]
— rüssel [illegible]
— schleich[illegible]
— schnecke[illegible]
— zunge ...[illegible]
Rosenapfel 152, 18
— blattlaus ..192, 21
— blattwespe ..148, 1
— drossel 69, 24
— gallwespe .147, 18; 152, 18

§.

Rosenkäfer 127, 29; 130, 29
— kranzförmige Fühler.....122 a
— nacktfliege..172, 23
— schneider...154, 24
Rostellaria 121, 57; 224, 46
Rostēllum 110 Fig.; 122
Roß 50
— ameise.....153, 19
— käfer 127, 20; 130, 20
— kastanien-Spanner.....161, 28
Rotalia.....222, 6
Rotatoria 242
Rothafter.129, 9; 189, 2
— auge.....107, 9
— bart 100, 5
— fisch.....107, 1
— hals 82, 5
— hirsch 53
— horn 128, 7
— kehlchen 69, 10
— lachs.....107, 1
— schwänzchen ..69, 10
— wild 53
— würmer...215; 216
Röthlinge 69, 10
Rotĭfer...241, 5; 242, 5
Rübenweißling ...157, 9
Rücken d. Insekten .122
— — borste 104 Fig.; 168
— — flossen 97
— — füßer 202, 11; 303,
— — käfer.....128, 7
— — mark ..3 Fig.; 13
— — nerven ....3 Fig.
[illegible] wimmer 188, 15;
[illegible] köpfchen 190, 15
[illegible] upen 156, 9
[illegible] 2 Fig; 11
[illegible] 11, 2
[illegible] ...24
[illegible] 60
[illegible] 61
[illegible] b;
[illegible] 81
[illegible] 57
[illegible] 53
Rumpf.....2 Fig.; 11
— nerven ....13 IV.
Rumpfs-Rückenfüßer 203, 11
Rundmäuler ..98 a u. b; 119

§.

Rundwürmer ..215; 216
Runzelbock 142, 81
Rupicŏla .68, 21; 69, 21
Rusette.....33
Rüſſel ...168; 155, 122
— — fliegen 169
— — käfer 126; 127; 139
— — käferköpfe 76 Fig.; 127
— — maus 37
— — thiere 26 b; 47; 48
— — verberger .139, 73
— — wulſt 94 Fig.; 156
Rüſter-Haargallen-Blattlaus 192, 22
Rüttelfalke 65
Rytina 58; 59

Saatgans 82
— krähe 69, 28
— motte 164, 52
— ſchnellkäfer .129, 9
Sabēlla ..215, 4; 216, 4
Säbelheuſchrecke...181,5
Säbler 78; 79
Sackſpinne 196, 8; 198, 8
— trägerraupen 156,33; 161, 33
Saftgrün 107, 3
Sägeblattkäfer..127, 95; 143, 95
— bock 142, 80
— fiſch 117; 118
— fliege 169, 27; 172, 27
— hörnige Käfer .126; 127, 128.
— tauche[illegible]

Salamand[illegible]
Salamänd[illegible]
Salang[illegible]
Sali[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
Salpe[illegible]
Saltatoria 181
Saltĭcus ..196, 7; 198, 7
Sambo 28
Samenkäfer 127, 55; 139
Sammetkrabbe ...203, 7
— — muſchel .226, 98

§.

St. Peterfiſch ...100, 15
St. Petervogel ...82, 12
Sandart 100, 3
Sander....99, 3; 100, 3
Sandfloh.....171, 9
— käfer 127, 1; 128, 1
— löcher 215, 4; 216, 4
— muſchel...226, 100
— viper.....93, 11
— weſpe 153
— wurm 215, 3; 216, 3
Sänger...68, 10; 69, 10
Saperda 127, 85; 142, 85
Sarcophăga 169, 20; 172, 20
Sarcŏptes .195, 20; 200, 20
Sarcorămphus ..64; 65
Sardelle ..107, 15 u. 16
Sattel, polniſcher 226, 82
Saturnia 156, 21; 161, 21
Satyrus 31, 1
Sau.....48
— beller 37
Sauerampfer-Eule 162, 42
— ſtoff 6
Saugadern ...17; 18
— er (Fiſche) ..98 b; 119
— er (Inſekt)...122; 424 b
— lappen der Inſekten 99 Fig.; 122
— näpfe 12
— rüſſel.84 Fig.; 168
— ſcheide ..75 b; 127
— würmer .215; 217
[illegible]ria .....84 a u. 88
[illegible]gethiere 23; 25
— [illegible] Blutlauf derſelben 5 Fig.
[illegible]...68, 9; 69, 9
[illegible]33; 224, 34
[illegible]...63 a; 66
[illegible]127, 20; 130, 20
[illegible]Hemmen 130, 23
[illegible]9, 27; 100, 27
[illegible]a 169, 26; 172, 26
Schabe 109 Fig.; 156, 59; 180, 8; 182
Schacker 96, 6
Schaden d. Inſekten .123
— — Reptilien .83

§.

Schaden der Säugethiere 25
— — der Vögel .62
Schädel.....11
— — des Bieber 11 Fig.
— — — Delphin 19 Fig.
— — — Elephanten .12 Fig.
— — — Giraffen 16 Fig.
— — — Hirſcheber 13 Fig.
— — — Hundes 10 Fig.
— — — Menſchen 2 Fig.
— — — Orang-Utangs 8 Fig.
— — — Pferdes 14 Fig.
Schaf 52; 53
— bremſe ...172, 31
— drehwurm 218, 25
— kameel 53
— laus 169, 38; 173, 38
— wurm....216, 11
Schaft der Federn ..60
— der Fühler 122 a
Schäferhund 37
Schakal 37
Schalen d. Weichthiere 128 bis 132 Fig.
— — affel 202, 23; 208
— — krebſe 202
— — ſchupper ..120 b
Schalthiere 220
Schambein ...2 Fig.; 11
Scharbe 81, 8; 82, 8
Scharfdornraupen .156, 3
Scharlachkörner .193, 25
— — läuſe 193
Schaumzirpe 188, 19; 191, 19
Scheckenfalter 156, 1
Scheeren .120 Fig.; 201
— — kiefern 116 Fig.; 195
— — ſchnabel 81, 16; 82, 16
Scheermaus 43
Scheibenbäuche 98 b; 108; 109

§.

Scheibenquallen 229; 232
— — röhre ... 215, 5; 216, 5
Scheindornraupen 156, 1
— eulenraupen 156, 46
Scheitelbein .. 2 Fig.; 11
— — der Insekten 122
Schellak 193, 25
Schellente 82, 5
— fische 98 b; 108, 1; 109, 1
Scheltopusik 90, 18
Schenkel .... 2 Fig.; 11
— — der Insekten 85 Fig.; 122
— — fliege .. 169, 28; 172, 28
— — geflecht . 3 Fig.; 13
— — hals od. -kopf 2 Fig.
— — ring ... 85 Fig.; 14 b; 122
Schichtung der Zähne 11
Schienbein . 2 u. 85 Fig.; 11; 61; 122
Schienen-Eidechse .. 90, 5
Schiffsbohrer .. 226, 116
— boot 221, 11; 222, 5
— dreieckmuschel 173 Fig.; 226, 104
— halter 109, 9
— werftkäfer .. 127, 19; 129, 19
Schildamsel 69, 6
— der Insekten 72 Fig.; 125
— chen der Muscheln 131 Fig.; 220
— fische .. 98 b; 108; 109
— käfer 127, 90; 143, 90
— kröten 84; 85; 87
— — käfer .. 127, 32; 131, 32
— — suppe ... 87
— läuse 188, 25; 193
— patt 87, 7
— raupen 156, 7 u. 17
— schuppen d. Fische 67 Fig.
— schuppen der Reptilien 83
Schillerfalter 156, 5; 157, 5

§.

Schimpanse 31
Schindelschuppen 83
Schinkenmuschel .. 221, 89
Schinn 14
Schizoneura ... 188, 22; 192, 22
Schlafapfel 152, 18
Schlafen 21, 5
Schläfenbein .... 2 Fig.; 11
Schlagadern 18
Schlammfliege 104 Fig.; 169, 29; 172, 29
— peitzger 107, 10
— schnecke 221, 46; 224, 24
— wurm . 215, 8; 216, 8
Schlangen .... 84 b; 91
— — fett 25, 2
— — gift 91
— — stern . 229, 9; 231, 9
— — zungen .. 117
Schlauchdärmer 217
— battel .. 224, 64
Schlehenschwärmer . 106, 17
Schleichenlurche 84 b; 95; 96
Schleihe .. 106, 6; 107, 6
Schleim 6
— häute 6; 14
— netz 14
— thiere ... 23; 219
Schließmundschnecke 145 Fig.; 221, 26; 224, [illegible]
Schlinger ... 92, 4; [illegible]
Schlitzschnecke 221, 5 [illegible]
Schloß der M[illegible]
— band[illegible]
— leiste[illegible]
— zähne[illegible]
Schlundkopf [illegible]
Schlupfwesp[illegible]
— wespen-Verwandte 147; 151
Schlüsselbein . 2 Fig.; 11; 25
Schmalbiene 147, 27; 154, 27

§.

Schmalbock 127, 86; 142, 86
— nasen 29
Schmalz 25, 2
— zünsler . 164, 51
Schmarotzer .. 188; 194
— — krebse . 202; 212
— — milbe 196, 21
Schmeißen 172, 22
Schmeißfliege .. 103 Fig.; 172, 20 u. 22
Schmelzfaltige Zähne 11
— leisten d. Zähne 12 Fig.
— schuppen .. 120 b
Schmerle 107, 10
Schmetterlinge .. 124 b; 155
— — — smücke 169, 4; 170, 4
Schmied ... 72 u. 78 Fig.; 129, 9
Schmiedeknechte 129
Schnabel . 100 Fig.; 60; 122
— — schnecke 221, 57
— — fisch 99, 18
— — kerfe 187
— — thier 26 b; 44; 45
— — wanze . 188 9; 189, 9
Schnäbel d. Muscheln 131 Fig.; 220
Schnake 170, 7
Schnäpperfisch ... 100, 16
[illegible] 69, 6
[illegible]köpfchen[illegible]recke 180, 2; 181, 2
[illegible] 78
[illegible]hörs . 14, 5
[illegible] 220
[illegible] 7
[illegible] 11
Schnellkäfer . 128, 7; 129
Schnepfen 52 Fig.; 63 b; 78; 79
— — dreck 79
— — fliege 169, 13; 172, 13

§.

Schnepfenkopf ..224, 44
— — tanzfliege172, 14
Schnirkelschnecke ...221, 25 ꝛc.; 224, 13
Schnörkelmuschel .221, 84
Schnurförmige Fühler 122a
Schnurrborsten 60
Schnurwurm215, 15; 216, 15
Schoberthier 21 b; 43, 18
Schollen ..65 Fig; 98 b; 108, 5; 109, 5
Schöpfrüssel 100 Fig.; 168; 122
Schöps.....53
Schoßbein .....2 Fig.
Schotenhäringe .... .25
Schrauben 221, 63; 224, 53
— — schnecke .221; 38; 224, 35
Schreitfüße d. Insekten 122
— — der Vögel 24 Fig.; 61
— wanzen ..188, 10; 189, 10
Schroll.....100, 4
Schulterbein .2 Fig.; 11
— — blatt 2 Fig.; 11
— — höhe. 2 Fig.; 11
— — zellen 146
Schupp 37
Schuppen.....83
— — flosser...98 b;
— — rau
— — thi
— — th
Schuſter
Sch
— — schwanz 157,8
Schwammkoralle 234,15; 237, 15
— rauhe. 161, 29
— spinner 161, 29
— stein . 238, 23

§.

Schwämme 156
Schwan 54 Fig.; 81; 82;
— (Insekt) .161, 29
— teichmuschel .226, 102
Schwanz.....60
— des Bieber 11 Fig.; 43
— federn.....60
— flossen .64 Fig.; 97
— hornraupen 93 Fig.; 156
— lurche 84 b; 95; 96
— meise....69, 13
Schwärmen 154, 30
Schwärmer 156, 3; 159,3
Schwarzaster....129, 17
— — drossel....69, 6
— — flügler....126; 127; 137
— — kehlchen...69, 9
— — koralle..237, 19
— — specht 33 Fig.; 67
— — wild 48
Schweber.....172, 15
Schwebfliege ... 169, 15; 172, 15 u. 30
Schweifhuhn 69, 12
Schweine 21 c; 26 b; 47; 48
— — laus 194
Schweknigel .37; 207, 19
Schweißhund.....37
rtfisch 99, 12; 100, 12
norpel 2 Fig.
wänze ...209
er 26 b; 52
der In-
75 Fig.; 122
n 97; 228
11 u. 26. u.
3 Fig.; 61
..26, b;
42; 43,5
— — höhlen ...228
— — käfer 126; 127, 43; 133
— — krabbe..202, 7
— — schnecke .. 221, 23; 224, 38

§.

Schwimmtaucher ...80
— — vögel 63 a u. b; 80
— — wanze 188, 16; 190, 16
Schwingen.....60
Schwinger.....166
Schwingkölbchen ... 122; 166
Schwungfedern 60
Sciaena ...99, 9; 100, 9
Sciaenoidei.....99
Scincus 42; 43; 89, 15; 90, 15
Sciurina..... 42
Sciürus 42; 43
Sclerodērmi.....113
Scolopacidae.....78
Scolopax 52 Fig.; 76; 79
Scolopender oder **Scolopēndra** 123 Fig.; 202, 22; 206
Scomber 99, 11; 100, 11
Scomberoidei.....99
Scopŭla. 156, 52; 164, 52
Scorpio oder **Scorpion** 116 Fig.; 196, 1; 197, 1
Scorpionfliege 175; 177, 6
Sculptur der Gehäuse 220
Scutēllum 72 Fig.; 125
Seehsauge.....100, 26
— füßer.....122
Secretion 15
Sectio 6
Seeadler.....100, 9
— anemone 234, 1; 236, 1
— barbe..99, 5; 100, 5
— barsch 100
— blase 229, 19; 232, 19
— drache..... .115
— einhorn 59
— feder .234, 5; 236, 5
— gurke.....230, 1
— hase 221, 3; 224, 65; 109, 8
— hecht.....168, 4
— hunde 17 Fig.; 26 a; 56
— igel ..229, 3; 231, 3
— jungfernfett....25, 2
— kröte..101, 6; 102, 6
— kuh...24; 59; 266; 58; 59

§.

Seelilie oder **Meerlilie** 181 Fig.; 129, 13; 131, 13
— löwe.....56
— mäuse.....118
— ohr..221, 16; 224, 67
— otter.....37
— pferdchen..103; 104
— pocke...202, 32; 213
— rabe.....82, 8
— ratze.....116
— rinde.....238, 21
— scheide.221, 126; 227
— schildkröten.84b; 86
— schlange...92, 16; 93, 16
— schwalbe.81, 15; 82, 15; 102, 1
— schwämme.....239
— spinne.....
— stern..229, 8; 231, 8
— —, dessen Nerven 4 Fig.
— taucher.81, 17; 82, 17
— teufel.....101, 5
— tulpe...202, 31; 213
— weibchen.....59
Segelfalter.....157, 8
— qualle 229, 20; 232, 20
Segler.....68, 40
Segmente.....122
Sehloch.....14
Sehnen.....12
Seide.....161, 23
Seidenaffe.....31
— — hase.....43
— — raupe....161, 23
— — schwanz..68, 22; 69, 22
— — spinner..161, 23
Seitenlinie der Fische 97
— — streifraupen..156, 10
— — zähne der Muscheln 132 Fig.; 220
Sekretär.....64; 65
Senfweißling.....157, 9
Sensibilität.....156, 10
Sepia....221, 2; 222, 2
Sepie..14, 5; 222, 1 u. 2
Serpentarius...64; 65
Serpēntes.....91
Serpŭla..215, 6; 216, 6
Serricornia...126; 127; 129

§.

Sertularia 234, 7; 236, 7
Serum.....18
Sesia...156, 19; 160, 19
Setigĕra.....47
Siălis.....175; 177, 6
Sichelwespe....147, 10; 150, 10
Siebbein.....11
— muschel 221, 75; 226, 117
— wespe....147; 153
Siebenschläfer...42; 43
Silberbär.....37
— — fasan.....74
— — fuchs.....37
— — mund....224, 31
— — strich.....157, 2
Silpha...127, 35; 131, 35
Silurīni.....106
Silūrus.106, 18; 107, 18
Simiae.....30
Simulia...169, 5; 170, 5
Singapparat.....181
— drossel.....69, 6
— muskeln.....68
— schwan.....82
— vögel 21, 4; 63a u. b; 68
— zirpe 114 Fig.; 188, 18; 191, 18
Sinne.....14
Sinnesorgane.....14
— — werkzeuge....14
Siphōnops 95, 14; 96, 14
Siphuncŭlus 229, 2; 230, 2
Sippe.....
Sippschaft.....
Sirēdon..95, 1
Siren....95,
Sirēna....
Sirenen...
Sirex...
Siricidae
Sitōna..
Sitta 46 F
Sitzender
86 u. 11
Sitzbein.
— fuß...
Skelet des Menschen 2 Fig.; 11; 12
Skink....89, 15; 90, 15
Slepetz.....43
Smerīnthus....156, 14; 159, 14

§.

Sohlengänger 25; 26b; 36
Solarium 221, 17; 224, 28
Soldaten..224, 52; 178
Solea....108, 7; 109, 7
Solen.221, 102; 226, 99
Solidungŭla.....26a
Solitair.....76
Somateria 81, 4; 82, 4
Sommerkleid.....66
— — schlaf.....21, 5
— — spinne.196, 13; 198, 13
Sonne, rothe...226, 108
Sonnenfisch.99, 15; 100, 15
— — käfer....144, 98
— — kälbchen 127, 98; 143
— — schirmthierchen 241, 2; 242, 2
Sorex.....36; 37
Soricīna.....36
Spalax.....42; 43
Spaltfüße.....61
— — hufer.....51
— — schnäbler 63, 6; 68, 6; 69, 6
— — schwimmfüße 26 Fig.; 61
— — züngler.84, 6; 89
Spaniol.....163, 46
Spanner...156, 7; 163
— — raupen 97 Fig.; 156, 7
Spargelhähnchen.143, 89
Sparoidei.....99
...köpfchen.180 Fig.; 229, 7; 231, 7
...69, 17
... Fig.; 63b; 66; 67
...; 68,
...32
...8
...48
...34
...7, 15
...31, 31
...69, 13
Speiche.....2 Fig.; 11
Speiseröhre.....16
— — saft.....17
Sperber.....65
Sperling.....69, 17
Sperma ceti.....59

§.

Sphaerŏdus 102, 8
Sphargis 86; 87
Sphex 147; 153
Sphingodea.....156
Sphinx.156, 13; 159, 13
Spielart.....8
Spiegel.....60; 181
— — karpfen...107, 3
— — tödten.....155
— — zelle 88 Fig.; 146
Spießbock.....142, 81
Spießer.....53
Spindel od. Spindelsäule 128 Fig.; 220
— — baum-Schnauzenmotte 166,60
— — förmige Fühler 122a
— — rand 128 Fig.; 220
— — raupen..156, 26
— — schnecke.221, 52; 224, 42
— — thierchen 241, 9; 243, 9
Spinnen..20; 23; 126; 196; 198
— — thiere.....195
Spinner....156, 5; 161
Spinngefäße der Insekten,.....122
Spirifer 161 Fig.; 225, 74
Spirōrbis.215, 5; 216, 5
Spitz.....37
— haare.....25
— kopf.....189, 3
— mäuse 26b; 36; 37
— schwanz....163, 50
— zähne
Splintkäfer
Spondylus
Spon
Sp
Sp
Sp
Sp
Sp
Spring
83 Fig.; 122
Springer.....180; 181
Springfisch.....107, 14
— — käfer 83 Fig.; 129; 127, 72; 139, 72; 143

§.

Springmaus.....43
— — schwanz.180, 11; 185
Spritzfisch.21b; 100, 18
— wurm 229,1; 230,1
Sprossenbildung.....20
Sprosser.....69, 10
Sprotte.....107, 15
Sprungbein..2 Fig.; 11
— — spinne....196, 7
Spuhle.....60
Spulwurm 215, 12; 216, 12
Squalini.....117
Squalus 68 Fig.; 117, 1; 118, 1
Squamāta (reptilia) 84; 85; 89
Squamipēnnes....99, 5
Squatīna.....117; 118
Squilla....202, 13; 204
Staar....68, 23; 69, 23
Stabthierchen...241, 12; 243, 12
Stachel.....25; 146
— — bauch.113; 114
— — beerblattwespe 148, 4
— — beerspanner 97 Fig.; 163, 48
— — flossen 64 Fig.; 97
— — flosser...98a; 99
— — füßer..202; 209
— — häuter 23; 229; 231
— — käfer 127,49; 136
— — kopfwürmer 215, 9; 218, 9
— — koralle..234, 19
— — kugel 189 Fig.;
41, 13; 243, 13
chel..221, 87
..42; 43
...118, 5
. 221, 55; 224, 44
ze..98b; 99; 100
ne...26b; 42; 43
Stämme d. Menschen.28
Standvögel.....62
Staphylinus 74 Fig.; 127, 38; 132, 38
Steatophygen.....14, 5
Steatōrnis.....69, 42

§.

Stechborsten 100 Fig.; 168
— fliege 169, 19; 172, 19
— mücke 100 Fig.; 168; 169, 1; 170, 1
— roche.117, 6; 118, 6
— stachel.....148
Steckmuschel 221, 94; 226, 90
Steigbügel.....14, 5
Steinadler.....65
— bock.....53
— bockshorn 137 Fig.; 122, 7
— bohrer.221, 101 u. 115; 226, 93 u. 115
— butte 65 Fig.; 108, 6; 109, 6
— forelle.....107, 1
— hummel...154, 31
— kauz.....65
— korallen.....233
— marder.....37
— picker.....224, 14
— schmätzer... 68, 9; 69, 9
— sperling 44 Fig.; 69, 17
Steißbein.....11
— flossen.....97
— fuß 26 Fig.; 81, 18; 82, 18
— huhn.....73
— wirbel..2 Fig.; 11
Stellio....89, 11; 90, 11
Stelzenbein..21 Fig.; 61
Stemmăta.....122b
Stenelytra 126; 127; 136
Stenostŏma.....92
Stentor (Affe)...30; 31
— — (Aufgußth.) 241, 14; 243, 14
Stenus..127, 41; 132, 41
Sterbevogel.....69, 22
Sterna...81, 15; 82, 15
Sterngänge.....140
— koralle 185 Fig.; 234, 10; 237, 10
— seher.99, 7; 100, 7
— stein 185 Fig.; 237, 10
Sternum.....122
Sternwürmer...23; 230
Steuerfedern.....60
Stichling..101, 4; 102, 4

§.
Stickstoff.....6
Stieglitz.....69, 17
Stier.....53
Stigmăta...87 Fig.; 19; 146; 148
Stimme.....21, 4
Stimmritze.....19
Stinkhahn.....69; 35
— thier.....36; 37
Stint....106, 2; 107, 2
Stirn der Insekten.122
— bein.... 2 Fig.; 11
Stockente.....82, 3
— fisch.....109, 1
— —, kleiner..109, 4
— lack.....193, 25
Stomatopŏda.....204
Stomōxys.169, 19; 172, 19
Stopfwachs.....154, 30
Storch..53 Fig.; 78; 79
Stoßfalke.....65
— taucher.....80
Störe 67 Fig.; 98b; 115; 116
Strahlthiere. 13, IV; 23; 229
Strandläufer.....78
— — reuter 21 Fig.; 78; 79
Stratiŏmys 169, 33; 172, 33
Strauße...63b; 75; 76
Streifenraupen...156, 45
Streifling.89, 20; 90, 20
Strichvögel.....62
Strigĭdae.....64
Stringocephălus 162 Fig. 225, 74
Strix,....64, 13; 65; 13
Strombus.221, 58; 224, 47
Strongȳlus 215, 11; 216, 11
Strudelwürmer 215; 216
Struthio.....75; 76
Struthionĭdae.....75
Stubenfliege 99 Fig.; 18; 172, 22
Stummel.....25
— — füße....89, 18
— — füßer.....92
Stumpfmuschel.. 221, 98; 226, 111
Sturio.....116
Sturionīni.....115

§.
Sturmhaube...221, 54; 224, 49
— — schwalbe 57 Fig.; 82, 12
— — vögel 63b; 81, 12; 82, 12
Sturnus...68, 23; 69, 23
Stutzkäfer.....131, 32
— kopf.....100, 14
Stylastriten.....231
Subbranchiāles 98a; 108
— classis.....8
— costalnerv.....146
— genus.....18
— ordo.....8
— radius.....146
— species.....9
— ulicornia.....176
— ulirōstres.....68
— ungulāta.....42
Succinea 147 Fig.; 221, 47; 224, 19
Südsee-Wallfisch.....59
Sukuruku.....93, 13
Sula.....81, 10; 82, 10
Sumpfhühner...78; 79
— — ohreule.....65
— — salamander 96, 10
— — schlammschnecke 224, 24
— — schnecke 150 Fig.; 221, 41; 224, 26
— — vögel..63a u. b; 78
Sus.....47; 48
Süßwasserschildkröten 84b; 86
— — schnecke[illegible]
Sycophānta.....[illegible]
Sylvĭa..40 Fig.; [illegible]
Sympatetisch[illegible]
Syngnăth[illegible]
Synōtus..[illegible]
Syrnium..[illegible]
Syrphus 1[illegible]
Systēma.[illegible]
Systeme, a[illegible]
— —, v[illegible]

Tabackspfeife.....104
Tabānus 169, 35; 172, 35
Tachīna 169, 18; 172, 18
Tachypĕtes..81, 7; 82, 7

§.
Tafelente.....82, 5
— fisch.....100, 10
— schuppen.....83
Tagfalter.....156; 157
— pfauenauge...157, 3
— schläfer.....68, 41 69, 41
Talg.....25, 2
— drüsen.....14
Talpa.....36; 37
Talpīna.....36
Tamarin.....30
Tamias.....42; 43
Tanāgra.68, 19; 69, 19
Taenia 127 Fig.; 215, 23; 218, 23
Taenioidei.....101
Tannenhäher 68, 30; 69, 30
— — papagei..69, 18
— — zapfen-Wickler 165, 58
Tanrek.....36; 37
Tantălus.....78; 79
Tanzfliege 169, 14; 172, 14
Tapetenmotte....166, 59
Tapir.....47; 48
Tapĭrus.....47; 48
Tarandus.....53
Tarantel 117 Fig.; 198, 8
Tarantŏla.....90, 14
Tarsenglieder od. Tarsi 85 Fig.; 122
Tarsus od. Tarsen 11; 61
Taschenkrebs 120 Fig.; 202, 6; 203, 6
Tastapparat.....61
[illegible]..127, 99; 145
[illegible]14; 83; 122
[illegible].....61
[illegible]er 100 u.
[illegible] Fig.; 122
[illegible]..195
[illegible]44
[illegible]
[illegible]
[illegible]316
[illegible]160
[illegible]17
[illegible]133
Tausendfuß 202, 20; 208
— — füßer 202; 208
Taxicornia...126; 127; 135
Taxikornen 126; 127; 135
Taxus.....37. 9

§.

Technologie 1
Tegenaria 196, 9; 198, 9
Teguīxin.....90, 6
Teichkugelmuschel 226, 109
— muschel...221, 104; 226, 102
— napfschnecke 224, 71
— salamander ..96, 10
— unke.....: 95, 7
Teju-Eidechse.....90, 6
Teke 173, 38
Teleas 151
Tellerschnecke 148 Fig.; 221, 18; 224, 22
Tellīna ..132 Fig.; 221, 112; 226, 105
Tellmuschel 132 Fig.; 221, 112; 226, 105
Temperatur 21
Tenebrio...79 Fig.; 37; 127, 52
Tentacŭla.....214; 233
Tenthrēdo 147, 5; 148, 5
Tenthredonĭdae....148
Tenuirōstres.....68
Terĕbra 221, 63; 224, 53; 146
Terebratel od. Terebratŭla 157 u. 158 Fig.; 221, 78; 225, 74
Terēdo 221, 76; 226, 116
Termes.....175; 178
Terminologie.....9
Termiten 21 b; 175; 178
Testudināta.....84; 85
Testūdo.....86; 87
Tetragnātha....196, 13; 198, 13
Tetramĕra...
Tetrăo.....
Tetrix.....
Tetrŏdon...
Teufelsfin...
Te...
Th...
The...
The...
Thie...
Thierkor...234; 236
— läuse....180; 186
— parasiten...123, 7; 188
— reich 5
— schmarotzer....188

§.

Thomīsus 196, 6; 198, 6
Thoracĭci.....98; 99
Thorax.....121; 122
Thrips 107 Fig.; 180, 10; 184
Thunfisch 21b; 98b; 100, 11
Thurmfalk.....65
— schwalbe...69, 38
Thylacītes 76 Fig.; 127, 60; 139, 60
Thysanūra.....185
Tibetziege.....53
Tibia 85 Fig.; 11; 61; 122
Tichodrŏma 68, 34; 69, 24
Tiger.....37
— muschel....224, 51
— porzellanschnecke 224, 51
— spinne.....198, 7
Tinca...98 Fig.; 106, 6; 107, 6
Tinea...156, 59; 166, 59
Tineodea.....156, 10
Tipŭla....169, 8; 170, 8
Todtengräber 73 Fig.; 21b; 127, 34; 131, 34
— — käfer 127, 51; 137
— — kopf 21, 4; 159, 15
— — — muschel 221, 80; 225, 75
— — uhr.....129, 13
Tölpel....81, 10; 82, 10
Tonne..221, 66; 224, 56
Tonnenpuppe.....168
...der Insekten ..122
...n.....172, 29
...espe.....153, 24
...117, 7; 118, 7
.....156, 9
...; 165, 57
...15; 151,
...; 152, 18
...78; 79
...; 162, 40
...Fig.; 19;
...122; 195
...a 126; 127; 138
Trachīnus..99, 6; 100, 6
Trachys 127, 12; 129, 12
Trampelthier.....53
Trappe.....78; 79

§.

Trauerfliege 169, 16; 172, 16
— — mantel....157, 3
— — schweber..172, 16
Träumen 21, 5
Trematōda 215
Trepang.....230, 1
Tribus 8
Trichechoidea.....55
Trichĕchus.....55; 56
Trichiūrus 101, 10; 102, 10
Trichodēctes...180, 14; 186
Trichōdes 127, 30; 131, 30
Tridācna 221, 99; 226, 88
Trigla.....101; 102
Trigloidei 101
Trigonia 173 Fig.; 221, 97; 226, 103
Trigonocephălus 92, 14; 93, 14
Trilobiten 124 Fig.; 121; 210
Trimĕra.....126
Tringa 78
Triŏnyx 86; 87
Triphaena 156, 42; 162, 42
Triton..61 Fig.; 95, 10; 96, 10
Tritonium 221, 56; 224, 45
Tritonshorn.....224, 45
Trochānter 2 u. 85 Fig.; 122; 146
Trochĭlus 68, 37; 69, 37
Trochiten.....231, 13
— — kalk ...231, 13
Trochus 221, 34; 224, 29
Troctes 175; 178
Trödelweib.....224, 29
Troglodȳtes 68, 11; 69, 11
Trogmuschel...221, 100; 226, 104
Trogŭlus ..196, 15; 199
Trombidium 196, 16; 200, 16
Trommelfell.....14, 5
— — fisch....100, 25
— — haut.....181
Trompetenschnecke..221, 56; 224, 45
— — thierchen 241, 14; 243, 14

§.
Trompetervogel . . 78; 79
Tropidonōtus 92, 6; 93, 6
Tropidūrus 89, 12; 90, 12
Tropikvogel 81, 11; 82, 11
Trotzkopf 129, 13
Trupial 68, 25
Truthahn 73; 74
Trüffelkäfer 135
Trygon . . . 117, 6; 118, 6
Trypoxȳlon 153, 24
Tubĭfex . . 215, 8; 216, 8
Tubipŏra 182 Fig.; 234, 4; 236, 4
Tukan 66
Tulpe (Muschel) . . 226, 92
Tümmler 59
Tunicāta 227
Tunkenmuschel . . 226, 105
Turbinolia 234, 3; 236, 3
Turbo 221, 39; 224, 31 u. 57
Turdus . . 38 Fig.; 68, 6; 69, 6
Turluru 203, 9
Turritēlla 221, 38; 224, 35
Turteltaube 71
Türken 130, 25
Tüte 79
Tylopŏda 52
Typhlops . . . 92, 1; 93, 1
Typogrăphus 81 Fig.; 104, 74

Uebersicht der Anzahl der Thiere in den Klassen 7
Uferaas 176
— haft 176
— käfer 127, 2; 128, 2
— läufer 79, 16
— schnecke 221, 40; 224, 32
— schwalbe 69, 38
Uhu 65
Uistiti 30
Uklei 107, 9
Umberfisch . . . 98 b; 99, 9
Umbōnes 132 Fig.; 220
Umbrīna 100, 9
Umdreher 2 Fig.
Unau 45
Ungeflügelte Insekten 122; 185
Ungleichflügler 188
— — zehige Käfer 126
Ungulāta . . . . . 26 a; 46

§.
Unio 221, 110; 226, 101
Unke 93, 6
Unorganische Körper . . . 3
Unterarm 11
— art 8
— flügel 155
— gattung 8
Untergesicht 104 Fig.; 168
— kiefer 1 u. 2 Fig.; 11; 122 c
— klasse 8
— lippe . . . . . 122 c
— ordnung 8
— rand d. Muscheln 132 Fig.; 220
— — ader 146
— schenkel . . . 60; 122
Unze 37
Unzertrennliche 67
Upŭpa 68, 35; 69, 35
Uranoscŏpus 99, 7; 100, 7
Urbildung 20
Uria 81, 20; 82, 20
Ursīna 36
Urstoffe 6
Ursus 36; 37
Urzeugung 20

Valvāta 221, 30; 224, 24
Vampyr 33; 34
Vanēllus 78; 79
Vanēssa 95 Fig.; 156 3; 157, 3
Varietät 8
Velēlla 229, 20; 232, 20
Velia . . . 188, 12; 189, 12
Venae . . . . . [illegible]
Venen 5—7 Fig. [illegible]
— blut . . . . . [illegible]
Venus 221, 120; [illegible]
— fächel 18[illegible]
— gür[illegible]
— mu[illegible]
Fig.; [illegible]
Verbreitun[illegible]
Verdauung[illegible]
Verdauung[illegible]
— — system 10; 16
— — werkzeuge d. Insekten 122
Vermehrung d. Fische 97
— d. Insekten . . . 122

§.
Vermes . . . 23; 214; 215
Vermilinguia 44
Verschiedenkiemer 224
Vertebrāta 23; 24
Vertheidigungsmittel der Insekten 122
Verwandlung 22
— der Insekten . . 122
Vespa 147; 153
Vespertilio 33; 34
Vespertilionea 33
Vesperūgo 33
Vicognethier 53
Vicunna 53
Vidŭa 69, 17
Viehbreme 169, 35
— vogel 68, 24
Vielfraß 36; 37
— — schnecke . 221, 43; 224, 14
— hufer 26 a u. b.; 46
— räderthierchen . . . 141
— ringler 202, 21; 208
Vierauge . . . 40; 107, 11
— eck 161, 26
— händer 29
— horn 114
— zehige Käfer 126
Viper 92, 11; 93, 11
Vipĕra . . . 92, 11; 93, 11
Virilescenz 60
Vitrīna . 221, 35; 224, 20
Vivērra 36; 37
Viverrīna oder Viverren 26 b; 36
Vogeleidechsen 90
— läuse 186
[illegible]be 200, 22
[illegible]köpfchen [illegible]ndianischer 70
[illegible] indianische
[illegible] 69, 38
[illegible] . . . 198, 5
[illegible] 23; 60
[illegible] 15
[illegible] 32
[illegible] 458
[illegible] 8;
[illegible] 3, 8
[illegible] 3 [illegible]kten
[illegible] 122
— brustring 122
— flügel der Insekten 122
— glieder 11
— kiemendeckel . . . 97

§.

Vorderrand d. Flügel 155
— rand der Muscheln 132 Fig.; 220
— zähne..1 Fig.; 11
Vorkammern.....18
— magen.....62
— stehehund.....37
Vorticella 241, 15; 243, 15
Vorwachs.....154, 30
Vulkanwels.....107, 19
Vultur...30 Fig.; 64, 65
Vulturinae.....64

Wabe.....154, 30
Wabenkröte 95, 1; 96, 1
Wachen.....21, 5
Wachholderdrossel..69, 6
Wachshaut.....60
— schabe.....166, 61
Wachtel.....74
— huhn.....73
— könig.....79
Wadenbein..Fig. 2; 11
— stecher.....172, 19
Waffenfliege.....169, 33; 172, 33
Wagegänge.....140
Waldameise.....153, 19
— huhn.....73
— lindenspanner 163, 45
— maus.....43
— mensch.....31
— roßkäfer....130, 20
— schnepfe.....79, 14
— strauß.....76
— teufel.....[illegible]
— verder[illegible]
Wale.....[illegible]
Walker...[illegible]
Wallfische[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
Walzen[illegible].....142, 85
— fliege...169, 17; 172, 17
— raupen .156, 18
— scheide .221, 128; 227

§.

Walzenspinne...196, 4; 197, 4
— thierchen 241, 16; 243, 16
Wälzer.202, 14; 205, 14
Wandelfüße..25 Fig.; 61
Wanderheuschrecke 181, 2
— ungen.....21 b
— ratte.....43
— taube..21b; 71
Wandlaus.....189, 8
Wangen der Insekten 122
Wanst.....51
Wanzen.....187; 188
Wappenträger...161, 30
Warn-Eidechse 89, 4; 90, 5
Warzenbein..2 Fig.; 11
— beißer....181, 6
— büschelraupe 156, 29
— fische.....112
— fortsätze.....11
— schwein..47; 48
Waschbär.....36; 37
— schwamm.....239
Wasseramsel 68, 7; 69, 7
— assel.....207, 16
— blase....218, 24
— fadenwurm 216, 13
— floh 125 Fig.; 202, 28; 211
— hühner 27 u. 51 Fig. 63 b; 78; 79
— jungfer 175; 176
— käfer 126; 127, 45; 134
— kalb... .216, 13
— kröte.....96, 7
— [illegible]ufer 78; 189, 12
— [illegible]en.....51
— [illegible]..196, 18; 200, 18
— [illegible]84 b; 95, 10
— [illegible]n.....177
— [illegible]he.....176
— [illegible].....79
— [illegible].....43
— [illegible]mander 96, 10
— säcke.....100, 20
— säugethiere.. 26 a
— schlängelchen 215, 9; 216, 9
— schnabelthiere..44

§.

Wasserskorpionwanze 113 Fig.; 188, 13; 190, 13;
— spinne..196, 10; 198, 10
— spitzmans.....37
— springschwanz 185
— staar.....69, 7
— vögel 21 b; 63 a; 77
— waffenfliege 172, 33
— wanzen 188, 11 — 16; 189, 11—16
— würmer.....215
Watbein 21 u. 27 Fig.; 61
— vögel.....78
Weberbock.....142, 84
— knecht..196; 199
— spinne...196, 11; 198, 11
— vogel 21 b; 69, 17
Wechselgeburten.....20
Wegschnecke...221, 131; 224, 12
— wespe....147; 153
Wehrvogel.....78
Weib, das alte....114, 5
Weichflossen 64 Fig.; 97
— flosser....98; 105
— käfer.....127, 17; 129, 17
— thiere 23; 221; 220
Weidenblattlaus 192, 21
— bohrer 12; 161, 28
— furchtkäfer 143; 92
— raupe....161, 28
— spinner..161, 29
— zeisig.....69, 10
Weihrauch, wilder 153, 19
Weinbergsschnecke...20; 224, 13
— vogel.....69, 6
— schwärmer..159, 13
Weiser.....154, 30
Weisheitszähne.....28
Weißbirkenfalter..157, 7
— fische 98b; 106, 3 u. 9; 107, 3
— kehlchen.....69, 10
— lachs.....107, 1
— ling..109, 2; 156, 9
— punktrüsselkäfer 139 69

§.
Weißwürmer 215
Weitmund.....224, 54
Wellhorn 224, 57
Welse 98b; 106, 18; 107, 18
Wendehals 22 Fig.; 66; 67
— ltreppe...221, 33; 224, 34
— zehe..20 Fig.; 61
Werre.....181, 4
Wespe 21 b; 147, 25; 153, 25
Wetterfisch 107, 10
Wickelschleiche 92, 2; 93, 2
— schnecke...221, 68; 224, 58
Wickenstecher.....139, 59
Wickler.....156, 9; 165
Widder 53
— chen 156, 4; 160, 4
— käfer 82 Fig.; 127, 83; 142, 83
Wiedehopf 68, 35; 69, 35
Wiederkäuer 15 u. 16 Fig.; 26a u. b; 51
Wiege.....140
Wiesel.....37
Wiesenknarrer.....79
— mücke 169, 7; 170, 7 u. 8
— schnake....170, 8
Wiesent 53
Wildpret 25
— schur.....25, 3
— schwein.....48
Wimperfischchen. 241, 1; 242, 1
Windhund..37; 224, 41
— spiel 37
— ungen 130 Fig.; 220
Winkelhaken 226, 81
— spinne.....198, 9
Winselaffe .....30 u. 31
Winterkleid 60
— saateule..162, 36
— schlaf 17; 21, 5; 62
— schlaf der Reptilien 83
— spanner..163, 46
— vogel 79, 11
Wippsteert 69, 3
Wirbel.....11
— der Muscheln 131 Fig.; 220
— säule...2 Fig.; 11
— thiere....23; 24

§.
Wirbelthierchen ..241, 5; 242, 5
Wirtelschuppen.....83
Wittling.....108, 2
Wittwe.....69, 17
Wolf 37, 12
— smilchschwärmer 159, 13
Wolle.....25, 3
— haare.....25
— hasen.....43
— schweber....172, 15
Wühlmaus.....42; 43
Würger 36 Fig.; 68, 1; 69, 1
Würmer...23; 214; 215
Wurmmoos.....239
— röhre 215, 6; 216, 6
— schlange....96, 15
— züngler 26b; 44; 45
— (Eidechsen) 84b; 89
Wurzelraupen....156, 20

Xanthidium 189 Fig.; 241, 13; 243, 13
Xenŏpus ...95, 2; 96, 2
Xiphias..99, 12; 100, 12
Xylīna..156, 37; 162, 37
Xylophăga 126; 127; 140
Xylōta..169, 27; 172, 27
Xyrichthys 99, 26; 100, 26

Yponomeuta 156, 60; 166, 60

Zabrus .....1[illegible]
Zahl der Thiere...[illegible]
— der Insekten[illegible]
Zähmung.....[illegible]
Zahnarme od. za[illegible]
Thiere 2[illegible]
— des S[illegible]
— forme[illegible]
— — [illegible]
— — d[illegible]
— — de[illegible] Fig. 16
— — des Hirscheber Fig. 13
— — der Hufeisennase Fig. 9

§.
Zahnformel des Hundes Fig. 10
— — des Pferdes Fig. 14
— schnäbler 63 b; 68; 69, 1
Zähne.....11; 83
— der Fische.....97
Zambo 28
Zangenbock 127, 87; 142, 87
Zapfenraupen ...156, 24
Zauberkraft der Schlangen 91
Zaunkönig 68, 11; 69, 11
Zebra 50
Zebu.....53
Zecke.....200, 23
Zehen des Menschen Fig. 2; 11
— (Tarsen) der Insekten 122
— füßer...202; 203
— gänger 25; 26b; 36
— säugethiere 26a; 27
Zeichenraupen...156, 48
Zeigefinger 11
Zeisig.....69, 17
Zellen der Insektenflügel 86 Fig.; 146
Zellenkoralle...235; 238
Zellgewebe.....12
Zerēne 97 Fig.; 156, 48; 163, 48
Zeugung.....20
Zeus....99, 15; 100, 15
Zibeth 25, 2
Zibethkatze. 37, 19
[illegible]köpfchen 42, 16
[illegible]....36, 19
[illegible]; 52 u. 53
[illegible] Fig.; 69, 40
[illegible] 84
[illegible]
[illegible] 118, 7
Zitterwels 21, 3; 106, 19; 107, 19
Zitzen.....25
— fortsätze.....11
— zähne...12 Fig.; 47

§.

Zobel 37
Zokor 14, 2; 42; 43
Zoocorallia 236
Zoologie 3
Zoophyten 233
Zubr 53, 9
Zuckerameise 153, 19
— gast. 180, 12; 185
Zugheuschrecke 181, 2
Zugvögel 62
Züge der Fische 97
Zügel der Vögel 60
Zunft 8
Zunge 104 Fig.; 14, 3; 24
— — (Fisch) 108, 7; 109, 7

§.

Zunge der Insekten 122 c
— — Reptilien
60 Fig.; 83; 89
Zünsler 156, 8; 164
Zweiflügler 21, 4; 124 b; 168
— händer ..... 26 a; 28
— hufer, Fuß der
16 Fig.; 51
— spitzraupen ... 156, 6
Zwerchfell ... 11; 15; 62
Zwerghirsch 53
— käfer 145
— spitzmaus 37
Zwetschenspanner 163, 47

§.

Zwetschensplintkäfer 140. 76
— — wickler. 165, 56
Zwiebelfliege 172, 24
— made 172, 24
— muschel .. 226, 82
Zwischenkieferknochen
1 Fig.; 11
Zwitter 20
Zwölffingerdarm 16
Zygaena 117; 118; 156, 18; 160, 18
Zygaenidae 156
Zyngis ... 80, 16; 90, 16
Zyperkatze 37, 14

Hofbuchdruckerei der Gebr. Jänecke in Hannover.

Schreib- und Setzfehler.

Seite	2	Zeile	10	von unten	statt	63	lies 62.
„	5	„	25	„ „	„	Bostychus.	„ Bostrychus.
„	6	„	4	„ „	„	Hinterhauptloch .	„ Hinterhauptsloch.
„	8	„	6	„ oben	„	Warzenbein ꝛc...	„ Zitzenfortsatz am Schläfenbeine.
„	13	„	22	„ „	„	bewirkt wird	„ liegt.
„	20	„	16	„ unten	„	Grillen	„ Grillen.
„	28	„	16	„ oben	streiche Leberthran.		
„	36	„	21	„ „	statt	Fig. 11	„ §. 11, Seite 7.
„	47	„	21	„ unten	„	paradŏxus	„ paradŏxus.
„	54	„	9	„ „	„	grönländisches ...	„ grönländischen.
„	57	„	29	„ „	„	Pneumaticität ...	„ Pneumacität.
„	61	„	5	„ oben	„	Luftvögel.....	„ Laufvögel.
„	65	„	3	„ „	„	verhaßte.....	„ verhaßt.
„	58	„	12	„ „			
„	82	„	4 u. 6	„ „	„	Wadbeine.....	„ Watbeine.
„	59	unter den Fig. 21 u. 27					
„	93	Zeile	4	von oben	„	weit hin	„ weit hinter.
„	107	„	32	„ unten	„	Zähnen und.....	„ Zähnen oder.
„	118	„	11	„ oben	„	exilens	„ exilïens.
„	122	„	3 u. 10	„ unten	„	Accipenser.....	„ Acipenser.
„	142	„	1	„ oben	„	Rynchophöra	„ Rhynchophöra.
„	143	„	13	„ „	„	Lathridïus	„ Latridïus.
„	174	„	9	„ unten	„	Noctucacĕa.....	„ Noctuacĕae.

Auf Seite 251 ist die nach der Natur gezeichnete Fig. 153 links gewunden statt rechts gewunden dargestellt.

LANE MEDICAL LIBRARY

To avoid fine, this book should be returned on or before the date last stamped below.


D748 Leunis,J. 43390
L56 Schul-Naturgeschichte
1851 1.T. Zoologie. 2.Aufl.
NAME
DATE DUE